

کنه‌های بدون استیگمای (Astigmata) خاک مزارع یونجه، گزارش دو رکورد جدید از کنه‌های خانواده‌ی *Histiostomatidae* و پراکنش آن‌ها در شمال غرب آذربایجان شرقی

^۱پریسا لطف الهی - ^۲کریم حداد ایرانی نژاد - ^۳محمد باقری - ^۴مصطفی ولیزاده

۸۸/۷/۲۰، بخ د، بافت:

۸۹/۹/۲:

حکیمہ

طی مطالعه‌ی فونستیکی در سال ۱۳۸۵ که به منظور جمع آوری و شناسایی کنه‌های راسته بدون استیگمای مزارع یونجه‌ی نواحی شمال غرب استان آذربایجان شرقی (جلقا، زنوز، پیام، صوفیان، شبستر و مرند) در سه زمان متفاوت (اوخر اردیبهشت، اوخر تیر و اوخر شهریور) و با استفاده از طرح ترتیبی انجام گرفت. تعداد ۱۲ گونه از پنج جنس متعلق به دو خانواده شناسایی گردید. در کل، بیشترین و کمترین تعداد کنه به ترتیب در شبستر و زنوز و بیشترین میانگین تعداد در ارتباط با کل مناطق و زمان‌های نمونه برداری در اوخر تیر به دست آمد. خانواده‌ی Acaridae درصد بیشتری از نمونه‌های شناسایی شده را به خود اختصاص داد. در بین جنس‌های شناسایی شده از این خانواده Tyroborus، Tyrophagus (Rhizoglyphus T. : *Tyrophagus neiswandi* Johneston & Bruce, 1965) و در بین گونه‌های شناسایی شده *Tyrophagus putrescentiae* (Schrank, 1844)؛ *T. longior* (Gervais, 1844)؛ *T. brevicrinatus* Roberston, 1956؛ *similis* Volgin, 1949، *Suidasia nesbiti* Hughes, 1948، *T. palmarum* Oudemans, 1924؛ *T. perniciosus* Zachvatkin, 1941؛ ۱۷۸۱) *Tyrophagus longior* (Gervais) گونه‌ی *Tyroborus lini* Oudemans, 1924، *Rhizoglyphus robini* Claspard, 1969 یک Histiostomatidae بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد. از خانواده‌ی Histiostomata (Gervais, 1844) یک *Histiostoma litorale* (Oudemans, 1914) و *polypori* (Oudemans, 1914) شناسایی گردید که هر دو گونه برای فون کنه‌های ایران جدید هستند و میانگین پراکنش این گونه‌ها نیز در کل اختلاف معنی داری را نشان نداد.

واژه های کلیدی: Histiostomatidae , Astigmata , Acaridae , آذربایجان، یونجه

مقدمة

افراد خانواده‌ی Acaridae پوسیده‌خوار، غله‌خوار، قارچ‌خوار یا گیاه‌خوار بوده و اغلب به مواد انباری خسارت می‌زنند (۳۰). جنس‌های Suidasia، Tyrophagus، Acarus و Tyrophagoidae در تماس انسان با مواد آلوده به آن‌ها ایجاد تورم‌های پوستی می‌کنند. همچنین در صورت استنشام یا تقدیه از مواد آلوده به این کنه‌ها، آلودگی شش‌ها، مجرای تنفسی و ادراری انسان را به دنبال دارد. تعداد خیلی کمی از بدون استیگماهای خاکری از قبیل بعضی گونه‌های جنس‌های Rhizoglyphus و Tyrophagus نیز گیاه‌خوارند. گونه‌های جنس

۱۰- دانشجوی دکتری و استاد گروه گیاهپرشنگی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

(Email: khaddad@tabrizu.ac.ir; نویسنده مسئول: *)

۳- استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

۴- استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

است و گونه‌های زیادی از آن‌ها توسط محققین مختلف از نقاط مختلف ایران گزارش شده است (۱۷). از جمله مطالعاتی که بر روی این گروه از کنه‌ها صورت گرفته است می‌توان مطالعات حاجی‌قبر (۱۱)؛ حاجی‌قبر و همکاران (۱۲) سروش و کمالی (۱۵)؛ احادیث و همکاران (۱)؛ جلالی زند و همکاران (۱۰)؛ بهرامی و همکاران (۹)؛ موسوی و همکاران (۹)؛ برادران و همکاران (۸)؛ اردشیر (۷)؛ منصور قاضی و همکاران (۱۸)؛ سیدی و همکاران (۱۶)؛ اردشیر و همکاران (۶)؛ حداد ایرانی نژاد و همکاران (۱۴)؛ حداد ایرانی نژاد و همکاران (۱۳)؛ اردشیر و نعمت‌الهی (۴)؛ اردشیر و خرمالی (۳) و ارجمندی نژاد و همکاران (۲) را نام برد.

کار حاضر بخش بسیار کوچکی از یک طرح جامع بررسی فون کنه‌ای گیاهان زراعی اصلی و کلیدی منطقه از جمله یونجه، چغدرقند، پنبه، سیب زمینی و غلات است؛ بدیهی است که پایه و اساس انجام هرگونه مطالعه‌ی بیولوژیکی منوط به داشتن اطلاعات پایه‌ای است که در راس آن‌ها مطالعات فونستیکی قرار دارد.

مواد و روش‌ها

به منظور جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های راسته‌ی بدون استیگمای خاک مزارع یونجه‌ی ناحیه‌ی شمال غرب استان آذربایجان شرقی، مناطق جلفا، مرند، زنوز، پیام، صوفیان و شبستر انتخاب گردید. نمونه‌برداری از خاک هر یک از مناطق شش گانه طی فصول زراعی سال ۱۳۸۵ و با استفاده از روش تربیتی انجام شد (۳۲) به این ترتیب که در هر یک از مناطق مورد اشاره تعداد سه مزرعه و از هر مزرعه تعداد سه نمونه و در سه نوبت زمانی اواخر اردیبهشت، اوخر تیر و اوخر شهریور نمونه‌برداری انجام شد. قابل ذکر است که نمونه‌برداری تا عمق حداقل ۲۵ سانتیمتری خاک انجام گرفت. نمونه‌ها به آزمایشگاه کنه‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تبریز منتقل و با استفاده از قیف بریز کنه‌ها جداسازی شدند. کنه‌ها با استفاده از محلول شفاف کننده‌ی لاکتوگلیسرین و نسبیت (۳۰) شفاف‌سازی شدند. سپس طی بررسی‌های روزانه از نمونه‌های شفاف‌شده اسلامیدهای میکروسکوپی دائمی تهیه گردید (۳۰) و پس از ثبت مشخصات با استفاده از منابع مکتوب موجود، منابع اینترنتی و نیز منابعی که از طریق مکاتبه با متخصصین خارجی تهیه می‌شد شناسایی گردیدند و در مواردی نمونه‌های شناسایی شده جهت تأیید به دکتر کازومی تاگامی (از کشور ژاپن) ارسال شدند. تصاویر گونه‌های شناسایی شده با استفاده از لوله‌ی ترسیم، تهیه گردید. در نهایت اطلاعات مرتبط با پراکنش گونه‌ها یا مناطق مورد مطالعه به صورت درصد(یا فراوانی) به کمک نرم افزار Exell تهیه و تفسیر شدند.

معنی‌دار نیست. از مطالعات دیگری که بر روی تراکم جمعیت کنه‌ها صورت گرفته می‌توان بررسی فراوانی و تنوع کنه‌های خاکزی زیستگاه‌های مجزا در نیجریه‌ی جنوبی توسط بادیشو و الا-آدامز (۲۱) و بررسی کنه‌های موجود در مواد آلی، پسماندها و زباله‌ها، اصطبعله، مرغداری‌ها و لانه کبوتر توسط سولاز و همکاران (۳۳) را نام برد. هو و چن (۲۸) گونه‌ی *Rhizoglyphus longispinosus* Ho and Chen را از تایوان توصیف کردند که گیاهان گوش فیل (Colocasia formosana Hayate) و آکاسیاهای غول‌پیکر (*Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott and Endl.) را آلوده می‌کند. فاشینگ و چو (۲۶) رده‌بندی و اکولوژی گونه‌ی جدید *Naiadacarus nepenthicola* Fashing and Chua, 2002 از خانواده‌ی Acaridae را بررسی کردند که اولین گزارش این خانواده از گلهای کوزه‌ای شکل گیاه *Nepenthes* بود. کنه‌های خانواده‌ی Histiostomatidae پراکنش جهانی داشته و عمدها در مواد آلی مرتبط یافت می‌شوند (۲۴). و در تمام مراحل بجز هیپوپوس از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌های داخل مواد نیمه‌آبکی تغذیه می‌کنند. با وجود این گزارش شده است که *Histostoma berghi* و *murchiei* Hughes and Jackson, 1958 به ترتیب از تخم‌های کرم‌های خاکی و زالوها تغذیه می‌کنند؛ بعضی گونه‌های جنس‌های *Myianeotus* و *Histiostoma* آبشورگرا بوده و جلبک‌های محل‌های جزر و مدی یا مرتبط کنار دریا را ترجیح می‌دهند. هیپوپوس‌های آن‌ها بر روی حشرات و سایر بی‌مهرگان یافت می‌شود (۳۰). هیپوپوس و جکسون (۲۹) مروری را بر روی این خانواده انجام داده‌اند. وودربینگ و موسر (۳۷) نر و ماده‌های بالغ و پوره‌ی سن سوم گونه‌ی *Histostoma conjuncta* (Woodring and Moser, 1970) را توصیف کردند که در ارتباط با سخت‌بالپوشان پوست‌خوار کاج در ایالت لویزیانا (آمریکا)، پواتمالا و هندوراس است. *Darlingtonia californica* Torr. یک گیاه گوشت‌خوار در آمریکا است و از جمله بندپایانی که در کوزه‌های پر از مایع آن زندگی می‌کنند کنه‌های *Histiostomatidae* است که یکی از آن‌ها به نام *Sarraceniopus darlingtoniae* Fashing and Oconnor, 1984 می‌باشد که بطور اجباری از رشد میکروبی غنی حاصل از تجزیه‌ی بندپایان شکار شده در کوزه‌های این گیاه *Histostoma* تغذیه می‌کند (۲۵). هالیدی و کلینز (۲۷) گونه‌ی *papillata* را برای اولین بار به فون جهان معرفی کردند. اسیفك و همکاران (۲۰) هیپوپوس دو گونه از کنه‌های خانواده‌ی *Histostoma gracilis* *Histiostomatidae* به نامهای علمی *Histostoma fortis* را از پاکستان جمع‌آوری و شناسایی کردند. در ایران نیز مطالعات زیادی بر روی کنه‌های بی‌استیگمای خانواده‌ی *Acaridae* و *Histiostomatidae* صورت گرفته

شدند که جنس *Tyrophagus* درصد بیشتری از نمونه‌های شناسایی شده را به خود اختصاص داد (شکل ۲):

کلید شناسایی جنس‌های خانواده‌ی **Acaridae** جمع آوری شده از خاک مزارع یونجه‌ی شمال غرب استان آذربایجان شرقی:


- موهای عمودی خارجی (*ve*) نزدیک گوشه‌های جلویی- جانبی صفحه‌ی پشتی پروپودوزومایی و هم ردیف با موهای عمودی داخلی (*vi*) یا کمی عقب تر از آن قراردارند ۲
- موهای *ve* تحلیل رفته یا وجود ندارد و در صورت وجود ازنزدیک قسمت میانی لبه‌های کناری صفحه‌ی پروپودوزومایی بیرون آمدند ۳

نتایج و بحث


از این راسته بیشترین و کمترین تعداد کنه به ترتیب در شبستر و زنوز بدست آمد و اواخر تیرماه در بین زمان‌های نمونه برداری بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. از این راسته در کل دو خانواده‌ی **Histiostomatidae** و **Acaridae**، پنج جنس و ۱۲ گونه شناسایی شد که بیشترین تنوع و فراوانی جنس‌ها و گونه‌های شناسایی شده متعلق به خانواده‌ی **Acaridae** بود (شکل ۱):

خانواده‌ی **Acaridae Ewing and Nesbitt , 1942**

از این خانواده بیشترین تعداد در شبستر و کمترین تعداد از آن‌ها در زنوز بدست آمد و بین زمان‌های سه گانه‌ی نمونه برداری، اواخر تیر بیشترین میانگین را نشان داد. از این خانواده چهار جنس شناسایی



شکل ۱- درصد خانواده‌های تشکیل دهنده‌ی راسته‌ی بدون استیگما در شمال غرب آذربایجان شرقی



شکل ۲- درصد جنس‌های تشکیل دهنده‌ی خانواده‌ی **Acaridae** در شمال غرب آذربایجان شرقی

- طول موی d_2 تقریباً برابر طول la *T. similis*
 ۵- موی فوق پیش رانی پهن و دارای مژک های نسبتاً بلند، ω_1 استوانه ای و بلند *T. putrescentiae*
 - موی فوق پیش رانی پهن نشده، ω_1 کوتاه، ضخیم و با دو طرف موازی ۶
 ۶- سولنیدی ω_1 استوانه ای، در قسمت وسط کمی متورم و *T. palmarum*
 منتهی به یک نوک مشخص
 - سولنیدی ω_1 کوتاه، کلفت، با طرفین موازی و منتهی به یک سر مشخص *T. perniciosus*

جنس *Rhizoglyphus* Claparede, 1869

از این جنس فقط یک گونه به نام *Rhizoglyphus robini* Claspard, 1969 از صوفیان، جلفا، زنوز، پیام، شبستر و مرند جمع آوری گردید که بیشترین درصد آن در جلفا و کمترین درصد در پیام مشاهده شد.

جنس *Suidasia* Oudemans, 1905

از این جنس فقط یک گونه به نام *Suidasia nesbitti* Hughes, 1948 از صوفیان، جلفا، زنوز، شبستر و مرند جمع آوری گردید که بیشترین درصد از آن را شبستر و کمترین درصد را جلفا و زنوز بطور مساوی به خود اختصاص داده بودند.

جنس *Tyrophagus* Oudemans, 1924

از این جنس فقط یک گونه به نام *Tyrophagus lini* Oudemans, 1924 از صوفیان، زنوز، شبستر و مرند جمع آوری گردید که بیشترین درصد را شبستر و کمترین درصد را زنوز به خود اختصاص داده بود.

خانواده *Histiostomatidae*

کنه های این خانواده از صوفیان و مرند در اوخر تیر بدست آمد. از این خانواده دو گونه متعلق به یک جنس شناسایی شد که هر دو برای اولین بار از ایران گزارش می شوند که توضیح آن ها در زیر آورده می شود:

کلید شناسایی افراد بالغ گونه های خانواده *Histiostomatidae*

شمال غرب استان آذربایجان شرقی:
 - در انتهای بدن دارای دو عدد برآمدگی خیلی بزرگ کشیده است که دو عدد از موهای پشتی (f_2 و h_1) بر روی آن قرار

- موی e در سطح پشتی - انتهایی پنجهای پای اول کوتاه و سوزنی شکل، دارای پنج خار انتهایی شکمی در پنجهای اول *Tyrophagus*
 - موی e معمولاً خاری شکل، دارای سه خار شکمی در انتهای پنجهای اول *Tyroborus*
 ۳- کوتیکول بطور طولی رگبندی شده یا با یک الگوی فلس مانند *Suidasia*
 - کوتیکول نرم یا تقریباً نرم و بدون الگوی مشخص *Rhizoglyphus*

جنس *Tyrophagus* Oudemans, 1924

از این جنس در مجموع هفت گونه شامل *Tyrophagus neiswandi* Johneston & Bruce, 1965 (زنوز، صوفیان) (*T. similis* Volgin, 1949؛ شبستر، جلفا، زنوز، مرند، پیام، صوفیان)؛ *T. brevicrinatus* Roberston, 1956 (شبستر، زنوز، مرند، صوفیان)؛ (*T. longior* (Gervais, 1844)؛ *T. putrescentiae* (Schrank, 1781) (شبستر، جلفا، زنوز، مرند، صوفیان)؛ *T. perniciosus* (شبستر، جلفا، زنوز، مرند، پیام، صوفیان)؛ *T. zachvatkini*, 1941 (شبستر، مرند، پیام، صوفیان)؛ و (*T. palmarum* Oudemans, 1924) (شبستر، مرند، پیام، صوفیان)) شناسایی شد که گونه *i* *T. longior* تعداد را به خود اختصاص داد.

کلید شناسایی افراد بالغ گونه های جنس *Tyrophagus* جمع آوری شده از خاک مزارع یونجهای شمال غرب استان آذربایجان شرقی:

- ۱- موی فوق پیش رانی تیغه ای شکل^۱ و دارای دندانه های ریز، موی lp خیلی کوتاه تر از *sai* *T. brevicrinatus*
 - موی فوق پیش رانی شانه ای، موی lp خیلی دراز و تقریباً هم اندازه *sai*
 ۲- موی d_2 کوتاه، اغلب دو برابر طول la
 ۳- موی d_2 همیشه بیشتر از دو برابر طول la
 ۴- دارای یک جفت عدسی رنگی در حاشیهای جلویی - جانبی *T. neiswandi*
 - فقد عدسی رنگی در حاشیهای جلویی جانبی صفحه ای پروپودوزومایی
 ۵- طول موی d_2 تقریباً ۱/۵ برابر طول la *T. longior*

1- Blade like

پاها (شکل ۳: ج-و) : پاها باریک و استوانه ای ، با پنج بند آزاد؛ کوتاکسی بندهای مختلف پاهای اول تا چهارم به قرار زیر است: پنجه: ۱۳-۱۲-۱۱؛ ساق: ۱-۲-۲؛ زانو: ۰-۲-۱؛ ران: ۱-۰-۱؛ سولنیدیوتاکسی بندهای مختلف آنها از جلو به عقب به قرار زیر است: پنجه: ۳-۱-۰؛ ساق: ۱-۱-۰؛ زانو: ۰-۱-۲؛ ران: ۰-۰-۰؛ فاقد فامولوس؛ در پای اول (شکل ۳-ج) : در انتهای پنجه‌ی پانه مو و یک سولنیدی ناخن انتهایی را احاطه کرده اند، موی d در انتهای پنجه دراز و شلاقی شکل، ω_1 چماقی شکل و ضخیم و ω_2 استوانه ای و باریک، سولنیدی ساق (Φ) طویل و مویی شکل، در زانو σ_1 کمی طویل تر از σ_2 و هر دو استوانه ای، در پای اول همه‌ی موها بجز موی d خاری شکل و کوتاه؛ در پای دوم (شکل ۳-د) : موی d نسبتاً طویل و شلاقی شکل ولی کمی کوتاه تر از آن در پای اول، ω_1 چماقی شکل است، σ استوانه ای، در پای دوم همه‌ی موها بجز موی d خاری شکل و کوتاه؛ در پای سوم و چهارم (شکل ۳-ه) سولنیدی ساق (Φ) استوانه ای و بقیه‌ی موها کوتاه و خاری شکل.

پوره‌ی سن دوم (شکل ۴: الف-ز) : بدن گرد، طول آن کمی بیشتر از عرض آن، طول آن برابر ۳۵۹ و عرض آن برابر ۲۷۳ میکرومتر.

پالپوزوما (شکل ۴-ز) : گناتوزووما تحلیل رفته و تبدیل به پالپوزوما شده، سولنیدی های پالپ دو برابر ساب کاپیتولوم طول دارند. سطح پشتی ایدیوزوما (شکل ۴-الف) : پروپودوزوما مثلثی با یک شیار عرضی ضعیف و انتهای میانی پیچ خورده؛ موهای sci و sce کوتاه، هیستروزووما در جلو مخطط، کوتیکول صاف؛ موهای هیستروزوومایی اغلب ریز، بجز h_3 که ضخیم است؛ e_1 و d_1 طویل تر از همه‌ی موها هیستروزوومایی؛ غدد اپیستوزومایی (gla) مابین d_2 و e_2 ، مابین ia و c_1 و c_2 و e_2 و f_2 .

سطح شکمی ایدیوزوما (شکل ۴-ب) : آپودم های اول با یکدیگر ادغام شده و در قسمت پشت محل چسبیدن ساب کاپیتولوم، استرنوم درازی را تشکیل می دهند که در انتهای آزاد است، آپودم های دوم به طرف میانی عقبی کشیده شده اند، آپودم های سوم در وسط ادغام شده، آپودم های چهارم به طرف جلو پیش رفته اند و به آپودم میانی متصل شده؛ منفذ جنسی کوچک و گرد و با دو جفت برآمدگی جنسی، صفحه های بادکشی بزرگ و عریض، نیمه گرد و با حاشیه‌ی شیاردار.

پاها (شکل ۴: ج-و) : همه‌ی پنجه ها منتهی به یک ناخن، با پنج بند آزاد، کوتاکسی بندهای مختلف آنها از جلو به عقب به قرار زیر است: پنجه: (۱)(۶-۵-۴-۳-۲)؛ ساق: (۲)(۲-۳-۵-۴)؛ زانو: ۰-۱-۱-۰-۰-۲؛ ران: ۰-۰-۱-۲-۲؛ طول چهار بند انتهایی در پاها به ترتیب برابر: پای اول ۸۷، پای دوم ۷۱، پای سوم ۵۹، پای چهارم ۶۵ میکرومتر؛ در پای اول (شکل ۴-ج) : طول پنجه برابر طول مجموع سه بند دیگر است،

Histiostoma litorale..... دارند.....
- فاقد خصوصیت ذکر شده در فوق می باشد.

Histiostoma polypori.....
گونه‌های (Oudemans, 1914) و *H. polypori* (Oudemans, 1914) به گروه آپومورفی‌هایی به عنوان تعلق دارد (۳۵). این گروه می‌تواند بر اساس آپومورفی‌هایی به عنوان یک زیرگروه مونوفیلیتیک از Histiotomatidae در نظر گرفته شود، شامل: در افراد بالغ و مراحل غیر بوره‌ی سن دو انگشت ثابت اره مانند و دارای یک تعداد و اشکال خاصی از دندانه‌ها هستند، لبه‌ی غشای *palpar* در انتهای پالپ به دو بخش تقسیم شده است، و در بوره‌ی سن دو آپودم r_2 وجود دارد (۳۶).

***Histiostoma polypori* (Oudemans , 1914) (شکل ۳ و ۴)**

ماده (n=۲) : بدن بیضوی، با برآمدگی های نسبتاً کوچک در قاعده‌ی موها؛ طول ایدیوزوما ۳۲۸ و عرض آن ۱۹۵ میکرومتر. گناتوزووما : کلیسرها (شکل ۳-ز) : بند ثابت با یک زایده‌ی غشایی انگشت مانند باریک در قسمت انتهایی، انگشت متحرک بطوط مشخص دندانه دار و در انتهای کمی پیچ خورده؛ پالپ ها (شکل ۳-۳) : هر پالپ در انتهای دارای یک سولنیدی (ω) و یک یوپاتیدی ("ul") مجاور هم و تقریباً هم اندازه .

سطح پشتی ایدیوزوما (شکل ۳-الف) : صفحه‌ی پروپرسال تا پیش ران پای اول کشیده شده و مشبك است، این نقش و نگار در قسمت جلویی و کناره ها مشخص؛ v_i بلندتر از v_{i+1} کوتیکول پوشیده از ریزمویچه^۱ هایی؛ همه‌ی موها ضخیم و مویی شکل و موهای cp و f_2 از همه‌ی موها بلندتر؛ شیار سجوگال کاملاً مشخص است؛ غدد اپیستوزومایی (gla) رشد کرده و مابین موهای e_1 و d_2 ؛ سوراخ جفت گیری رشدیافته و گلابی شکل.

سطح شکمی ایدیوزوما (شکل ۳-ب) : آپودم های پای اول در میانه به هم متصل شده و V شکل؛ یک جفت اندام حلقه مانند جلویی که خوب اسکلروتینی شده و بیضوی هستند در قسمت جلویی پیش ران سوم قرار داشته و از منفذ جنسی نسبت به حاشیه ها دورترند؛ شیار جنسی عرضی؛ یک جفت اندام حلقه مانند عقبی در عقب تر از شیار جنسی و تقریباً هم سطح با پیش ران های چهارم قرار دارند؛ موهای پیش رانی کوتاه و تقریباً هم اندازه، موی $4a$ در قسمت کناری عقبی اندام های حلقه مانند عقبی و $3a$ در قسمت عقبی کناری داخلی ساختارهای حلقه مانند جلویی و $3b$ در قسمت عقبی کناری موی $3a$ ، موی $1a$ در قسمت میانی پیش ران اول، دارای سه جفت موی کنار مخرجی تقریباً هم اندازه در اطراف شکاف مخرجی طولی.



شکل ۳- مشخصات ریخت‌شناسی کنه‌ی ماده‌ی *H. polyptori* (اصلی)

الف- سطح پشتی ایدیوزوما	ب- سطح شکمی ایدیوزوما	ج- پنجه تا ران پای اول	د- پنجه تا ران پای دوم
ح- پالپ	ز- کلیسر	و- پنجه تا ران پای چهارم	ه- پنجه تا ران پای سوم

اندازه در اطراف شکاف مخرج.

پاها (شکل ۵-ج-و): پاها باریک و استوانه ای، با پنج بند آزاد؛ کتوتاسکی بندهای مختلف آن ها از جلو به عقب به ترتیب : پنجه: ۱۰-۱۱-۱۱-۱۰-۱۰؛ ساق: ۲-۲-۲-۲؛ زانو: ۰-۰-۲-۲؛ ران: ۱-۱-۰-۰؛ سولنیدیوتاسکی بندهای مختلف آن ها از جلو به عقب به قرار زیر است: پنجه: ۱-۳-۰-۰-۰؛ ساق: ۱-۱-۰-۰؛ زانو: ۰-۰-۱-۲؛ فاقد فامولوس؛ در پای اول (شکل ۵-ج): در انتهای پنجه پانه مو و یک سولنیدی ناخن انتهایی را احاطه کرده اند، موی d در انتهای پنجه دراز و شلاقی شکل، ω_1 چماقی شکل و ضخیم، ω_2 چماقی شکل ولی باریک و کوچک، سولنیدی ساق (Φ) طویل و موی شکل، در زانو σ_1 طویل تراز σ_1 و هر دو استوانه ای، در پای اول همهی موها بجز موی d خاری شکل و کوتاه؛ در پای دوم (شکل ۵-د): موی d نسبتاً طویل و شلاقی شکل ولی کوتاه تراز آن در پای اول، ω استوانه ای و به طرف انتهای باریک، σ استوانه ای، در پای دوم همهی موها بجز موی d خاری شکل و کوتاه؛ در پای سوم و چهارم (شکل ۵-ه، و) همهی موها کوتاه و خاری شکل.

این گونه به صورت کنهی مادهی بالغ و شناسایی گردید که برای اولین بار از ایران گزارش می شود و هویت آن به تا بید دکتر تاگامی از ژاپن رسیده است.

بحث

بهورا (۲۳) یک استراتژی دوگانه (bimodal) در رابطه مابین *Forficula auricularia* و گوش خیزک *H. polypori* (Dermoptera) توصیف کرد به این صورت که هیپوپوس این کنه ها "معمولًا متصل به گوش خیزک می ماند تا زمانی که گوش خیزک بمیرد"؛ و سپس در داخل مواد مایع جسد رشد و نمو می کند و به کنه های بالغ تبدیل می شود، اما او همچنین کنه هایی را مشاهده کرد که قادر به استفاده از "سبزیجات تازه فاسد شده و مواد جانوری در دسترس" می باشند. از آنجا که در مزرعه یونجه ای نیز وجود داشت و وجود کنه های گوش خیزک در مزرعه بعید نبود، در نتیجه وجود کنه های گوش خیزک در هر دو حالت، دور از انتظار نیست.

Histiostoma در راسته ای بدون استیگما، میانگین کنه ها از اواخر اردیبهشت تا اوخر تیر افزایش و سپس به همان میزان از اوخر تیر تا اوخر شهریور کاهش یافت، این حالت می تواند ناشی از حساسیت این کنه ها نسبت به تغییرات دما باشد؛ از میان خانواده های شناسایی شده، خانواده ای Acaridae در اوخر تیر بیشترین میانگین تعداد کنه را دارا بود که می تواند بیانگر گرمایش بودن افراد این خانواده باشد.

موی انتهای پنجه قاشقی شکل و ω_3 استوانه ای، ω_1 گرزی شکل، Φ موی شکل و طویل تراز ω_1 و فامولوس (ϵ) و بقیه ای موها خاری شکل و کوتاه؛ در پای دوم (شکل ۴-د): e برگی شکل، ω_2 گرزی شکل و Φ موی شکل و ضخیم و هر دو از نظر طول یکسان و ω_3 استوانه ای و خمیده و بقیه ای موها خاری شکل؛ در پای سوم (شکل ۴-ه): e موی شکل، ω_4 خاری شکل، ω_2 تازه کمانند و Φ موی شکل و طویل تراز بقیه ای موها؛ در پای چهارم (شکل ۴-د): e دراز و شلاق مانند، ω_4 طویل و Φ خاری شکل.

این گونه به صورت کنهی مادهی بالغ و پوره ای سن دو از صوفیان جمع آوری و شناسایی گردید که برای اولین بار از ایران گزارش می شود و هویت آن به تا بید دکتر تاگامی از ژاپن رسیده است.


Histiostoma litorale (Oudemans , 1914)

(شکل ۵)

ماده (n=1): بدن تخم مرغی شکل، با برآمدگی های کوچک و بزرگ زیاد؛ طول ایدیوزوما ۴۰۶ و عرض آن ۲۱۸ میکرومتر. گناتوزوما: کلیسیرها (شکل ۵-ز): بند ثابت با یک زایده ای غشایی انگشت مانند در قسمت انتهایی، انگشت متحرک بطور مشخص دندانه دار؛ دارای یک مو در قسمت پشتی کلیسیر که نسبتاً بلند بوده ولی به انتهای انگشت متحرک نمی رسد. پالپ ها (شکل ۵-ح): هر پالپ در انتهای دارای یک سولنیدی (ω) و یک یوپاتیدی (ul) که به طرف بیرون خمیده شده اند.

ناحیه ای پشتی (شکل ۵-الف): صفحه ای پرودرسال تا پیش ران پای اول کشیده شده و مشبك؛ کوتیکول از ریزمویچه هایی پوشیده شده است؛ همهی موها بر روی برآمدگی هایی قرار دارند که به سمت عقب بدن بزرگتر می شوند؛ همهی موها ضخیم و موی شکل و اندازه ای آن ها به سمت عقب بدن بلندتر می شود؛ شیار سجوگال کاملاً مشخص؛ غدد اپیستوزومایی (gla) رشد کرده و مابین موهای d_2 و d_3 ؛ سوراخ جفت گیری رشدیافته و گلابی شکل.


سطح شکمی ایدیوزوما (شکل ۵-ب): آپودم های جلویی (coxa) در میانه به هم متصل شده و V شکل است، یک جفت اندام حلقه مانند جلویی به شکل گرد، به خوبی اسکلروتینی شده و در کنار پیش ران سوم و اطراف منفذ جنسی قرار دارند؛ دارای یک جفت اندام حلقه مانند عقبی نیز در قسمت کناری عقبی پیش ران سوم؛ موهای پیش رانی کوتاه؛ موی $4a$ در قسمت کناری عقبی اندام های حلقه مانند عقبی و $3a$ در قسمت عقبی داخلی ساختارهای حلقه مانند جلویی و $3b$ در قسمت عقبی کناری موی $3a$ ، موی $1a$ در قسمت کناری جلویی پیش ران اول؛ دارای سه جفت موی کنار مخرجی تقریباً هم



شکل ۴- مشخصات ریخت شناسی پورهی سن دوی *H. polypori* (اصلی)

الف- سطح پشتی ایدیوزوما ب- سطح شکمی ایدیوزوما ج- پنجه تا ران پای اول
 د- پنجه تا ران پای دوم ه- پنجه تا ران پای چهارم ز- پالپوزوما

و- پنجه تا ران پای سوم




شکل ۵- مشخصات ریخت شناسی کنه‌ی ماده‌ی *Histiostoma litorale* (Oudemans , 1914) (اصلی)

الف- سطح شکمی ایدیوزوما ب- سطح پشتی ایدیوزوما ج- پنجه تاران پای اول د- پنجه تاران پای دوم
ه- پنجه تاران پای سوم و- پنجه تاران پای چهارم ز- کلیسر ح- پالپ

است بدین صورت که در کل دما و رطوبت منطقه‌ی مورد مطالعه و زمان نمونه‌برداری تأثیر مستقیم بر روی تعداد و تنوع کنه‌ها داشت. غالبترین گونه در کل *T. longior* بود (شکل ۶).

در مطالعات زیادی واستنگی تراکم و تنوع کنه‌ها به دما و رطوبت ثابت شده است از آن جمله می‌توان مطالعات بدانو و همکاران (۲۲)، توروس و امکی (۳۴) و نیز فتحی پور (۱۳۷۳) و اردشیر (۷) از ایران را نام برد. در مطالعات حاضر نیز اگرچه محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه کوتاه بود ولی نتایج به دست آمده از این مطالعات به خوبی قابل تأیید



شکل ۶- درصد گونه‌های شناسایی شده در شمال غرب آذربایجان شرقی

منابع

- ۱- احديت ع، استوانه، و صبوری ع. ۱۳۸۳. کنه‌های مرتبط با سوسک *Scolytus amygdali* Cuerin-Meneville, 1847 در منطقه‌ی کرج. شانزدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۵۱.
- ۲- ارجمندی نژاد ع... استوانه، رامروdi س، ناروئی راد م، و مدرس نجف آبادی س.س. ۱۳۸۷. بررسی تنوع زیستی کنه‌های خاکری در منطقه‌ی سیستان. هجدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۳ الی ۶ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۸۲.
- ۳- اردشیر ف، و خرمالی س. ۱۳۸۷. مقایسه‌ی فون کنه‌گندم انبار شده در استان گلستان بین دهه‌ی ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰. هجدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۳ الی ۶ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۷۵.
- ۴- اردشیر ف، و نعمت الهی م. ۱۳۸۷. بررسی فون کنه‌های انبار شده و گزارش جدید (Barilo, 1985) در استان اصفهان. هجدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۳ الی ۶ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۷۴.
- ۵- اردشیر ف، یوسفی پرشکوه آ، و صبوری ع. ۱۳۸۵. بررسی جمعیت کنه‌های انباری گندم در استان تهران. هفدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۱۱ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۱۸۸.
- ۶- اردشیر ف، کمالی ه، و رنجی ح. ۱۳۸۷. مقایسه‌ی فون کنه‌های انباری در استان خراسان و آذربایجان غربی. هجدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۳ الی ۶ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۷۳.
- ۷- اردشیر ف. ۱۳۸۳. مطالعه‌ی جمعیت کنه‌های دانه‌های انباری در فصل‌های مختلف در ایران. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور، دانشگاه تبریز، صفحه‌ی ۲۸۲.
- ۸- برادران پ، اربابی م، حسینی نیا س.م، امامی س، و امیر نظری م. ۱۳۸۳. مطالعه‌ی فون کنه‌های گیاهان زینتی در محیط‌های گلخانه‌ای و آزاد. شانزدهمین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه‌ی ۲۶۳.
- ۹- بهرامی ف، کمالی ک، و فتحی پوری. ۱۳۸۳. تنوع گونه‌ای کنه‌های بالاخانواده‌ی Acaroidea در منطقه‌ی تهران. شانزدهمین کنگره‌ی

- گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۲۵۷-۲۵۸.
- ۱۰- جلالی زند ع.، استوان ه.، کمالی ک.، و حاتمی ب. ۱۳۸۳. بررسی فون کنه های نارون در شهر اصفهان. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۲۵۵-۲۵۶.
- ۱۱- حاجی قبیر ح. ۱۳۸۰. جمع آوری و شناسایی فون کنه های مزارع چغندر قند میاندوآب. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ۲۵۷ صفحه.
- ۱۲- حاجی قبیر ح.، حداد ایرانی نژاد ک.، و طالبی چایچی پ. ۱۳۸۱. گزارش کنه های خانواده ای Acaridae از راسته ای بدون استیگمات (Astigmata) مزارع چغندر قند میاندوآب. مجله ای دانش کشاورزی، جلد ۱۲، شماره های ۲، صفحات ۱-۱۰.
- ۱۳- حداد ایرانی نژاد ک. و باقری م. ۱۳۸۶. کنه های راسته ای بدون استیگمات (Astigmata) خاک مزارع و باغات ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان. مجله ای دانش کشاورزی، جلد ۱۷، شماره های ۳، صفحات ۱۶۱-۱۷۴.
- ۱۴- حداد ایرانی نژاد ک.، رهگذر م.، و ولیزاده م. ۱۳۸۶. کنه های راسته ای Astigmata (بی استیگماتیان) و پراکنش آنها در خاک مزارع یونجه های نواحی جنوب غربی استان آذربایجان شرقی. مجله ای دانش کشاورزی، جلد ۱۷، شماره های ۱، صفحات ۱۲۷-۱۳۷.
- ۱۵- سروش م.، و کمالی ک. ۱۳۸۱. بررسی فون کنه های باغ های انار ساوه (استان مرکزی). پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۶ الی ۲۰ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۲۴۴-۲۴۵.
- ۱۶- سیدی م.، صبوری ع.، کمالی ک.، خرازی پاکدل ع.، و ترک م. ۱۳۸۵. فون کنه های محصولات انباری کرج، ایران. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۱ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۱۸۷-۱۹۲.
- ۱۷- کمالی ک.، استوان ه.، و عطامهر ا. ۱۳۸۰. فهرست کنه های (Acari) ایران. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۹۲ صفحه.
- ۱۸- منصور قاضی م.، کمالی ک.، اربابی م.، و خانیزاد ع. ۱۳۸۵. بررسی فون کنه های مزارع توت فرنگی استان کردستان. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۱ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۱۸۱-۱۸۲.
- ۱۹- موسوی س.ح.، استوان ه.، و علیدوست ح. ۱۳۸۳. بررسی فون کنه های مزارع سیب زمینی در شهرستان ارومیه. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۷ الی ۱۱ شهریور ماه ۱۳۷۰، صفحه های ۲۶۳-۲۶۴.
- 20- Asbfaq M., Sarwar M., and Amjad A.W. 2000. Two new mite species (Hypopi) of the genus *Histiostoma* (Acari: Histiostomatidae) from Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 37(1-2).
- 21- Badejo M.A., and Ola-Adams B.A. 2000. Abundance and diversity of soil mites of fragmented habitats in a biosphere reserve in Southern Nigeria. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 35(11): 2121-2128.
- 22- Bedano J.C., Cant M.P., and Doucet E.M. 2005. Abundance of soil mites (Arachnida: Acari) in a natural soil of central Argentina. Zoological Studies, 44(4): 505-512.
- 23- Behura B.K. 1956. The relationship of the tyroglyphid mite, *Histiostoma polypori* (Oud.) with the earwig, *Forficula auricularia*. Journal of the New York Entomological Society, 64:85-94
- 24- Bongers M.G.H., Oconnor B.M., and Lukoschus F.S. 1985. Morphology and ontogeny of Histiostomatid mites (Acari: Astigmata) associated with cattle dung in the Netherlands. Zoologische Verhandelingen, 223: 1-56.
- 25- Fashing N.J. 2004. Biology of *Sarraceniopus darlingtoniae* (Histiostomatidae: Astigmata), an obligatory inhabitant of the fluid-filled pitchers of *Darlingtonia californica* (Sarraceniaceae). Contribution of the 5th EURAAC-Symposium, Berlin, Phytophaga, 14: 299-305.
- 26- Fashing N.J., and Chua T.H. 2002. Systematic and ecology of *Naiadacarus nepenthicola*, a new species of Acaridae (Acari: Astigmata) inhabiting the pitchers of *Nepenthes bicalcarata* Hook. F. in Brunei. International Journal of Acarology, 28(2): 157-167.
- 27- Halliday R.B., and Collins R.O. 2002. *Histiostoma papillata* sp. n. (Acari: Histiostomatidae), a mite attacking fish in Australia. Australian Journal of Entomology, 41, 155-158.
- 28- Ho C.C., and Chen W.H. 2001. A new species of *Rhizoglyphus* Claparede (Acari: Acaridae) from Taiwan infesting the taro and giant alocasia. Plant Protection Bulletin, 43: 47-49.
- 29- Hughes R.D., and Jackson C.G. 1958. A review of the Anoetidae (Acari). Virginia Journal of Science, 9: 5-198.
- 30- Krantz C.W. 1978. A manual of acarology. Oregon State University Book Stores Inc., Oregon State University, U.S.A.
- 31- Lindo Z., and Visser S. 2004. Forest floor microarthropod abundance and oribatid mite (Acari: Oribatida) composition following partial and clear-cut harvesting in the mixedwood boreal forest.

- Canadian Journal of Forest Research, 34: 998-1006.
- 32- Snedecor G.W., and Cochran W.G. 1967. Statistical Methods. Iowa State University Press, USA, 593pp.
- 33- Solarz K., Szilman P., and Szilman E. 1997. Preliminary study on the occurrence and species composition of astigmatic mites (Acari: Astigmata) in samples of dust, debris and residues from farming environment in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 4: 249 -252.
- 34- Toros S., and Emekci M. 1989. *Acarus siro* L. (Acarina: Acaridae) nun degisik sicaklik ve nem ortamlardaki gelismesi üzerinde arastirmalar. Turkiye Entomoloji Dergisi, 13(4): 217-228.
- 35- Wirth S. 2007. Phylogeny and characteristic transformations of the Histiostomatidae. In: Morales-Malacara JB, Behan-Pelletier V, Ueckermann E, Perez T, Estrada-Venegas EG, Badii M (eds) Acarology XI: Proceedings of the International Congress. Instituto de Biologia and Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad Universitaria, Mexico, pp 607–615.
- 36- Wirth S. 2009. Necromenic life style of *Histiostoma polypori* (Acari: Histiostomatidae), Experimental & Applied Acarology,, 49:317–327
- 37- Woodring J.P., and Moser J.C. 1975. Description of *Histiostoma conjuncta* (new comb.) (Acari: Anoetidae), an associate of Central American bark beetles. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 77(1): 83-86.