



## بررسی امکان بیوکنترل باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت آنتاگونیست، در شرایط آزمایشگاه

محمد کاظم متخلبی<sup>۱\*</sup>- حشمت الله رحیمیان<sup>۲</sup>- ماهرخ فلاحتی رستگار<sup>۳</sup>- بهروز جعفر پور<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۸۷/۱۰/۳

تاریخ پذیرش: ۸۹/۱۱/۲

### چکیده

بیماری شانکر باکتریایی مرکبات با عامل *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* یکی از بیماریهای مهم مرکبات در دنیا می باشد. این بیماری بیش از یک دهه است که در منطقه جنوب کشور استقرار یافته و در حال گسترش می باشد. در این تحقیق پتانسیل باکتری های اپی فیت سطح برگ مرکبات به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تعداد ۴۵۳ جدایه از برگهای مرکبات جمع آوری شده از مناطق مختلف هرمزگان، جیرفت و مازندران خالص سازی شدند. سپس اثر بازدارندگی از رشد جدایه های مذکور روی باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات در روی محیط کشت (YNA) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد ۲۶ جدایه توансند از رشد باکتری *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* جلوگیری کنند. جدایه هایی که فعالیت آنتاگونیستی داشتند از نظر خصوصیات فنوتیپی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمونهای واکنش گرم، تولید رنگ فلورسنت، واکنش هیدرولیز ژلاتین، هیدرولیز کاربین و چربی (توئین ۸۰)، تولید لوان و استفاده از منابع کربنی در پنج گروه مجزا قرار گرفتند. چهار گروه از آنها گرم منفی بوده و طبق نتایج بدست آمده و خصوصیات ذکر شده در منابع این گروه ها با باکتری های *P.syringae* و *P.viridiflava* و *P.fluorescens* و *Pseudomonas fluorescens* مشابه داشتند. یک گروه از باکتری ها گرم مثبت و هوازی بوده و تولید اندوسپور نمودند که بر اساس خصوصیات فنوتیپی در جنس *Bacillus* قرار گرفتند.

**واژه های کلیدی:** شانکر باکتریایی مرکبات، *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri*، مبارزه بیولوژیک، باکتری های اپی فیت، آنتاگونیست

### مقدمه

سطح زیر کشت مرکبات در دنیا حدود ۱/۶ میلیون هکتار می باشد و میزان متوسط محصول مرکبات در جهان بالغ بر ۶۷۹۶۷۹۰۰ تن است (۳۰). سطح زیر کشت مرکبات کل کشور حدود ۲۶۸ هزار هکتار برآورد شده است که درصد سطح درختان بارور مرکبات و ۱۲/۹۳ درصد این سطح، نهال بوده و میزان تولید مرکبات کشور حدود ۴/۲۲ میلیون تن می باشد (۱).

بیماری شانکر مرکبات در سال ۱۸۹۹ برای اولین بار در ژاپن بر روی برگهای واشنگتن ناول مشاهده گردید ولی نامی برای آن مشخص نشد (۹). در سال ۱۹۱۴ برگ و همکاران شانکر را به عنوان یک بیماری جدید معرفی کردند (۱۵).

۱-موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

(\*)-نویسنده مسئول: [montakhabii@yahoo.com](mailto:montakhabii@yahoo.com)

۲- استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران

۳- استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

سوسپانسیون بدست آمده روی محیط کشت (Yeast extract Nutrient Agar) پخش شد. برای هر نمونه دو تکرار در نظر گرفته شد. تستک های پتری در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳ تا ۵ روز نگهداری شدند. با توجه به رنگ، اندازه، شکل ظاهری و جمعیت، تک کلنی هایی انتخاب و خالص شدند.

### خالص سازی و نگهداری جدایه ها

برای اطمینان از خلوص باکتری های جدا شده، هر تک کلنی روی محیط کشت NAS (Nutrient Agar Sucros) مختلط گردید. سپس از هر تستک پتری یک کلنی برداشته و به صورت نقطه ای روی محیط NAS مجدد کشت شد. سپس سوسپانسیون نسبتاً کدری از هر جدایه تهیه و در ظروف پلاستیکی دربسته در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری شد.

### بررسی خصوصیت آنتاگونیستی جدایه ها

برای انجام این آزمایش یک جدایه *X. a. pv. citri* پاتوتیپ A یا شانکراسیایی استفاده شد (۲). از کشت ۷۲ تا ۴۸ ساعته جدایه روی محیط کشت NAS، سوسپانسیونی در آب مقطر سترون تهیه و جذب نوری آن در طول موج ۶۰۰ نانومتر نزدیک به  $1/10$  واحد، به طور تقریبی معادل  $1 \times 10^7$  سلول باکتری (cfu)<sup>۱</sup> در میلی لیتر تنظیم گردید. از جدایه های جمع آوری شده نیز به صورت نقطه ای روی محیط کشت NAS کشت و سه روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس سوسپانسیون  $1 \times 10^7$  باکتری در میلی لیتر *X. a. citri* به روی سطح تستک های پتری به طور یکنواخت پاشیده شد و به مدت ۱۵ دقیقه تستک ها با در باز در زیر هود قرار داده شد تا سطح آنها کاملاً خشک شود. تستک های پتری به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا اثرات متقابل دو باکتری بر روی هم ظاهر گردد. این آزمایش در دو تکرار انجام گردید. در مواردی که جدایه ها دارای حالت آنتاگونیستی نسبت به *X. a. citri* pv. بودند، پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت اطراف آنها یک هاله شفاف که نشانه عدم رشد پاتوژن است دیده شد. به این ترتیب جدایه های آنتاگونیست از بقیه مجزا شدند.

### بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی جدایه ها

بر اساس جمعیت تقریبی اولیه باکتری ها بر روی برگ و توانایی آنتاگونیستی آنها علیه عامل بیماری شانکر مرکبات، تعداد ۲۶ جدایه انتخاب و آزمایش های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تغذیه ای بر اساس روش های معمول و استاندارد باکتریولوژی شاد انجام گرفت (۲۲).

1-colony forming unit

### 3. *Xanthomonas alfalfa subsp. citrumelo*

بیماری باکتریائی شانکر مرکبات اولین بار در ایران بر روی لیمو مکزیکی از منطقه کهنوج استان کرمان بوسیله علیزاده و رحیمیان (۷) گزارش شد. وقوع فرم آسیایی شانکر برای اولین بار در ایران توسط مستوفی زاده و رحیمیان (۴) گزارش گردید. مستوفی زاده قلمفرسا (۵) استرین های مختلف شانکر مرکبات در جنوب را بر اساس دامنه میزبانی و خصوصیات فنوتیپی در سه گروه مختلف قرار داد. رحیمیان و همکاران (۲۰) گسترش شانکر را در استان های جنوبی بررسی نموده و گزارش کرده اند این بیماری در اکثر باغات استان هرمزگان، کهنوج و تمدادی از باغات جیرفت و سیستان و بلوچستان وجود دارد و درختان لیموترش به پاتوتیپهای موجود حساسیت بالای داشته ولی ارقام پرتفاقاً، نارنگی و نارنج حساسیت کمتری دارند.

علاوه این بیماری شامل زخم های برآمده و نکروتیک مشخص بر روی برگها، ساقه و میوه می باشد. شدت بیماری باعث ریزش برگها، بد شکلی میوه ها، ریزش پیش از موقع میوه، خشکیدگی سر شاخه ها و ضعف عمومی درخت می شود. البته این بیماری سیستمیک نمی باشد و فقط باعث زخم های موضعی می گردد (۲۳، ۱۵، ۱۴ و ۲۴). با توجه به اهمیت استفاده از استراژی مبارزه بیولوژیک به عنوان یکی از روش های کنترل عوامل بیماری، در این تحقیق، باکتری های اپی فیت و آنتاگونیست از باغات مرکبات مناطق شمالی و جنوبی کشور جدا سازی شده و توانایی آنتاگونیستی آنها جهت استفاده در بیوکنترل بیماری شانکر مرکبات مورد بررسی قرار گرفت.

## مواد و روش ها

### نمونه برداری و جداسازی

در اوایل مهر ماه و اوخر آذر ماه سال ۱۳۸۰ از برگ های مرکبات مناطق جنوب کشور شامل اطراف بندرعباس، میناب، توکهور، چراغ آباد، سر泽ه و شمیل استان هرمزگان و اطراف جیرفت، علی آباد، خیرآباد، کهنوج، منجان، بارگاه، رضآباد و بهارآباد استان کرمان نمونه برداری به عمل آمد. مرحله دوم نمونه برداری در آبان ماه ۱۳۸۰، خرداد و مرداد ماه ۱۳۸۱ از برگ های مرکبات مناطق شمالی کشور شامل باغات اطراف ساری، دامیر، سنتگریزه، فیروز کنده، جوپار، چفت، اطراف قائم شهر، سنگ تاب، کلار پشت، صفرآباد و کیا کلا صورت گرفت. نمونه ها درون پاکت های کاغذی قرار داده شده و به آزمایشگاه حمل گردید و در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری شد. جداسازی باکتری از برگ های مرکبات به روش ساکتی ول و میو (۲۱) با تغییری جزئی انجام شد. از هر نمونه به شکل تصادفی چهار گرم برگ جدا کرده، پس از خرد کردن در ۲۵ میلی لیتر آب مقطر استریل حاوی یک قطره توئین ۲۰ (Tween 20) به مدت نیم ساعت با شیکر دورانی تکان داده شد. سپس یک میلی لیتر از

تشک های پتری پخش شد. پس از ۴۸ ساعت نگهداری تشک های پتری در ۲۵ درجه سانتیگراد، ایجاد هاله بازداری از رشد بررسی شد.

## نتایج و بحث

از نمونه های جمع آوری شده در مهرماه و آبان ماه سال ۱۳۸۰ استانهای هرمزگان و کرمان به ترتیب ۷۵ و ۹۱ استرین بدست آمد. از نمونه های مربوط به شمال کشور ۱۱۵ جدایه در آبانماه ۱۳۸۰ به ترتیب ۷۷ و ۷۹ جدایه در خرداد و مرداد ماه ۱۳۸۱ جدا شد.

### بررسی اثرات آنتاکوئینستی در آزمایشگاه

بعد از گذشت ۲۴ ساعت از کشت باکتری ها، رشد باکتری های پاتوژن در تشک های پتری بررسی گردید و مشاهده شد که در بعضی جدایه ها، دو باکتری هیچ اثری روی هم نداشته و هر یک جدایه به رشد خود ادامه داد (شکل ۱-B). در بعضی از جدایه ها یک هاله مشخص که ناشی از عدم رشد باکتری پاتوژن بود مشاهده شد که قطر آن در جدایه های مختلف متفاوت بود (شکل ۱-A). در مواردی اثرات بازدارندگی به صورت دو هاله مجزا از هم ظاهر شد (شکل ۱-C).

از تعداد کل ۴۵۳ جدایه مورد بررسی تعداد ۹۷ جدایه در اطراف خود ایجاد هاله بازدارندگی از رشد پاتوژن *X. a. pv. citri* نمودند. قطر هاله بازدارندگی رشد از ۲ الی ۱۷ میلی متر در جدایه های مختلف متفاوت بود. نمونه هایی که دارای بازدارندگی ضعیف بوده و یا فراوانی اولیه آنها در سطح برگ کم بود حذف شده و تعداد ۲۶ جدایه برای بررسی های بعدی انتخاب شدند (جدول ۲).

### بررسی خصوصیات فنوتیپی

بر اساس آزمون گرم، ۱۵ جدایه گرم مثبت و ۱۱ جدایه گرم منفی تشخیص داده شد. در آزمون رنگ آمیزی اسپور مشخص شد تمام جدایه های گرم مثبت دارای توانایی تولید اسپور می باشند.

طبق آزمونهای اولیه انجام شده روی ۱۱ جدایه گرم منفی، سه گروه فلورسنت و یک گروه غیر فلورسنت تشخیص داده شد. از آزمونهای فنوتیپی انجام شده بر روی جدایه های هر گروه نتایج زیر بدست آمد.

گروه A شامل باکتریهای گرم منفی، تقریباً میله ای شکل که بر روی محیط کینگ ب (KingB) ایجاد رنگ فلورسنت کرده، هوایی، کاتالاز، اکسیداز، لوان و ژلاتیناز مثبت، اما قادر به احیای نیترات و لهاندن ورقه های سیب زمینی نبودند.

گروه B شامل باکتریهای گرم منفی، میله ای شکل که در محیط کینگ ب ایجاد رنگ فلورسنت کرده، هوایی، کاتالاز و اکسیداز مثبت،

### آزمون بیماریزایی

از کشت تازه جدایه ها سوسپانسیونی با غلظت تقریبی  $10 \times 10^7$  cfu در میلی لیتر تهیه شده و توسط سرنگ به درون پارانشیم برگ گیاه توتوون، شمعدانی و لیمو تزریق شد. همچنین مقداری از کلنی را به طور مستقیم روی برگ قرار داده و سپس با سوزن زخم‌هایی روی سطح برگ ایجاد شد. تعدادی زخم بدون استفاده از کلنی و همچنین تعدادی تزریق با سوسپانسیون پاتوژن در نظر گرفته شد. نتایج تا دو هفته بر روی این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت.

### الکتروفورز پروتئین

الکتروفورز (SDS-PAGE) پروتئینهای محلول سلولی در ژل پلی آکریل آمید ۱۰ درصد در سیستم نایپوسته لملی (laemmli, 1970) انجام شد. سوسپانسیونی از کشت دو روزه استرین ها روی محیط کشت Nutrient Broth (NB) در یک میلی لیتر آب مقطر تهیه و دانسیته نوری (OD) آن در طول موج ۶۳۰ نانومتر برابر با یک تنظیم شد. به نمونه ها بافر تریس حاوی سدیم دودسیل سولفات و مرکاپوتاanol اضافه شد و مدت پنج دقیقه در حمام آب، جوشانده شد. سپس به مدت ده دقیقه در ۴۰۰۰ دور سانتریفیوژ گردید. از پروتئینهای محلول به میزان ۵۰ میکرولیتر از هر استرین روی ژل نایپوسته آکریل آمید حاوی ۱۰٪ آکریل آمید، به درون چاهک ها اضافه شد و الکتروفورز با جریان ثابت ۲۰ میلی آمپر تا رسیدن رنگ پیشرو به انتهای ژل ادامه یافت. سپس ژل در محلول رنگی شامل ۱٪ درصد کومازی بلو در متانول، آب و اسید استیک به نسبت حجمی ۱:۵:۵ به مدت دو ساعت روی شیکر رنگ آمیزی گردید و سپس در همان محلول ولی بدون کومازی بلو تا زمان ظهور ووضوح باندها قرار داده شد. ژل حاصله جهت نگهداری به محلول اسید استیک هفت درصد منتقل و در چهار درجه سانتیگراد جهت بررسی نوارها نگهداری گردید.

### بررسی تولید ترکیبات بازدارنده پاتوژن، توسط سودوموناسهای فلورسنت

این آزمون بر اساس تلفیقی از روشهای گراس و زو (Zo et al., 2002) انجام شد. ابتدا جدایه آنتاکوئینست روی محیط ساکتی ول و میو (King) به صورت لکه ای کشت شدند. پس از ۴۸ ساعت کشت King به صورت لکه ای کشت شدند. ایجاد رنگ فلورسنت کرده، رشد در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، لایه باکتری از سطح محیط پاک و تشک های در مععرض پنج میکرولیتر کلروفرم قرار داده شدند. سپس تشک های پتری بصورت باز به مدت یک ساعت زیر اشعه UV قرار گرفتند. ۱۰٪ میلی لیتر از سوسپانسیون پاتوژن (۱۰٪ سلول باکتری در لیتر) با پنج میلی لیتر از محلول آگار ۷٪ مذاب مخلوط و در سطح

بليکمن (۸) رطوبت تنها عاملی است که رشد و بقا باكتريهای اپی فیت را تحت تاثیر قرار می دهد و وجود آب آزاد یا رطوبت نسبی بیشتر از ۹۵ درصد در سطح برگ، ضروری است. چنین شرایطی عمدتاً در استان مازندران می تواند بطور دائم فراهم باشد. ولی مهمترین علت قابل ذکر برای تغییر فلور باكتريهای اپی فیت و جمعیت آنها طی فصل رشد در استان مازندران، تغییر در محیط شیمیایی سطح برگ می تواند باشد چون در اکثر مواقع رطوبت لازم برای باكتريهای اپی فیت فراهم است. اما از یک طرف با افزایش سن برگ و تغییر در شدت نور، کیفیت و کمیت مواد ترشح شده از برگ تغییر می کند و از طرف دیگر مواد مختلفی که از محیط اطراف در سطح برگ قرار می گیرند، تنوع بیشتری پیدا می کنند. بعلاوه بايد قابلیت متفاوت باكتريهای مختلف در استفاده از مواد غذایی گوناگون را به این دلایل اضافه نمود (۱۸ و ۱۹). ابرین و لیندو (۱۹) معتقدند شدت نور در استقرار و مقاومت باكتری روی گیاه موثر است و این مسئله می تواند دلیل تغییر جمعیت باكتری ها طی فصل رشد باشد.

به منظور شناسایی باكتريهایي آنتاگونیست، استرینهایي جدا شده بر اساس نتایج آزمونهای واکنش گرم، تولید رنگ فلورسنت، واکنش اکسیداز، هیدرولیز ژلاتین، هیدرولیز کازئین و چربی (توئین ۸۰) و تولید لوان به گروه های زیر تقسیم شدند.

گروه A شامل سه جدایه، که خصوصیات آنها در مثبت بودن واکنش اکسیداز، عدم لهاندن ورقه های سیب زمینی، عدم ایجاد فوق حساسیت در توتون، مثبت بودن هیدرولیز ژلاتین، منفی بودن احیا نیترات، منفی بودن هیدرولیز چربی، قابلیت استفاده از ترهالوز، بتا-آلانین، دی- زایلوز، لاکتات، سیترات، ال- تایروزین، بتایین، ال- آرایینز، فنیل آلانین، دی مانوز، دی فروکتوز، سوکروز، دی- الانین، مالونیت، ایتاکونیت، ال- لئوسین و عدم استفاده از والریت، سبکیت، دی تارتاریت در هر سه جدایه مشترک بود ولی جدایه S 7E/Br خلاف دو جدایه دیگر قادر به استفاده از اریتیتول و والریت نبود. این مشخصات در مجموع با خصوصیات ذکر شده در منابع برای باكتری I *P. fluorescens* مطابقت می نماید (۱۲).

گروه B شامل سه جدایه که در خصوصیاتی از قبیل منفی بودن تولید لوان، مثبت بودن اکسیداز، عدم لهاندن ورقه های سیب زمینی، منفی بودن فوق حساسیت در توتون، منفی بودن احیاء نیترات، مثبت بودن هیدرولیز ژلاتین و چربی و قابلیت استفاده از لاکتات، سیترات، ال- آرایینز، ال- تایروزین، دی زایلوز، دی مانوز، دی- فروکتوز، ترهالوز، پروپیونیت، والریت، مالونیت، دی- تارتاریت، فنیل آلانین، ال- لئوسین و عدم استفاده از سوکروز، سوبکیت، ال- تارتاریت، ایتاکونیت، اریتیتول، سوربیتول، گلایسین، دی آلانین و تریپتوفان مشترک بودند که این خصوصیات با مشخصات ذکر شده در منابع برای باكتری V *P. fluorescens* مطابقت دارد ولی این جدایه ها

قادر به هیدرولیز ژلاتین ولی در احیاء نیترات و تولید لوان ناتوان بودند.

گروه C شامل باكتريهای گرم منفی، ميله ای شکل که ايجاد رنگ فلورسنت در محیط كينگ ب می نمایند و هوازی، كاتالاز مثبت، اكسیداز منفی، عدم توانایی در استفاده از نیترات و تولید لوان ولی قادر به هیدرولیز ژلاتین بودند.

گروه D شامل باكتريهای گرم منفی، ميله ای شکل، غير فلورسنت روی محیط كشت كينگ ب، كاتالاز و ژلاتیناز مثبت، اما اكسیداز، لوان و احياء نیترات آنها منفی بودند. سایر خصوصیات در جدول ۱ درج شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده

*P. fluorescens* A به بیووار I از گونه

(Trevisan) Migula

*P. fluorescens* B به بیووار V از گونه

*P. viridiflava* C به گونه

*P. syringae* D به گونه P. syringae بيشترین شاهرت را دارا بودند.

### آزمون بیماریزایی

تمام ۲۶ جدایه آنتاگونیست که از سطح برگهای مرکبات جدا شده بودند، جهت اثبات بیماریزایی مورد بررسی قرار گرفتند. از هر جدایه به طور جدا سوسپانسیون غلیظی با آب مقطر تهیه شده و به وسیله سرنگ به درون بافت پارانشیم برگ لیمو، توتون و شمعدانی تزریق گردید. از بین تمام جدایه ها، سه جدایه در برگ شمعدانی علائم نکروزه تولید نمودند که نشانه توان بیماریزایی این جدایه ها بوده و در ادامه تحقیق این جدایه ها حذف شدند. در گیاهان شاهد که با آب مقطر تزریق شده بودند علائمی ایجاد نگردید.

### بررسی نقوش الکتروفورزی پرتنینها

مشاهده نقوش پروتئینی ایجاد شده سویه های گرم منفی مشخص کرد که این جدایه ها در چهار گروه متمایز قرار می گیرند. این گروهها با وجود تشابه زیاد، اختلاف کمی با هم داشتند. البته این اختلاف ها در داخل هر گروه به حداقل رسیده و سویه های داخل هر گروه غالباً یکسان بودند.

نتایج حاصل از نمونه برداری نشان داد که فلور باكتريایي مرکبات در شمال كشور نسبت به جنوب كشور دارای تنوع بيشتری می باشد. همچنين در شمال كشور، در ماه های آبان و خرداد این تنوع از مردادماه بيشتر است. وجود چنین تغييرات و تفاوتهايی در فلور باكتريهای اپی فيت طبیعی است، چون عوامل مختلف مثل شرایط محیطي، کیفیت و کمیت این باكتريها را تغییر می دهند (۱۹). در این میان، عامل رطوبت شاید مهمترین علت این اختلافات باشد. به عقیده

اثرات آنتا گونیستی جدایه های سودوموناس مشخص شده که همه ایزوله ها غیر از *P.syringae* روی محیط King B (در شرایط فقر آهن) تولید رنگهای فلورسنت می کنند. البته رنگهای فلورسنت مختلف توسط سودوموناسها در محیط های دارای آهن کم تولید می شود. مهمترین آنها Pyoverdin است که در زیر نور مأواه بنشش خصوصاً طول موج ۴۰۰ نانو متر به رنگ سبز فلورسنت دیده می شود که این ترکیبات در گرفتن و انتقال آهن به درون باکتری نقش دارند (عواید ۱۶) و از این طریق می توانند در کنترل بیماریها موثر باشند (۲۷ و ۲۸).

از دیگر مکانیسم های موثر در ایجاد هاله بازداری از رشد، تولید آنتی بیوتیک توسط جدایه های آنتا گونیست می باشد به خصوص در جدایه های گروه D که تولید سیدروفورون می کند این احتمال وجود دارد که با تولید آنتی بیوتیکهایی باعث بازداری از رشد عامل پاتوژن شود. گروه Gross (۱۱) گزارش کرده است که حداقل تولید آنتی بیوتیک توسط *P.syringae* در حضور گلوکز به مقدار یک درصد یا بیشتر صورت می گیرد، در ۵٪ درصد گلوکز، میزان آنتی بیوتیک تولید شده بسیار ناچیز و در غیاب گلوکز، آنتی بیوتیک تولید نخواهد شد. همچنین طبق نظر داگلاس و همکاران (۱۳) گروهی از آنتی بیوتیکهای *P.fluorescens* فقط در غیاب گلوکز و گروهی دیگر فقط در حضور مقادیر نسبتاً زیاد گلوکز تولید می شوند. افزایش غلظت گلوکز در محیط موجب افزایش فعالیت gluconate dehydrogenase می شود، این آنزیم روی *P. syringae* که در بعضی سودوموناسها نقش مهمی در متabolism گلوکز و سنتر آنتی بیوتیکها به عهده دارد، موثر است (۱۲). با توجه به این گزارشات میزان تولید آنتی بیوتیکها با توجه به شرایط محیطی و تغییر فصول و در نتیجه تغییر میزان گلوکز متفاوت می باشد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان توانایی بازدارندگی از رشد را در جدایه هایی مانند گروه D که تولید سیدروفورون می کنند را به تولید آنتی بیوتیک توسط آنها نسبت داد.

در پایان با در نظر گرفتن خسارات سنگین بیماری شانکر مرکبات در سالهایی که شرایط برای طفیان فراهم باشد و همچنین آثار سوء ناشی از صرف سوم شنبایی، می توان از یافته های این تحقیق در استفاده از برخی گونه های اپی فیت سطح برگ مرکبات به عنوان یکی از عوامل مبارزه با بیماری شانکر مرکبات در استراتژی مدیریت کنترل بیمارگر سود برد.

پیشنهاد می شود در ادامه این تحقیق، بررسی هایی در سطح سایر باغات مرکبات مناطق آلوده کشور انجام گیرد و میزان ماندگاری و جمعیت این جدایه ها و امکان موققیت آن در طبیعت مشخص گردد.

برخلاف باکتری *V. P. fluorescens* قادر به استفاده از پروپیونیت نبودند.

گروه C شامل دو جدایه که دارای خصوصیات مشترک مثبت بودن اکسیداز و کاتالاز، منفی بودن تولید لوان و عدم احیا نیترات، عدم استفاده از چربی، مثبت بودن هیدرولیز ژلاتین و استفاده از دی- زایلوز، ال- آرابینوز، سیترات، دی- مانوز، دی- فروکتوز، لاکتات، مالونیت، دی تارتاریت، سوربیتول، اریتیتول، ال- تایروزین، ال- تریپتوفان و عدم استفاده از سوکروز، ال- تارتاریک، ال- لئوسین، والریت، ترهالوز، سبکیت، ایتاکونیت، گلایسین، فنیل آلانین می باشند. این دو استرین دارای برخی خصوصیات متفاوت بودند. جدایه ۸A/S قادر به استفاده از پروپیونیت و بتاپین نبود در صورتی که جدایه ۴A/S قادر به استفاده از این ترکیبات بود و همینطور جدایه ۴A/S قادر به استفاده از دی آلانین نبود ولی جدایه ۸A/S قادر به استفاده از آن بود. با توجه به این خصوصیات و مطابقت آن با منابع، مشخصات این گروه با باکتری *P. viridiflava* بیشترین شباهت را دارد.

گروه D شامل سه جدایه که در منفی بودن لوان، منفی بودن واکنش اکسیداز، ایجاد فوق حساسیت در توتون، عدم احیا نیترات، هیدرولیز ژلاتین و استفاده از دی- زایلوز، ال- آرابینوز، سیترات، دی- مانوز، دی- فروکتوز بتایین، کوین، والریت، مالونیت، دی تارتاریت، ترهالوز، دی- آلانین و عدم استفاده از سوکروز، اریتیتول، ال- لئوسین، ال- تایروزین، ال- تریپتوفان، ترهالوز، سبکیت، ایتاکونیت، گلایسین و فنیل آلانین مشترک بودند.

جدایه ۵C/M برخلاف دو جدایه دیگر قادر به استفاده از سوربیتول و پروپیونیت نبود و همچنین جدایه ۲۹G/A برخلاف دو

جدایه دیگر قادر به استفاده از دی- تارتاریت نبود. با توجه به این خصوصیات و مطابقت آن با منابع این گروه نزدیکترین شباهت را با *P. syringae* van Hall دارند اما در مواردی بین خصوصیات این گروه با باکتری *P. syringae* تفاوت وجود دارد از جمله باکتریهای این گروه قادر به استفاده از ال- تریپتوفان و ال- تایروزین می باشند و قادر به لهاندن ورقه های سبب زمینی بوده که با آنچه در منابع ذکر شده تفاوت دارد.

نتایج آزمایشگاهی نشان داد که قطر هاله بازداری از رشد باکتری عامل شانکر در جدایه های مختلف متفاوت می باشد که بیشترین قطر مربوط به جدایه ۸B/S بوده و جدایه های ۷E/S و ۴A/S به

ترتیب بیشترین قطر بازداری از رشد داشته اند. از مکانیسمهای موثر در ایجاد این هاله بازداری از رشد، تولید رنگهای فلورسنت توسط جدایه های آنتا گونیست می باشد. در بررسی

جدول ۱ - خصوصیات فنوتیپی جدایه های آنتا گونیست جدا شده از برگ های مرکبات


گروه استرینها				آزمون
D	C	B	A	
-	-	-	-	واکنش گرم
-	+	+	+	تولید رنگ فلورست
-	-	+	+	اکسیداز
-	-	-	+	تولید لوان
+	+	+	+	هیدرولیز ژلاتین
+	-	+	-	هیدرولیز توئین ۸۰
-	+	+	+	هیدرولیز کارئین
+	+	+	+	کاتالاز
+	-	-	-	لهانیدن ورقه های سیب زمینی
-	-	-	-	احیاء نیترات
+	-	-	-	فوق حساسیت در توتون
+	+	+	+	تحمل نمک طعام %۳
-	-	+	+	تحمل نمک طعام %۴
-	-	-	-	تحمل نمک طعام %۵
رشد هوایی	رشد هوایی	رشد هوایی	رشد هوایی	رشد هوایی / بی هوایی
-	-	+	+	آرجنین دی هیدرولیز
			+	استفاده از:
+	+	+	+	دی-مانوز
*+	+	-	+	سوربیتول
+	+	+	+	دی-زایلوز
+	+	+	+	دی-فروکتوز
-	-	-	+	سوکروز
-	-	+	+	تر هالوز
-	-	+	+	بتا-آلاین
+	-	+	+	آل-تاپروزین
-	-	-	-	گلاسین
*	+	+	-	دی-تارتاریت
+	-	-	-	آل(+)-تارتاریت
+	+	+	+	سیترات
+	-	+	**+	والریت
*+	**+	-	+	پروپیونیت
+	+	+	+	آل-ارابینوز
-	+	+	+	آل-لئوسین
*+	+	-	+	آل-تریپتوфан
+	**+	+	+	پتائین
+	+	+	+	لакنات
-	-	-	-	سبکیت
+	+	+	+	کوئینیت
-	-	-	+	ایناکوئینیت
+	+	-	**+	اریتربیول
+	**+	-	+	دی-آلاین

جدول ۲- جدایه های آنتاگونیست برگ های مرکبات، جمع آوری شده از استانهای مازندران، کرمان و هرمزگان

شماره	جدایه	استان	شهر/روستا
۱	29B/Z	هرمزگان	شمیل
۲	17G/A	کرمان	توکمehr
۳	48G/A	کرمان	توکمehr
۴	44G/A	کرمان	جهادآباد
۵	29G/A	کرمان	بارگاه
۶	5C/M	مازندران	سبزی باغ
۷	7E/S	مازندران	سنگ تاب
۸	12E/S	مازندران	سنگ تاب
۹	41/PM	مازندران	تلارپشت
۱۰	8A/S	مازندران	ستگریزه
۱۱	5A/S	مازندران	ستگریزه
۱۲	44D/M	مازندران	جوپیار
۱۳	4A/S	مازندران	دامیر
۱۴	49A/S	مازندران	دامیر
۱۵	25H/M	مازندران	کیاکلاز
۱۶	48F/M	مازندران	فیروز کنده
۱۷	8B/S	مازندران	چفت سر
۱۸	17B/S	مازندران	چفت سر
۱۹	19T/M	مازندران	قائم شهر
۲۰	A17a	مازندران	قائم شهر
۲۱	A14a	مازندران	قائم شهر
۲۲	A13a	مازندران	قائم شهر
۲۳	7T/S	مازندران	قائم شهر
۲۴	5S/M	مازندران	ساری
۲۵	13S/M	مازندران	ساری
۲۶	35S/M	مازندران	ساری

شکل ۱- اثر متقابل باکتری *Xanthomonas axonopodis* pv.*citri* با باکتریهای آپی فیت مرکبات

A : حالت بازدارندگی از رشد پاتوژن توسط باکتری آنتاگونیست؛ B : عدم ظهور هاله بازدارندگی از رشد پاتوژن؛ C : ایجاد دو هاله بازدارندگی از رشد پاتوژن



## منابع

- ۱- آمار نامه کشاورزی. ۱۳۸۴. اداره کل آمار و اطلاعات تهران، وزارت کشاورزی، جلد اول، صفحه ۱۰۲.
- ۲- خداکرمان غ. و رحیمیان ح. ۱۳۸۷. خصوصیات فنوتیپی، دامنه میزانی و چگونگی پراکنش استرینهای باکتری *Xanthomonas axonopodidis* عامل شانکر مرکبات جنوب ایران. بیماریهای گیاهی، جلد ۳۵، صفحه ۱۰۹.
- ۳- خوئی س. ۱۳۷۱. اصول تغذیه مرکبات. انتشارات معلم، صفحه ۲۶۶.
- ۴- مستوفی زاده قلمفرسا ر. و رحیمیان ح. ۱۳۷۵. وقوع آلودگی نوع آسیایی شانکر باکتریایی مرکبات در ایران. بیماریهای گیاهی، جلد ۳۲، صفحه ۲۹۰.
- ۵- مستوفی زاده قلمفرسا ر. ۱۳۷۵. بررسی استرینهای عامل شانکر مرکبات در جنوب ایران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. صفحه ۷۶.
- 6- Ahl P., Voisard C., and Defago G. 1986. Iron bound-siderophores, cyanic acid, and antibiotics involved in suppression of *Thielaviopsis basicola* by a *Pseudomonas fluorescens* strain . J. Phytopathology 116: 121-134.
- 7- Alizadeh A., and Rahimian H. 1990. Citrus canker in kerman province. Iran. J.plant Pathol. 26(1-4): 42.
- 8- Blakeman J.P. 1982. Phylloplane interaction. Pages 307-333. In: phytopathogenic Prokaryotes, Vol. 1,M.S. Mount and G. H. Lacy (eds.), Academic Press, New York. 541 pp
- 9- Civerolo E.L. 1981. Citrus bacterial canker disease :An overview . Proc .Int . Soc. Citriculture. 1:390-394.

- 10-Davies F.S., and Alborigo L.G. 1994. Citrus. CABI Press. 254pp.
- 11-Gross D. 1985. Regulation of syringomycin synthesis in *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* and defined conditions for its production. Journal of Applied Bacteriology 58: 167-174.
- 12-Holt J.G., Krieg N.R., Sneath P.H.A., Staley J.T., and Williams S.T. 1994. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology , 9th ed., Williams & Wilkins, Baltimore. 787 pp.
- 13-James DW Jr, Gutterson NI. 1986. Multiple antibiotics produced by *Pseudomonas fluorescens* HV37a and their differential regulation by glucose. Appl Environ Microbiol. Nov;52(5):1183–1189.
- 14-Koizumi M. 1981. Resistance of citrus plants to bacterial canker disease :A review. Proc . Int. Soc . Citric. 1:402-405.
- 15-Koizumi M. 1985. Citrus canker: The world situation . Pages 2-7 in : citrus Canker: An International perspective. Timmer L. W., ed. Gainesville, USA.
- 16-Leong J. 1986. Siderophores :Their biochemistry and possible role in the biocontrol of plant pathogens . Annu. Rev . Phytopathol. 24:187-209.
- 17-Liao C.H. 1989. Antagonism of *Pseudomonas putida* strain pp22 to phytopathogenic bacteria and its potential use as a biocontrol agent. Plant Dis . 73:223-226.
- 18-Morris C.E., and Rouse D.I. 1991. Role of nutrients in regulating epiphytic bacterial population . Pages 63-82. In: Biological Control on the Phylloplane , 3th ed, C. E. Windels and S. E. Lindow (eds.), Am.Phytopathol. Soc .St.Paul, MN. 169 pp.
- 19-O'Brien R.D., and Lindow S.E. 1989. Effect of plant species and environmental conditions on epiphytic population sizes of *Pseudomonas syringae* and other bacteria . Phytopathology 79:619-627.
- 20-Rahimian H., Khodakaramian G., Babaee-zad V., and Zarei A. 1998. Widespread distribution of citrus canker in southern Iran. 13th Iran. Pant protect. Cong. Karaj. 246.
- 21-Sakthivel N ., and Mew T.W. 1991. Efficacy of bacteriocinogenic strains of *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae* on the incidence of bacterial blight disease of (*oryza sativa* L. ). Can . J . Microbiol 37:764-768.
- 22-Schaad N.W. 1988. Laboratory Guide for Identification of Plant pathogenic Bacteria, 2th ed . Am. Phytopathol. Soc, St. Paul, MN. 158 PP.
- 23-Schaad N.W., Postnikova E., Stromberg V.K., Lacy G.H., Stromberg P.E., Vidaver A.K., Sechler A., Agarkova I. 2005. Reclassification of *Xanthomonas campestris* pv. *citri* (ex Hasse 1915) Dye 1978 forms A, B/C/D, and E as *X. smithii* subsp. *citri* (ex Hasse) sp. nov. nom. rev. comb. nov., *X. fuscans* subsp. *aurantifolii* (ex Gabriel 1989) sp. nov. nom. rev. comb. nov., and *X. alfalfae* subsp. *citrumelo* (ex Riker and Jones) Gabriel et al., 1989 sp. nov. nom. rev. comb. nov.; *X. campestris* pv *malvacearum* (ex Smith 1901) Dye 1978 as *X. smithii* subsp. *smithii* nov. comb. nov. nom. nov.; *X. campestris* pv. *alfalfae* (ex Riker and Jones, 1935) Dye 1978 as *X. alfalfae* subsp. *alfalfae* (ex Riker et al., 1935) sp. nov. nom. rev.; and "var. *fuscans*" of *X. campestris* pv. *phaseoli* (ex Smith, 1987) Dye 1978 as *X. fuscans* subsp. *fuscans* sp. nov. *Syst. Appl. Microbiol.*, 2005, 28, 494-518.).
- 24-Schoulties C.L., Civerolo E.L., Miller J.W., Stall R.E., Krass C.J., Poe S.R., and DuCharme E.P. 1987. Citrus canker in Florida.plant Dis. 71:388-355.
- 25-Stall R.E., and Seymour C. 1983. Canker, a threat to citrus in the Gulf-Coast states . Plant Dis.67:581-585.
- 26-Swings J.G., and Civerolo E.L. 1993. *Xanthomonas* . Chapman and Hall. 399pp.
- 27-Vauterin L., Hoste B., Kersters K., and Swings J. 1995. Reclassification of *Xanthomonas* . Int . J. Sys . Bacteriol . 45: 472-489.
- 28-XU G.W., and Gross D.C. 1986. Field evaluations of the interactions among fluorescent pseudomonads, *Erwinia carotovora*, and potato yields. Phytopathology 76:423-430.
- 29-XU G.W., and Gross D.C. 1986. Selection of Fluorescent pseudomonads antagonistic to *Erwinia carotovora* and suppression of potato seed piece decay . Phytopathology 76:414-422.