



## مقاله کوتاه پژوهشی

# اولین گزارش (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (*Aphis punicae* Pass.) در ایران

حسین صادقی نامقی<sup>۱\*</sup> - مجتبی حسینی<sup>۲</sup> - نجیب‌الله جلالی مقدم<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۳/۱۰

## چکیده

در بررسی فون دشمنان طبیعی شته انار (*Aphis punicae* Pas.) در شهرستان کاشمر یک گونه پارازیتوئید داخلی از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شده به نام *Endaphis perfidus* Keiffers ۱۸۹۶ تعبین هویت گردید. گونه‌ی *E. perfidus* یکی از شش گونه‌ی جنس *Endaphis* می‌باشد که تاکنون فقط از روی شته‌ی افرا (Afr.) از کشورهای انگلستان، فرانسه و روسیه گزارش شده بود. وجود این گونه در ایران برای اولین بار گزارش می‌گردد. به علاوه، برای دنیا نیز شته‌ی انار به عنوان دومین میزبان این انگل معرفی می‌شود.

**واژه‌های کلیدی:** انار، پشه‌های گالزا، دشمنان طبیعی، شته‌ها

که شکارگر شته‌ها است، اکثر آنها گیاه خوار و گالزا هستند.

## مقدمه

از میان ۲۰ جنس و ۳۰۰ گونه گوشتخوار و پارازیتوئید در دو بالان خانواده Cecidomyiidae گزارش شده در دنیا تنها تعداد اندکی از *Aphidoletes aphidimyza* (Rondani) آنها به عنوان مثال، *Aphidoletes aphidimyza* (Rondani) در برنامه‌های مبارزه بیولوژیک به ترتیب با شته‌ها و کنه‌های تارتون استفاده می‌شوند (۵). طبق آبه و همکاران (۲)، گونه *Endaphis fugitiva* نیز کاندیدای مناسبی برای کنترل شته‌ی *Pentalonia nigronervosa* Coq. می‌باشد. بر اساس منابع (۴ و ۶)، جنس *Endaphis* در دنیا محدود به ۶ گونه است که هیچیک از آنها تاکنون از ایران گزارش نشده است. براساس مدرس اول (۱) تاکنون تنها ۹ گونه از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جزو فون حشرات ایران ثبت شده است *Aphidoletes aphidimyza* Rondani که با استثنای گونه‌ی *Aphidoletes aphidimyza* Rondani)

مواد و روش‌ها

در نمونه‌های جمع آوری شده از شته‌های انار در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۰ در شهرستان کاشمر برای اولین بار وجود لارو های یک پارازیتوئید داخلی در بدن این شته‌ها مورد توجه نگارندهان قرار گرفت. در نمونه برداری های بعدی از شته‌های انار در همان منطقه تعداد بیشتری لارو و شفیره این پارازیتوئید جمع آوری گردید که با نگهداری آنها در انکوباتور (شرایط ۱۴°C ساعت روشناپی و ۱۰ ساعت تاریکی، دمای ۲۳±۲°C و رطوبت نسبی ۶۰±۵%) تعداد ۷ عدد حشره کامل شامل ۲ عدد نر و ۵ عدد ماده بدست آمد. نمونه‌های حشرات کامل به‌الکل اثانول ۷۵ درصد منتقل و برای مطالعه میکروسکوپی، نمونه‌ها با استفاده از هیدروکسید پتاسیم ۵۰ درصد شفاف شده و سپس در محلول هویر بر روی لام به صورت اسلاید میکروسکوپی دایمی تشییت شدند. شکل اندام‌ها با لوله ترسیم متصل به میکروسکوپ اولیمپوس مدل BH-2 ترسیم گردید. نمونه‌ها با استفاده از کلید شناسایی هاریس (۳) در سطح جنس شناسایی و سپس با ارسال تعدادی از نمونه‌ها برای دکتر آر. جی. گاگنه (آزمایشگاه سیستماتیک

۱- به ترتیب دانشیار و استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، موسسه آموزش عالی جهاد

۳- دانشگاهی شعبه کاشمر  
(Email: Sadeghin@um.ac.ir)  
\*\*- نویسنده مسئول:

دو گره نسبتاً هم اندازه که روی هریک از آن‌ها فقط یک سری رشته‌های حلقوی وجود دارد (شکل ۱-الف). بند‌های شاخک حشره ماده استوانه‌ای و هر بند دارای یک ناحیه گردان مانند قبل از اتصال به بند بعدی بوده و رشته‌های حلقوی روی گره‌ها ساده هستند. هریک از گره‌های هر فلاژلومر مجهر به تعداد زیادی مو بوده که روی توبرکول قرار دارند. بال نسبتاً پهن، رگبال شعاعی یک (R<sub>1</sub>) در نیمه قاعده‌ای به رگبال کناری (C) می‌پیوندد. رگبال شعاعی پنچ (R<sub>5</sub>) تقریباً در نوک بال به رگبال کناری متصل شده است (شکل ۱-ب). اداغوس نر نسبتاً ضخیم و رشد یافته است (شکل ۱-ج).

### سپاسگزاری

بدینوسیله از دکتر آر. جی. گاکنه (آزمایشگاه سیستماتیک حشرات، موسسه علوم گیاهی بلتسویلی امریکا) برای همکاری در شناسایی گونه و دکتر الهیاری (دانشگاه تهران) برای تهیه منابع قدردانی می‌گردد.

حشرات، موسسه علوم گیاهی بلتسویلی امریکا) نام جنس تائید و گونه آن شناسایی شد. در واژه شناسی از گاکنه (۴) پیروی شد.

نمونه‌های مستند (voucher) در گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و تعدادی نیز در مجموعه آزمایشگاه سیستماتیک حشرات موسسه علوم گیاهی بلتسویلی امریکا نگهداری می‌شوند.

### نتایج و بحث

در این بررسی، پارازیتوئید جمع آوری شده از بدن شته انار به نام *Endaphis perfidus* Keiffer 1896 تعیین گردید. وجود جنس و گونه این پارازیتوئید در ایران برای اولین بار گزارش می‌شود. به علاوه شته انار نیز برای اولین بار در دنیا به عنوان میزان این پارازیتوئید گزارش می‌گردد. برخی ویژگی‌های ریخت شناسی آن به شرح زیر می‌باشد.

حشره کامل دارای چه نسبتاً کوچک، طول بال بین ۱ تا ۱/۵ میلیمتر است. پالپ‌ها ۴ بندی است. شاخک ۱۴ بندی (شامل اسکاپ و پدیسل و ۱۲ فلاژلومر)، هریک از فلاژلومرهای شاخک نر دارای



شکل ۱- برخی از ویژگی‌های ریخت شناسی *Entimedaphis perfidus* Keiffer 1896 الف- فلاژلومر سوم شاخک نر  
ب- بال و ج- زنیتالیای حشره نر (شکل‌ها اصلی)

### منابع

- 1- مدرس اول م. ۱۳۷۶. فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آنها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- 2- Abe J., Sato S., and Yukawa J. 2011. Description of two new endoparasitic cecidomyiids (Diptera: Cecidomyiidae) from Japan. Applied Entomology and Zoology, 46: 15-25.
- 3- Harris K.M. 1966. Gall midge genera of economic importance (Diptera: Cecidomyiidae) Part 1: Introduction and subfamily Cecidomyiinae; supertribe Cecidomyiidi. Transaction Royal Entomology Society of London. 118 (10): 313-358.
- 4- Gagne R.J. 1981. Cecidomyiidae. In: Manual of Nearctic Diptera. McAlpine JF, Peterson BV, Shewell GE, Teskey HJ, Vockeroth JR and Wood WM (eds.). Research Branch, Agriculture Canada Monograph no. 27. Canadian Government Publishing Centre, Hull, Vol.1. pp. 257-292.
- 5- Gagne RJ. 2004. A catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the World. Memoirs of the Entomological Society of Washington, 23: 1- 408.
- 6- Muratori F.B., Gagne R.J., and Messing R.H. 2009. Ecological traits of a new aphid parasitoid, *Endaphis fugitiva* (Diptera: Cecidomyiidae), and its potential for biological control of the banana aphid, *Pentalonia nigronervosa* (Hemiptera: Aphididae). Biological Control, 50: 185-193.