



## بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد لوبيا چشم بلبلی در شرایط کاربرد تریفلورالين (*Vigna sinensis L.*)

Abbas Nasirizadeh<sup>۱\*</sup> - Hesam Makarian<sup>۲</sup> - Monzher Qali Pour<sup>۳</sup> - Hamid Abbas Dkhasteh<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

### چکیده

به منظور بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر خصوصیات سبزشدن بذر و رشد لوبيا چشم بلبلی در شرایط کاربرد علفکش خاک مصرف تریفلورالين، دو آزمایش مزرعه‌ای و گلخانه‌ای در سال ۱۳۹۳ در داشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهراه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۱-شاهد (عدم تیمار بذور) - ۲-تریفلورالين با مقدار توصیه شده (۲ لیتر در هکتار) - ۳- امواج فرماصوت (اوپرایمینگ) - ۴- امواج فرماصوت+تریفلورالين با مقدار کاهش یافته - ۵- امواج فرماصوت+تریفلورالين با مقدار توصیه شده - ۶- هیدروپرایمینگ - ۷- هیدروپرایمینگ+تریفلورالين با مقدار کاهش یافته - ۸- هیدروپرایمینگ+تریفلورالين با مقدار افزایش محتواي کلروفیل برگ به میزان ۳۳/۶ درصد نسبت به شاهد گردید. در آزمایش مزرعه‌ای، تیمار امواج فرماصوت باعث افزایش وزن خشک ساقه و برگ به ترتیب به میزان ۲۵/۲۷ و ۳۹/۵۸ درصد نسبت به شاهد شد. در آزمایش گلخانه، کاربرد امواج فرماصوت باعث افزایش کلروفیل برگ به میزان ۳۳/۶ درصد نسبت به شاهد گردید. براساس نتایج این پژوهش، کاشت بذور لوبيا چشم بلبلی پیش تیمار شده با امواج فرماصوت و هیدروپرایمینگ در خاک تیمار شده با تریفلورالين سبب کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور، وزن خشک انعام‌های هوایی و شاخص سطح برگ می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: استقرار اولیه، ترفلان، رشد گیاهچه، رقابت

### مقدمه

اراضی کشاورزی موجب مضلات زیست محیطی عدیدهای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصلخیزی خاک‌ها گردیده است (۴۶). بنابراین هر تلاشی در جهت مدیریت تلقیقی علفهای هرز و جایگزین کردن علفکش‌ها با روش - هایی جدید و بدون عارضه مانند امواج اولتراسونیک و پرایمینگ می‌تواند در تولید محصولات سالم اهمیت زیادی داشته باشد. امواج فرماصوت، امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنها بیش از ۲۰ کیلوهرتز بوده و دارای انرژی بالایی هستند و می‌توانند سبب بالا رفتن دمای بافت‌ها شوند (۲۷). سرخی الله لو (۴۲) افزایش معنی دار سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه همیشه بهار در تیمارهای ۱ و ۴ دقیقه امواج فرماصوت نسبت به شاهد را گزارش داد. یلداگرد و همکاران (۴۵) نیز کاهش ۳۰-۴۵ درصدی در زمان جوانه زنی در بذور جو و افزایش درصد جوانه زنی را پس از تیمار بذور جو با امواج فرماصوت گزارش نموده اند. با توجه به تاثیر مثبت امواج فرماصوت در افزایش سرعت جوانه زنی بذور، به نظر می‌رسد گیاهانی که زودتر سبز می‌شوند با استفاده بهتر از منابع محیطی از وضعیت رشد بهتری برخوردار شده و می‌توانند قابلیت رقابت بیشتری با علفهای هرز داشته باشند.

لوبيا چشم بلبلی با نام علمی *Vigna sinensis L.* با داشتن حدود ۱۲ تا ۳۲ درصد پروتئین، یکی از مهمترین گیاهان خانواده حبوبات به شمار می‌آید که نیمی از سطح زیر کشت حبوبات در ایران را به خود اختصاص داده است (۲۲). علفهای هرز به عنوان یکی از مواد تولید حداکثری عملکرد در لوبيا می‌باشد (۶). براساس آمارهای موجود از تمام مناطق ایران که در آنها لوبيا کاری صورت می‌گیرد در ۹۴ درصد آنها مشکل علف هرز وجود دارد (۸). به هر حال، کنترل علفهای هرز در کشت لوبيا چشم بلبلی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. تاکنون علفکش‌های متعددی از قبیل تریفلورالين، اتال فلورالين، لاسو، کلرتال دی متیل، ای پی تی سی+دی کلرامید، بنتازون و هالوکسی فوب اتوکسی اتیل در ایران برای مهار علفهای هرز لوبيا به ثبت رسیده است. مصرف نهاده‌های شیمیایی از جمله علفکش‌ها در

۱- داشجوی دکتری اگرواکولوژی داشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

(Email: abbasnasiri110@yahoo.com )

۲- دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات داشکده کشاورزی،  
دانشگاه شاهزاد

مورد استفاده توده محلی لوبيا چشم بلبلی بود که از منطقه بسطام شهرستان شاهروд تهیه شد. تعداد ۷ عدد بذر در گلدان هایی با قطر ۲۵ و ارتفاع ۳۰ سانتی متر کاشته شد. برای ایجاد زهکش در ته گلدان سوراخ هایی تعییه و سپس در کف گلدان تا ارتفاع ۲ سانتی متری شن دانه درشت شسته شده ریخته و بقیه حجم گلدان با خاک مزرعه پر شد. بذور مربوط به تیمارهیدرопرایمینگ قبل از کشت به مدت ۷ ساعت در آب خیسانده شد سپس در گلدان های مربوطه کشت گردید. همچنین بذور قبیل از صوت دهی نیز، به مدت ۷ ساعت در آب Digital خیسانده شدند. برای اعمال فراصوت از حمام فراصوت (ultrasonic مدل ۴۸۲۰ CD) با فرکانس ثابت ۲۶ کیلوهرتز به مدت ۶ دقیقه در دمای محیط در آب مقطر، استفاده گردید (۱۳). شمارش بذور جوانه زده در هر گلدان، به صورت روزانه تا ثابت شدن تعداد بذور جوانه زده ادامه پیدا کرد. پس از ثابت شدن تعداد بذور جوانه زده، گیاهچه ها از گلدان خارج شده، تعداد برگ، سطح برگ، طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شد. سپس ریشه چه، ساقه چه و برگ هر گیاه بعد از قرار گرفتن در پاکت های کاغذی به مدت ۴۸ ساعت در آون و در دمای  $70^{\circ}\text{C}$  قرار داده شدند و پس از آن، وزن خشک آنها اندازه گیری شد. محتوای کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل متر (SPAD-502, Konika-Minolta Co) اندازه گیری شد. به این منظور، از خطوط میانی هر کرت، ۳ برگ در موقعیت مشابه بر روی بوته های مختلف انتخاب و میزان کلروفیل ۳ نقطه از هر برگ با استفاده از دستگاه فوق تعیین شد و میانگین این اعداد به عنوان عدد مربوط به آن کرت ثبت شد (۲۱).

درصد سبز شدن (PG) از طریق معادله ۱ به دست آمد (۹).

$$\text{معادله ۱: } \text{PG} = \frac{\text{Nt}}{\text{Ni}} * 100$$

که در آن Ni: تعداد کل بذر های جوانه زده و Nt: تعداد کل بذرها می باشد.

سرعت سبز شدن (RG) از طریق معادله ۲ به دست آمد (۲۹).

$$\text{معادله ۲: } \text{RG} = \frac{\sum \frac{\text{Nt}}{\text{ni}}}{\text{D}_i}$$

ni تعداد بذر سبز شده در روز i و Di تعداد روز پس از شروع آزمایش می باشد.

شاخص بنیه گیاهچه (SVI) نیز با استفاده از معادله ۳ محاسبه گردید (۴).

$$\text{معادله ۳: } \text{SVI} = \frac{(\text{RL} + \text{SL})}{\text{n}}$$

که در آن RL و SL به ترتیب طول ریشه چه و ساقه چه و n تعداد کل بذر سبز شده در روز آخر می باشد.

اندازه گیری محتوی نسبی آب در برگ به روش ریچی و نگویان (۳۷) انجام گرفت. روز قبل از آبیاری نمونه برگ گیاه لوبيا چشم بلبلی در ساعات صبح گرفته شده و بلا فاصله نمونه ها در ظرف حاوی یخ

پرایمینگ بذر نیز از جمله مهم ترین روش های افزایش دهنده قدرت و سرعت جوانهزنی بذر است که می تواند منجر به افزایش قابلیت رقابت گیاه زراعی با علف های هرز شود (۲). پرایمینگ به روش های مختلف بهبود دهنده بذور اطلاق می شود که در تمامی آن ها آبدهی کنترل شده بذر اعمال می شود (۱۲). پژوهش گران با استفاده از این تکنیک، درصد و سرعت جوانه زنی و سبز شدن را در گیاه ذرت افزایش داده اند که در نتیجه این امر پایداری گیاهچه ها و قدرت رقابت آن ها با علف های هرز نیز بیشتر شده و در نهایت عملکرد گیاه زراعی افزایش یافته است (۱). پرایمینگ باعث افزایش آنزیمه های آنتی اکسیدانت از قبیل گلوتاتیون و آسکوربیات در بذر می گردد که این آنزیم ها فعالیت پراکسیداسیون لیپید را در طی جوانهزنی کاهش می دهد و در نتیجه باعث افزایش درصد جوانهزنی می شوند (۳۹) (۷).

از عمدترين علف کش های پیش رویشی مورد استفاده برای کنترل علف های هرز مزارع لوبيا می توان تریفلورالین را نام برد (۸). این علف کش خاک مصرف می باشد که از طریق جلوگیری از تشکیل رشته های دوک در تقسیم میتوز باعث اختلال در تقسیم سلولی و طویل شدن سلول ها و جلوگیری از سبز شدن بذر علف های هرز می گردد. با این وجود، این علف کش می تواند تاثیرات منفی خود را روی سبز شدن گیاهان زراعی حساس نیز نشان دهد که در سویا جلوگیری از رشد بوسیله تری فلورالین با توقف تقسیمات سلولی در بافت های میریستمی گزارش شده است (۴۳).

با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده به نظر می رسد اعمال پرایمینگ و امواج فراصوت از طریق بهبود استقرار گیاهچه نقش موثری در قابلیت رقابت گیاه لوبيا چشم بلبلی با علف های هرز و کاهش مصرف علف کش ها داشته باشد. از طرفی تاثیر کاربرد تریفلورالین در خاک بر بذور پرایم شده و تیمار شده با امواج فراصوت تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تیمار پرایمینگ بذر و امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذر و رشد گیاه لوبيا چشم بلبلی در شرایط کاربرد ترفلان در دو آزمایش گلخانه ای و مزرعه ای انجام گردید.

## مواد و روش ها

آزمایش اول به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط گلخانه در سال ۱۳۹۳ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۱- شاهد (عدم تیمار بذور)- ۲- تریفلورالین با مقدار توصیه شده (۲ لیتر در هکتار)- ۳- تریفلورالین با مقدار کاهش یافته (یک لیتر در هکتار)- ۴- امواج فراصوت- ۵- امواج فراصوت+تریفلورالین با مقدار کاهش یافته- ۶- امواج فراصوت+تریفلورالین با مقدار توصیه شده- ۷- هیدروپرایمینگ- ۸- هیدروپرایمینگ+تریفلورالین با مقدار کاهش یافته- ۹- هیدروپرایمینگ+تریفلورالین با مقدار توصیه شده بودند. بذر

شد. سرانجام برگ‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد در آون قرار گرفت و وزن خشک برگ اندازه‌گیری شد. در نهایت محتوای نسبی آب برگ توسط معادله شماره ۴ محاسبه گردید.

$$= \text{محتوای نسبی آب برگ (درصد)}$$

ساقه و برگ اندازه‌گیری شدند. آنالیز داده‌ها توسط نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگین داده‌ها با روش LSD و در سطح ۵ درصد انجام شد.

## نتایج و بحث

### آزمایش گلخانه‌ای

**درصد و سرعت سبز شدن:** نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش گلخانه‌ای نشان داد که از نظر درصد سبز شدن در سطح ۵ درصد و از نظر سرعت سبز شدن درسطح یک درصد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱).

نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین درصد سبز شدن به میزان ۱۰۰ درصد مربوط به تیمارهای فراصوت، شاهد و علف‌کش کاهش یافته بود که البته از نظر آماری با تیمارهای هیدروپرایمینگ، هیدروپرایمینگ+علف‌کش کاهش یافته و همچنین کاربرد علف‌کش توصیه شده در یک گروه قرار داشتند (جدول ۲). نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف‌کش کاهش یافته در مقایسه با کاربرد علف‌کش کاهش یافته به تهایی به طور معنی‌داری باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن گردید.

کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف‌کش کاهش یافته باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن به ترتیب به میزان ۲۸/۶ و ۳۵/۸۳ درصد نسبت به کاربرد علف‌کش کاهش یافته به تهایی گردید. این در حالی بود که کاربرد ترکیبی پرایمینگ با علف‌کش (کاهش یافته یا توصیه شده) از نظر درصد و سرعت سبز شدن بذور در مقایسه با کاربرد علف‌کش به تهایی تاثیر معنی‌داری نداشت. پرایمینگ سرعت و درصد جوانه زنی را در شرایط غیرپاییم مزرعه بهبود می‌بخشد (۲۳). به دلیل فعالیت بهتر برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت از قبیل گلوتاتیون و آسکوربات در بذور پرایم شده، فعالیت پراکسیداسیون لیپیدها در طی جوانه زنی بذر کاهش یافته (۱۴ و ۲۴)، قابلیت دسترسی به مواد غذایی در طول جوانه زنی در بذرها پرایمینگ شده آسانتر شده، این بذرها بهتر قادر به کامل کردن فرآیند جوانه‌زنی در زمان کوتاه هستند و حتی استرس‌های محیطی مانند شوری را به خوبی تحمل می‌کنند (۲۳). در بررسی تأثیر ریاضی مغناطیس و امواج فراصوت بر جوانه زنی بذور کنگر فرنگی، گزارش شد که میدان مغناطیسی جوانه زنی را به طور معنی‌داری افزایش داد (۱۷).

قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از توزین نمونه‌ها (وزن تازه)، به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر و در دمای ۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد و مجدد وزن برگ (وزن تورژسانس) اندازه‌گیری

معادله ۴

$$\frac{\text{وزن خشک برگ} - \text{وزن تازه برگ}}{\text{وزن خشک برگ} - \text{وزن اشباع برگ}} \times 100$$

آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهزاد (طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۵۷ دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۳۴۵ متر از سطح دریا) اجرا شد. تیمارهای آزمایش مزرعه‌ای دقیقاً مشابه آزمایش گلخانه و شامل ۱- شاهد (عدم تیمار بذور)-۲- تریفلورالین با مقدار توصیه شده (۲ لیتر در هکتار)-۳- تریفلورالین با مقدار کاهش یافته (یک لیتر در هکتار)-۴- امواج فراصوت-۵- امواج فراصوت کاهش یافته-۶- امواج فراصوت+تریفلورالین با مقدار توصیه شده-۷- هیدروپرایمینگ-۸- هیدروپرایمینگ+تریفلورالین با مقدار کاهش یافته-۹- هیدروپرایمینگ+تریفلورالین با مقدار توصیه شده-۱۰- ریدیف ریتماتیک-۱۱- ریدیف ریتماتیک+تریفلورالین با مقدار کاهش یافته در نظر گرفته شد، که یکی به منظور رساندن آب به هر تکرار و دیگری به منظور خروج آب زهکش تکرار بالایی بود. برای هر تیمار در هر کرت، ۴ خط کاشت ۶ متری در نظر گرفته شد. علف‌کش تریفلورالین (ترفلان EC%۴۸) با مقدار توصیه شده (۲ لیتر در هکتار) و کاهش یافته (۱ لیتر در هکتار) در صبح روز کشت (۱۹ خردادماه)، با سم پاش متابی شارژی ساخت اسپانیا و با حجم محلول ۳۰۰ لیتر در هکتار در کرت‌های مربوطه به کار برده شد و بالاصله تا عمق ۱۰ سانتی‌متری با خاک مخلوط گردید. علف‌کش مورد استفاده محصول شرکت گیاه بود. اعمال تیمار آزمایش (هیدروپرایمینگ و فراصوت) دقیقاً مشابه آزمایش گلخانه صورت گرفت. یادداشت برداری‌ها از تعداد بذور سبز شده روی دو خط کاشت وسط به صورت روزانه انجام گرفت. شمارش تا زمان ثابت شدن تعداد بذور سبز شده ادامه یافت. پس از آن درصد و سرعت سبز شدن محاسبه گردید. نمونه برداری اندام هوایی نیز در ۵۵ روز بعد از کشت، با حذف دو خط کاشت کناری به عنوان حاشیه، از دو خط کاشت میانی صورت گرفت. بوته‌ها بالاصله درون کیسه‌های کاغذی قرار داده شد و جهت اندازه‌گیری صفات مختلف به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه اندام‌های برگ و ساقه جدا شد و درون پاکت‌های کاغذی قرار گرفتند و در درون آون با دمای ۷۰°C به مدت ۷۲ ساعت خشک و سپس توزین شدند. به این ترتیب مولفه‌های وزن خشک

جدول ۱- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی تحت تاثیر تغییراتی اعمال شده در شرایط گلخانه  
Table 1- Analysis of variance for investigated traits of cowpea as affected by trial treatments in greenhouse condition

ردیف میانگین مربعات میانگین مربعات میانگین مربعات	متغیر میانگین مربعات	میانگین مربعات میانگین مربعات میانگین مربعات										شاخص بنیه گیاهچه Seedling vigor index
		فرزند سرعت سبز شدن	فرزند مسرعت Emergence percentage	طول ارتفاع Height	طول جذع چه جذع Length of root	کلروفیل Chlorophyll	وزن خشک جذع جذع dry weight	وزن خشک پر جذع dry weight	وزن خشک ساقه چه جذع dry weight	فرزند رشته جذع Root dry weight	تعداد برگ Number of leaf	
بلوك	3	3.213 <sup>ns</sup>	0.122 <sup>ns</sup>	54.917 <sup>ns</sup>	0.63 <sup>ns</sup>	1.788 <sup>ns</sup>	0.002 <sup>ns</sup>	0.001 <sup>ns</sup>	0.001 <sup>ns</sup>	10.074 <sup>ns</sup>	0.051 <sup>ns</sup>	2.024 <sup>ns</sup>
تیمار	8	4.382*	0.911**	6957.52**	158.09**	338.65**	0.081**	0.078**	0.033**	657.132**	7.036**	181.625**
خطا	24	1.65	0.056	48.333	1.609	3.658	0.001	0.002	0.001	8.012	0.057	0.987
Error												
ضریب تغییرات	21.92	21.92	21.74	14.54	3.54	21.95	33	17.25	20.06	19.8	16.3	
C.V (%)												

\*\*\* ترتیب پیاپی معنی داری در مقطع احتمال ۱ و ۵ درصد و عدم وجود تفاوت معنی دار را نشان می دهد.

\*\* and \* significant at 1% and 5% respectively and ns non-significant different

بود. کمترین مقدار کلروفیل برگ (۴۴/۷۵) مربوط به تیمار فراصوت+علف کش توصیه شده بود که البته از نظر آماری با تیمارهای هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده، هیدروپرایمینگ+علف کش کاهش یافته و تیمار شاهد در یک گروه قرار داشتند (جدول ۲). در آزمایش گلدانی مشاهده شده که تیمار امواج فراصوت باعث افزایش محتوای کلروفیل برگ به میزان ۳۳/۶ درصد نسبت به شاهد گردید. در همین راستا مرغایی زاده و همکاران (۳۳) نیز افزایش میزان کلروفیل برگ گیاه زنیان در اثر پرتوهای امواج فراصوت نسبت به شاهد را گزارش دادند. نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی پرایمینگ یا فراصوت با علف کش (اعم از کاهش یافته و توصیه شده) باعث کاهش معنی داری در کلروفیل برگ نسبت به کاربرد علف کش به تنها بی گردید که این کاهش میزان کلروفیل برگ با افزایش مقدار علف کش، به مقدار زیادی تشید یافت. افزایش مقدار علف کش سبب کاهش بیشتر محتوای کلروفیل برگ گردید، به طوری که علف کش توصیه شده (۲ لیتر در هکتار) باعث کاهش محتوای کلروفیل برگ به میزان ۱۱/۴۸ درصد نسبت به علف کش کاهش یافته (۱ لیتر در هکتار) گردید. تریفلورالین با اختلال در رشد ریشه های جانبی، سرعت جابجایی یا جذب سطحی عناصر غذایی ضروری از جمله نیتروژن، فسفات و سولفات را کاهش می دهد و باعث ایجاد عدم تعادل در مواد معدنی گیاه می شود (۳۲). لذا محتوای کلروفیل کمتر حاصل شده در تیمارهای حاوی علف کش بخصوص تیمارهایی که ابتدا بذور آن پرایم شده یا امواج دریافت کرده بودند و سپس در خاک دارای علف کش کش شده بود به دور از انتظار نمی باشد.

**وزن خشک اندام های هوایی گیاه:** نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایش گلدانی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از نظر بینی گیاهچه بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین مقدار صفت بینی گیاهچه مربوط به تیمارهای فراصوت و شاهد بود، البته دو تیمار از نظر تاثیر براین صفت در یک گروه آماری قرار داشتند (جدول ۲). گزارش شده است که با اعمال تیمارهای میدان مغناطیسی و امواج فرماحتوی بر گیاه زنیان، جوانه زنی و ویگور بذور بهبود و عملکرد نهایی تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت (۳۳). نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی بذور فراصوت دیده با علف کش به طور معنی داری شاخص بینی گیاهچه را کاهش داد. به طوری که کاربرد امواج فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش بینی گیاهچه به میزان ۸۸/۶۸ درصد نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها بی گردید. در همین راستا تالبرت (۳۳) نیز گزارش داد که در سویا جلوگیری از رشد بوسیله تریفلورالین با توقف تقسیمات سلولی در بافت های مریستمی و کاهش رشد همراه است.

**کلروفیل برگ (اسپید):** نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایش گلخانه ای نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر کلروفیل برگ بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). بیشترین میزان کلروفیل برگ (۶۸/۹) مربوط به تیمار امواج فراصوت

امواج فراصوت با ایجاد حرارت و تأثیرات مکانیکی روی غشاء سلولی، پوسته بذر را نفوذپذیر کرده و جذب آب راحت تر صورت می گیرد، که در نتیجه جوانه زنی و خروج گیاهچه از پوسته تسهیل می شود (۱۶). فاریابی و همکاران (۱۵) گزارش دادند که درصد و سرعت جوانه زنی بذور فلفل دلمه ای در اثر تیمار ۴ دقیقه فراصوت نسبت به شاهد افزایش یافت. گزارش سکی و همکاران (۴۰) نیز حاکی از اختلاف معنی دار تیمارهای فراصوت با شاهد در گیاه اسطوخودوس از نظر درصد جوانه زنی بود. علف کش خاک مصرف تریفلورالین به زیر واحد های پروتئین توبولین متصل شده و کمپلکس توبولین علف کش مانع پلیمریزه شدن میکروتوبول ها می شود که این امر به نوبه خود باعث اختلال در مرحله متفاوت تقسیم می تسد (۱۹) و در نهایت سبب اختلال در رشد ریشه چه و ساقچه شده و گیاه از بین می رود. می توان گفت بذور در تیمارهای پرایمینگ و فراصوت، هر دو به مدت یکسان در آب خیسانده می شوند، اما بذوری که علاوه بر خیساندن تحت تاثیر امواج فراصوت نیز قرار می گیرند، به دلیل نفوذپذیر شدن پوسته این بذور در مقایسه با بذور پرایم شده و نیز تسريع فرایندهای جوانه زنی (۱ و ۲)، سریعتر در معرض مقادیر بیشتر علف کش قرار گرفته و علف کش با نفوذ سریعتر در این بذور باعث کاهش یا متوقف کردن سبز شدن بذور می گردد. در مجموع نتایج نشان داد پیش تیمار بذور لوپیا چشم بلبلی در شرایط کاربرد تریفلورالین، کاهش درصد و سرعت سبز شدن را به همراه دارد.

**بنیه گیاهچه:** نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایش گلدانی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از نظر بینی گیاهچه بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین مقدار صفت بینی گیاهچه مربوط به تیمارهای فراصوت و شاهد بود، البته دو تیمار از نظر تاثیر براین صفت در یک گروه آماری قرار داشتند (جدول ۲). گزارش شده است که با اعمال تیمارهای میدان مغناطیسی و امواج فرماحتوی بر گیاه زنیان، جوانه زنی و ویگور بذور بهبود و عملکرد نهایی تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت (۳۳). نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی بذور فراصوت دیده با علف کش به طور معنی داری شاخص بینی گیاهچه را کاهش داد. به طوری که کاربرد امواج فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش بینی گیاهچه به میزان ۸۸/۶۸ درصد نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها بی گردید. در همین راستا تالبرت (۳۳) نیز گزارش داد که در سویا جلوگیری از رشد بوسیله تریفلورالین با توقف تقسیمات سلولی در بافت های مریستمی و کاهش رشد همراه است.

**www.SID.ir**

ارتفاع گیاه بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمارهای شاهد و امواج فراصوت بود (جدول ۲). مهدوی و همکاران (۳۰) میدان الکترومغناطیس را بر روی یونجه یکساله مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند این تیمار باعث افزایش طول ساقچه گردید. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد کاربرد تیمار ترکیبی امواج فراصوت+علف کش توصیه شده (دو لیتر در هکتار) باعث کاهش ارتفاع به میزان ۹۰/۱۵ درصد نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید. این کاهش رشد ممکن است ناشی از تاثیر مستقیم تریفلورالین بر روی تقسیم سلولی (۱۱) و جذب و انتقال مواد غذایی باشد (۲۵) که در بذور پرایم شده تشید شده است.

**شاخص سطح برگ (LAI) و تعداد برگ:** نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش گلدانی نشان داد اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از نظر شاخص سطح برگ و تعداد برگ بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). نتایج مقایسه میانگین آزمایش گلدانی نشان داد که بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و بیشترین تعداد برگ مربوط به تیمار امواج فراصوت بود گرچه همانطور که در جدول ۲ مشهود است از نظر معنی داری با تیمار شاهد در یک گروه آماری قرار داشتند. مرغایی زاده و همکاران (۳۳) برتری میانگین نسبت سطح برگ تیمار ۵ دقیقه امواج فراصوت را نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد امواج) در گیاه زنیان گزارش دادند. نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی بذور صوت دهی شده با علف کش (توصیه شده یا کاهش یافته) به طور معنی داری تعداد برگ و شاخص سطح برگ گیاه را در مقایسه با کاربرد امواج فراصوت به تنها ی و یا حتی شاهد کاهش داد.

به طوریکه کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش ۷۹ درصدی تعداد برگ و ۸۹/۶۲ درصدی شاخص سطح برگ نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید. می توان گفت امواج فراصوت با ایجاد حرارت و تأثیرات مکانیکی روی غشاء سلولی، پوسته بذر را نفوذپذیر کرده (۱۶)، که در اثر این فرآیند، تریفلورالین سریعتر و راحت تر جذب این بذور گشته و جوانه زنی را کاهش داده یا متوقف می کند. به علاوه تریفلورالین ممکن است اثر مهار کنندگی مستقیم و غیر مستقیم، بر روی فرآیندهای ضروری برای بزرگ شدن سلول از جمله سنتز پروتئین یا RNA داشته باشد (۳۶).

### آزمایش مزرعه ای

**درصد و سرعت سبز شدن:** نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش مزرعه‌ای نشان داد، اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر درصد و سرعت سبز شدن بین تیمارها وجود داشت (جدول ۳).

داد کاربرد ترکیبی امواج فراصوت با علف کش باعث کاهش معنی داری در وزن خشک برگ گیاه نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید، به طوریکه کاربرد ترکیبی تیمار امواج فراصوت به همراه علف کش کاهش یافته و توصیه شده به ترتیب باعث کاهش ۷۲/۷ و ۸۰/۹۳ درصدی وزن خشک برگ گیاه نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید. بررسی ها نشان می دهد که مکانیسم عمل تریفلورالین، مهار تقسیم سلولی و طویل شدن سلول ها در ناحیه مریستمی ریشه می باشد. کاهش تقسیم سلولی باعث کاهش رشد ریشه و به دنبال آن موجب کاهش رشد اندام های هوایی در اثر کاهش جذب مواد غذایی می شود (۲۵). به نظر می رسد استفاده از امواج فراصوت و هیدروپرایمینگ بذور با تسريع جوانه زنی و سبز شدن بذور و همچنین افزایش طول ریشه چه باعث می شود که گیاه از منابع غنی ابتدای فصل استفاده بیشتری کرده و در نتیجه بیوماس گیاهی را افزایش دهد. از طرفی طویل شدن طول ریشه چه، گیاه را در معرض علف کش بیشتر قرار داده و در نتیجه زیست توده گیاهچه در تیمارهای دارای علف کش همراه با بذور پرایم شده کاهش می یابد.

**طول و وزن خشک ریشه چه:** نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش گلخانه‌ای نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از نظر طول و وزن خشک ریشه چه بین تیمارها وجود داشت (جدول ۱). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین طول ریشه چه و بیشترین وزن خشک ریشه چه مربوط به تیمار امواج فراصوت بود، گرچه از نظر آماری با تیمار شاهد در یک گروه قرار داشتند (جدول ۲). عباس زاده و همکاران (۳) در تحقیقی بر روی بذور گیاه شنبلیله نشان دادند که میدان مغناطیسی باعث افزایش طول ریشه چه نسبت به شاهد گردید. اما در آزمایش حاضر تیمار ترکیبی امواج اولتراسونیک به همراه علف کش باعث کاهش معنی داری در طول و وزن خشک ریشه چه نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی و همچنین شاهد گردید. کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف کش توصیه شده (۲ لیتر در هکتار) باعث کاهش وزن خشک ریشه چه نسبت به تیمارهای فراصوت و شاهد به ترتیب به میزان ۶۵/۲۵ و ۶۱/۲۳ درصد گردید. همچنین کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش طول ریشه چه نسبت به تیمارهای امواج فراصوت و شاهد به ترتیب به میزان ۷۳/۴ و ۷۳/۷ درصد گردید. در راستای نتایج این پژوهش، گزارش شده است که تیمار تریفلورالین باعث مهار طویل شدگی ریشه در گیاهچه های گندم و ذرت می شود (۲۶). لذا به نظر می رسد تاثیر این علف کش روی گیاهان پرایم شده و امواج دیده تشید شده و کاهش معنی دار طول و وزن ریشه چه را به همراه داشته است.

**ارتفاع گیاه:** نتایج تجزیه واریانس داده‌های حاصل از آزمایش گلدانی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد از نظر

Table 2- Mean comparison plant parameters in greenhouse experiment affected by trial treatments

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to least significance difference (LSD) test.

T1: Control T2: Ultrasonic waves T3: Ultrasonic waves + recommended herbicide dose T4: Ultrasonic waves + reduced herbicide dose T5: Hydro-priming + recommended herbicide dose T7: Hydro-priming + reduced herbicide dose T8: Reduced herbicide dose T9: Recommended herbicide dose.

جدول ۳- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی لوبیا چشم بلبلی تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده در شرایط مزرعه  
Table 3- Analysis of variance for investigated traits of cowpea as affected by trial treatments in field condition

منبع تغییر Source of variation	درجه آزادی Degrees of freedom	درصد سبزشدن Emergence percentage	سرعت سبزشدن Rate of emergence	محتوای نسبی Relative water content	وزن خشک برگ Leaf dry weight	وزن خشک ساقه Stem dry weight	ارتفاع Height	میانگین مربuat
					کلروفیل Leaf chlorophyll	آب برگ Ae bract		
بلوک Block	3	2.14 <sup>ns</sup>	0.221 <sup>ns</sup>	422.764*	16.712 <sup>ns</sup>	1.094 <sup>ns</sup>	0.313*	5.88 <sup>ns</sup>
تیمار Treatment	8	64.008**	13.34**	464.485**	54.259*	1.313*	0.64**	70.236**
خطا Error	24	6.873	1.356	95.326	19.799	0.402	0.08	17.421
ضریب تغییرات C.V (%)		30.71	33.25	29.6	6.64	24.87	17.02	13.17

\*\* و \* به ترتیب بیانگر معنی داری در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد و عدم وجود تفاوت معنی دار را نشان می دهد.

\*\* and \* significant at 1% and 5% respectively and ns non-significant different

آماری با تیمارهای هیدروپرایمینگ و شاهد در یک گروه قرار داشت. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش ۵۵/۸۵ درصدی کلروفیل برگ نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنهایی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۵۶/۹۳ درصدی محتوای کلروفیل برگ نسبت به کاربرد تیمار هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید (جدول ۴).

**محتوای رطوبت نسبی برگ:** نتایج تجزیه واریانس مربوط نسبت به تیمار شاهد، پرایمینگ و فراصوت به تنهایی و علف کش کاهش یافته به تنهایی، کاهش یافت. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب به میزان ۶۴/۸۳ و ۵۶/۱۳ درصد نسبت به کاربرد علف کش کاهش یافته به تنهایی گردید. همچنین، ترکیب تیماری پرایمینگ+علف کش کاهش یافته باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب به میزان ۵۰/۴ و ۵۳/۸ درصد نسبت به کاربرد علف کش کاهش یافته به تنهایی گردید. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۷۸ درصدی درصد سبز شدن و ۸۰/۸۷ درصدی سرعت سبز شدن بذور نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنهایی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۴۴/۷۷ درصدی سبز شدن و ۵۴/۳۳ درصدی سرعت سبز شدن نسبت به تیمار هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید.

**کلروفیل برگ (AePd):** نتایج تجزیه واریانس مربوط نسبت به تیمار شاهد داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ک درصد از نظر کلروفیل برگ بین تیمارها وجود داشت (جدول ۳). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد در آزمایش مزرعه‌ای بیشترین درصد و سرعت سبز شدن مربوط به تیمار شاهد بود که البته از نظر آماری با تیمارهای فراصوت، هیدروپرایمینگ و کاربرد علف کش کاهش یافته به تنهایی، در یک گروه آماری قرار داشت (جدول ۴). نتایج نشان داد که درصد و سرعت سبز شدن بذور تیمار شده با امواج فراصوت و کاشت شده در شرایط کاربرد علف کش کاهش یافته و توصیه شده بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، پرایمینگ و فراصوت به تنهایی و علف کش کاهش یافته به تنهایی، کاهش یافت. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش کاهش یافته باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب به میزان ۶۴/۸۳ و ۵۶/۱۳ درصد نسبت به کاربرد علف کش کاهش یافته به تنهایی گردید. همچنین، ترکیب تیماری پرایمینگ+علف کش کاهش یافته باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب به میزان ۵۰/۴ و ۵۳/۸ درصد نسبت به کاربرد علف کش کاهش یافته به تنهایی گردید. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۷۸ درصدی درصد سبز شدن و ۸۰/۸۷ درصدی سرعت سبز شدن بذور نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنهایی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۴۴/۷۷ درصدی سبز شدن و ۵۴/۳۳ درصدی سرعت سبز شدن نسبت به تیمار کلروفیل برگ (۴۸/۳۵) مربوط به تیمار فراصوت بود که البته از نظر

علف کش توصیه شده به تنها ی گردید. این در حالی بود که کاربرد ترکیبی این پیش تیمارها با مقدار کاهش یافته (۱ لیتر در هکتار) در مقایسه با کاربرد علف کش کاهش یافته به تنها ی تفاوت معنی داری نداشت. این نتیجه را می توان به اثر گذاری بیشتر علف کش در غلظت های بالاتر در بذور پیش تیمار شده نسبت داد. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۵۲/۸ درصدی وزن خشک ساقه نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۴۴/۳۷ درصدی وزن خشک ساقه نسبت به کاربرد تیمار هیدروپرایمینگ به تنها ی گردید. بیشترین وزن خشک برگ (۳/۵۱) گرم در بوته) مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بود که البته با تیمار فراصوت (۳/۳ گرم در بوته) از نظر معنی داری در یک گروه قرار داشت. تیمار فراصوت و پرایمینگ باعث افزایش وزن خشک برگ به ترتیب به میزان ۳۹/۵۸ و ۳۱/۲۴ درصد نسبت به شاهد گردیدند. سرخی الله لو (۴۲) افزایش معنی دار وزن خشک گیاهچه همیشه بهار را در تیمارهای ۱ و ۴ دقیقه امواج فراصوت نسبت به شاهد گزارش داد. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۴۹/۵۷ درصدی وزن خشک برگ نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنها ی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۳۳ درصدی وزن خشک برگ نسبت به کاربرد تیمار هیدروپرایمینگ به تنها ی گردید.

علف کش بیشتری قرار گرفته و در مراحل بعدی رشد طول ریشه چه کاهش بیشتری نشان دهد و دسترسی آن به رطوبت خاک کاهش یابد.

**وزن خشک اندامهای هوایی گیاه:** نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایش مزرعه ای نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر وزن خشک اندامهای هوایی گیاه بین تیمارها وجود دارد (جدول ۳). نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین وزن خشک ساقه (۲/۳۸ گرم در بوته) مربوط به تیمار فراصوت بود گرچه با تیمار هیدروپرایمینگ (۲/۰۵ گرم در بوته) در یک گروه آماری قرار داشت. کمترین مقدار وزن خشک ساقه (۱/۱۲ گرم در بوته) مربوط به تیمار فراصوت+علف کش توصیه شده (دو لیتر در هکتار) بود که از نظر آماری با تیمارهای هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده و هیدروپرایمینگ+علف کش کاهش یافته در یک گروه قرار داشتند (جدول ۴). تیمار فراصوت و پرایمینگ باعث افزایش وزن خشک ساقه به ترتیب به میزان ۲۵/۲۷ و ۱۳ درصد نسبت به شاهد گردید. در همین راستا عبادی قهرمانی و همکاران (۱۳) افزایش وزن خشک ساقه گیاه لو بیا چشم بلبلی در اثر اعمال تیمار ترکیب فراصوت در مقایسه با شاهد را گزارش دادند. ترکیب تیماری فراصوت+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۳۵ درصدی وزن خشک ساقه نسبت به کاربرد علف کش توصیه شده به تنها ی گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف کش توصیه شده باعث کاهش ۳۴/۲۴ درصدی وزن خشک ساقه نسبت به کاربرد تیمار

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده در شرایط مزرعه  
Table 4- Mean comparison plant parameters in field experiment affected by trial treatments

تیمارها Treatments	درصد سبز شدن Emergence percentage (%)	سرعت سبز شدن Rate of emergence (seed /day)	کلروفیل Leaf chlorophyll (spad)	محتوای نسبی آب برگ Relative water content (%)	وزن خشک برگ Leaf dry weight (g/plant)	وزن خشک ساقه Stem dry weight (g/plant)	ارتفاع Height (cm)
T1	100 <sup>a</sup>	6.137 <sup>a</sup>	44.61 <sup>a</sup>	74.7 <sup>a</sup>	2.417 <sup>c</sup>	1.784 <sup>bc</sup>	29.75 <sup>bc</sup>
T2	89.28 <sup>ab</sup>	5.243 <sup>ab</sup>	48.35 <sup>a</sup>	69.06 <sup>abc</sup>	3.432 <sup>ab</sup>	2.387 <sup>a</sup>	37.5 <sup>a</sup>
T3	30.35 <sup>d</sup>	1.563 <sup>d</sup>	21.35 <sup>bc</sup>	65.4 <sup>bc</sup>	2.211 <sup>c</sup>	1.569 <sup>c</sup>	29.5 <sup>bc</sup>
T4	19.64 <sup>d</sup>	1.003 <sup>d</sup>	27.85 <sup>bc</sup>	70.15 <sup>ab</sup>	1.731 <sup>c</sup>	1.127 <sup>d</sup>	28.5 <sup>bc</sup>
T5	74.35 <sup>ab</sup>	4.62 <sup>ab</sup>	44.67 <sup>a</sup>	66.1 <sup>bc</sup>	3.515 <sup>a</sup>	2.051 <sup>ab</sup>	39 <sup>a</sup>
T6	42.85 <sup>cd</sup>	2.267 <sup>cd</sup>	30.07 <sup>bc</sup>	64.56 <sup>bc</sup>	2.308 <sup>c</sup>	1.533 <sup>cd</sup>	28.5 <sup>bc</sup>
T7	41.07 <sup>cd</sup>	2.11 <sup>cd</sup>	19.24 <sup>c</sup>	62.72 <sup>c</sup>	2.354 <sup>c</sup>	1.141 <sup>d</sup>	28 <sup>c</sup>
T8	64.85 <sup>bc</sup>	3.673 <sup>bc</sup>	25.45 <sup>bc</sup>	64.32 <sup>bc</sup>	2.421 <sup>c</sup>	1.735 <sup>bc</sup>	34.5 <sup>ab</sup>
T9	86.28 <sup>ab</sup>	4.903 <sup>ab</sup>	35.24 <sup>ab</sup>	66.56 <sup>bc</sup>	2.562 <sup>bc</sup>	1.662 <sup>bc</sup>	30 <sup>bc</sup>
LSD value	27.31	1.69	14.25	6.49	0.92	0.41	6.09

در هر ستون میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون LSD در سطح ۵ درصد دارای تفاوت معنی داری نمی باشند.

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to least significance difference (LSD) test.

T2: اولتراسونیک T3: اولتراسونیک+علف کش توصیه شده T5: پرایمینگ T6: پرایمینگ+علف کش کاهش یافته T7: شاهد T1: پرایمینگ+علف کش توصیه شده T9: علف کش توصیه شده T8: علف کش توصیه شده T4: اولتراسونیک+علف کش کاهش یافته T1: Control T2: Ultrasonic waves T3: Ultrasonic waves + reduced herbicide dose T4: Ultrasonic waves + recommended herbicide dose T5: Hydro-priming T6: Hydro-priming + reduced herbicide dose T7: Hydro-priming + recommended herbicide dose T8: Recommended herbicide dose T9: Reduced herbicide dose.

ارتفاع و بطور کلی زیست توده هوایی گیاه لوبیا چشم بلبلی شود. البته تاثیر مثبت امواج فرا صوت بر صفات مختلف لوبیا چشم بلبلی بیشتر از اثر هیدروپرایمینگ بود. نتایج این پژوهش نشان داد چنانچه بذور هیدروپرایم شده و امواج دیده در خاک حاوی تریفلورولین کشت شوند، درصد و سرعت سبز شدن، محتوای کلروفیل و شاخص سطح برگ آن نسبت به عدم پیش تیمار بذور و کاربرد علف کش به تهایی کاهش معنی داری پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد بذور تابش دیده و پرایم شده که فعالیت های آنزیمی را برای جوانه زنی آغاز نموده اند وقتی که در خاک کشت می شوند با سرعت بیشتر و زمان کوتاه تری علف کش تریفلورالین را دریافت کرده و علف کش بلا فاصله روی فرایندهای جوانه زنی تاثیر گذاشته و جوانه زنی را متوقف یا کاهش می دهد، در حالیکه بذور پرایم شده و یا تابش ندیده موانعی از قبیل پوسته و پوشش های جینی دارند که بر سر راه علف کش قرار می - گیرد و جذب و انتقال علف کش را به درون بذر کاهش داده یا به تاخیر می اندازد. از طرفی به نظر می رسد تاخیر در شروع فرایندهای متابولیکی دخیل در جوانه زنی در بذور تیمار نشده (۲) سبب می شود که بذر در معرض مقادیر کمتر علف کش قرار گیرد و تاثیر سوء آن را بر این بذور کاهش دهد. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط عدم کاربرد علف کش خاک مصرف تریفلورالین، پیش تیمار بذری با امواج فرا صوت یا هیدروپرایمینگ در بهبود رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی موثر می باشد، اما پیش تیمار بذری در شرایط کاربرد این علف کش سبب کاهش درصد و سرعت سبز شدن و متعاقباً کاهش رشد و تولید زیست توده در گیاه لوبیا چشم بلبلی می شود.

**ارتفاع گیاه:** نتایج تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش مزرعه ای نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح یک درصد از نظر ارتفاع گیاه بین تیمارها وجود داشت (جدول ۳). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بود که از نظر آماری با تیمارهای امواج فرا صوت و علف کش توصیه شده در یک گروه قرار داشتند. تیمار امواج فرا صوت و پرایمینگ باعث افزایش ارتفاع گیاه به ترتیب به میزان ۷۰/۲ و ۷۳/۷ درصد نسبت به شاهد گردیدند (جدول ۴). افضل و همکاران (۵) نیز گزارش دادند بین پیش تیمارهای بذری هیدروپرایمینگ،  $\text{CaCl}_2$ ، آسکوربیات و سرماده هی، تیمار با نمک و همکاران در افزایش رشد طولی ریشه و ساقه گندم در تنش شوری بودند. عبادی قهرمانی و همکاران (۱۲) گزارش دادند تیمار بذور لوبیا چشم بلبلی با امواج فرا صوت به مدت ۸ دقیقه باعث افزایش ارتفاع گیاه به میزان ۵/۲۲ درصد نسبت به شاهد گردید. همچنین نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی تیمارهای امواج فرا صوت و هیدروپرایمینگ با علف کش توصیه شده به ترتیب باعث کاهش ۲۶ و ۲۱/۲۸ درصدی ارتفاع گیاه نسبت به کاربرد این تیمارها به تهایی گردید.

### نتیجه گیری کلی

بر اساس نتایج این آزمایش، هیدروپرایمینگ بذر و کاربرد امواج فرا صوت از طریق افزایش سرعت فرایندهای موثر در جوانه زنی و سرعت سبز شدن بذور لوبیا چشم بلبلی و بهره برداری زودتر گیاهچه ها از منابع غنی در ابتدای فصل می تواند باعث بهبود سرعت رشد گیاهچه، افزایش محتوای کلروفیل و رطوبت نسبی برگ، افزایش

### منابع

- 1- Abbasdokht H., and Edalatpisheh M.R. 2012. Effect of seed priming and different levels of urea on yield and yield component of two corn (*Zea mays L.*) hybrids. Iranian Journal of Crop Science, 3: 381-389. (In Persian).
- 2- Abbasdokht H. Makarian H., Ahmadi Sharaf H., Gholami A., and Rahimi M. 2012. The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (*Zea mayz L.*). Journal Weed Research, 4: 63-76. (In Persian).
- 3- Abbaszadeh F., Khakestari D., and Naker F. 2011. The Effect of magnetic field on seed germination in fenugreek (*Trigonella foenum L.*). Paper Abstracts of the 2nd Conference on Seeds. Mashhad: Ferdowsi University, pp. 768-775.
- 4- Abdul-baki A. A., and Anderson J. D. 1970. Viability and leaching of sugars from germinating barely. Crop Science, 10: 31-34.
- 5- Afzal I., Basra S.A.M., Hamid A., and Farooq M. 2006. Phisiological enhancements for alleviation of salt stress in wheat. Pakistan Journal, 38: 1649-1659.
- 6- Amini R., and Fateh E. 2011. Effect of redroot pigweed (*Amaranthus retroflexus L.*) on growth indices and yield of red kidney bean (*Phaseolus vulgaris L.*) cultivars. Journal of Sustainable Agriculture And Production Science, 2:113-129. (in Persian).
- 7- Ansari O. and Sharif-Zadeh F. 2012. Osmo and hydro priming improvement germination characteristics and enzyme activity of Mountain Rye (*Secale montanum*) seeds under drought stress. Journal of Stress Physiology and

- Biochemistry, 8(4):253-261.
- 8- Bagheri A., Zand A., and Parsa M. 1998. Beans, the bottlenecks and strategies of jihad Mashhad University Press. (in Persian).
- 9- Belcher E. W., and Miller L. 1974. Influence of substrate moisture level on the germination of sweetgun and pine seed. Proceeding of the Association of Official Seed Analysis, 65:88-89.
- 10- Caseiro R., Bennett M.A., and Marcos-Filho J. 2004. Comparison of three priming techniques for onion seed lots differing in initial seed quality. Seed Science Technology, 32:365-375.
- 11- Duke S.O. 1990. Overview of herbicide. Mechanisms of Action. Environ. Health Perspect, 87:263-271.
- 12- Duman I. 2006. Effect of seed priming with PE Gant K3PO4 on germination and seedling growth in Lettuce. Pakistan Journal of Biology Science, 9(5): 923-928.
- 13- Ebadi Sh., Gholipoor M., and Gholami A. 2013. The effect of ultrasonic waves and nitroxin biological fertilizer on growth, yield and yield components of cowpea (*Vigna sinensis*). Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment, (in Persian).
- 14- Farooq M., Basra S.M.A., Warraich E.A., and Khalid A. 2006. Optimization of hydropriming techniques for rice seed invigoration. Seed Science Technology, 34:529-534.
- 15- Faryabi A., Zaremansh H., Keshvarei M., and Abdali N. 2008. The effect of ultrasonic waves on physiologic and morphologic processes of seed germination in capsicum pepper (*Capsicum annuum*) and radish (*Raphanus sativus*). The 1st National Conference on Iranian Seed Science and Technology, Gorgan.
- 16- Gavrilov L.R., Tsirulnikov E.M., and Davies H. 1996. Application of focused for the stimulation of neural structures Ultrasound in Medicine and Biology, 22(2):179-192.
- 17- Ghasemi-Rad P., Mehravar A., Hosseini M., Mansouri M., and Bygry M. 2011. The effect of magnetic attraction and ultrasonic waves on seed germination in artichoke (*Cynara scolymus* L.). The 2nd National Conference on Iranian Seed Science and Technology. Mashhad: Islamic Azad University, pp. 79-83.
- 18- Gholipour M. and Mohammadi Y. 2008. Evaluating the effect of wheat germination on magnetic field. Paper Abstracts of the 1st National Conference on Iranian Seed Science and Technology, Gorgan.
- 19- Hess D. and Bayer D. 1974. The effect of trifluralin on the ultrastructure of dividing cells of the root meristems of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) (Acala 4-42). Journal Cell Science, 15:429-441.
- 20- Hassanien R. H. E., HOU T. Z., LI Y. F. and LI B. M. 2014. Advances in effects of sound waves on plants. Journal of Integrative Agriculture, 13(2):335-348.
- 21- Jalilian A., Ghobadi R., and Farnia, A. 2011. Response of some photosynthesis system traits and leaf relative water content of corn [SC704] on different amounts of nitrogen fertilizer in different irrigation regimens. 5th National Conference on New Ideas in Agriculture. 16 and 17 February, Isfahan. (in Persian).
- 22- K. poshtmasari H., Pirdashti H., and Bahmanyar M.A. 2007. Comparison of mineral and biophosphate fertilizer effects on agronomical characteristics in two faba bean (*Vicia faba* L.) cultivars. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 4: 1-9.
- 23- Kant S., Pahuja S.S., and Pannu R.K. 2006. Effect of seed priming on growth and phenology of wheat under late-sown conditions. Tropical Science, 44: 9-15.
- 24- Kaur S., Gupta A.K., and Kaur N. 2005. Seed priming increase crop yield possibly by modulating enzymes of sucrose metabolism in chickpea. Journal of Agronomy and Crop Science, 191: 81-87.
- 25- Kust CA. and Struckmeyer BE. 1971. Effects of trifluralin on growth, nodulation, and anatomy of soybeans . Weed Science, 19:147-152.
- 26- Lignowski EM., and Scott EG. 1971. Trifluralin and root growth. Plant and Cell Physiology, 12 (5): 701-708.
- 27- Lipiec J., Janas P., and Barabasz W. 2004. Effect of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms. International Agrophysics, 18(4): 325-328.
- 28- Liu J., Liu G. S., Qi D. M., Li F. F., Wang E. H. 2002. Effect of PEG on germination and active oxygen metabolism in wild rye (*Leymus chinensis*) seeds. Acta Pratacult Sin, 11(1): 59-64.
- 29- Maguire J.D. 1962. Speed of germination in selection and evolution for seeding vigor. Crop Science, 2: 176-177.
- 30- Mahdavi B., Modares-Sanavi A.M., and Balochi H.R., 2008. The effect of electromagnetic fields on germination and primary growth in the seeds of annual alfalfa (*Medicago sativa* L.), barley (*Hordeum vulgare* L.), dodder (*Cuscuta* sp.), and barnyard grass (*Echinochloa crus-galli* L.). Iranian Journal Biology, 21(3): 433-442.
- 31- Maleki-Farahani S. and Fahiminejad H. 2011. The effect of seed germination in common caraway (*Carum carvi* L.) and cumin (*Cuminum cyminum* L.) before treatment with ultrasonic sources. Paper Abstracts of the 2nd Conference on Seeds. Pp: 258-261.
- 32- Marenc RA., and Lopes NF. 1994. Leaf chlorophyll concentration and nitrogen content in soybean plants treated with herbicide. Departamento de Biologia Vegetal, Universidade Federal de Viçosa, 6(1):7-13.
- 33- Marghaeizadeh Gh., Gharineh M.H., Fathi Gh. Abdali A.R. and Farbod M. 2012. Effect of ultrasound waves and magnetic field on germination, growth and yield of *Carum copticum* (L.) C. B. Clarke in lab and field conditions. 12 th Iranian Crop Sciences Congress. 1-4. (in Persian).

- 34- Mirshekari, B., Farahvash, F., Siyami, R., Hosseinzadeh Moghboli, A., Sotudeh Khiabani, A., 2013. Ultrasonic irradiation could increase germination and seedling vigor of common yarrow (*Achillea millefolium*), as a medicinal plant. Life Science Journal, 10(5s): 302-305.
- 35- Morejohn L. C., Bureau T. E., Mole- Bajer J., Bajer A. S., and Fosker D. E. 1987. Oryzalin, a dinitroaniline herbicides bins to plant tubulin and inhibits microtubule polymerization in vitro. *Planta*, 172: 252-264.
- 36- Nooden L.D. and Thimann K.V. 1963. Evidence for a requirement for protein synthesis for auxin-induced cell enlargement. *Botany Science*, 50: 194-200.
- 37- Ritchie S. W. and Nguyen H. T. 1990. Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. *Crop Science*, 30: 105-111.
- 38- Ross, M. A., Lembi, C. A., 1999. Applied Weed Science, 2<sup>nd</sup> Edition. Prentice Hall Inc., New Jersey. 452 pp.
- 39- Rouhi H.R., Aboutalebian M.A., Moosavi S.A., Karimi F.A., Karimi F., Saman M. and Samadi M. 2012. Change in several antioxidant enzymes activity of Berseem clover (*Trifolium alexandrinum* L.) by priming. *International Journal of Agriculture Science*, 2 (3): 237-243.
- 40- Saki T., Nasiri M., Abdali N., and Alinia-Fard S. 2009. The Effect of ultrasonic waves on germination percentage and rate in lavender (*Lavandula stoechas* L.) medicinal plant. Tehran: The Scientific Conference on Industrial Development of Medicinal Plants in Iran.
- 41- Shimomura S. 1990. The effects of ultrasonic irradiation on sprouting radish seed. *Ultrasonic Symposium Proceedings*, 3:1665-1667.
- 42- Sorkhy Ialelo F. 2009. Evaluate the effect of ultrasound waves and magnetic field on seeds germination in Marygold (*Calendula officinalis*). 6th Iranian Horticultural Science Congress, 1161-1165. (in Persian).
- 43- Talbert R. E. 1965. Effects of trifluralin on soybean root development. Proc. 18<sup>th</sup> Southern Weed Control Conference. p. 652.
- 44- Wang, A., Kopachik, W., 1995. Effects of trifluralin on growth and differentiation of the amoeba-flagellate *Naegleria*. *FEMS Microbiology*, 127:99-103.
- 45- Yaldagard M., Mortazavi S.A., and Tabatabaie T. 2008. Application of ultrasonic waves as a priming technique for accelerating and enhancing the germination of barely seed: optimization of method by the Taguchi approach,The Institute of Brewing & Distilling.
- 46- Zand E., Baghestani M. A., Bitarafan M., and Shimi P. 2007. Guide of Herbicides In Iran & Management of Weed Resistance to Heabicides. (pp 66). Jahad Daneshgahi of Mashhad pub. Mashhad. (in Persian).