

## مقاومت هشت گونه نهال جنگل کاری شده نسبت به موربانه زیر زمینی

### *Microcerotermes gabrielis* Weidner

عزیز شیخی گرجان<sup>۱</sup> - مجتبی محمدیزاده<sup>۲</sup> - محمد رضا نعمتیان<sup>۳</sup> - فربرز زرانی<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

#### چکیده

موربانه‌ها یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده عرصه‌های جنگل کاری می‌باشند. منطقه جنگل کاری شده سلمزار واقع در استان البرز با مساحتی در حدود ۵۴ هکتار، از جمله مناطقی بود که در سال ۱۳۹۴ تحت تاثیر خسارت موربانه قرار گرفت. این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومت هشت گونه نهال کاشته شده در برابر خسارت موربانه در این منطقه و شناسایی گونه موربانه خسارت‌زا روی آن‌ها اجرا شد. نمونه‌برداری از اندام‌های آلوده نهال‌ها از چهار نقطه آلوده منطقه نشان داد که موربانه خسارت‌زا در این منطقه گونه *Microcerotermes gabrielis* می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی میانگین درصد آلودگی به موربانه در هشت گونه جنگلی نشان داد که گونه‌های گیاهی عرعر و بادام کوهی هیچ گونه آلودگی به موربانه نداشتند (صفر درصد) و به‌عنوان مقاوم‌ترین گونه‌های گیاهی در منطقه شناخته شدند و گونه گیاهی بنه با ۳۰ درصد آلودگی در رتبه بعدی قرار گرفت. همچنین گونه‌های سنجد و داغداغان به ترتیب با ۶۵ و ۵۷/۵ درصد آلودگی، حساسترین گونه‌های گیاهی به موربانه بودند. درصد نهال‌های از بین رفته در دو گونه اخیر ۵۵ و ۶۵ درصد نسبت به کل نهال‌های آلوده بود. در نهال‌های آلوده ارغوان تنها ۲۰ درصد از بین رفته بودند و در گروه نهال متحمل به موربانه قرار گرفت. گونه‌های زبان گنجشک و زرشک با درصد آلودگی و خسارت کمتر از ۵۰ درصد در گروه نسبتاً حساس به موربانه قرار گرفت. بنابراین گونه‌های گیاهی عرعر و بادام کوهی را می‌توان جایگزین نهال‌های از بین رفته در منطقه کرد.

واژه‌های کلیدی: آلودگی، البرز، جنگل کاری، خسارت

#### مقدمه

کاهش گازهای گلخانه‌ای منطقه مفید باشد. علاوه بر مورد فوق الذکر، جنگل کاری‌ها اهداف دیگری مانند جلوگیری از تصرفات احتمالی، تبدیل اراضی، ایجاد تفرجگاه و تلطیف هوا در حاشیه شهرهای صنعتی و بزرگ بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند (۳).

جنگل‌های دست کاشت به دلیل ویژگی خاص در سال‌های اولیه تأسیس بیشتر تحت تاثیر آفات و بیماری‌های مختلف گیاهی قرار دارند و ممکن است در صورت بی توجهی، اغلب گونه‌های مختلف گیاهی کشت شده از بین بروند. موربانه‌ها در میان آفات مختلف در مناطق آلوده یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در عرصه‌های جنگل کاری شده می‌باشند. میزان تغذیه سالانه موربانه‌ها از مواد سلولزی در سراسر جهان  $10^{12} \times 3$  کیلوگرم تخمین زده شده است و میزان خسارت آن در حدود ۲۲ میلیارد دلار می‌باشد (۸). بر اساس مطالعات انجام شده مهمترین موربانه‌های استان البرز متعلق به خانواده Termitidae می‌باشد که می‌توان به گونه‌ی *Microcerotermes gabrielis* Weidner اشاره کرد این گونه در مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب ایران نیز گزارش شده‌اند. همچنین نتایج حاصل از مرور منابع، نشان دهنده جمع‌آوری گونه‌های *M. varaminica* Ghayourfar, *Amitermes vilis* (Hagen), *A. kharazii* Ghayourfar, *Anacanthotermes vagan* (Hagan) در استان تهران می‌باشد (۸).

جنگل‌ها نقش مهمی در پایداری حیات در زمین دارند بطوریکه جنگل‌ها یک سوم از سطح زمین را می‌پوشانند و بیش از ۸۰ درصد گونه‌های گیاهی و جانوری در خود جای داده و درآمد بیش از ۱/۶ میلیارد نفر از جنگل تامین می‌کنند. اما متأسفانه در جهان سالانه ۱۳ میلیون هکتار جنگل بین رفته و ۲۰-۱۲ درصد به انتشار گاز‌های گلخانه‌ای افزوده می‌شود (۴). امروزه حفاظت از تنوع زیستی یکی از مهمترین شاخص‌های پایداری جنگل‌ها و بیشه‌زارها می‌باشد. احیاء و توسعه جنگل‌ها، اراضی بایر و تخریب شده از وظایف مهم هر دولتی می‌باشد و می‌تواند در فرآیند ترسیب کربن، حاصلخیزی خاک و

۱- دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

\* - نویسنده مسئول: (Email: asheikhi48@gmail.com)

۲- دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

۳- پژوهشگر، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

۴- پژوهشگر، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

می تواند امکان موفقیت پروژه های جنگل کاری را افزایش دهد.

### مواد و روش ها

محل اجرای پروژه با مساحتی در حدود ۱۶۳ هکتار بصورت یکپارچه در شرق و شمال شرق روستای شلمزار واقع گردیده است. روستای شلمزار از روستاهای شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که در شرق شهرک هیو واقع گردیده است. مختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر بر اساس سیستم UTM شامل (۴۶۷۰۰-۴۷۳۰۰)  $Y_{min,max}$  و (۳۹۸۵۰۰۰-۳۹۹۲۰۰۰)  $X_{min,max}$  می باشد. از نظر توپوگرافی منطقه مورد نظر تپه ماهوری بوده و به ترتیب دارای حداقل و حداکثر ارتفاع ۱۵۷۵ و ۱۷۰۰ متر از سطح دریا می باشد. با توجه به پروفیل های حفر شده، بافت عمومی خاک محدوده اجرای پروژه، متوسط و سبک بوده واز نوع لومی می باشد. در این منطقه، تعداد هشت گونه جنگلی درختی و درختچه ای بومی و سازگار با اقلیم منطقه کاشته شده است (جدول ۱). الگوی کاشت در این پروژه به شکل مثلثی بوده و هر نهال در یک ردیف و در وسط ردیف قبلی قرار می گیرد، به طوری که نهال ها در محل رأس مثلث قرار می گیرند. در این تحقیق نهال های جنگلی کاشته شده از لحاظ آلودگی و خسارت موریانه مورد بررسی قرار گرفتند.

تغذیه موریانه ها از درختان جنگلی یکسان نیست و بستگی به مقدار نسبی لیگنین در درختان دارد. به عبارت دیگر، گیاهانی که درصد لیگنین در آن ها بیشتر از ۵۰٪ است برای موریانه ها خوش خوراک نیستند. موریانه ها اغلب از الوارهایی که درصد لیگنین کمتر از ۲۳٪ دارند تغذیه می کنند (۱۰). بررسی مقاومت درختان اراضی خوزستان به موریانه ها نشان داد که درخت کهور در میان چهار گونه گیاهی کاشته شده مقاوم ترین می باشد و بیشترین خسارت نیز مربوط به درخت گز شاهی می باشد (۱۵). همچنین نامبردگان در تحقیق دیگری نشان دادند که در میان سه گونه گیاهی کاشته شده در عرصه های شنی خوزستان شامل (گزال شاهی، استبرق و کهور) از لحاظ مقاومت به موریانه شنی اختلاف معنی داری دارند به نحوی که درخت استبرق بیشترین آلودگی را داشت (۱۶).

با توجه به اینکه موریانه ها یکی از عوامل مهم تخریب و خشکاندن نهال ها در اراضی جنگل کاری شده می باشند، این تحقیق با هدف تعیین درصد آلودگی و خسارت گونه های گیاهی کاشته شده به موریانه در منطقه شلمزار و مشخص کردن مقاومترین و حساسترین نهال ها به موریانه انجام شد و بدنبال آن گونه ی موریانه خسارت زا روی نهال های کاشته شده در منطقه شلمزار شناسایی گردید لازم به ذکر است که شناسایی گونه های گیاهی حساس و مقاوم به موریانه

جدول ۱- فهرست گونه های درختی و درختچه ای کاشته شده در منطقه شلمزار، استان البرز، ایران

Table 1- List of sapling species planted in the afforested area of Shalamzar in Alborz province, Iran.

نام فارسی	نام انگلیسی	نام علمی	خانواده	فرم رویشی
Persian name	English name	Scientific name	Family	Vegetation form
Daghdaghan داغدغان	Hackberry	<i>Celtis caucasica</i>	<i>Ulmaceae</i>	درخت خزان کننده Deciduous tree
Baneh بنه	Wild pistachio	<i>Pistacia mutica</i>	<i>Anacardiaceae</i>	درخت خزان کننده Deciduous tree
Badam kohi بادام کوهی	Mountain Almond	<i>Amygdalus scoparia</i>	<i>Rosaceae</i>	درختچه همیشه سبز Evergreen shrub
Zereshk زرشک	Barberry	<i>Berberis integerrima</i>	<i>Berberidaceae</i>	درختچه خزان کننده Deciduous shrub
Arghavan ارغوان	Judas tree	<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Logominoseae</i>	درختچه خزان کننده Deciduous shrub
Senjed سنجد	Silverberry	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Elaeagnaceae</i>	درخت خزان کننده Deciduous tree
Zabangonjeshk زبان گنجشک	Ash	<i>Fraxinus rutundifolia</i>	<i>Oleaceae</i>	درخت خزان کننده Deciduous tree
Ar-ar عرعر	Juniper	<i>Ailanthus altissima</i>	<i>Simaroubaceae</i>	درخت خزان کننده Deciduous tree

پزشکی کلید و شناسایی شدند.

### بررسی میزان آلودگی

برای بررسی میزان آلودگی نهال های کاشته شده در عرصه های جنگل کاری شلمزار، از هشت گونه اشاره شده در جدول ۱

### شناسایی گونه های فعال موریانه در منطقه شلمزار

برای این منظور پس از انجام بازدید از مناطق آلوده به موریانه در منطقه شلمزار، از نهال های آلوده و دالان های فعال در اندام های هوایی نهال ها نمونه برداری شد. سپس موریانه های سرباز جمع آوری شده و در آزمایشگاه بخش رده بندی حشرات موسسه تحقیقات گیاه

نمونه برداری شد. بدین منظور از چهار نقطه از منطقه آلوده نمونه برداری صورت گرفت، در هر یک از نقاط آلوده تعداد ۱۰ اصله از هر گونه نمونه برداری شد که در مجموع ۴۰ اصله نهال از هر گونه نمونه برداری گردید و میانگین درصد آلودگی بر اساس تعداد پایه های آلوده به کل همان گونه محاسبه گردید.

### تعیین درصد خسارت

برای این منظور هریک از گیاهان نمونه برداری شده از طوقه تا قسمت انتهایی گیاه به تفکیک بررسی شدند و بر اساس میزان خسارت موریانه در هر نهال به صورت چشمی به پنج گروه تقسیم بندی شدند که شامل: ۱. بدون خسارت یا سالم (صفر درصد)، ۲. خسارت کم ( $0 < \% < 25$ )، ۳. خسارت متوسط ( $25 < \% < 50$ )، ۴. خسارت زیاد ( $50 < \% < 75$ )، و ۵. از بین رفته ( $100 < \% < 75$ )، بود.

### تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار انجام و در نهایت داده های درصد آلودگی آنالیز واریانس شده و میانگین درصد آلودگی به روش LSD مقایسه گردید. همچنین در خصوص پارامتر میزان درصد خسارت موریانه روی گونه های گیاهی مورد مطالعه، به خاطر نرمال نبودن داده ها از آزمون کروسکال-والیس (آزمون غیر پارامتریک) استفاده شد. در ادامه فراوانی گونه های جنگلی کاشته شده در گروه های مختلف درصد خسارت موریانه محاسبه و گونه های مقاوم به موریانه مشخص گردید. لازم به ذکر است که تمامی آنالیزهای صورت گرفته در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار SAS v9.1 انجام شد.

### نتایج

نتایج حاصل از جمع آوری و شناسایی موریانه های سرباز جمع آوری شده از منطقه مورد مطالعه، نشان داد که گونه خسارت زرا در منطقه شلمزار روی نهال های کاشته شده، گونه *Microceroterme gabrielis* می باشد و تنها این گونه روی نهال های آلوده مشاهده شد. البته گونه هایی از جنس *Amitermes* از این منطقه گزارش شده است (۸)، که در نمونه برداری های ما از نهال های آلوده به موریانه مشاهده نشد همچنین در طی نمونه برداری از منطقه، روی علف های هرز مرتعی موریانه ای از جنس *Anacanthotermes spp.* جمع آوری گردید ولی روی نهال های کاشته شده مشاهده نشد. در جداول ۲ اطلاعات مربوط به میزان آلودگی و درصد خسارت هر یک از گونه های نهال کاشته شده در منطقه شلمزار ارائه گردیده است. همچنین در جدول ۳ درصد فراوانی گونه های گیاهی در گروه های

مختلف خسارت موریانه ارائه شده است.

بر اساس نتایج حاصل از میانگین درصد آلودگی به موریانه در منطقه شلمزار استان البرز، گونه های بادام کوهی و درخت عرعر به خاطر نداشتن آلودگی و خسارت (صفر درصد) ناشی از موریانه در گروه گونه های مقاوم به موریانه قرار داشتند به طوری که در تمامی نمونه های مورد بررسی، این دو گونه هیچگونه علائم خسارت و دالان موریانه مشاهده نشد. این گیاهان در میان هشت گونه گیاهی کاشته شده مقاوم ترین گیاهان نسبت به موریانه *M. gabrielis* بودند. بعد از آن ها، گونه های بنه و زرشک با ۳۰ و ۳۳/۷ درصد آلودگی و ۲۸/۵ و ۳۸/۳ درصد خسارت توانسته بودند خسارت موریانه را تحمل کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که گونه های سنجد و داغداغان با ۶۵ و ۵۷/۵ درصد آلودگی و ۵۷/۱۱ و ۵۷/۵ درصد خسارت حساس ترین گونه های نهال به موریانه هستند به طوری که بر اساس شاخص ویلکسون بالاترین رتبه را از نظر میزان خسارت در میان گیاهان مورد مطالعه داشتند و بیش از ۵۰ درصد از نهال های مورد بررسی این دو گونه ۱۰۰-۷۵ درصد خسارت دیده و از بین رفته بودند (جدول ۲ و ۳).

از نظر خسارت موریانه گونه های ارغوان و زبان گنجشک به ترتیب با شاخص ویلکسون ۱۷۶ و ۱۶۷ در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در نهال هایی که کاملاً از بین رفته بودند دالان موریانه در سطح بوته تا ارتفاع ۱/۵ متری نهال دیده می شد و نهال ها خشک شده با کوچکترین حرکتی از خاک جدا می شدند. این موضوع نشان می داد که در بیشتر نهال های از بین رفته تمامی ریشه هایشان به وسیله موریانه خورده شده اند.

با توجه به اینکه تعداد نهال های نمونه برداری شده از هشت گونه گیاهی یکسان بودند فراوانی گونه های گیاهی کاشته شده در منطقه توزیع یکنواختی داشت بررسی آن ها در گروه های خسارت موریانه نشان داد که ۳۹/۴۵ درصد از کل نهال های نمونه برداری شده آلوده به موریانه هستند که ۳۰ درصد از آن ها از بین رفته اند (جدول ۳).

### بحث

در میان هشت گونه گیاهی مورد مطالعه، نهال های عرعر و بادام کوهی مقاوم ترین و داغداغان و سنجد حساس ترین گونه های گیاهی به موریانه *M. gabrielis* بودند. در مجموع در حدود ۳۰ درصد از نهال های کاشته شده، توسط موریانه از بین رفته بودند که بیشتر شامل نهال های داغداغان، سنجد و زبان گنجشک بود.

جدول ۲- میانگین درصد آلودگی نهال‌های کاشته شده به موریهانه *Microceroterme gabrielis* و مقایسه میانگین شاخص ویلکسون محاسبه شده برای درصد خسارت موریهانه در هریک از گونه‌های گیاهی مورد مطالعه با استفاده تجزیه واریانس غیر پارامتریک آزمون کروسکال-والیس در منطقه شلمزار، استان البرز، ایران

Table 2- Mean infestation percentage of planted saplings to termite, *Microceroterme gabrielis* and comparative mean Wilcoxon Scores for damage rate of termite on the studied plant species by nonparametric analysis of variance, Kruskal-Wallis Test in the afforested area of Shalamzar in Alborz province, Iran.

گونه های گیاهی Plant species	<i>Cercis siliquastrum</i>	<i>Amygdalus scoparia</i>	<i>Pistacia mutica</i>	<i>Celtis caucasica</i>	<i>Fraxinus rutundifolia</i>	<i>Berberis integerrima</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	<i>Ailanthus altissima</i>
میانگین درصد آلودگی Mean infestation(%)	62.5 ±5a	0c	30±1.63b	57.5±6.4a	47.5±9.5ab	33.7±23b	65±5.77a	0c
آماره های آنالیز واریانس Aanalysis variance parameters			ضریب تغییرات CV=33.4	درجه آزادی DF=7,21	F=17.16	Pr<0.0001		
میانگین درصد خسارت Mean damage (%)	34.8	0	28.58	57.5	40.62	32.9	57.11	0
شاخص ویلکسون (خسارت) Wilcoxon Scores (damage)	176	94	143	195	167	154	194	94
Kruskal-Wallis Test			Chi-Square=60	درجه آزادی DF=7	Pr<0.0001			

جدول ۳- فراوانی گونه‌های گیاهی نمونه برداری شده (نهال‌ها) در گروه‌های مختلف خسارت موریهانه

Table 3. The frequency of sampled plant species(saplings) in different groups of termite damage

گونه گیاهی Plant species	گروه بندی درصد خسارت موریهانه Grouping termite damag percentage				
	0	1-25	26-50	51-75	76-100
<i>Cercis siliquastrum</i>	14	14	2	2	8
<i>Amygdalus scoparia</i>	40	0	0	0	0
<i>Celtis caucasica</i>	16	0	1	1	22
<i>Pistacia mutica</i>	29	0	0	0	11
<i>Fraxinus rutundifolia</i>	21	0	4	1	14
<i>Berberis integerrima</i>	25	2	1	1	11
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	15	0	3	1	21
<i>Ailanthus altissima</i>	40	0	0	0	0

موریهانه از نظر ترجیح میزبانی به چوب‌های مختلف نشان داد که *Microcertermes* بیشتر به چوب راش تمایل دارد در حالی که *Microtermes* بیشتر چوب سرو را ترجیح می‌دهد (۶) و موریهانه

البته حساسیت گونه‌های مختلف درختان و درختچه‌ها بسته به نوع گونه موریهانه می‌تواند متفاوت باشد زیرا ترجیح میزبانی در گونه‌های مختلف موریهانه متفاوت است (۱۵ و ۷). در مقایسه سه گونه

*Odontotermes* از جمله موربانه‌هایی هستند که از پوست و بافت‌های زنده گیاهان تغذیه می‌کند و بیشتر به سطح خارجی درختان خسارت وارد می‌کند (۲۰).

تفاوت در رجحان و عدم رجحان موربانه‌ها در ارقام مختلف گیاهی می‌تواند ناشی از مواد شیمیایی، رطوبت چوب، مقدار سلولز و لیگنین باشد. موربانه در گیاهانی که درصد سلولزشان بالا است تمایل بیشتری به تغذیه از آن نشان می‌دهند (۲۰ و ۱۱). یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در میزان خسارت موربانه روی درخت جنگلی مؤثر باشد تراکم چوب است. درختانی که چوب نرم (با تراکم چوب کمتر) دارند، در مقایسه با درختان چوب سخت نسبت به موربانه حساس‌ترند. مقایسه میانگین درصد آلودگی به موربانه در گونه‌های مختلف نشان داد که نهال‌های عرعر و بادام‌کوهی هیچ‌گونه آلودگی به موربانه نداشتند که می‌تواند ناشی از وجود یکسری ترکیبات در گیاهان مقاوم به موربانه باشد که دارای خاصیت دورکنندگی، ضد تغذیه‌ای و کشندگی هستند. گیاه عرعر دارای ترکیبات کازینوئید، آیلانتون، آمارولید، استیل آمارولید و ۳-هیدروکسی آیلانتون است که می‌تواند خاصیت آفت کشی داشته باشند و روی برگ‌خوارها و شته‌ها مؤثر باشند اما خاصیت علف کشی آن از خاصیت حشره کشی بیشتر است (۲۴). وجود آمیگدالین در بذر بادام‌کوهی نشان داده است که خاصیت حشره کشی (۲۵) و باکتری کشی (۱۲) دارد این ویژگی بادام‌کوهی می‌تواند از استقرار موربانه در روی آن درختچه جلوگیری کند درعین حال بررسی‌ها نشان داده است که درختچه بادام‌کوهی می‌تواند مورد حمله سوسک طوقه و ریشه بادام *Capnodis carbonaria* Klug، زنبور مغزخوار بادام *Eurytoma amygdali* Enderlein، شپشک نخودی *Eulecanium persicae* Fabricius، جوجه تیغی *Scolytus hystrix leucura* Sykes و سوسک پوست خوار *amygdali* Geurin-Meneville قرار گرفته و خسارت شدیدی را دریافت کند (۹). با این وجود گزارشی از خسارت موربانه روی این گیاه دریافت نشده است. با توجه عدم آلودگی به موربانه پیدا نکردن آثار خسارت و دالان‌های موربانه در سطح نهال مقاومت نهال‌های عرعر و بادام‌کوهی به موربانه از نوع مقاومت آنتی زنوز می‌باشد البته وجود ترکیباتی که خاصیت حشره کشی و ضد باکتریایی در این دو گیاه، می‌تواند وجود مقاومت آنتی بیوز آن‌ها را تأیید کند. اگرچه نداشتن داده‌های دقیق آزمایشگاهی برای بررسی مقاومت آنتی بیوز گیاهان مورد نظر به موربانه می‌تواند یک نقطه ضعف برای این تحقیق باشد. اما اغلب عصاره‌های گیاهی دارای اثر سمی نسبتاً پایین روی موربانه در مقایسه با حشره‌کش‌های رایج هستند. این ترکیبات اغلب آنتی‌اکسیدان بوده و خاصیت موربانه کشی نیز دارند (۱۴). بر طبق گزارش امیدبخش و همکاران مقاومت چوب‌ها به موربانه به شرایط رویشگاه و میزان ترکیبات شیمیایی و فیزیکی چوب نیز بستگی دارد

(۱۵). مقدار اسانس و عصاره در چوب‌های مقاوم ۴-۵ درصد بوده درحالی که در گونه‌های گیاهی حساس مواد فوق ۲/۵ درصد می‌باشد. همچنین مقدار لیگنین در گیاهان مقاوم بیش از ۲۵ درصد است درحالی که در گونه‌های حساس درصد لیگنین کمتر از ۲۰ درصد است. وجود ماده لیگنین در چوب‌ها میزان خوش‌خوراکی را برای موربانه کاهش می‌دهد (۱۰ و ۱).

در تحقیق حاضر گونه‌هایی که میانگین درصد آلودگی بالایی داشتند درصد خسارت ناشی از موربانه نیز در آن‌ها بالا بود (به جزء گونه ارغوان، جدول ۲). در نهال‌های ارغوان با وجود اینکه درصد آلودگی ۶۲/۵ درصد است اما تنها ۲۰/۶ درصد از نهال‌ها به وسیله موربانه از بین رفته بودند و بیش از ۵۰ درصد نهال‌های آلوده ارغوان میزان خسارتشان کمتر از ۲۵ درصد بود (جدول ۳). این موضوع نشان می‌دهد که درخت ارغوان می‌تواند خسارت موربانه را تحمل کند. در این میان در گیاه بنه با وجود درصد آلودگی کمتر به موربانه همه بوته‌های آلوده آن از بین رفته بودند. نتایج نشان می‌دهد که گیاه بنه نمی‌تواند خسارت موربانه را تحمل کند. وجود ترکیبات فنلی و دیگر ترکیبات شیمیایی در چوب به عنوان آنتی‌اکسیدان می‌تواند در مقاومت چوب به موربانه مؤثر باشد. بررسی‌های قبلی نشان داده است چوب‌هایی که عصاره فنلی آن‌ها بیشتر است خاصیت آنتی‌اکسیدان داشته و در برابر پوسیدگی قارچی و حشره‌ای مقاوم هستند. بیشتر چوب‌های بیرونی (آوند‌های چوبی فعال) کم‌دوام هستند اما چوب‌های مرکزی بعضی از گونه‌ها به خاطر داشتن ترکیبات فنلی نسبتاً مقاوم و بادوام هستند. تراکم بالای سلولز، میزان لیگنین و ترکیبات ضد آب (روغنی) در چوب از عوامل مقاوم به پوسیدگی هستند (۲۲). تحقیقات انجام شده روی چهار گونه اکالیپتوس نسبت به خسارت موربانه نشان داد که گونه *Eucalyptus camalduleinsis* به عنوان گونه پایدار و مقاوم به موربانه و گونه *E. vimindis* به عنوان گونه کم‌دوام و حساس به موربانه هستند (۵ و ۱۹). همچنین در بررسی دوام چوب‌های صنوبر، تبریزی و سپیدار در برابر موربانه در چند منطقه نشان داد که حداکثر دوام طبیعی این چوب‌ها ۱۸ ماه است و در گروه چوب‌های بی‌دوام قرار می‌گیرد (۱۸)

نمونه‌برداری از نقاط آلوده به موربانه *M. gabrialis* در جنگل کاری شلمزار نشان داد که ۳۹/۵ درصد از نهال‌های کاشته شده آلوده به موربانه بود. در گونه‌های زبان گنجشک و زرشک میانگین درصد آلودگی (۳۳-۴۷ درصد) و میانگین درصد خسارت (۳۲-۴۰ درصد) بود. در مقایسه با سایر گونه‌های گیاهی می‌تواند در گروه متوسط قرار گیرد بطوریکه ۱۰ درصد از نهال‌های آلوده توانسته بودند خسارت موربانه را تحمل کرده و زنده بمانند. بررسی‌های محققین در این زمینه نشان داد که درختان بلوط، سرو، صنوبرها، عرعر، گردو سیاه و آلبالو نسبتاً مقاوم و درختان نارون، زبان گنجشک، شوکران

جنس‌های *Neotermes* و *Microcerotermes* و به ترتیب ۱۵/۲۲ و ۸/۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند (۲۱). به‌طور کلی در میان ۸ گونه گیاهی مورد مطالعه گونه‌های داغداغان و زرشک جز حساس‌ترین و گونه‌های بادام‌کوهی و عرعر مقاوم‌ترین گونه‌های گیاهی به موربانه *M. gabrielis* است. بنابراین می‌تواند از دو گونه مقاوم برای جایگزینی نهال‌های از بین رفته در منطقه استفاده کرد همچنین پیشنهاد می‌شود برای موفقیت در ایجاد جنگل و ابقای طولانی آن بهتر است شناسایی آفات مهم و ارزیابی گیاهان جنگلی از نظر مقاومت به آفات و بیماری‌ها قبل از کشت در سطح وسیع انجام گیرد. و در ارتباط با ترجیح میزبانی موربانه‌های مهم و خسارت زای کشور و مقاومت نهال‌های جنگلی لازم است تحقیقات تکمیلی بیشتری صورت گیرد.

نسبتاً حساس به موربانه *Coptotermes formosanus* Shirak هستند (۱۳ و ۲۳). امیدبخش و همکاران (۱۵) در بررسی درختان مناطق شن زار در خوزستان نشان دادند که گز شاهی و کهور به ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین چوب نسبت به موربانه *Psammotermes hybostoma* Desneux هستند.

تفاوت در ترجیح میزبانی گیاهی جنس‌های مختلف موربانه نشان می‌دهد که قبل از هرگونه عملیات جنگل کاری و توسعه فضای سبز لازم است آفات غالب و مهم از جمله گونه‌های فعال موربانه هر منطقه شناسایی شود تا بر اساس آن از کاشت نهال‌های حساس خودداری شود. بطوریکه یک مقاله تحلیلی در کشور هند نشان داد که موربانه جنس *Odontotermes* ۱۹ درصد از ۹۲ گونه گیاهی را به‌عنوان منبع غذایی انتخاب می‌کنند و از نظر اهمیت در رتبه اول قرار می‌گیرد و

## منابع

- 1- Abdullah F., Subramanian P., Ibrahim H., Abdul Malek S.N., Lee G.S., and Hong S.L. 2015. Chemical Composition, Antifeedant, Repellent, and Toxicity Activities of the Rhizomes of Galangal, *Alpinia galanga* Against Asian Subterranean Termites, *Coptotermes gestroi* and *Coptotermes curvignathus* (Isoptera: Rhinotermitidae). *Journal of Insect Science*, 15(1):1-7.
- 2- Aihetasham A., and Iqbal S. 2013. Feeding preferences of *Microcerotermes championi* (Snyder) for different wooden blocks dried at different temperatures under forced and choice feeding conditions in laboratory and field. *Agris*, 44(4): 1137-1144.
- 3- Anonymous. 2011. Forests in a green economy a synthesis. United Nations Environment Programme. Available in: [http://www.unep.org/pdf/PressReleases/UNEP-ForestsGreenEco-basse\\_def\\_version\\_normale.pdf](http://www.unep.org/pdf/PressReleases/UNEP-ForestsGreenEco-basse_def_version_normale.pdf). htm.
- 4- Anonymous. 2016. The theme of the 2016 International Day of Forests is "forests and water". United Nations. Available in <http://www.un.org/en/events/forestsday/>. htm.
- 5- Arabtabar Firozichaei H., Rezanejad A., Hosseinzadeh A., Nejatsalari A., and Golbabei F. 2008. Investigation on impregnation and durability of *Eucalyptus* species in natural and treated form against decay and insect attack. *Research Institute of Forest and Rangeland (RIFR), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)*, Final Report NO: 31028. (in Persian with English abstract)
- 6- Badawi A., Faragala A.A., and Dabbour A., 1984. The natural resistance of some imported wood species to subterranean termites in Saudi Arabia. *Zeitschrift fur angewandte Entomologie*, 98:500-504.
- 7- Gay F.T., Greaves T., Holdaway F.G., and Wetherly A.H. 1954. Standard laboratory colonies of termites for evaluating the resistance of timber, timber preservatives and other materials to termite attack. *CSIRO Australia*, 277: 1-64.
- 8- Ghayourfar, R. 2005. Termite of Iran. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iranian Research Institute of Plant Protection, Amozesh Keshavarzi press, Karaj, Iran, p.180 (in Persian).
- 9- Golestaneh, S.R., Karampour F., and Farrar N. 2013. Introduction of the destructive agents affecting wild almond *Amygdalus scoparia* forests in Koh-Siah Dashti area in Bushehr province. *Iranian Journal of Forest and Range Protection Research*, V 10(2) :165-177.
- 10- Harris, W.V., 1961. *Termites, Their Recognition and Control*. Longmans, London, 186 pp.
- 11- Judd T.M., and Corbin C.C. 2009. Effect of cellulose concentration on the feeding preferences of the termite, *Reticulitermes flavipes* (Isoptera: Rhinotermitidae). *Sociobiology*, 53(3):775-784.
- 12- Mahdavi Meymand Z., Moshafi M.H., and Forutanfar H. 2009. Antibacterial Activity of Metanolic Extract of 12 Herbal Species on 6 Bacterial Strains Using Cylinder-plate Method. *Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences*, V8(3) Page 227 -237.
- 13- Morales-Ramos J.A., and Rojas M.G. 2001. Nutritional Ecology of the Formosan Subterranean Termite (Isoptera: Rhinotermitidae)-Feeding Response to Commercial Wood Species. *Journal of Economic Entomology*, 94(2):516-523.
- 14- Mounquengui S., Tchinda J.B.S., Ndikontar M.K., Dumarçay S., Attéké C., Perrin D., Gelhaye E. and Gérardin P. 2015. Total phenolic and lignin contents, phytochemical screening, antioxidant and fungal inhibition properties of the heartwood extractives of ten Congo Basin tree species. *Annals of Forest Science*, 1-10.
- 15- Omidbakhsh M., Soleymanejadyan E., Habibpour B. and Asareh M.H. 2003. A study of resistance of four tree

- species to Sand-termite, *Psammotermes hybostoma* Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae) in sand dunes of Khozestan province. Pajouhesh – va- Sazandegi in Natural Science, 16(30):44-51. (in Persian with English abstract)
- 16- Omidbakhsh M., Soleymanjadyan E., Habibpour B., and Asareh M.H. 2004. Sand-termite, *Psammotermes hybostoma* Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae) damage to three plants used in biological stabilization of sand dunes in Khozestan. The Scientific Journal of Agriculture, 27(10):77-91. (in Persian with English abstract)
  - 17- Rasib K.Z., 2008. Feeding preferences of *Microcerotermes championi* (Snyder) on different timbers dried at different temperatures under choice and no choice trials. Nature Proceedings. Available <http://hdl.handle.net/10101/npre>, 20481.
  - 18- Rezanajaddeldari A., and Hoseinkhani H. 2014. Investigation on durability of *P. nigra* and *P. alba* against termite using filed trial. *Research Institute of Forest and Rangeland(RIFR), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)*, Final Report NO: 45444. (in Persian with English abstract)
  - 19- Shafiei Alavijeh E., Habibpour B., Moharramipour S., and A. Rasekh. 2014. Bioactivity of *Eucalyptus camaldulensis* essential oil against *Microcerotermes diversus* (Isoptera: Termitidae). *Journal of Crop Protection*, 3(1):1-11.
  - 20- Shahid A.S., and Akhtar M.S. 1983. Wood preferences and survival of *Coptotermes heimi* (Wasmann) and *Odontotermes obesus* (Rambur) (Isoptera). *Pakistan Journal of Zoology*, (11):303-314.
  - 21- Shanbhag R.R., and Sundararaj R. 2012. Host range, pest status and distribution of wood destroying termites of india. *The Journal of Tropical Asian Entomology*, 2(1): 12-27
  - 22- Skyba O., Douglas C.J., and Mansfield S.D. 2013. Syringyl-rich lignin renders poplars more resistant to degradation by wood decay fungi. *Applied and Environmental Microbiology*, 79(8):2560-2571.
  - 23- Smythe R.V., and Carter F.L. 1970. Feeding responses to sound wood by *Coptotermes formosanus*, *Reticulitermes flavipes*, and *R. virginicus* (Isoptera: Rhinotermitidae). *Annals of the Entomological Society of America*, 63: 841-847.
  - 24- Tsao R., Romanchuk F.E., Peterson C.J., and Coats J. R. 2002. Plant growth regulatory effect and insecticidal activity of the extracts of the Tree of Heaven (*Ailanthus altissima* L.). *BioMed Centra Ecology*. 2: 1-6
  - 25- Yang R.Z, and Tang C.S. 1988. Plants used for pest control in China: a literature review. *Economic botany* 42: 376-406.