



بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (*Datura stramonium L.*)

اکبر علی وردی^۱ - ابراهیم ایزدی دربندی^{۲*}

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

چکیده

جستجو چهت پیدا کردن مواد طبیعی که استعداد کاربرد به همراه مواد شیمیایی کشاورزی را داشته باشد از اولویت‌های پژوهشی در زمینه کاربرد این مواد می‌باشد. از اینرو، یک آزمایش واکنش به مقدار علف کش تحت شرایط گلخانه‌ای جهت بررسی فعالیت روغن‌های انسانی سیاه دانه، رازیانه، کندور و گل سرخ، هر کدام در دو غلظت ۰/۵ و ۱ درصد حجمی/حجمی^(۷)، در بهینه‌سازی کارایی علف کش ایمازتاپیر بر روی علف‌هز تاتوره اجرا شد. بر اساس شب منحنی‌های واکنش به مقادیر علف کش، اگر تمامی این مواد افزودنی در غلظت‌های مورد بررسی به تهایی و بدون علف کش به کار برد شوند، از نظر زیستی بر روی تاتوره غیر فعال خواهد بود. وقتی که این مواد افزودنی به محلول پاشش علف کش ایمازتاپیر افزوده شد، بهبود معنی داری در کارایی آن مشاهده شد. در بین مواد افزودنی مورد بررسی، تنها در مورد روغن سیاه دانه، افزایش غلظت ماده افزودنی سبب بهبود معنی داری در کارایی علف کش شد. بر اساس داده‌های وزن خشک تاتوره، کارایی ایمازتاپیر با کاربرد ۱ درصد (۷/۷) از روغن رازیانه تا حدود ۴/۶۱ برابر بهبود پیدا کرد. در حالی که، بر اساس داده‌های وزن خشک تاتوره، کارایی ایمازتاپیر با کاربرد ۱ درصد (۷/۷) از روغن رازیانه تا حدود ۴/۵۰ برابر بهبود پیدا کرد. این تحقیق ثابت کرد که مواد طبیعی مورد بررسی دارای استعداد قابل توجهی در بهبود کارایی علف کش ایمازتاپیر در کنترل علف-هرز تاتوره می‌باشند. بنابراین، این مواد را می‌توانند به عنوان مواد افزودنی با پایه گیاهی مناسب بکار برد.

واژه‌های کلیدی: روغن انسانی، علف کش، مواد افزودنی

مقدمه

رهیافت دیگری بهینه سازی مصرف علف کش‌های است. پیش از این، این رهیافت‌ها در بسیاری موارد به وسیله کشاورزان، نه به خاطر نگرانی‌های زیست محیطی بلکه به دلیل فشار هزینه‌هایی که امروزه کشاورزان با آن رو به رو هستند، پذیرفته شده است^(۲). نمود علف-کش‌ها متأثر از تعدادی از عوامل زیستی و فیزیکوشیمیایی و دانشی از عوامل کلیدی موثر در کارایی علف کش است که پیش نیاز بهینه-سازی مقدار مصرف می‌باشد. در این میان، مواد افزودنی از مهمترین عوامل قابل ملاحظه هنگام تعیین مقدار مصرف علف کش می‌باشد.

به هر ماده شیمیایی که می‌توان به محلول پاشش اضافه کرد تا سبب بهبود کارکرد علف کش شود، ماده افزودنی گویند^(۲). بر مبنای ویژگی کارکرده، مواد افزودنی را در پنج گروه دسته‌بندی می‌کنند که شامل بازدارنده‌های فرار پاشش، گسترش دهنده‌ها، چسباننده‌ها، خیس کننده‌ها و نفوذ دهنده‌ها. مواد افزودنی نفوذ دهنده را می‌توان از نظر شیمیایی به دو گروه روغن‌های معدنی و گیاهی دسته‌بندی کرد^(۱۱). اگرچه برخی از گزارشات نشان داده است که روغن‌های گیاهی در مقایسه با روغن‌های معدنی در بهبود کارایی علفکش‌ها کمتر موثر هستند^(۱۴)، ولی نظر به نگرانی‌های موجود در رابطه با محیط زیست، به نظر می‌رسد که کاربرد روغن‌های گیاهی جایگزین مناسبی برای روغن‌های معدنی باشد^(۵) به دلیل اینکه روغن‌های گیاهی دارای یک سری مزایایی مانند داشتن قابلیت تجدیدپذیری و تجزیه زیستی

استفاده از عوامل حفظ نباتات تحت نگاه موسکافانه روز افزونی قرار دارند. آفت‌کش‌ها تصویر عمومی بدی دارند، بنابراین باید تلاش کرد تا کاربرد درستی از آنها به جامعه ارائه داد. در بیشتر کشورها توجه زیادی به اثرات ناسازگار آفت‌کش‌ها در سلامت انسان و محیط زیست به وجود آمده است. به طوری که پژوهش‌های زیادی به منظور جستجو برای کاهش اثرات جانبی آفت‌کش‌ها بر روی گونه‌های غیر هدف، الودگی آب‌های سطحی و زیر سطحی و باقیمانده آن‌ها در مواد غذایی به اجرا در آمده است. با این وجود، توافق های عمومی وجود دارد که آفت‌کش‌ها یک عنصر جامع در کشاورزی مدرن هستند و اگر کشاورز به آفت‌کش‌ها یک خطرات ناسازگار باشد، درآمد کل صنعت کشاورزی کاهش خواهد یافت^(۹). برای کاهش خطرات ناسازگار علف کش‌ها، نوآوری‌هایی به وجود آمده است. ایجاد مناطق بافر کننده، کاربرد علف کش خاص در مناطق خاص، کنترل دقیق تجهیزات سم پاشی و تعلیم کشاورزان از جمله این نوآوری‌ها است.

۱- استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بولی سینا

۲- دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(*)- نویسنده مسئول: (Email: e-izadi@um.ac.ir)

DOI: 10.22067/jpp.v0i.0.51115

در صد هیپوکلرید سدیم برای مدت ۱۰ دقیقه خد عفونی شدن و با آب مقطر شسته شدن. حدوداً تعداد ۲۵ بذر تاتوره در عمق ۰/۵ سانتی متری خاک در درون گلدان‌های ۲ لیتری کشت شدند. ترکیب خاک درون گلدان شامل نسبت‌های مساوی از خاک، ماسه بادی و خاکبرگ بود. در این روش، تقریباً ۸۸ درصد بذر تاتوره کاشته شده سبز شدند. گلدان‌ها هر سه روز یکبار تحت آبیاری مساوی قرار گرفتند. در مراحل رشدی یک برگی و دو برگی تاتوره، گیاهچه‌ها تنک شدند تا به یک جمعیت نهایی ۴ بوته در درون هر گلدان برسد. علاوه بر این، با تنک سازی دو مرحله ای سبب شد تا بوته‌های باقیمانده در تمامی واحدهای آزمایشی از نظر اندازه تقریباً یکنواخت باشند. پس از هر بار تنک سازی، گلدان‌ها به میزان ۲۰ میلی لیتر از محلول ۳ گرم کود ازت: فسفر: پتاسیم (۲۰:۲۰:۲۰) در لیتر آب کوددهی شدند. دمای گلخانه در ساعت روشنایی روز از ۲۷ تا ۳۶ درجه سانتی گراد و در ساعت شبانه از ۱۴ تا ۲۱ درجه سانتی گراد متغیر بود. رطوبت نسبی نیز از ۶۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بود.

در مرحله چهار برگی که ارتفاع بوته‌های تاتوره بین ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر بود، عملیات تیماردهی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد. فاکتور مقدار علف‌کش شامل مقادیر صفر، ۴/۶۹، ۹/۳۸، ۱۸/۷۵، ۹/۳۸ و ۷۵/۵ گرم ماده موثره از علف‌کش ایمازتاپیر در هکتار و فاکتور ماده افودنی طبیعی شامل با و بدون کاربرد غلظت‌های ۰/۵ و ۱ درصد (۷/۷) از روغن‌های خام سیاه دانه، رازیانه، کندور و گل سرخ بود. از فرمولاسیون تجاری ایمازتاپیر (پرسوئیت ۱۰٪ مایع محلول) در این آزمایش استفاده شد. به منظور امولسیون کردن روغن‌ها در محلول پاشش از امولسیون کننده آکلیل آریل گلیکول اتر استفاده شد. نسبت کاربرد امولسیون کننده به روغن خام به صورت ۹۵ به ۵ درصد بود. عملیات تیماردهی با استفاده از سپیاچ متحرک ریلی مجهز به نازل بادیزنی معمولی با شماره نازل ۸۰۰۲ با خروجی ۱۸۰ لیتر در هکتار و با فشار پاشش ۲۰۰ کیلوپاسکال انجام گرفت. سه هفتۀ پس از تیماردهی، زیست توده موجود بر روی سطح خاک هر گلدان جمع آوری و توزین شدند. سپس، زیست توده جمع آوری شده در دمای ۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت خشک و توزین شدند. سپس، از میانگین وزن تر یا خشک در هر گلدان برای برآش منحنی‌های واکنش به مقدار استفاده شد.

واکنش وزن تر یا خشک تاتوره به مقدار علف‌کش ایمازتاپیر با تکنیک رگرسیون غیر خطی و با استفاده از نرم افزار R آنالیز شد. تمامی داده‌ها به طور همزمان با مدل چهار پارامتری لجستیک زیر

2- *Nigella sativa* L.

3- *Foeniculum vulgare* L.

4- *Boswellia sacra* Flueck.

5- *Rosa damascena* L.

هستند (۶). گزارش‌ها نشان می‌دهند که کاربرد روغن اسانسی حاصل از گیاهان دارویی در غلظت‌های پایین نه تنها دارای فعالیت بهبود دهنده‌گی کارایی علف‌کش‌ها هستند (۲ و ۶)، بلکه کاربرد این مواد در غلظت‌های بالا نیز می‌تواند منجر به ایجاد فعالیت‌های علف‌کشی شود (۴، ۱۲ و ۱۳). به طور کلی، اعتقاد بر آن است که منفعت حاصل از روغن‌های گیاهی در بهبود کارایی علف‌کش‌ها را می‌توان به توانایی آنها در (۱) کاهش میزان و سرعت خشک شدن قطرات پاشش از زمان آزاد سازی آنها تا لحظه برخورد آنها با هدف؛ (۲) کاهش میزان برگشت‌پذیری قطرات پاشش پس از برخورد با هدف؛ (۳) کاهش زاویه تماس قطرات پاشش با سطوح برگی و متعاقباً بهبود گسترش قطرات پاشش بر روی آنها؛ (۴) تاخیر در فرآیند ایجاد بلور ماده موثره علف‌کشی بر روی سطوح برگ؛ (۵) کاهش تجزیه نوری ماده موثره علف‌کشی که بر روی سطوح برگ قرار گرفته‌اند؛ و (۶) حل و یا شل‌سازی کوتیکول موجود در سطوح برگی و نفوذ‌پذیرسازی آن برای عبور ماده موثره علف‌کش، دانست (۵). از آنجایی که روغن‌های گیاهی در آب مخزن قابلیت حل و پخش ندارند، از اینرو، عموماً آنها را با نسبت ۹۵ درصد روغن به همراه ۵ درصد امولسیون کننده مورد بررسی قرار می‌دهند. آزمایشات قبلی نشان داده است که کاربرد امولسیون کننده آکلیل آریل گلیکول اتر به تنها یی هیچ‌گونه تاثیری بر کارایی برخی از علف‌کش‌ها ندارد (۹).

یک بخش اساسی تحقیقات در زمینه مواد شیمیایی کشاورزی شامل جستجو و کشف مواد شیمیایی طبیعی است که با داشتن ویژگی‌های ذکر شده در بالا بتواند ما را به سیاست کاهش مصرف علف‌کش‌ها نزدیک نماید. از اینرو، این پژوهش جهت بررسی فعالیت روغن‌های انسانی سیاه دانه، رازیانه، کندور و گل سرخ در بهینه‌سازی کارایی علف‌کش ایمازتاپیر بر روی علف‌هرز تاتوره به اجرا در آمد.

مواد و روش‌ها

برای اجرای آزمایش، علف‌هرز تاتوره به عنوان گونه گیاهی محک به دلیل اسان بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت، انتخاب شد. کپسول‌های رسیده تاتوره از مزارع اطراف شهر قزوین در پاییز سال ۱۳۹۱ هجری شمسی جمع آوری شد. بذر درون کپسول‌ها در شرایط دمای اتفاق تا روز اجرای آزمایش نگهداری شدند. آزمایش در طی ماه‌های تیر تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲ هجری شمسی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. بذر تاتوره هر یک ساعت برای مدت هفت روز متولی تحت شستشوی سنگین آب شرب قرار گرفتند تا بازدارنده‌های موجود در پوسته بذر از بین بود (۱). سپس، بذر بطور سطحی با محلول ۵

1- *Datura stramonium* L.

خود غیر فعال خواهد بود. به عبارتی دیگر، هیچگونه خاصیت کیاهسوزی بر روی این علف‌هرز ایجاد نخواهد کرد.

همان طور که در شکل مشخص است، کاربرد تمامی مواد افزودنی طبیعی موجب کشیده شدن منحنی واکنش به مقدار به سمت چپ منحنی علف‌کش ایمازتاپیر به تنهایی شده است، که نشان دهنده افزایش کارایی ایمازتاپیر به وسیله این مواد افزودنی است. این نتیجه از جدول نیز معلوم است. به طوری که بر اساس داده‌های وزن تر و خشک تاتوره، زمانی که علف‌کش به تنهایی مورد استفاده قرار گرفت، مقادیر پارامتر GR_{10} به ترتیب برابر $7/50$ و $7/40$ گرم ماده موثره در هکتار، مقادیر پارامتر GR_{50} به ترتیب $18/08$ و $19/01$ گرم ماده موثره در هکتار و مقادیر پارامتر GR_{90} به ترتیب $50/48$ و $43/54$ گرم ماده موثره در هکتار بدست آمد (جدول ۱). همان طور که از جدول استنتاج می‌شود، مواد افزودنی طبیعی به طور معنی‌داری باعث کاهش مقادیر GR_{10} ، GR_{50} و GR_{90} علف‌کش ایمازتاپیر در کنترل علف‌هرز تاتوره شد. کاهش پارامتر GR_{50} سبب شد تا مقادیر پارامتر پتانسیل نسبی بزرگتر از یک بدست آید، که نشان دهنده افزایش کارایی علف‌کش می‌باشد.

داده‌های وزن تر و خشک روند تقریباً مشابهی را نشان دادند، البته با یک سری اختلافات جزئی که توضیحی برای آن یافت نشد. بر اساس داده‌های وزن تر تاتوره بهترین نتیجه بهینه‌سازی با کارایی ایمازتاپیر وقتی که به همراه روغن رازیانه با غلظت ۱ درصد ($7/7$) بدست آمد. به طوری که کاربرد این ماده افزودنی کارایی علف‌کش در کنترل وزن تر تاتوره حدود $4/61$ برابر افزایش پیدا کرد. در حالی که بر اساس داده‌های وزن خشک تاتوره، بهترین نتیجه بهینه‌سازی با کارایی ایمازتاپیر وقتی که به همراه روغن کندور با غلظت ۱ درصد ($7/7$) بدست آمد. به طوری که کاربرد این ماده افزودنی کارایی علف‌کش در کنترل وزن تر تاتوره حدود $4/50$ برابر افزایش پیدا کرد (جدول ۱). نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هر یک از مواد افزودنی مورد بررسی، پتانسیل نسبی بیشتر افزایش یافت. ولی تنها در مورد روغن سیاه دانه، افزایش غلظت ماده افزودنی سبب بهبود معنی‌داری در کارایی علف‌کش شد. به طوری که بر اساس داده‌های وزن خشک تاتوره، هنگام کاربرد علف‌کش به همراه $0/5$ و ۱ درصد ($7/7$) از روغن سیاه دانه، مقادیر پتانسیل نسبی علف‌کش به ترتیب برابر $2/24$ و $3/58$ بدست آمد. منفعت حاصل از افزایش غلظت روغن‌های گیاهی در بهبود کارایی علف‌کش‌ها قبله به وسیله محققان دیگری گزارش شده است.

برای مثال، یک رابطه مثبتی قوی بین غلظت روغن منداب و تاثیر آن بر کارایی علف‌کش‌های فن‌مدیفام (۶) و گلیفوسویت (۳) مشاهده شده است. به طوری که افزایش غلظت روغن منداب از $0/1$ به ۱ درصد ($7/7$) سبب بهبود کارایی هر دو علف‌کش شده است.

برازش داده شدند (۱۰):

$$Y = C + \{D - C / 1 + \exp[B(\log X - \log E)]\}$$

که در آن: Y : بیانگر وزن تر یا خشک، D و C : حد مجاز بالا و GR_{50} : بیانگر مقدار علف‌کش لازم (X) برای کاهش ۵۰ درصد وزن تر یا خشک علف‌هرز بین حدود بالا و پایین (D و C) است، و B : متناسب با شب منحنی در محدوده GR_{50} می‌باشد. با استفاده از دستورات نرم افزار R، مقادیر GR_{10} و GR_{90} برآورد شدند که به ترتیب بیانگر مقدار علف‌کش لازم برای کاهش ۱۰ و ۹۰ درصد وزن تر یا خشک علف‌هرز بین حدود بالا و پایین (D و C) می‌باشد. بخش میانی منحنی، از اهمیت علمی خاصی برخوردار می‌باشد. به طوری که بیانگر ویژگی موسوم به فعالیت ذاتی علف‌کش در گیاه است. به طوری که از نسبت آنها برای ارزیابی جایه‌جایی افقی منحنی در اثر کاربرد مواد افزودنی استفاده می‌شود. این نسبت را پتانسیل نسبی (R) می‌نامند که براساس معادله ۲ محاسبه می‌شود (۱):



$$R = GR_{50a} / GR_{50b}; R \leq 1 \leq R$$

که در آن: صورت و مخرج معادله نشانگر مقادیری از ایمازتاپیر (GR_{50}) به ترتیب بدون ماده افزودنی (a) و به همراه ماده افزودنی (b) که دارای اثرات مشابهی در کنترل علف‌هرز تاتوره بوده‌اند. اگر R برابر یک باشد، دو منحنی دارای پتانسیل نسبی یکسانی خواهند بود. اگر پتانسیل نسبی بزرگتر از یک باشد، منحنی دوم دارای فعالیت شاخ و برگی بیشتری از منحنی اول خواهد بود و اگر پتانسیل نسبی کوچکتر از یک باشد، بر عکس آن صادق خواهد بود. اختلاف بین مقادیر پتانسیل نسبی بر اساس خطای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج و بحث

منحنی‌های واکنش به مقدار علف‌کش مورد استفاده در این تحقیق وقتی که با و بدون مواد افزودنی طبیعی بر روی علف‌هرز تاتوره پاشیده شده بود، در شکل ۱ نشان داده شده است. در جدول ۱ نیز نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی این شکل نشان داده شده است. با وجود اختلاف بین شب منحنی‌ها، ولی برحسب خطاها ایستاندارد، هیچگونه اختلاف معنی‌داری بین منحنی‌های واکنش به مقدار علف‌کش مشاهده نشد. به عبارتی دیگر، تمامی منحنی‌های واکنش به مقدار دارای شب برابری هستند.

بر اساس ریتز و استریبیگ (۱۰)، در زمانی که اختلاف معنی‌داری بین شب منحنی‌ها وجود نداشته باشد، آنها را می‌توان موازی در نظر گرفت. در چنین وضعیتی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر هر یک از این مواد افزودنی طبیعی در غلظت‌های مورد بررسی به تنهایی و بدون علف‌کش بر روی تاتوره پاشش شوند، از نظر زیستی به خودی-



شکل ۱- منحنی های واکنش وزن تر (راست) و خشک (چپ) علف هرز تاتوره به مقادیر مختلف علف کش ایمازتاپیر پاشیده شده به تنها یی (H) و به همراه روغن های انسانی سیاه دانه (B)، رازیانه (F)، گل سرخ (R) و کندور (O) در دو غلظت ۰/۵ و ۱ درصد (v/v).

Figure 1- Dose-response curves of the shoot fresh (right) and dry (left) weights of jimsonweed on imazethapyr (g a.i. ha⁻¹) doses alone (H) and with the essential oils of Blackseed (B), Fennel (F), Olibanum (O), and Rose (R) at two concentrations of 0.5 and 1% (v/v)

روغن های گیاهی مورد استفاده در بخش مقدمه مورد توجه قرار گرفته است.

نتیجه گیری کلی

نظر به اینکه کوتیکول موومی سطح برگ مانع اصلی جهت نفوذ دادن ماده موثره علف کش های محلول در آبی مانند ایمازتاپیر به بافت های درونی برگ است؛ لذا، ثابت شده است که مواد افزودنی روغنی دارای عملکرد مناسبی باشند (۶). نتایج این تحقیق نیز این موضوع را به اثبات رساند. از طرفی دیگر، در افکار عمومی یک تغییری در روند تمایل در کاربرد مواد افزودنی از مواد افزودنی مخالف محیط زیست به سمت مواد افزودنی دوستدار محیط زیست مشاهده می شود.

در حال حاضر، مواد افزودنی نفوذدهنده بر مبنای روغن های گیاهی به مواد افزودنی نفوذدهنده بر مبنای روغن معدنی ترجیح داده می شوند (۱۵) به دلیل اینکه آنها تجدید و تجزیه پذیر هستند. بنابراین، ضروری است که به دنبال کشف روغن های انسانی از گیاهان دارویی به عنوان مواد بالقوه طبیعی جهت بهبود کارایی علف-

تакنون، هیچ گزارشی مبنی بر کاربرد این مواد افزودنی طبیعی به همراه آفت کش ها ارائه نشده است، ولی گزارشات دیگری (۲، ۵، ۷) مبنی بر کاربرد مواد افزودنی طبیعی دیگری به عمل آمده است. کابانی (۲) گزارش کرده است که کارایی علف کش کلودینا فوپ - پروپارژیل تقریباً به میزان ۶ برابر با افزودن ۰/۵ درصد (۷/۷) از روغن انسانی کاج بهبود پیدا می کند. ایزدی دریندی و همکاران (۵) نیز گزارش کرده اند که کارایی برخی از علف کش های گروه B/۲ در کنترل علف هرز یولاف وحشی آ به وسیله تعدادی از روغن های گیاهی بهبود پیدا می کند.

برای مثال، کارایی علف کش ایمازامتابنز متیل به همراه روغن منداب^۱ تقریباً به میزان ۸ برابر افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، آنها دریافتند که بین ظرفیت بهبود دهنگی روغن های گیاهی در کارایی علف کش و نسبت اسیدهای اشباع به غیر اشباع روغن های گیاهی یک رابطه منفی وجود دارد (۵). دلایل بهبود کارایی ایمازتاپیر به وسیله

1- *Pinus pinaster* Ait.

2- *Avena ludoviciana* L.

کش‌های شاخ و برگ مصرف بود.

جدول ۱- ضرایب رگرسیون غیرخطی تاثیر غلظت‌های روغن‌های اسانسی بر کنترل وزن تر و خشک تاتوره.

Table 1. The non-line regression coefficients of effect of essence oil concentrations on the efficacy of imazethapyr to control the dry and fresh weight of jimsonweed.

تیمارها Treatments	غلظت (% v/v) Concentration	وزن تر اندام هوایی Shoot fresh weight					پتانسیل نسبی Relative potency	پتانسیل نسبی Relative potency
		شیب منحنی Slope (b)	GR ₁₀	GR ₅₀	GR ₉₀	پتانسیل نسبی Relative potency		
ایمازتاپیر	-	2.14 (0.66)	6.47 (1.57)	18.08 (3.37)	50.48 (3.21)	1.00		
Imazethapyr (I)								
ایمازتاپیر + سیاه دانه	0.5	1.94 (1.12)	2.82 (0.90)	8.75 (1.32)	27.10 (1.71)	2.06 (0.49)*	1.00	
I + Blackseed oil								
ایمازتاپیر + سیاه دانه	1	3.07 (0.83)	2.56 (0.54)	5.25 (0.46)	10.73 (2.31)	3.44 (0.71)*	1.66 (0.29)*	
I + Blackseed oil								
ایمازتاپیر + روغن رازیانه	0.5	2.38 (0.75)	2.22 (0.67)	5.58 (0.60)	14.02 (4.44)	3.24 (0.69)*	1.00	
I + Fennel oil								
ایمازتاپیر + روغن رازیانه	1	1.88 (1.22)	1.23 (0.61)	3.92 (0.61)	12.56 (4.45)	4.61 (1.12)*	1.42 (0.27)ns	
I + Fennel oil								
ایمازتاپیر + اسانس گل سرخ	0.5	2.51 (0.72)	2.70 (0.69)	6.47 (0.70)	15.49 (4.52)	2.79 (0.60)*	1.00	
I + Rose								
ایمازتاپیر + اسانس گل سرخ	1	2.47 (0.44)	1.00 (0.52)	4.43 (0.80)	19.56 (8.53)	4.08 (4.08)*	1.46 (0.30)ns	
I + Rose essence								
ایمازتاپیر + کندور	0.5	2.87 (1.05)	2.67 (0.73)	5.74 (0.54)	12.33 (3.90)	3.15 (0.65)*	1.00	
I + Frankincense								
ایمازتاپیر + کندور	1	2.18 (0.99)	1.44 (0.81)	3.93 (0.61)	10.75 (4.16)	4.59 (1.11)*	1.45 (0.26)ns	
I + Frankincense								
وزن خشک اندام هوایی Shoot dry weight								
ایمازتاپیر	-	2.50 (1.12)	7.50 (2.19)	19.01 (3.97)	43.54 (4.83)	1.00		
Imazethapyr (I)								
ایمازتاپیر + سیاه دانه	0.5	2.41 (0.87)	3.23 (1.13)	8.06 (1.26)	20.07 (7.59)	2.24 (0.60)*	1.00	
I + Blackseed oil								
ایمازتاپیر + سیاه دانه	1	1.63 (0.62)	1.64 (0.90)	5.30 (1.43)	24.26 (4.21)	3.58 (0.91)*	1.52 (0.35)*	
I + Blackseed oil								
ایمازتاپیر + روغن رازیانه	0.5	1.65 (0.72)	1.12 (0.77)	5.60 (0.98)	15.88 (8.56)	4.28 (1.37)*	1.00	
I + Fennel oil								
ایمازتاپیر + روغن رازیانه	1	2.16 (0.86)	2.03 (0.87)	4.22 (0.94)	15.44 (6.80)	3.22 (0.89)*	1.32 (0.21)ns	
I + Fennel oil								
ایمازتاپیر + اسانس گل سرخ	0.5	1.37 (0.67)	1.69 (0.04)	8.33 (2.81)	41.40 (3.37)	2.16 (0.87)*	1.00	
I + Rose								
ایمازتاپیر + اسانس گل سرخ	1	2.01 (0.73)	1.84 (0.83)	6.51 (1.01)	16.43 (6.98)	2.92 (0.94)*	1.27 (0.58)ns	
I + Rose essence								
ایمازتاپیر + کندور	0.5	1.20 (0.60)	0.77 (0.06)	5.68 (2.11)	41.63 (4.06)	3.17 (1.37)*	1.00	
I + Frankincense								
ایمازتاپیر + کندور	1	2.09 (1.21)	1.40 (0.04)	4.01 (0.87)	11.46 (6.08)	4.50 (1.39)*	1.41 (0.61)ns	
I + Frankincense								

علف کش + روغن با غلظت ۰/۵ GR₅₀ هر یک از تیمارهای دیگر محاسبه شده است. پتانسیل نسبی ۲ به صورت GR₅₀ علف کش تنها تقسیم بر GR₅₀ پتانسیل نسبی ۱ به صورت به ترتیب معنی داری در سطح ns علف کش + همان روغن با غلظت ۱ درصد محاسبه شده است. اعداد داخل پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد هستند. *، ** و *** درصد تقسیم بر احتمال ۵ و ۱ درصد و غیر معنی داری را نشان می‌دهد.

Relative potency = GR₅₀ / GR₅₀, showing horizontal displacement between curves. Relative potency 1 = GR₅₀ none adjuvant / GR₅₀ each adjuvant; Relative potency 2 = GR₅₀ adjuvant at 0.5 (% v/v) / GR₅₀ adjuvant at 1 (% v/v). Standard errors are in parentheses. * - Statistical significance (P ≤ 0.05); ** - Highly statistical significant (P ≤ 0.01); ns - No statistical significant.

سپاسگزاری

از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکر و قدردانی به عمل می‌آید. همچنین، از همکاری صمیمانه خانم سمية ابراهیم‌پور فرجی و آقای هادی مهدی‌خانی در اجرای این تحقیق صمیمانه تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

این موضوع می‌تواند ما را در به سمت پیشبرد سیاست کاهش مصرف مواد شیمیایی کشاورزی سوق دهد تا از خطرات ناشی از کاربرد کاسته شود. از نتایج بدست آمده از این تحقیق، می‌توان به این جمع بندی نهایی رسید که روغن‌های اسانسی سیاه دانه، رازیانه، کندور و گل سرخ قادرند تا فعالیت علف‌کش ایمازتاپیر را در کنترل علف‌هزز تاتوره افزایش دهند. از این‌رو، از این مواد طبیعی می‌توان برای توسعه مواد افزودنی نفوذ دهنده تجاری بهره برد. توصیه می‌شود که موضوع کیفیت عمل انتخابی علف‌کش برای گیاه زراعی در هنگام کاربرد این مواد افزودنی در نظر گرفته شود. از این‌رو، لازم است تحقیقات مزرعه‌ای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

منابع

- 1- Andersen R.N. 1968. Germination and establishment of weeds for experimental purposes. Weed Science Society of America, Urbana, IL, USA.
- 2- Cabanne F. 2000. Increased efficacy of clodinafop-propargyl by terpineols and synergistic action with esterified fatty acids. *Weed Research*, 40:81-189.
- 3- Gauvrit C., Muller T., Milius A., and Trouve G. 2007. Ethoxylated rapeseed oil derivatives as non-ionic adjuvants for glyphosate. *Pest Management Science*, 63:707-713.
- 4- Haig T.J., Seal A.N., Pratley J.E., An M., and Wu H. 2009. Lavender as a source of novel plant compounds for the development of a natural herbicide. *Journal of Chemical Ecology*, 35:1129-1136.
- 5- Izadi-Darbandi E., Aliverdi A., and Hammami H. 2013. Behavior of vegetable oils in relation to their influence on herbicides' effectiveness. *Industrial Crops and Products*, 44:712-717.
- 6- Muller T., Brancq B., Milius A., Okori N., Vaille C., and Gauvrit C. 2002. Ethoxylated rapeseed oil derivatives as novel adjuvants for herbicides. *Pest Management Science*, 58:1243-1249.
- 7- Nalewaja J.D., Praczyk T., and Matysiak R. 1995. Surfactants and oil adjuvants with nicosulfuron. *Weed Technology*, 9:689-695.
- 8- Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., Hamami H., and Zand E. 2010. Optimizing the performance of diclofop-methyl, cycloxydim, and clodinafop-propargyl on littleseed canarygrass (*Phalaris minor*) and wild oat (*Avena ludoviciana*) control with adjuvants. *Weed Biology and Management*, 10:57-63.
- 9- Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., and Rahimi S. 2011. Optimizing dosage of sethoxydim and fenoxaprop-p-ethyl with adjuvants to control wild oat. *Industrial Crops and Products*, 34:1583-1587.
- 10- Ritz C., and Streibig J.C. 2005. Bioassay Analysis using R. *Journal of Statistical Software*, 12:1-22.
- 11- Somervaille A., Betts G., Gordon B., Green V., Burgis M., and Henderson R. 2012. Adjuvants - Oils, surfactants and other additives for farm chemicals. Grains Research and Development Corporation. Conservation Farmers Inc. Australia.
- 12- Uddin M.R., Li X., Won O.J., Park S.U., and Pyon J.Y. 2011. Herbicidal activity of phenolic compounds from hairy root cultures of *Fagopyrum tataricum*. *Weed Research*, 52:25-33.
- 13- Vaughn S.F., and Holser R.A. 2007. Evaluation of biodiesels from several oilseed sources as environmental friendly contact herbicides. *Industrial Crops and Products*, 26:63-68.
- 14- Zawierucha J.E., and Penner D. 2001. Adjuvant efficacy with quinclorac in canola (*Brassica napus*) and turf grass. *Weed Technology*, 15:220-223.
- 15- Zollinger R.K. 2000. Extension perspective on grower confusion in adjuvant selection. *Weed Technology*, 14:814-818.