

مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخص‌های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل

علف هرز

مهدی راستگو^{۱*} - قربانعلی اسدی^۲ - عبدالله درپور سرخ سراپی^۳ - سلمان رحیمی^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر شاخص‌های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل علف‌های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل الگوی کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای در دو سطح کشت مخلوط بین ردیفی و کشت مخلوط درون ردیفی و نسبت کشت مخلوط در پنج سطح شامل ۷۵:۲۵، ۵۰:۵۰، ۲۵:۷۵ و کشت خالص دو گیاه پنبه و چغندر علوفه‌ای به عنوان عامل اصلی و تداخل علف‌های هرز در دو سطح شامل وجین و عدم وجین تمام فصل علف هرز به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر الگوی کشت مخلوط و برهمکنش الگوی کشت و نسبت‌های کاشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای بر تراکم و وزن خشک کل علف‌های هرز معنی‌دار نبود، اما اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای بر وزن خشک کل علف‌های هرز معنی‌دار بود. در نسبت کشت ۷۵:۲۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، وزن خشک علف‌های هرز پایین‌تر از سایر نسبت‌های اختلاط بود. در شرایط تداخل و یا عدم تداخل علف‌های هرز، حداقل ۵۰ درصد کاهش در عملکرد و پنبه و ۸۳ درصد کاهش در عملکرد ریشه چغندر علوفه‌ای در شرایط کشت مخلوط، در مقایسه با کشت خالص هر یک از گیاهان مشاهده شد. دو شاخص نسبت برابری زمین و کاهش عملکرد واقعی نشان‌دهنده برتری کشت خالص پنبه نسبت به کشت مخلوط بود، ولی شاخص مجموع ارزش نسبی بیان‌کننده برتری کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای نسبت به کشت خالص پنبه بود. به طوری که کاشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای با نسبت ۷۵:۲۵ موجب شد در شرایط حضور و عدم حضور علف هرز مجموع ارزش نسبی به ترتیب ۲/۵ و ۸/۶ برابر کشت خالص پنبه افزایش یابد. شاخص‌های رقابتی شامل ضریب ازدحام نسبی، نسبت رقابت و شاخص غالبیت نشان دادند که چغندر علوفه‌ای نسبت به پنبه از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای به صورت جانشینی، فقط از نظر یکی از شاخص‌های ارزیابی کشت مخلوط (مجموع ارزش نسبی) مناسب بود و در مجموع قابل توصیه نیست.

واژه‌های کلیدی: سری‌های جانشینی، عملکرد و ش، مجموع ارزش نسبی

(۲ و ۵)

مقدمه

کنترل شیمیایی و مکانیکی دو گزینه اصلی در مدیریت علف‌های هرز مزارع پنبه جهان و کشور به شمار می‌آیند (۸). با این وجود در ایران تنها هفت علف‌کش توصیه شده برای مزارع پنبه در دسترس هست (۳۸). معمولاً کاربرد یکی از آن‌ها به تنهایی نمی‌تواند مؤثر واقع شود و جهت کنترل مناسب باید یک علف‌کش پیش رویشی همراه با حداقل یک مرتبه پاشش علف‌کش پس رویشی بکار برده شود (۲۹) و (۳۱). همچنین کاربرد ادوات مکانیکی همچون کولتیواتور برای کنترل علف‌های هرز به تنهایی و یا یک مرتبه در دوره رشد پنبه مؤثر نبوده و نیاز به کاربرد حداقل دو مرتبه از آن‌ها در طول فصل رشد هست (۴) و (۳۱)، که با داشتن این شرایط نیز علف‌های هرز روی پشته‌ها از بین نمی‌روند و صدماتی نیز به ساختار خاک وارد می‌شود.

پنبه (*Gossypium hirsutum* L.) یکی از محصولات زراعی مهم در منطقه خراسان به شمار می‌آید که در مجموع با داشتن ۳۷ هزار هکتار سطح زیر کشت، ۵۰ درصد از کل سطح زیر کشت پنبه کشور را به خود اختصاص داده‌اند (۱). طولانی بودن دوره رشد پنبه که حدود هفت ماه به طول می‌انجامد و سرعت رشد پایین و سایه‌اندازی بسیار ضعیف در ابتدای رشد دستیابی به عملکرد بهینه آن را به علت تداخل طولانی علف‌های هرز با چالش جدی مواجه می‌کند

۱، ۲ و ۳ - به ترتیب دانشیاران و دانشجویان دکتری علوم علف‌های هرز، گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(Email: m.rastgoo@um.ac.ir)

(* نویسنده مسئول)

DOI: 10.22067/JPP.2021.32834.0

کشت مخلوط به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت زراعی علف‌های هرز مطرح است، که از مهم‌ترین اهداف آن افزایش آگاهانه تنوع سیستم زراعی در جهت کاهش خسارت عوامل زنده آسیب‌رسان مانند علف‌های هرز هست (۱۱ و ۲۷). در کشت‌های مخلوط به‌واسطه حضور حداقل دو گیاه زارعی، دسترسی به منابع و فضا برای علف‌های هرز محدود می‌گردد (۱۳، ۱۹ و ۳۵).

پنبه به‌واسطه کاستی‌هایی که در رقابت با علف‌های هرز دارد به کشت مخلوط با اکثر گیاهان زراعی پاسخ مثبت نشان می‌دهد (۱۶ و ۳۳). در هندوستان، چین و آمریکا به‌عنوان سه کشور برتر جهان در تولید پنبه (۱۰)، آن را به‌صورت مخلوط با بسیاری از گیاهان زراعی مانند غلات پاییزه، برنج (*Oryza sativa* L.)، بادام‌زمینی (*Arachis hypogaea* L.) و سویا (*Glycine max* L.) کشت می‌کنند که به دلیل کنترل بهتر آفات پنبه و مجموع درآمد و ارزش نسبی بیشتر نسبت به کشت خالص پنبه رو به گسترش است (۱۵، ۳۶ و ۳۹). کاندرو و همکاران (۱۷) نتیجه گرفتند که کشت مخلوط دو گیاه زراعی آللوپاتیک سورگوم و آفتابگردان (*Helianthus annuus* L.) با پنبه، موجب کنترل علف‌های هرز تا ۶۲ درصد و افزایش ۲۲ درصدی عملکرد دانه پنبه شد.

در سال‌های اخیر، پنبه‌کاران بومی منطقه خراسان، به‌ویژه در منطقه تربت‌جام، با استفاده از رهیافت کشت مخلوط پنبه-چغندر علف‌های (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* L.)، از مزایایی مانند رویش بهتر گیاه چغندر علف‌های، تأمین علفه برای دام و نیز افزایش درآمد بهره‌مند شده‌اند. در این شرایط، قرار گرفتن بوته‌های چغندر علف‌های در بین و یا داخل ردیف‌های کشت پنبه موجب تسریع در تسخیر فضا و منابع نسبت به کشت خالص پنبه می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز برتری رقابتی اجزای کشت مخلوط بر جامعه علف‌های هرز شود. در رابطه با کشت مخلوط پنبه - چغندر علف‌های و تأثیرات آن بر عملکرد هر دو گیاه و نیز پتانسیل این سیستم زراعی در کنترل علف‌های هرز، اطلاعات کمی در دسترس هست. بنابراین این آزمایش باهدف ارزیابی تأثیر کشت مخلوط پنبه-چغندر علف‌های بر کنترل علف‌های هرز و ارزیابی شاخص‌های رقابتی و سودمندی بین دو گیاه در منطقه مشهد، طراحی شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در ۱۰ کیلومتری شرق مشهد با مختصات طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۲۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی با ارتفاع ۹۸۵ متر از سطح دریا اجرا شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول ۱ ارائه شده است.

اطلاعات هواشناسی در طول دوره رشد پنبه و چغندر علف‌های در

سال ۱۳۹۳ از ایستگاه سینوپتیک مشهد تهیه شد (شکل ۱).

آزمایش به‌صورت فاکتوریل خردشده^۱ در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل الگوی کشت مخلوط در دو سطح کشت مخلوط بین ردیفی و کشت مخلوط درون ردیفی و نسبت کشت مخلوط جانشینی پنبه-چغندر علف‌های در پنج سطح شامل ۲۵:۷۵، ۵۰:۵۰، ۷۵:۲۵ و کشت خالص دو گیاه پنبه و چغندر علف‌های به‌عنوان عامل اصلی و تداخل علف‌های هرز در دو سطح شامل وجین و عدم وجین تمام فصل علف هرز به‌عنوان عامل فرعی بودند. هر کرت آزمایشی با ابعاد ۲×۸ متر شامل ۴ ردیف کاشت با فواصل ۵۰ سانتی‌متر بود که به دو قسمت تقسیم شد. در یک قسمت کنترل کامل علف‌های هرز صورت گرفت و در قسمت دیگر تداخل علف‌های هرز با گیاهان زراعی در تمام فصل وجود داشت.


زمین آزمایشی در سال زراعی قبل به‌صورت آیش بود. عملیات تسطیح و آماده‌سازی زمین یک ماه پیش از اجرای آزمایش صورت گرفت. هم‌زمان با دیسک کود گاوی پوسیده به مقدار ۴۵ تن در هکتار به زمین داده شد. کشت پنبه (رقم خرداد تهیه‌شده از مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی) و چغندر علف‌های (توده محلی تربت‌جام) در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ و به‌صورت دستی انجام شد.

بذر هر دو گیاه در عمق ۴ سانتی‌متری قرار داده شد. ۱۵ روز پس از کاشت به علت عدم یکنواختی در سبز شدن چغندر علف‌های، عملیات واکاری انجام شد. الگوی سری‌های جانشینی با رعایت فاصله بوته ۲۵ سانتی‌متر روی ردیف و تراکم کل ۸ بوته در متر مربع بود. فاصله بین کرت‌های آزمایشی یک متر و فاصله بین بلوک‌ها ۲ متر بود. در الگوی کشت مخلوط بین ردیفی جهت حصول نسبت‌های اختلاط دو گیاه از کاشت یک ردیف در میان پنبه و چغندر علف‌های برای نسبت ۵۰:۵۰ و ۳ ردیف پنبه و یک ردیف چغندر علف‌های و بالعکس برای نسبت‌های ۲۵:۷۵ و ۷۵:۲۵ استفاده شد. در الگوی کشت مخلوط درون ردیفی، بر روی هر کدام از ردیف‌های کاشت کرت‌های آزمایشی، نسبت دو گونه رعایت شد.

در طول دوره رشد دو گیاه، با این هدف که پایداری نظام کشت مخلوط حفظ شود، هیچ‌گونه عملیات کوددهی صورت نگرفت و تنها به همان میزان ۴۵ تن در هکتار کود گاوی پوسیده اکتفا شد. آبیاری به‌صورت نشتی و بر اساس نیاز آبی دو گیاه هفته‌ای یک‌بار و یک ماه پیش از برداشت به دو هفته یک‌بار کاهش یافت. به علت خشکی بسیار هوا در تیر و مردادماه، برخی اوقات فاصله آبیاری به ۴ روز کاهش می‌یافت.

جدول ۱- خصوصیات شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 1- Soil chemical properties of the experiment site

بافت خاک Soil texture	نیترژن کل Total N (%)	فسفر قابل دسترس Available P (ppm)	پتاسیم قابل دسترس Available K (ppm)	ماده آلی Organic matter (%)	pH	هدایت الکتریکی Electrical conductivity (dS.m ⁻¹)
سیلتی رسی لومی Silty clay loam	0.0279	1.5	213	0.241	7.13	2.156



شکل ۱- درجه حرارت (کمینه، بیشینه و میانگین) و درصد رطوبت هوا در طول دوره رشد پنبه و چغندر علوفه‌ای در سال ۱۳۹۳
Figure 1- Daily temperature (minimum, maximum, and mean) and air humidity percentage in cotton and fodder beet growing period at 2014 experiment

با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد قرار داده و سپس توزین شدند. سودمندی کشت مخلوط و اثرات رقابتی بین پنبه و چغندر علوفه‌ای با استفاده از شاخص‌های مختلف ارزیابی شد. نسبت برابری زمین^۱ (LER) به عنوان کاربردی‌ترین معیار سودمندی کشت مخلوط در استفاده از منابع محیطی مطرح است که بیان‌کننده مقدار مساحت موردنیاز زمین برای کشت خالص دو گونه در مقایسه با کشت مخلوط آن‌ها جهت حصول عملکرد برابر هست (۲۳).

$$LER_C = \left(\frac{Y_{cb}}{Y_{ca}} \right) \quad LER_B = \left(\frac{Y_{bb}}{Y_{ba}} \right) \quad (1) \text{ معادله}$$

$$LER = LER_C + LER_B$$

1- Land Equivalent Ratio

در انتهای فصل رشد و در زمان رسیدگی پنبه و چغندر علوفه‌ای، بوته‌های موجود از سطح یک کادر به مساحت یک متر مربع جمع‌آوری و عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. برداشت پنبه هم‌زمان با شکوفایی بیش از ۷۵ درصد غوزه‌ها و رطوبت حدود ۱۲ درصدی وش پنبه در ۱۰ مهر و برداشت چغندر علوفه‌ای هم‌زمان با پایان فصل رویش گیاه و زرد شدن و افتادگی برگ‌های گیاه در اول آبان ماه انجام شد. برای چغندر علوفه‌ای عملکرد ریشه و زیست‌توده کل و برای پنبه زیست‌توده کل، تعداد غوزه و عملکرد وش در واحد سطح اندازه‌گیری شد. جهت اندازه‌گیری تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در همان کادر، تمامی علف‌های هرز شمارش، جمع‌آوری و به مدت ۴۸ ساعت در داخل آون

$$K_C = \left(\frac{Y_{cb} \times Z_{bb}}{Y_{ca} - Y_{cb} Z_{cb}} \right) \quad K_B = \left(\frac{Y_{bb} \times Z_{cb}}{Y_{ba} - Y_{bb} Z_{bb}} \right) \quad (۴)$$

$$K = K_C \times K_B$$

در معادله (۴) K_B و K_C به ترتیب ضریب ازدحام نسبی پنبه و چغندر علوفه‌ای هست. مقدار بالاتر از یک برای K نشان‌دهنده بیشترین کارایی مصرف منابع در کشت مخلوط و در نتیجه سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص است، مقدار برابر با یک نشان‌دهنده عدم تفاوت کشت مخلوط و خالص و مقدار کمتر از یک نشان‌دهنده کارایی کم در مصرف منابع در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص و در نتیجه عدم سودمندی کشت مخلوط است (۷).
نسبت رقابت برای پنبه و چغندر علوفه‌ای با استفاده از معادله (۵) برآورد گردید (۷).
معادله (۵)

$$CR_C = \left(\frac{LER_C \times Z_{bb}}{LER_B \times Z_{cb}} \right) \quad CR_B = \left(\frac{LER_B \times Z_{cb}}{LER_C \times Z_{bb}} \right)$$

در معادله (۵۴) CR_B و CR_C به ترتیب نسبت رقابت پنبه و چغندر علوفه‌ای هست. مقادیر بزرگ‌تر نسبت رقابت برای یک‌گونه نسبت به دیگری، نشان‌دهنده رقابت‌پذیری بیشتر آن گونه هست. برای تعیین شاخص غالبیت از معادله (۶) استفاده شد (۷).

$$A = \left(\frac{Y_{cb}}{Y_{ca} \times Z_{cb}} \right) - \left(\frac{Y_{bb}}{Y_{ba} \times Z_{bb}} \right) \quad (۶)$$

مقدار مثبت شاخص غالبیت نشان‌دهنده غالبیت پنبه و مقدار منفی آن نشان‌دهنده غالبیت چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط هست. تجزیه واریانس داده‌ها با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته از طریق رویه GLMMIX در محیط نرم‌افزار SAS 9.4 انجام پذیرفت (۲۰). تأثیر سه فاکتور الگوی کشت مخلوط، نسبت اختلاط و تداخل علف‌های هرز و برهمکنش آن‌ها با یکدیگر به‌عنوان اثرات ثابت و تأثیر بلوک و بلوک × الگوی کشت مخلوط × نسبت اختلاط و خطای کل به‌عنوان متغیرهای تصادفی در مدل در نظر گرفته شدند. مقایسه میانگین‌ها اثرات ساده فاکتورها و برهمکنش آن‌ها با استفاده از روش مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات در همین رویه انجام شد.

نتایج و بحث

مهم‌ترین علف‌های هرز ثبت‌شده در مزرعه مورد بررسی تاج‌خروس وحشی (*Amaranthus retroflexus* L.)، تاج‌ریزی سیاه (*Solanum nigrum* L.)، سلمه تره (*Chenopodium album* L.)، توق (*Xanthium strumarium* L.)، پیچک (*Convolvulus arvensis* L.)، گاو پنبه (*Abutilon theophrasti* Medik.) و سوروف (*Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv.) بودند. در این آزمایش، اثر الگوی کشت مخلوط و برهمکنش الگوی کشت و

در معادله (۱) Y_{ca} و Y_{cb} عملکرد اقتصادی پنبه در کشت مخلوط و خالص، Y_{ba} و Y_{bb} عملکرد اقتصادی چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط و خالص، LER_B و LER_C به ترتیب نسبت برابری زمین جزئی برای پنبه و چغندر علوفه‌ای و LER نسبت برابری زمین کل هست. مقادیر برابر با یک، بزرگ‌تر از یک و کوچک‌تر از یک برای این شاخص به ترتیب بیان‌کننده عدم اختلاف بین کشت خالص و مخلوط، برتری کشت مخلوط نسبت به خالص و برتری کشت خالص نسبت به مخلوط هست. کاهش یا افزایش عملکرد واقعی^۱ (AYL)، دیگر شاخص سودمندی مورد استفاده در این آزمایش با استفاده از معادله (۲) برآورد شد (۳).

معادله (۲)

$$AYL_C = \left\{ LER_C \times \left(\frac{100}{Z_{cb}} \right) \right\} - 1 \quad AYL_B = \left\{ LER_B \times \left(\frac{100}{Z_{bb}} \right) \right\} - 1$$

$$LER = AYL_C + AYL_B$$

در معادله (۲) Z_{bb} و Z_{cb} به ترتیب نسبت پنبه و چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط، AYL_C و AYL_B به ترتیب کاهش عملکرد واقعی جزئی برای پنبه و چغندر علوفه‌ای و AYL کاهش عملکرد واقعی کل هست. مقدار مثبت یا منفی عملکرد واقعی به ترتیب نشان‌دهنده سودمندی و زیان عملکرد کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هست. مجموع ارزش نسبی^۲ (RVT) به‌عنوان شاخص سودمندی اقتصادی با استفاده از معادله (۳) برآورد شد (۳۴).

$$RVT_C = \left(\frac{P_c \times Y_{cb} + P_b \times Y_{bb}}{P_c \times Y_{ca}} \right) \quad (۳)$$

در معادله (۳) RVT_C ارزش نسبی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص پنبه و P_b و P_c به ترتیب نشان‌دهنده قیمت هر کیلوگرم از محصول که برای پنبه ۴۸۷۶۰ ریال و برای چغندر علوفه‌ای ۵۰۲۰ ریال در نظر گرفته شد. مقادیر بالاتر از یک برای این شاخص نشان‌دهنده سودمندی اقتصادی کشت مخلوط و مقادیر پایین‌تر نشان‌دهنده عدم سودمندی اقتصادی در کشت مخلوط هست. به علت اصلی بودن کشت پنبه در این آزمایش، مجموع ارزش نسبی تنها برای این گیاه برآورد گردید. سه شاخص ضریب ازدحام نسبی^۳ (RCC)، نسبت رقابت^۴ (CR) و شاخص غالبیت^۵ (A) به‌عنوان شاخص‌های رقابتی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب ازدحام نسبی که با K نیز نشان داده می‌شود با استفاده از معادله (۴) برآورد شد (۷).

- 1- Actual Yield Loss
- 2- Relative Value Total
- 3- Relative Crowding Coefficient
- 4- Competitive Ratio
- 5- Aggressivity

وزن خشک علف‌های هرز پایین‌تر از سایر نسبت‌های اختلاط بود، بطوریکه در مقایسه با کشت خالص پنبه، حدود ۳۳ درصد و نسبت به کشت خالص چغندر علوفه‌ای نیز ۲۷ درصد کاهش داشت که البته با کشت خالص چغندر علوفه‌ای تفاوت معنی‌داری هم نداشت (جدول ۲).

نسبت‌های کاشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای بر تراکم و وزن خشک کل علف‌های هرز معنی‌دار نبود، اما اثر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط پنبه - چغندر علوفه‌ای بر وزن خشک کل علف‌های هرز معنی‌دار بود ($p \leq 0.05$) (جدول تجزیه واریانس نشان داده نشده است). بر این اساس در نسبت کشت ۲۵:۷۵ از پنبه- چغندر علوفه‌ای،

جدول ۲- مقایسه میانگین تراکم و وزن خشک کل علف‌های هرز و تلفات عملکرد پنبه در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط با چغندر علوفه‌ای
Table 2- Mean comparison of total weed dry density, total weed dry weight and cotton yield loss in different intercropping proportions with fodder beet

نسبت کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای Cotton-Fodder beet intercropping proportion (%)	تراکم علف‌های هرز Weed density (plants m ⁻²)	وزن خشک علف‌های هرز Weed dry weight (g m ⁻²)	تلفات عملکرد Cotton yield loss (%)
100:0	65 (43) ^a	864 (146) ^a	94.4 (1.7) ^a
75:25	46 (40) ^a	811 (168) ^a	94.6 (0.89) ^a
50:50	56 (37) ^a	838 (170) ^a	95.1 (1.6) ^a
25: 75	31 (21) ^a	576 (232) ^b	93.2 (2.6) ^a
0:100	42 (19) ^a	791 (225) ^{ab}	-

در هر ستون میانگین‌های با حروف مشابه اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار می‌باشند.

Values in columns with the same letter are not significantly different

Values in parentheses are standard deviation.

۸۰ درصد لوبیا منجر به ۷۰ درصد کاهش در وزن خشک کل علف‌های هرز نسبت به کشت خالص لوبیا شد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوی کشت مخلوط و برهمکنش آن با سایر متغیرهای آزمایشی، بر هیچ کدام از صفات عملکردی پنبه و چغندر علوفه‌ای معنی‌دار نبود، اما اثر نسبت اختلاط آن‌ها در کشت مخلوط و اثر تداخل علف‌های هرز و برهمکنش آن‌ها بر صفات عملکردی پنبه و چغندر علوفه‌ای معنی‌دار بود (جدول ۳).

بر اساس نتایج آزمایش، در شرایط عاری از علف‌های هرز، بیشترین تعداد غوزه پنبه در کشت خالص آن با ۱۴۶ غوزه در مترمربع بدست آمد و همزمان با کاهش نسبت پنبه در کشت مخلوط، تعداد غوزه در مترمربع کاهش یافت که مقدار این کاهش در نسبت ۲۵ درصد پنبه، ۸۵ درصد بود. در شرایط آلوده به علف‌های هرز و بطور مشابه این مقدار کاهش در تعداد غوزه نسبت به کشت خالص پنبه، ۷۸ درصد بود.

در کشت خالص پنبه بدون تداخل علف‌های هرز، عملکرد وش برابر ۴۳۹۰ کیلوگرم در هکتار بود و در شرایط تداخل علف‌های هرز کشت خالص پنبه با افت ۹۴/۵ درصدی در عملکرد وش مواجه شد (جدول ۴).

کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز تحت تأثیر استفاده از نظام‌های کشت مخلوط در بسیاری از مطالعات گزارش شده است. از جمله مهنی و همکاران (۲۴) نشان دادند که کشت مخلوط ۲۵ درصد سیاهدانه و ۷۵ درصد شنبلیله به طور معنی‌داری تراکم و وزن خشک کل علف‌های هرز را نسبت به کشت خالص هر یک از گیاهان کاهش داد. بر اساس نتایج این محققین کاهش عملکرد ناشی از حضور علف‌های هرز در کشت خالص شنبلیله حدود ۸۷ درصد بود حال آنکه این کاهش عملکرد در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط دو گیاه ۲۵ تا ۳۵ درصد بود.

فتح‌الله زاده دیزجی و میرشکاری (۹) نیز در بررسی کشت مخلوط ماش و همیشه بهار بیان کردند که بیشترین وزن خشک علف‌های هرز در نسبت‌های پایین کشت مخلوط ماش با همیشه بهار ایجاد شد و افزایش نسبت کاشت ماش در همیشه بهار به شکل قابل توجهی منجر به کاهش وزن خشک کل علف‌های هرز شد. در پژوهشی دیگر نیز مشخص شد بیشترین ماده خشک علف‌های هرز با ۷۴۲ گرم در مترمربع به کشت لوبیای خالص و کمترین آن با ۲۵۳ گرم در متر مربع در تیمار ۱۰۰ درصد ذرت و ۲۰ درصد لوبیا حاصل شد، که بیانگر تأثیر معنی‌دار کشت مخلوط بر کاهش وزن خشک علف‌های هرز بود (۲۲). منصوری و همکاران (۲۱) نیز گزارش کردند که در کشت مخلوط ذرت-لوبیا، تیمار کشت مخلوط افزایشی

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد پنبه و چغندر علوفه‌ای در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط تحت تأثیر الگوی کشت مخلوط و تداخل علف‌های هرز

Table 3- Results of analysis of variance of yield and yield components of cotton and fodder beet in different proportion of intercropping under the influence of planting pattern and weed interference

اثر / متغیر Effect/Variables	تعداد غوزه		عملکرد وش		عملکرد بیولوژیک		عملکرد ریشه		عملکرد بیولوژیک		
	پنبه NB	پنبه NB	پنبه CLY	پنبه CLY	پنبه BYC	پنبه BYC	چغندر علوفه‌ای RYB	چغندر علوفه‌ای RYB	چغندر علوفه‌ای BYB	چغندر علوفه‌ای BYB	
اثرات ثابت Fixed effects	درجه آزادی Df	درصد از کل واریانس تیمار PTV†	احتمال معنی‌داری P value	درصد از کل واریانس تیمار PTV	احتمال معنی‌داری P value	درصد از کل واریانس تیمار PTV	احتمال معنی‌داری P value	درصد از کل واریانس تیمار PTV	احتمال معنی‌داری P value	درصد از کل واریانس تیمار PTV	احتمال معنی‌داری P value
	الگوی کشت مخلوط Intercropping Pattern (IP)	1	0.003	0.8199	0.013	0.4924	0.0001	0.9831	0.014	0.4431	0.001
نسبت کشت مخلوط Intercropping Proportion (IP)	4	45.1	<.0001	62.8	<.0001	75.7	<.0001	74.2	<.0001	76.5	<.0001
نسبت کشت × الگوی کشت مخلوط مخلوط IP×IR	4	0.04	0.939	0.03	0.9021	0.005	0.991	0.1	0.6444	0.1	0.8065
تداخل علف‌های هرز Weed Interference (WI)	1	39.3	<.0001	28.2	<.0001	18.5	<.0001	19.5	<.0001	17.4	<.0001
الگوی کشت مخلوط × تداخل علف‌های هرز IP×WI	1	0.001	0.8727	0.02	0.4079	0.0001	0.9189	0.045	0.1675	0.1	0.1474
نسبت کشت مخلوط × تداخل علف‌های هرز IR×WI	4	13.2	<.0001	7.7	<.0001	4.9	<.0001	5.2	<.0001	4.7	<.0001
الگوی کشت مخلوط × نسبت کشت مخلوط × تداخل علف‌های هرز IP×IR×WI	4	0.4	0.1458	0.2	0.1998	0.1	0.2216	0.04	0.7794	0.1	0.7333
اثرات تصادفی Random effects											
تخمین واریانس Variance estimate†											
بلوک Block (B)		0.00007		0.00004		NE		NE		NE	
بلوک × الگوی کشت مخلوط × نسبت کشت مخلوط B×IP×IR		NE		0.00004		0.0001		NE		0.0002	
خطا Error		0.005		0.013		0.011		0.005		0.008	
ضریب تغییرات (%) C.V.		4.9		4.2		5.3		2.1		2.1	

داده‌های برای همه متغیرها تبدیل شد

درصد از کل واریانس تیمار

اعداد سیاه نشان‌دهنده اثر معنی‌دار می‌باشند

NE: غیر قابل تخمین

Data were transformed for all variables

†Percentage of total explained treatment variation

Bold numbers show significant effect

NE: non estimated; NB: number of bolls, LYC: lint yield of cotton, BYC: biological yield of cotton, RYB: root yield of fodder beet, BYB: biological yield of fodder beet

نشان دادند که در شرایط عدم تداخل علف‌های هرز، کشت مخلوط ردیفی ذرت و پنبه به نسبت ۵۰:۵۰ درصد از تراکم کل، موجب کاهش ۵۰ درصدی در عملکرد و ش پنبه نسبت به کشت خالص آن شد. ژانگ و همکاران (۳۹) مشاهده کردند که در کشت مخلوط تأخیری گندم-پنبه، عملکرد و ش پنبه بین ۵۴ تا ۶۹ درصد نسبت به کشت خالص آن کاهش یافت. همچنین بر اساس نتایج آزمایش، تداخل علف‌های هرز در مقایسه با شرایط عدم تداخل منجر به ۹۳/۱ درصد کاهش در عملکرد بیولوژیک پنبه در واحد سطح شد (جدول ۴).

همچنین در شرایط عاری از علف‌های هرز، کاهش نسبت پنبه به سطح ۲۵ درصد در کشت مخلوط، منجر به کاهش ۹۶ درصد عملکرد و ش پنبه نسبت به کشت خالص آن شد و این درصد کاهش در کمترین نسبت اختلاط (۲۵ درصد) در شرایط آلوده به علف‌های هرز، ۹۵ درصد بود (جدول ۴). با توجه به اینکه تعداد غوزه در واحد سطح مهم‌ترین جزء تعیین کننده عملکرد و ش در گیاه پنبه می‌باشد، لذا یکی از دلایل کاهش عملکرد و ش در نسبت‌های مختلف کاشت مخلوط در شرایط عاری از علف‌هرز و آلوده به علف‌هرز کاهش تعداد غوزه در واحد سطح می‌باشد (جدول ۴). کوچکی و همکاران (۱۸)

جدول ۴- مقایسه میانگین تعداد غوزه، عملکرد و ش و عملکرد بیولوژیک پنبه در نسبت‌های مختلف اختلاط با چغندر علوفه‌ای تحت تأثیر تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز

Table 4- Mean comparison of number of bolls, lint yield and biological yield of cotton in different proportion of intercropping with fodder beet under the interference and non-interference of weeds

تداخل علف‌هرز Weed interference	نسبت کشت مخلوط Intercropping proportion (%)†	تعداد غوزه Number of bolls (m ⁻²)	عملکرد و ش Lint yield (kg ha ⁻¹)	عملکرد بیولوژیک Biological yield (kg ha ⁻¹)
عاری از علف‌هرز Weed free	100	146 (13) ^a	4390 (402) ^a	12478 (1629) ^a
	75	96 (12) ^b	2152 (271) ^b	5866 (613) ^b
	50	54 (12) ^c	812 (179) ^c	2105 (513) ^c
	25	21 (7) ^d	157 (52) ^d	390 (119) ^e
آلوده به علف‌هرز Weed infested	100	14 (6) ^{de} [90%]	239 (70) ^d [94%]	860 (70) ^d [93%]
	75	9 (3) ^{ef} [90%]	115 (30) ^d [94%]	393 (30) ^e [93%]
	50	5 (2) ^{fg} [90%]	39 (18) ^e [95%]	149 (18) ^f [92%]
	25	3 (1) ^{fg} [85%]	10 (5) ^f [93%]	39.6 (5.6) ^g [89%]

درصد مختلف تراکم پنبه از تراکم کل در سطح

اعداد داخل ستون‌ها با حروف مشابه اختلاف معنی‌داری ندارند.

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.

اعداد داخل کروشه درصد کاهش نسبت به تیمار مشابه در شرایط عاری از علف هرز است.

† Different percentage of cotton density of total density in area

Values in columns with the same letter are not significantly different

Values in parentheses are standard deviation

Values in brackets are reduction percentage respect to same treatment in weed free condition

عملکرد و ش پنبه سبب کاهش در عملکرد بیولوژیک شده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه بجز در مورد صفت عملکرد و ش، در صفات تعداد غوزه در واحد سطح و نیز عملکرد بیولوژیک همزمان با کاهش نسبت گیاه پنبه در مخلوط و یا به عبارت دیگر همزمان با افزایش نسبت چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط، درصد کاهش عملکرد در مقایسه با شرایط عاری از علف‌های هرز، یک روند کاهشی نشان داد، که نشان از ضعف گیاه پنبه در مقایسه با چغندر علوفه‌ای در شرایط رقابت با علف‌های هرز است (جدول ۴).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش نسبت گیاه پنبه در کشت مخلوط، عملکرد بیولوژیک پنبه در شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز نسبت به کشت خالص پنبه به ترتیب ۹۵ و ۹۶ درصد کاهش یافت (جدول ۴). با توجه به اینکه عملکرد بیولوژیک پنبه متأثر از تعداد غوزه در واحد سطح و عملکرد و ش می‌باشد، در نتیجه نتایج مربوط به تأثیر نسبت کشت مخلوط بر صفات عملکردی پنبه، بسیار به هم نزدیک بود (جدول ۴). بر این اساس کاهش همزمان تعداد غوزه در واحد سطح و نیز

تداخل علف هرز ۸۳/۷ درصد کاهش نشان داد. در شرایط عاری از علف های هرز، عملکرد ریشه چغندر علوفه‌ای در نسبت کاشت ۲۵ درصد، در مقایسه با کشت خالص آن، ۹۱ درصد و در شرایط آلوده به علف‌های هرز، نیز ۹۲ درصد کاهش یافت (جدول ۵).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد ریشه چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز کاهش یافت. به طوری که در کشت خالص چغندر علوفه‌ای و در شرایط عدم تداخل علف‌های هرز، عملکرد ریشه حدود ۱۶۲ تن در هکتار بود که نسبت به شرایط

جدول ۵- مقایسه میانگین عملکرد ریشه و عملکرد بیولوژیک چغندر علوفه‌ای در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط با پنبه تحت تأثیر تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز

Table 5- Mean comparison of root yield and biological yield of fodder beet in different proportion of intercropping with cotton under the interference and non-interference of weeds

تداخل علف‌هرز Weed interference	نسبت کشت مخلوط Intercropping proportion (%)†	عملکرد ریشه Root yield (kg ha ⁻¹)	عملکرد بیولوژیک Biological yield (kg ha ⁻¹)
عاری از علف‌هرز Weed free	100	162083 (37253) ^a	195433 (54502) ^a
	75	102025 (11488) ^b	124509 (13210) ^{ab}
	50	61433 (7198) ^c	82042 (13710) ^b
	25	14281 (1645) ^e	18557 (2924) ^d
آلوده به علف‌هرز Weed infested	100	26400 (2123) ^d [83%]	36250 (449) ^e [81%]
	75	19359 (3218) ^{de} [81%]	25978 (4691) ^{cd} [79%]
	50	7644 (2661) ^f [87%]	10118 (4461) ^e [87%]
	25	2021 (744) ^g [85%]	2789 (802) ^f [84%]

درصد مختلف تراکم پنبه از تراکم کل در سطح

اعداد داخل ستون‌ها با حروف مشابه اختلاف معنی‌داری ندارند.

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.

اعداد داخل کروشه درصد کاهش نسبت به تیمار مشابه در شرایط عاری از علف هرز است.

† Different percentage of cotton density of total density in area

Values in columns with the same letter are not significantly different

Values in parentheses are standard deviation

Values in brackets are reduction percentage respect to same treatment in weed free condition

بود. بنابراین نسبت‌های مخلوط مورد مطالعه کارایی کمتری در استفاده از منابع نسبت به کشت خالص داشتند. کمترین نسبت برابری زمین در نسبت ۵۰:۵۰ از پنبه-چغندر علوفه‌ای در شرایط تداخل علف‌های هرز مشاهده شد که نسبت به کشت خالص هرکدام از اجزای مخلوط، ۵۳ درصد کارایی کمتری در بهره‌برداری از منابع نشان داد (جدول ۶). این مساله تایید می‌کند که کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای از سودمندی بسیار پایین برخوردار است.

کاهش عملکرد واقعی به‌عنوان شاخص کاهش یا افزایش عملکرد واقعی کشت مخلوط نشان داد که در همه نسبت‌های کشت مخلوط، عملکرد واقعی نسبت به کشت خالص کاهش یافت و در شرایط تداخل علف‌های هرز این کاهش بیشتر از شرایط عدم تداخل آن‌ها بود. شاخص کاهش عملکرد واقعی جزئی نیز نشان داد که میزان کاهش عملکرد پنبه نسبت به چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط بیشتر بود (جدول ۶).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با کاهش نسبت چغندر علوفه‌ای در کشت مخلوط، عملکرد بیولوژیک در هر دو شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌هرز کاهش یافت. به طوری که در کشت خالص چغندر قند علوفه‌ای و در شرایط تداخل علف‌های هرز، عملکرد بیولوژیک این گیاه به میزان ۸۱ درصد نسبت به شرایط عدم تداخل علف‌های هرز، کاهش یافت (جدول ۵). با توجه به اینکه در چغندر علوفه‌ای بخش قابل توجهی از سهم عملکرد بیولوژیک مرتبط با عملکرد ریشه است، لذا کاهش عملکرد بیولوژیک در نسبت‌های مختلف کاشت مخلوط و در شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز قابل انتظار است. مطالعه رجب و همکاران (۲۸) نشان داد که بازدهی کشت چغندر علوفه‌ای در شرایط اختلاط با جو، گندم و باقلا افزایش یافت.

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در هر دو شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز، مقدار نسبت برابری زمین در همه نسبت‌های مخلوط پنبه- چغندر علوفه‌ای کمتر از کشت خالص آن‌ها

جدول ۶- شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط پنبه و چغندر علوفه‌ای تحت تأثیر تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز

Table 6- Advantage indices of cotton-fodder beet intercropping affected by interference and non-interference with weeds

تداخل علف‌هرز Weed interference	نسبت کشت مخلوط پنبه - چغندر علوفه‌ای Cotton-Fodder beet proportion (%)	نسبت برابری زمین برای پنبه LER _C	نسبت برابری زمین برای چغندر علوفه‌ای LER _B	نسبت برابری زمین کل LER	کاهش عملکرد واقعی پنبه AYL _C	کاهش عملکرد واقعی چغندر علوفه‌ای AYL _B	کاهش عملکرد واقعی کل AYL	مجموع ارزش نسبی پنبه RVT _C
عاری از علف‌هرز Weed free	100:0	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00
	75:25	0.49	0.09	0.60	-0.34	-0.62	-0.96	0.83
	50:50	0.19	0.41	0.60	-0.63	-0.18	-0.82	1.64
	25:75	0.04	0.67	0.71	-0.86	-0.11	-0.97	2.46
	0:100	-	1.00	1.00	-	-	-	3.77
آلوده به علف‌هرز Weed infest	100:0	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00
	75:25	0.51	0.7	0.58	-0.32	-0.71	-1.03	1.33
	50:50	0.18	0.29	0.47	-0.65	-0.43	-1.08	3.89
	25:75	0.05	0.72	0.77	-0.80	-0.04	-0.84	8.66
	0:100	-	1.00	1.00	-	-	-	12.30

LER_C: Land equivalent ratio for cotton, LER_B: Land equivalent ratio for fodder beet, LER: Total land equivalent ratio, AYL_C: Actual yield loss for cotton, AYL_B: Actual yield loss for fodder beet, AYL: Total actual yield loss, RVT_C: Relative value total for cotton

عمدتاً بالاتر از ۳۰۰ هزار هکتار در کشور بود (۱۰)، اما پس از سال ۱۳۵۷ و خصوصاً در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست در زمینه قیمت‌گذاری و همچنین محدودیت بودجه پنبه-کاران، سطح زیر کشت پنبه در کشور به شدت کاهش یافته است. پنبه به‌عنوان یک محصول با بازدهی اقتصادی پایین در بین کشاورزان مطرح هست (۳۷). به همین دلیل در سال‌های اخیر کشت مخلوط پنبه با سایر گیاهان زراعی به‌خصوص گیاهان علوفه‌ای یک‌ساله تابستانه، در بین کشاورزان منطقه خراسان رضوی گسترش یافته است. نتایج این آزمایش نشان داد که کشت مخلوط پنبه با چغندر علوفه‌ای می‌تواند در کاهش ریسک قیمت پنبه و افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان مؤثر باشد.

مقادیر شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط پنبه و چغندر علوفه‌ای در جدول (۷) نشان داده شده است. مقدار ضریب ازدحام نسبی نشان داد که در کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای، با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده برای این شاخص در همه نسبت‌های کشت مخلوط و نیز شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز کمتر از یک بود، لذا نشان از کارایی کم کشت مخلوط در استفاده از منابع و نیز عدم سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر یک از گیاهان می‌باشد (جدول ۷).

هر دو شاخص بیان شده از دیدگاه اکولوژیکی سودمندی کشت مخلوط را ارزیابی می‌کنند، اما شاخص مجموع ارزش نسبی بیان‌کننده وضعیت اقتصادی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هست. نتایج نشان داد که در شرایط عدم تداخل علف‌های هرز (به‌جز نسبت مخلوط ۷۵:۲۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای) مجموع ارزش نسبی بیشتری برای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص پنبه مشاهده شد، به‌طوری که در نسبت مخلوط ۲۵:۷۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، مقدار مجموع ارزش نسبی ۲/۵ برابر کشت خالص پنبه بود. همین نسبت در شرایط تداخل علف‌های هرز نشان‌دهنده مجموع ارزش نسبی ۸/۶ برابری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص پنبه بود (جدول ۶).

در شرایط این آزمایش، دو شاخص نسبت برابری زمین و کاهش عملکرد واقعی نشان از برتری کشت خالص نسبت به کشت مخلوط پنبه - چغندر علوفه‌ای داشت، ولی شاخص مجموع ارزش نسبی بیان‌کننده برتری مخلوط نسبت به کشت خالص بود. سعید و همکاران (۳۰) گزارش کردند که سامانه‌های مختلف کشت مخلوط بر پایه پنبه در پاکستان، موجب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمد خالص مزرعه شدند.

کل سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۷۹ هزار هکتار در کشور بوده است (۱). سطح زیر کشت پنبه در دهه ۵۰

جدول ۷- شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط پنبه و چغندر علوفه‌ای تحت تأثیر تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز

Table 7- Competitive indices of cotton-fodder beet intercropping affected by interference and non-interference with weeds

تداخل علف‌هرز Weed interference	نسبت کشت مخلوط پنبه - چغندر علوفه‌ای Cotton-Fodder beet proportion (%)	ضریب ازدحام نسبی پنبه K _C	ضریب ازدحام نسبی چغندر علوفه‌ای K _B	ضریب ازدحام نسبی کل K	شاخص غالبیت A	نسبت رقابت پنبه CR _C	نسبت رقابت چغندر علوفه‌ای CR _B
عاری از علف‌هرز Weed free	25:75	0.20	0.07	0.015	0.28	1.87	0.58
	50:50	0.10	0.27	0.028	-0.45	0.49	2.23
	75:25	0.03	0.41	0.011	-0.75	0.17	6.63
آلوده به علف‌هرز Weed infest	25:75	0.22	0.05	0.012	0.39	3.89	0.46
	50:50	0.10	0.17	0.017	-0.22	0.63	1.93
	75:25	0.04	0.42	0.016	-0.76	0.23	7.89

K_C: Relative Crowding Coefficient for Cotton, K_B: Relative Crowding Coefficient for Fodder beet, K: Total Relative Crowding Coefficient
A: Aggressivity, CR_C: Competitive Ratio for Cotton, CR_B: Competitive Ratio for Fodder beet

مخلوط چغندر قند با گیاهان سویا و بادرشبو و ارزن، بیشترین سودمندی کشت مخلوط یا نسبت برابری زمین را به ترتیب در اختلاط با بادرشبو (*Deracocephalum moldavicia* L.) و سویا گزارش کردند. علی‌رغم نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از برتری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص، البته در نسبت‌های خاصی از اختلاط دو گیاه می‌باشد، از جمله مرادی و همکاران (۲۹) در ارزیابی کشت مخلوط جانشینی پنبه و ذرت نشان دادند که عملکرد اقتصادی دو گیاه در کشت خالص، بدلیل تراکم بوته بیشتر، بالاتر از مخلوط بود. با این حال کشت مخلوط از نظر شاخص کارایی مصرف نور نسبت به کشت خالص برتری داشت. خزائی (۱۷) نیز نشان داد که نسبت برابری زمین در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط چغندر-ذرت متفاوت است و بیشترین نسبت برابری زمین یا سودمندی کشت مخلوط در نسبت کاشت ۲۵:۷۵ (چغندر قند: ذرت) ۱/۰۹ و در نسبت کاشت ۷۵:۲۵ (چغندر قند: ذرت) ۱/۰۸ بدست آمد. در مطالعه‌ای دیگر نیز بیان شد که در کشت مخلوط ذرت و لوبیا، بدلیل اینکه مقادیر محاسبه شده برای ضریب ازدحام نسبی، بیشتر از یک بدست آمد، لذا کشت مخلوط ذرت-لوبیا در هر دو شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز، سودمندی داشت. بر اساس نتایج این محققین بیشترین سودمندی بر اساس ضریب ازدحام نسبی به تیمار کشت افزایشی ۴۰ درصد لوبیا در شرایط عدم کنترل علف‌های هرز بدست آمد (۲۱). در کشت مخلوط ذرت، سورگوم و ارزن (*Pennisetum glaucum* L.) با بادام زمینی، بیشترین مقدار ضریب

شاخص غالبیت نشان داد که در هر دو شرایط عدم تداخل و تداخل علف‌های هرز، در نسبت ۲۵:۷۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، پنبه نسبت به چغندر علوفه‌ای غالبیت و یا چیرگی دارد اما در هر دو نسبت ۵۰:۵۰ و ۷۵:۲۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، چیرگی متعلق به چغندر علوفه‌ای بود (جدول ۷). غالبیت در حالت‌های بیان شده با استفاده از شاخص نسبت رقابت نیز تأیید شد. شاخص نسبت رقابت پنبه در کشت مخلوط نشان داد که در نسبت ۲۵:۷۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، پنبه قدرت رقابتی ۱/۸ برابری نسبت به چغندر علوفه‌ای در شرایط عدم تداخل علف‌های هرز و ۳/۹ برابری در شرایط تداخل علف‌های هرز دارد. در نسبت مساوی ۵۰:۵۰ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، قدرت رقابتی چغندر علوفه‌ای دو برابر پنبه بود، و این شاخص در نسبت ۷۵:۲۵ از پنبه-چغندر علوفه‌ای، نشان‌دهنده قدرت رقابتی حداقل ۶/۶ برابری چغندر علوفه‌ای بود (جدول ۷). بطور کلی شاخص‌های رقابتی نشان دادند که چغندر علوفه‌ای نسبت به پنبه، در هر دو شرایط تداخل و عدم تداخل علف‌های هرز از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار بود. این مساله احتمالاً به دلیل سرعت رشد بالاتر، عادت رشدی خوابیده، توانایی بالا در توسعه تاج‌پوش و پوشاندن سطح خاک چغندر علوفه‌ای نسبت به پنبه باشد.

بطور کلی مزایای کشت مخلوط تحت تأثیر ترکیب گیاهان موجود در مخلوط، تراکم گیاهی، نسبت اختلاط اجزای مخلوط و نیز الگوی کشت مخلوط (افزایشی یا جانشینی) قرار گیرد، و این مساله منجر به تفاوت در سودمندی کشت مخلوط گیاهان مختلف می‌شود (۱۲، ۱۳ و ۱۵). از جمله نتایج چوب فروش خوئی و همکاران (۶) در بررسی کشت

شاخص‌های ارزیابی کشت مخلوط و شاخص‌های رقابتی، کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای با الگوی اختلاط جانشینی فاقد سودمندی و لذا قابل توصیه نمی‌باشد. علی‌رغم این موضوع، این نظام کشت برای سال‌ها توسط کشاورزان مناطقی از استان خراسان رضوی (بویژه تربت جام) استفاده شده است و با شاخص‌های مدنظر آن‌ها، به‌ویژه شاخص‌های اقتصادی که در این پژوهش نیز بدان اشاره شد (مجموع ارزش نسبی)، کاملاً توجیه‌پذیر بوده است. لذا ادامه این پژوهش بویژه با سایر الگوهای کشت مخلوط، نظیر کشت مخلوط افزایشی، جالب توجه خواهد بود.

سیاسگزاری

هزینه‌های این پژوهش از محل اعتبارات طرح پژوهشی ۲/۳۰۴۹۵ و توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد تامین شده است که بدین‌وسیله سپاسگزاری می‌شود.

ازدحام نسبی از کشت مخلوط ذرت با بادام زمینی بدست آمد، که نشانگر سودمندی این کشت مخلوط بود (۱۲).

همانطور که اشاره شد، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها حاکی از برتری نسبی کشت مخلوط گیاهان نسبت به کشت خالص آن‌ها می‌باشد، با این حال و بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد قرارگیری دو گیاه چغندرعلوفه‌ای و پنبه در شرایط کشت مخلوط حداقل بصورت اختلاط جانشینی مورد استفاده در این پژوهش قابل توصیه نباشد. بر اساس شاخص‌های ارزیابی کشت مخلوط، وقوع رقابت شدید بر سر منابع مورد نیاز برای رشد بین دو گیاه، بویژه از سوی گیاه چغندرعلوفه‌ای، از دلایل اصلی و احتمالی کاهش شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای در این پژوهش شده است. شاید به همین دلیل هم هست که فشار وارده بر جمعیت علف‌های هرز در شرایط کشت مخلوط نیز، بدلیل درگیری شدید رقابتی بین اجزای مخلوط، نتوانست تاثیر معنی‌داری بر کنترل علف‌های هرز ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

بطور کلی و بر اساس نتایج این پژوهش، با در نظر گرفتن اثرات کشت مخلوط پنبه-چغندر علوفه‌ای بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان پنبه و چغندر علوفه‌ای و نیز

منابع

- Ahmadi K., Ebadzadeh H.R., Abdeshah H., Kazemian A., and Rafiei M. 2018. Agricultural Statistics; 2016-17 growing season (Vol.1). Iranian Ministry of Agriculture. 116 Pp. (In Persian)
- Akram Ghaderi F., Sirani S., Aghajari A.A.Gh., Sohrabi B., and Younesabadi M. 2006. Determination of the critical period of weed control in cotton (*Gossypium hirsutum*) in Gorgan. Iranian Journal of Agricultural Science 37: 167-175. (In Persian with English abstract)
- Banik P., Midya A., Sarkar B.K., and Ghose S.S. 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in an additive series experiment: advantages and weed smothering. European Journal of Agronomy 24: 325-332.
- Barati Mahmoodi H., Jami Alahmadi M., Rashed Mohassel M.H., Mahmoodi S., and Shikhzadeh N. 2012. The Effect of integrated weed management (chemical and mechanical) on density and dry weight of weed and introduction of new herbicide (envoke) in cotton (*Gossypium hirsutum*) field in Birjand region. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 176-181. (In Persian with English abstract)
- Buchanan G.A., and Burns E.R. 1970. Influence of weed competition on cotton. Weed Science 18: 149-154.
- Choubforoush Khoei B., Amini R., Dabbagh Mohammadi Nasab A., and Raei Y. 2020. Effect of soybean, moldavian balm and proso millet intercropping on growth characteristics and yield of sugar beet (*Beta vulgaris* L.). Journal of Agricultural Science 30: 41-58. (In Persian with English abstract)
- Dhima K.V., Lithourgidis A.S., Vasilakoglou I.B., and Dordas C.A. 2007. Competition indices of common vetch and cereal intercrops in two seeding ratio. Field Crops Research 100: 249-256.
- Doğan M.N., Jabran K., and Unay A. 2014. Integrated Weed Management in Cotton. Recent advances in weed management. Springer. 197-222 Pp.
- Fathollahzadeh Dizaji R., and Mirshekari B. 2014. Additive intercropping of marigold (*Calendula officinalis*) and mungbean (*Vigna radiata*): a strategy for yield improvement and weeds control. Research in Field Crop Journal 1: 56-68. (In Persian with English abstract)
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2019. FAO Statistical. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at <http://www.fao.org/faostat/en/#data>.
- Frison E.A., Chervas J., and Hodgkin T. 2011. Agricultural biodiversity is essential for a sustainable improvement

- in food and nutrition security. Sustainability 3: 238–253.
12. Ghosh P.K. 2004. Growth, yield, competition and economics of groundnut/cereal fodder intercropping systems in the semi-arid tropics of India. Field Crop Research 88: 227-237.
 13. Hauggaard-Nielsen H., Jørnsgaard B., Kinane J., and Jensen E.S. 2008. Grain legume-cereal intercropping: the practical application of diversity, competition and facilitation in arable and organic cropping systems. Renew. Agricultural Food Systems 23: 3–12.
 14. Jamshidi K., Mazaheri D., Majnoun Hosseini N., Rahimian Mashhadi H., and Peyghambari A. 2011. Investigation of corn/cowpea intercropping effect on suppressing the weeds. Iranian Journal of Field Crop Science 42: 233-241. (In Persian with English abstract)
 15. Jayakumar M., and Surendran U. 2017. Intercropping and balanced nutrient management for sustainable cotton production. Journal of Plant Nutrition 40: 632-644.
 16. Kandhro M.N., Tunio S., Rajpar I., and Chachar Q. 2014. Allelopathic impact of sorghum and sunflower intercropping on weed management and yield enhancement in cotton. Sarhad Journal of Agricultural Science 30: 311–318.
 17. Khazaie M. 2015. The study of maize and Sugar beet intercropping. Journal of Crops Improvement 16: 987-997. (In Persian with English abstract).
 18. Koochaki A., Nasiri Mahalati M., Moradi R., and Alizadeh Y. 2015. Effect of different nitrogen levels on yield and nitrogen use efficiency in corn-cotton intercropping. Iranian Journal of Field Crops Research 13: 1-13. (In Persian with English abstract)
 19. Liebman M., and Dyck E. 1993. Crop rotation and intercropping strategies for weed management. Ecological Applications 3: 92–122.
 20. Littell R.C., Stroup W.W., Milliken G.A., Wolfinger R.D., and Schabenberger O. 2006. SAS for mixed models. SAS Institute.
 21. Mansouri L., Jamshidi K., Rastgoo M., Saba J., and Mansouri H. 2013. The effect of additive maize-bean intercropping on yield, yield components and weeds control in zanzan climate conditions. Iranian Journal of Field Crops Research 11: 483-492. (In Persian with English abstract)
 22. Mardan poor F., Arian nia N., and Lorzadeh Sh. 2017. Effect of intercropping of maize and bean on growth weeds control and yield plant in Gotvand area. Journal of Plant Production Sciences 7: 32-40. (In Persian with English abstract)
 23. Mead R., and Wiley R.W. 1980. The concept of a "Land Equivalent Ratio" and advantage in yields from intercropping. Experimental Agriculture 16: 217-228.
 24. Mehni J., Mahdavi B., Azari A., Afkar S., and Hashemi S. 2020. Evaluation of yield and productivity indices of black cumin and fenugreek intercropping under weedy and weed-free conditions. Iranian Journal of Field Crop Science 51: 73-87. (In Persian with English abstract)
 25. Mohler C.L., and Liebman M. 1987. Weed productivity and composition in sole crops and intercrops of barley and field pea. Journal of Applied Ecology 24: 685-699.
 26. Moradi R., Koocheki A., Nasiri Mahallati M. 2017. Evaluation of economical yield and radiation use efficiency of maize and cotton in sole and intercropping systems as affected by different levels of Nitrogen. Journal of Crop Production and Processing 7:47-59. (In Persian with English abstract)
 27. Pannacci E., Lattanzi B., and Tei F. 2017. Non-chemical weed management strategies in minor crops: A review. Crop Protection 96: 44-58.
 28. Rajab M.N., Salem A.K., and Abdel-Galil A.M. 2014. Increasing fodder beet productivity by intercropping with some field crops. Journal of Plant Production 5: 821-836.
 29. Richardson R.J., Wilson H.P., and Hines T.E. 2007. Preemergence herbicides followed by Triflurysulfuron postemergence in cotton. Weed Technology 21: 1-6.
 30. Saeed M., Shahid M.R.M., Jabbar A., Ullah E., and Khan MB. 1999. Agro-economic measurement of different cotton based inter-relay cropping system in two geometrical patterns. International Journal of Agriculture and Biology 4: 234–237.
 31. Salimi H., Bazoubandi M., and Fereidoonpour M. 2010. Investigating different methods of integrated weed management in cotton (*Gossypium hirsutum* L.). Journal of Crop Production 3: 187-197. (In Persian with English abstract).
 32. Shetty S.V.R., and Rao A.N. 1981. Weed management studies in sorghum/pigeonpea and pearl millet/groundnut intercrop systems-some observations. Pp 238-248 in International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). Proceedings of the International Work- shop on Intercropping, 10-13 January 1979, Hyderabad, India. ICRISAT, Patancheru, India.
 33. Singh S. 2014. Sustainable weed management in cotton. Haryana Journal of Agronomy 30: 1-14.
 34. Vandermeer J.H. 1992. The Ecology of Intercropping. Cambridge University Press.
 35. Weeraratne L.V.Y., Marambe B., and Chauhan B.S. 2016. Intercropping as an effective component of integrated weed management in tropical root and tuber crops: A review. Crop Protection 95: 89-100.

36. Xia J.Y., Wang J., Cui J.J., Leffelaar P.A., Rabbinge R., and van der Werf W. 2018. Development of a stage-structured process-based predator-prey model to analyse biological control of cotton aphid, *Aphis gossypii*, by the seven spot ladybeetle, *Coccinella septempunctata*, in cotton. *Ecological Complexity* 33: 11-30.
37. Yazdani S., Shahbazi H., and Kavooosi Kelashami M. 2011. Assessment of indirect production function and budget constraint in Khorasan provinces' cotton production. *Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research* 41: 425-433. (In Persian with English abstract).
38. Zand E., Baghestani M.A., Nezamabadi N., Shimi P., and Mousavi S.K. 2017. A Guide to Chemical Control of Weeds in Iran. *Jahad e Daneshgahi Mashhad Press*. 224 Pp. (In Persian)
39. Zhang L.Z., Van der Werf W., Zhang S.P., Li B., and Spiertz J.H.J. 2007. Growth, yield and quality of wheat and cotton in relay strip intercropping systems. *Field Crops Research* 103: 178-188.

Evaluation of Competitive Indices and Cultivation Efficiency of Cotton-Fodder Beet Intercropping under Weed Interference Conditions

M. Rastgoo^{1*}– G.A. Asadi²– A. Dorpoor³– S. Rahimi⁴

Received: 27-09-2020

Accepted: 10-05-2021

Introduction: Intercropping involves growing more than one crop in the same field at the same time. Intercropping increase diversity in the cropping system and enhance the utilization of resources such as light, heat and water. This practice can also help to suppress weeds and increase the likelihood of being able to reduce herbicide use in the cropping system. Alternatively, in organic systems where herbicides are not used, intercropping can reduce the yield loss potential and provide stability in the system. In recent years, native cotton growers in Khorasan region, especially in Torbat-e Jam region, using the intercropping of cotton-fodder beet (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* L.), while facilitating the growth of fodder beet plant providing forage for livestock and increasing land income in the cotton crop. Placement of fodder beet plants in or between rows of cotton cultivation accelerates the conquest of space and resources compared to cotton monoculture. Little information is available on the cultivation of fodder beet - cotton intercropping and its effects on the yield of both plants, as well as the potential of this crop system in weed control. Therefore, this experiment was designed with the aim of the effect of cotton- fodder beet intercropping on weed control and evaluation of intercropping and competitive indices in Mashhad region.

Materials and Methods: In order to evaluate the effect of cotton-fodder beet intercropping on weed suppression, a split factorial experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at Ferdowsi University of Mashhad research farm. Treatments include intercropping pattern at two levels of inter-row and intra-row intercropping and the ratio of cotton-fodder beet substitution intercropping at five levels including 75: 25, 50: 50, 25: 75 and monoculture of cotton and fodder beet as the main factor and weed interference at two levels including weeding and non-weeding throughout the weed season as a secondary factor. Land equivalent ratio for cotton, land equivalent ratio for fodder beet, total land equivalent ratio , actual yield loss for cotton, actual yield loss for fodder beet, total actual yield loss, relative value total for cotton, relative crowding coefficient for cotton, relative crowding coefficient for fodder beet, total relative crowding coefficient, aggressivity, competitive ratio for cotton, and competitive ratio for fodder beet were the indices which calculated and used as a basis for the evaluation of cotton – fodder beet intercropping.

Analysis of variance was performed using generalized linear models through GLMMIX procedure in SAS 9.4 software environment. The effect of three factors: intercropping pattern, intercropping ratio and weed interference and their interaction with each other were considered as fixed effects and block and block effect, mixed intercropping pattern, intercropping ratio and total error were considered as random variables in the model. Comparison of means of the simple effects of factors and their interaction were performed using the least squares mean comparison method in the same procedure.

Results and Discussion: The results showed that the effect of intercropping pattern and intercropping proportion on total weed density was not significant, but was significant on total dry weight of weeds, although it was still not significant compared to monoculture of cotton. Accordingly, at a 25: 75 crop proportion of cotton - fodder beet, the dry weight of weeds was lower than other intercropping proportion. Also, the effect of intercropping pattern on both crop traits was not significant, but the ratio of intercropping on cotton and fodder beet traits was significant. In terms of interference or non-interference of weeds, at least 50% reduction in cotton lint yield and 83% reduction in fodder beet root yield was observed in intercropping conditions, compared to monoculture of each plant. The two indices of land equivalent ratio and actual yield loss showed the superiority of cotton monoculture over intercropping, but the relative value total index expressed the superiority of cotton-fodder beet intercropping over cotton monoculture. So that intercropping of cotton-fodder beet with a ratio of 75:25, in the presence and absence of weeds, the relative value total increased by 2.5 and 8.6 times, respectively, of cotton monoculture. Competitive indices including relative crowding coefficient, competition ratio and aggressivity index showed that fodder beet has higher competitive power than cotton. In general, the results of this experiment showed that cotton-beet forage intercropping, although it had no significant effect on weed

1, 2 and 3, 4- Associate Professors and Ph.D. Students of Weed Science, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.

(*- Corresponding Author Email: m.rastgoo@um.ac.ir)

DOI: 10.22067/JPP.2021.32834.0

control, is still recommended in terms of mixed crop evaluation indicators.

Conclusion: In general, the results of this experiment showed that the cotton-fodder beet intercropping, as replacement pattern, had no significant effect on weed control, and considering that it was suitable only in terms of one of the evaluation indices (relative value total), it is not generally recommendable.

Keywords: Lint yield, Relative value total, Replacement series