



Research Article
Vol. 36, No. 1, Spring 2022, p. 79-96



Effect of Organic Mulch with Pre-emergence Herbicide Combinations on Weeds Control and Saffron Yield

Z. Hosseini- Evari¹, E. Izadi-Darbandi^{2*}, M. Kafi³, H. Makarian⁴

Received: 01-02-2020

Revised: 24-02-2020

Accepted: 12-04-2020

Available Online: 20-06-2022

How to cite this article:

Hosseini- Evari, Z., Izadi-Darbandi, E., Kafi, M., & Makarian, H. (2022). Effect of Organic Mulch with Pre-emergence Herbicide Combinations on Weeds Control and Saffron Yield. *Journal of Iranian Plant Protection Research* 36(1): 79-96. (In Persian with English abstract)

DOI: [10.22067/JPP.2021.32701.0](https://doi.org/10.22067/JPP.2021.32701.0)

Introduction

Saffron is a vulnerable crop to weed competition because of its short canopy and narrow leaves. So weeds are the major problem in saffron production. Weeds are mainly controlled by hand or mechanically in saffron fields, if these traditional methods are effective and environmental friendly but they are expensive and time consuming. These traditional methods are effective and environmental friendly, however they are expensive and time consuming. The number of suitable herbicide for weed control in saffron fields are limited. The importance of herbicide as alternatives method for weed control was recognized long ago. Herbicide treated mulch (HTM) is the combination of physical (mulch) and chemical (herbicide) weed control methods. This experiment was conducted to investigate the possibility of using mulch and herbicide treated mulch (HTM) to increase the efficiency of herbicides in saffron weeds management. The objectives of this study were to compare the effect of herbicides alone and in combination with mulch on weed control and also determine the influence of herbicide placement (on soil surface, under mulch or herbicide-treated mulch) on weed control and phytotoxicity of saffron.

Materials and Methods

Field experiments were conducted during the growing seasons of 2016 and 2017 in Khorasan Razavi, Iran. Two field of 4-year-old saffron that had not received herbicide applications for at least two years in two different climates were chosen. The treatments consist of trifluralin (EC48%) at 1200 g i.a.ha⁻¹, pendimethalin (EC33%) at 1485 g i.a.ha⁻¹ and metribuzin (WP70%) at 525 g i.a.ha⁻¹ were applied in three method: 1) Directly to soil: herbicides were applied before crust crushing directly in soil. 2) Under the mulch: herbicides were sprayed with an electric knapsack sprayer after crust crushing directly in soil, then the soil surface was covered with a layer of wood chips mulch with a depth of 3 cm. 3) Herbicide treated mulch: mulch of wood chips were pretreated with herbicides by placing the mulch on a plastic sheet at the depth of 3 cm above and herbicide was sprayed on top of the mulch and evenly mixed and allowed to dry for 48 hours before applying them to field. The non-treated control with and without mulch and also treatment of hand weeding was included for comparison

Results and Discussion

There was no severe phytotoxicity to saffron after treatments application according to EWRC, slight injuries observed in all plots ranging from 1 (No damage) to 2 (Very little damage including slightly yellowing). Metribuzin herbicide induced more phytotoxicity symptoms on saffron compared to two other herbicides, but it was better to weeds control and increasing saffron yield. Treatment of metribuzin mixed with mulch in both

1, 2 and 3- Ph.D. Student of Weed Science and Professors, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.

(*- Corresponding Author Email: e-izadi@um.ac.ir)

4- Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

fields after hand weeding were the best treatment to decreasing of weeds dry weight and improvement of yield components of saffron. Treatment of metribuzin mixed with mulch compared with control caused 85% and 87% reduction of weed dry weight in both fields, also this treatment compared with control increased dry weight stigma to 2.5 times and 2 times. It seems that after metribuzin, pendimethalin herbicide has better efficiency for use in saffron fields. Although, treatment of mulch without herbicide, is not prevented weed growth, but had more effective on increasing of saffron yield compared to weedy check, especially in field 1 (region of Kashmar). Therefore, the use of mulch in warm and dry areas has better effect on saffron yield improvement. Considering that the cultivation of saffron is carried in semi-arid regions of Iran such as Khorasan, the correct application of plant residues in semi-arid regions can have a direct effect on the amount of organic matter in the soil, which leads to an increase in flower yield. Generally the pre-mixed mulch with herbicide, in addition to improving the herbicide efficiency, increased saffron yield. This results indicate that the proper combination of herbicides with mulch layer as thin as 3 cm can provide acceptable weed control. According to the result, one suggested way to weed management in saffron could be the combination of herbicide (Metribuzin) with mulch.

Keywords: Herbicide-treated mulches, Physical and chemical integrated management, Metribuzin, Pendimethalin, Trifluralin

مقاله پژوهشی

جلد ۳۶، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱، ص ۷۹-۹۶

بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌های پیش‌رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و
عملکرد زعفران (*Crocus sativus* L.)زهرا حسینی ایوری^۱ - ابراهیم ایزدی دربندی^{۲*} - محمد کافی^۳ - حسن مکاریان^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در خراسان رضوی در دو مزرعه چهارساله زعفران با اقلیم‌های متفاوت جهت ارزیابی اثر ترکیب علف‌کش و مالچ به‌عنوان روشی جدید در کنترل علف‌های هرز زعفران طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۵ انجام شد. تیمارهای موردبررسی شامل کاربرد علف‌کش‌های پیش‌رویشی تریفلورالین (EC48%)، شرکت گیاه)، پندیمتالین (EC33%)، شرکت آریا) و متریبوزین (WP70%)، شرکت گیاه) به ترتیب در مقادیر ۱۲۰۰، ۱۴۸۵ و ۵۲۵ گرم ماده مؤثره در هکتار به سه روش مختلف به‌طور مستقیم در خاک، زیر لایه مالچ تراشه چوب و کاربرد مخلوط علف‌کش‌ها با مالچ تراشه چوب همراه با سه تیمار شاهد وجین، مالچ به‌تنهایی و نیز شاهد بدون کنترل بودند. نتایج نشان دادند که گونه‌های علف هرز غالب متعلق به خانواده‌های گندمیان، شببو و کاسنی بود. در هر دو مزرعه کمترین وزن خشک علف‌های هرز (به ترتیب ۹۰ و ۹۳ درصد کاهش در مقایسه با شاهد) و بیشترین عملکرد زعفران (به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۵ درصد افزایش وزن کلاله خشک در مقایسه با شاهد) از تیمار وجین دستی به دست آمد. تیمارهای مالچ مخلوط با علف‌کش هم در کاهش وزن خشک علف‌های هرز و هم افزایش اجزایی عملکرد زعفران بهتر از تیمارهای علف‌کش به‌تنهایی عمل کردند. تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ بعد از وجین بیشترین عملکرد را در کلیه شاخص‌های موردبررسی زعفران به خود اختصاص داد. مالچ بدون علف‌کش در ضخامت ۳ سانتی‌متر اگرچه باعث کاهش وزن خشک علف‌های هرز در هیچ‌کدام از مناطق موردبررسی نشد تأثیر مثبتی بر عملکرد زعفران داشت. به‌طور کلی تیمارهای مالچ مخلوط شده با علف‌کش علاوه بر بهبود کار آبی علف‌کش‌ها باعث افزایش عملکرد زعفران از ۸۱ تا ۱۶۰ درصد در مقایسه با شاهد نیز شدند. با توجه به نتایج حاصل، اختلاط علف‌کش متریبوزین با یک‌لایه مالچ تراشه چوب به ضخامت ۳ سانتی‌متر، می‌تواند کنترل قابل قبولی از علف‌های هرز زعفران فراهم کند.

واژه‌های کلیدی: پندیمتالین، تریفلورالین، مالچ مخلوط شده با علف‌کش، متریبوزین، مدیریت تلفیقی فیزیکی - شیمیایی

مقدمه

بالغ بر ۱۰۸۰۸۶/۴ هکتار بوده که از این سطح ۳۷۶/۲۳۴ تن زعفران به‌دست‌آمده است (Iranian Ministry of Agricultural Statistics, 2017). زعفران به علت دارا بودن ارتفاع کوتاه و برگ‌های باریک از نظر رقابت با علف‌های هرز گیاه آسیب‌پذیری است، به‌طوری که یکی از مشکلات عمده تولید زعفران، علف‌های هرز هستند (Rashed Mohassel, 1992). علف‌های هرز جو موشی (*Hordeum murinum* L.)، (Izadi-Darbandi and Hosseini, 2016)؛ Rashed Mohassel, Padarloo et al., 2018؛ evari, 2016؛ Soufizadeh et al., 2006 1992؛ علف پشمکی (*Bromus tectorum* L.) (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016)؛ Soufizadeh et al., 2006؛ شاهی وحشی (*Cardaria draba*)

زعفران (*Crocus sativus* L.) یک گیاه چندساله است که در برخی مناطق جهان مانند ایران، ایتالیا و یونان رشد می‌کند (Koocheki et al., 2016). ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در سراسر جهان است. در سال ۲۰۱۷، سطح زیر کشت زعفران در ایران

۱، ۲ و ۳- به‌ترتیب دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز و استادان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

*- نویسنده مسئول: (Email: e-izadi@um.ac.ir)

۴- دانشیار گروه زراعت و اصلاح نبات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
DOI: 10.22067/JPP.2021.32701.0

محیط مناسب برای رشد گیاه، توسعه و تولید کارآمد است (Somireddy, 2012).

در یک مطالعه ثابت شد که استفاده از مالچ خاک‌اکاره در سطح مزارع زعفران بسیار سودمند بود و به‌طور قابل توجهی عملکرد کلاله، سرعت تکثیر بنه و متوسط اندازه بنه پس از ۲ سال افزایش یافت (Molina et al., 2005). همچنین گزارش شده است که عملکرد گل زعفران توسط مالچ پاشی با تراشه‌های چوب و خاک‌اکاره افزایش می‌یابد. مالچ توانایی رقابتی زعفران با علف‌های هرز را از طریق به دست آوردن یک محیط رشد بهتر از نظر شرایط آب و هوایی و خاک بهبود می‌بخشد. در این ارتباط کاه به‌عنوان مالچ در گونه‌ای زعفران زینتی در هلند برای محافظت بنه از خسارت سرما در زمستان مورد استفاده قرار گرفت و نتایج سودمندی را به دنبال داشت (Gresta et al., 2008). از آنجایی که کشت زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک کشور انجام می‌شود (Azizi-Zohan et al., 2009) مالچ می‌تواند به تعدیل درجه حرارت خاک و نوسانات رطوبت کمک کند و شرایط بهتری برای تکثیر بنه یا گل‌انگیزی فراهم کند (Sadeghi, 2008). در بررسی اثر انواع بقایای گیاهی (آفتابگردان، جو و سیر) و گیاهان پوششی (جو، خلر، چاودار، شبدر ایرانی، ماشک گل خوشه‌ای و منداب) بر فراوانی نسبی، تراکم و زیست‌توده علف‌های هرز و برخی خصوصیات زراعی زعفران، مشخص شد که اگرچه کاربرد بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی باعث کاهش جمعیت علف‌های هرز می‌شود ولی تأثیر گیاهان پوششی به‌مراتب بیش از بقایای گیاهی بود (Rezvani et al., 2013). رضوانی مقدم و همکاران (Rezvani et al., 2013) در بررسی تأثیر سطوح مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد کلاله زعفران و تنوع علف‌های هرز مشاهده کردند کاربرد کمپوست قارچ تأثیر معنی‌داری بر کنترل علف‌های هرز زعفران داشت. مالچ تیمار شده با علف‌کش‌ها (HTM^۳) ترکیبی از روش‌های کنترل فیزیکی (مالچ) و شیمیایی (علف‌کش) علف‌های هرز است. مطالعات بسیاری نشان داده است که مالچ‌های تیمار شده با علف‌کش‌ها کارایی بهتر در کنترل علف‌های هرز، اثربخشی بهتر علف‌کش‌ها و کاهش اثرات گیاه‌سوزی در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی دارند (Case and Mathers, 2006; Mathers, 2003; Monzon et al., 2006). به‌طور کلی بر اساس مطالعات انجام‌شده، مدیریت علف‌های هرز مزارع زعفران در ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و علف‌های هرز در مزارع زعفران ایران از تراکم بالایی برخوردار است (Iranian Rashed Mohassel, 1992);

(L. Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016); Soufizadeh et al., 2006; Rezvani Moghaddam et al., 2013)، جو دره (*Hordeum spontaneum* Koch.) (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016)، علف هفت‌بند (*Polygonum aviculare* L.)، کنگر وحشی (*Cirsium arvense*) (L.) scop. (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016); Rashed Mohassel, 1992) تلخه (*Acroptilon repens*)، خاکشیر تلخ (*Sisymbrium subulatum* E.Fourn) (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016) و تاج‌خروس وحشی (*retroflexus*) (*Amaranthus* L.) (Rashed Mohassel, 1992) به‌عنوان علف‌های هرز غالب مزارع زعفران شناسایی شدند. در مزارع زعفران علف‌های هرز عمدتاً با وسایل مکانیکی و یا دستی کنترل می‌شوند. با اینکه این روش‌های سنتی مؤثر و دوستدار محیط‌زیست هستند، پرهزینه، زمان‌بر و پرزحمت هستند (Kumar et Behnia, 1992; al., 2019; McGimpsey et al., 1997). از آنجایی که بنه‌ها^۱ در ردیف‌های ۲۵ سانتی‌متری کاشت می‌شوند، کنترل مکانیکی می‌تواند باعث آسیب جدی به زعفران و کاهش عملکرد شود که این امر کنترل علف‌های هرز را دشوارتر می‌سازد. دسترسی به علف‌کش‌هایی که برای استفاده اختصاصی در زعفران معرفی شده‌اند دشوار است و تحقیقات کمی در مورد کنترل شیمیایی علف‌های هرز زعفران انجام شده است؛ با این وجود تعدادی علف‌کش برای کنترل علف‌های هرز مزارع زعفران معرفی شده‌اند (Abbasi, 1996; Abbasian et al., Abasspoor et al., 2011) 2013; Norouzzadeh and Delghandi, 2006; Rahimian, 1993; Soufizadeh et al., 2008). بر اساس آخرین ویرایش کتاب فهرست آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مهم محصولات عمده کشاورزی سازمان حفظ نباتات (Iranian Ministry of Agricultural Statistics, Plant Protection Organization, 2020) علف‌کش‌های متریبوزین، اکسی‌فلورفن و هالوکسی‌فوپ‌آر-متیل برای کنترل علف‌های هرز زعفران در کشور به ثبت رسیده است. از طرفی با توجه به افزایش تقاضا برای تولید زعفران ارگانیک، ادغام روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز برای رفع نگرانی‌های مالی و زیست‌محیطی ضروری است. اهمیت استفاده از روش‌های جایگزین به‌جای مواد شیمیایی برای کنترل علف‌های هرز از مدت‌ها قبل شناخته شده است. در سیستم‌های مدیریت تلفیقی علف‌های هرز (IWM^۲) ممکن است ترکیبی از روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز استفاده شود. یکی از راه‌های مهار رشد علف‌های هرز، استفاده از انواع مالچ‌ها بر روی سطح خاک است. مالچ پاشی فرآیند پوشش سطح خاک در اطراف گیاهان با مواد آلی یا مصنوعی برای ایجاد یک

3- *Helianthus annuus, Hordeum vulgare, Allium sativum*

4- *Lathyrus sativus, Secale montanum, Trifolium resupinatum, Vicia villosa, Eruca sativa*

5- Herbicide treated mulch

1- Corm

2- Integrated Weed Management

مواد و روش‌ها

موقعیت جغرافیایی محل انجام پژوهش

به منظور بررسی امکان استفاده از رهیافت اختلاط علف‌کش با مالچ، آزمایش مزرعه‌ای در طی فصل رشد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در خراسان رضوی و در دو منطقه کاشمر و کوهسرخ که به لحاظ اقلیمی و هواشناسی تفاوت‌هایی باهم دارند انجام شد (جدول ۱، شکل ۱ و شکل ۲).

کم رقابتی زعفران با علف‌های هرز، مدیریت و کنترل مؤثر علف‌های هرز پیش‌نیاز تولید زعفران با عملکرد بالا و باکیفیت است. لذا این آزمایش جهت بررسی امکان استفاده از مالچ‌های گیاهی و رهیافت اختلاط مالچ - علف‌کش برای بهبود مدیریت علف‌های هرز زعفران انجام شد.

جدول ۱- ویژگی‌های اقلیمی و مختصات جغرافیایی مناطق مورد بررسی و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

Table 1- Climatic, geographic coordinates and some soil physico-chemical characteristics of soil in

نام منطقه Region	اقلیم Climate	مختصات جغرافیایی Geographic coordinates	بافت خاک Soil texture	درصد کربن C (%)	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی EC (dS.m ⁻¹)	ارتفاع از سطح دریا Elevation from sea level (m)	هدایت الکتریکی EC (dS.m ⁻¹)
مزرعه ۱ Field 1	کاشمر Kashmar	معتدل گرم Warm temperate 58° 29' 54.6"E 35° 12' 18.2"N	لوم-رسی clay loam	0.153	8.01	2.19	1056	2.19
مزرعه ۲ Field 2	کوهسرخ Koohsorkh	معتدل سرد Cold temperate 58° 32' 42.2"E 35° 26' 15.9"N	لومی-شنی Sandy loam	0.537	7.83	1.11	1777	1.11

شد؛ به این ترتیب که مالچ‌ها بر روی یک ورقه پلاستیکی به ضخامت ۳ سانتی‌متر قرار گرفتند و علف‌کش بر روی مالچ اسپری و به‌طور یکنواخت مخلوط شد و ۴۸ ساعت بعد از خشک شدن، مالچ‌ها به‌طور یکنواخت در کرت‌ها پخش شدند (Case and Mathers, 2006). سه تیمار وجین علف‌های هرز (دو بار وجین طبق عرف منطقه)، تیمار مالچ به‌تنهایی به ضخامت ۳ سانتی‌متر و نیز تیمار شاهد بدون کنترل نیز برای مقایسه و به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. آبیاری و کود دهی مزارع زعفران طبق عرف منطقه انجام شد و در تمام فصل رشد از هیچ‌گونه سموم دفع آفات نباتی استفاده نشد.

صفات مورداندازه‌گیری

برآورد خسارت گیاه‌سوزی علف‌کش‌ها بر روی زعفران در ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز بعد از تیمار (DAT¹) به صورت چشمی و با استفاده از روش امتیازدهی EWRC² انجام شد. در این روش به تیماری که باعث نابودی کامل زعفران شد، امتیاز ۹ و به تیماری که کاملاً بدون تأثیر است، امتیاز ۱ و بقیه تیمارها در حد واسط ۱ و ۹ قرار گرفتند (جدول ۲). تراکم نسبی علف‌های هرز در هر دو مزرعه با استفاده از معادله $RD = D_w/D_t \times 100$ که RD: تراکم نسبی، D_w: تراکم یک گونه و D_t: تراکم تمام گونه‌ها است، محاسبه شد. وزن خشک علف‌های هرز پس از سم‌پاشی دو بار در اواخر اسفند


آزمایش در دو منطقه و در دو مزرعه ۴ ساله زعفران که حداقل به مدت دو سال، علف‌کش دریافت نکرده بودند، انجام شد. به‌منظور تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، از عمق صفر تا ۳۰ سانتی-متری خاک محل پژوهش نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی انجام و به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک در جدول یک نشان داده شده است. آزمایش به تعداد ۱۲ تیمار در ۳ تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. بر اساس نقشه طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۵ نسبت به کرت بندی مزرعه اقدام شد. هر کرت به ابعاد ۲×۳ مترمربع با فاصله هر تکرار ۱ متر و بین کرت‌ها ۰/۵ متر در نظر گرفته شد. تیمارها شامل تریفلورالین (EC48%)، شرکت گیاه) بانام تجاری ترفلان در ۱۲۰۰ گرم ماده مؤثره در هکتار، پندیمتالین (EC33%)، شرکت آریا) بانام تجاری استامپ در ۱۴۸۵ گرم ماده مؤثره در هکتار و متریبوزین (WP70%)، شرکت گیاه) بانام تجاری سنکور در ۵۲۵ گرم ماده مؤثره در هکتار به سه روش مختلف ۱: به‌طور مستقیم در خاک: علف‌کش‌ها بعد از اولین آبیاری و قبل از سله شکنی با استفاده از سم‌پاش پستی شارژی ماتابی با نازل سیلابی (شره‌ای) که برای حجم پاشش ۳۰۰ لیتر محلول در هکتار با فشار ۲/۵ کیلو پاسکال کالیبره شده بود، به‌طور مستقیم در خاک استفاده شدند. ۲: زیر مالچ (مالچ تراشه چوب): علف‌کش‌ها با یک سم‌پاش پستی شارژی ماتابی (همان‌طور که در بالا توضیح داده شد) بعد از سله شکنی به‌طور مستقیم در خاک استفاده شد، سپس سطح خاک با یک‌لایه از مالچ تراشه چوب به عمق ۳ سانتی‌متر پوشانده شد. ۳: مالچ تیمار شده با علف‌کش: مالچ تراشه چوب با علف‌کش از پیش مخلوط

1- Days after treatment


2- European weed research council

علف‌های هرز پس از شناسایی و تعیین تراکم آن‌ها، در کادر، برش داده‌شده، جمع‌آوری و در آون در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد برای ۴۸ ساعت خشک و سپس توزین شدند.

۱۳۹۵ (۱۵۰ روز پس از کاربرد تیمارها) و اواخر فروردین ۱۳۹۶ (۱۸۰ روز پس از کاربرد تیمارها) در طول فصل رشد زعفران با استفاده از کادر ۰/۲۵ متر مربع (۰/۵ × ۰/۵ متر) مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی



شکل ۱- میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد (از مرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷) کاشمر. سازمان هواشناسی ایران
 Figure 1- Monthly rainfall and average temperature during the two growing seasons in Kashmar (August 2016 until July 2018) at the I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO)



شکل ۲- میزان کل بارندگی و متوسط دمای ماهیانه طی دو فصل رشد (از مرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷) کوهسرخ. سازمان هواشناسی ایران
 Figure 2- Monthly rainfall and average temperature during the two growing seasons in Koohsorkh (August 2016 until July 2018) at the I.R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO)

جدول ۲- ارزیابی بصری آسیب علف‌کش روی زعفران بر اساس مقیاس استاندارد EWRC
 Table 2-Visual evaluation of herbicides damage to weeds and crop based on EWRC scale.

نمره ارزیابی	درصد خسارت به زعفران	توضیح
Evaluation score	Damage percentage	Crop tolerance
1	0	بدون خسارت No damage
2	1-2.5	خسارت با رنگ‌پریدگی بسیار کم و یا علائم خفیف مشابه Very little damage
3	2.5-7	خسارت کمی شدیدتر، ولی ناپایدار More damage
4	7-12.5	خسارت متوسط و پایدارتر Moderate and reversible damage
5	12.5-20	خسارت متوسط و پایدار Moderate and consistent damage
6	20-30	خسارت شدید Severe damage
7	30-50	خسارت بسیار شدید Very severe damage
8	50-99	خسارت در حد نابودی کامل Nearly full kill
9	100	نابودی کامل Full kill

نتایج و بحث

شناسایی علف‌های هرز

جدول ۲ گونه‌های علف‌های هرز مشاهده‌شده در مزارع زعفران مورد مطالعه را نشان می‌دهد. گونه‌های شایع در این آزمایش متعلق به خانواده‌های گندمیان (Poaceae)، شببو (Brassicaceae) و کاسنی (Asteraceae) بودند. علف‌های هرز جو موشی، شاهی وحشی و بومادران (*Achillea santolina*) در هر دو مزرعه آزمایشی حضور داشتند. در مزرعه زعفران کاشمر علف هرز شاهی وحشی با تراکم نسبی ۲۶/۷۶ و سپس جو موشی با تراکم نسبی ۱۹/۷۲ بیشترین تراکم علف هرز را به خود اختصاص دادند، درحالی‌که در کوهسرخ علف هرز علف پشمکی با تراکم نسبی ۲۹/۴۱ درصد، بیشترین تراکم علف‌های هرز را به خود اختصاص داد. جدول دو گونه‌های علف‌های هرز مشاهده‌شده در مزارع زعفران مورد مطالعه را نشان می‌دهد. محققان دیگر نیز علف‌های هرز جو موشی (Izadi-Darbandi and Rashed Mohassel, 1992; Hosseini evari, 2016; Soufizadeh et al., 2006) و علف پشمکی (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2008; Soufizadeh et al., 2008) و شاهی وحشی (Izadi-Darbandi and Soufizadeh et al., 2008)؛ Hosseini evari, 2016; Padarloo et al., 2018; Rashed Mohassel, 1992) و جودره (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016) را به‌عنوان علف‌های هرز غالب مزارع زعفران شناسایی نمودند. علف هرز گلابول وحشی (*Gladiolus*

نمونه‌برداری از بنه‌های زعفران در مردادماه سال ۱۳۹۶ هم‌زمان با دوره خواب بنه انجام شد. بدین‌صورت که از سطح هر کرت مساحتی معادل ۰/۵ متر مربع انتخاب‌شده و بنه‌ها از خاک خارج شدند. ویژگی‌های رشد شامل تعداد بنه دختری و وزن کل بنه‌ها اندازه‌گیری شدند. گل‌های زعفران از ۱۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ به‌صورت دستی از سطح یک مترمربع در هر کرت با رعایت اثر حاشیه‌ای برداشت و ثبت گردید. با توجه به برداشت‌های مکرر زعفران در طول فصل گلدهی، هرروز نسبت به برداشت گل اقدام گردید و در پایان اعداد نهایی، حاصل جمع نتیجه کل گلدهی زعفران در یک دوره حدود ۲۰ روز بود. سپس شاخص‌های مربوط به گل و رشد زایشی شامل تعداد و وزن تر گل‌ها و وزن خشک کلاله در واحد سطح، اندازه‌گیری و ثبت شد. نمونه‌های برداشت‌شده کلاله در آون با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند (Koocheki et al., 2016). همچنین وزن خشک اندام‌های هوایی (برگ‌ها) در واحد سطح بعد از برداشت گل‌ها در اوایل آذرماه اندازه‌گیری و ثبت شد. قبل از تجزیه‌های آماری، آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شد و در صورت نرمال نبودن داده‌ها از تبدیل $\sqrt{X+0.5}$ استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS ver9.3 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه واریانس مرکب داده‌ها برای اثر مکان، اثر تیمار و اثر متقابل آن‌ها انجام شد و میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

شبهات زیاد آن به گیاه زعفران به‌سختی انجام می‌گیرد (Iranian Ministry of Agricultural Statistics, 2017). پژوهشگران دیگر نیز وجود این علف هرز را در مزارع زعفران منطقه کوهسرخ گزارش داده‌اند (Izadi-Darbandi and Hosseini evari, 2016).

از علف‌های هرز در حال گسترش در مزارع زعفران است که در زمان انجام این آزمایش فقط در مزرعه کوهسرخ مشاهده شد (جدول ۳). این علف هرز از خانواده زنبق است که با زعفران در یک خانواده قرار دارد و اعتقاد بر این است که کنترل شیمیایی آن در مزارع زعفران امکان‌پذیر نیست و کنترل مکانیکی آن نیز به دلیل

جدول ۳- متوسط تراکم و تراکم نسبی گونه‌های علف هرز موجود در مزرعه زعفران آزمایشی در مرحله قبل از سم‌پاشی

Table 3- The average density and relative density of weed species in the experimental saffron field before spraying

مزرعه ۱: کاشمر				
Field 1: Kashmar				
نام علف هرز Persian name	نام علمی Scientific name	خانواده Family	تراکم Density (plant m ⁻²)	تراکم نسبی Relative density (%)
جودره	<i>Hordeum spontaneum</i> C.Koh.	Poaceae	3	4.23
جو موشی	<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae	14	19.72
شاهی وحشی	<i>Cardaria draba</i> L.	Brassicaceae	19	26.76
هفت‌بند	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	13	18.31
کنگر وحشی	<i>Cirsium arvense</i> L.	Asteraceae	2	2.82
تلخه	<i>Acroptilon repens</i> L.	Asteraceae	2	2.82
بومادران	<i>Achillea santolina</i>	Asteraceae	5	7.04
درشتوک	<i>Malcolmia africana</i> L.	Brassicaceae	3	4.23
آدونیس	<i>Adonis</i> sp.	Ranunculaceae	4	5.63
دیگر گونه‌ها	Others		6	8.45
مزرعه ۲: کوهسرخ				
Field 2: KoohSorkh				
	<i>Bromus tectorum</i> L.			
علف پشمکی	<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae	25	29.41
جو موشی	<i>Cardaria draba</i> L.	Poaceae	6	7.06
شاهی وحشی	<i>Alyssum</i> sp.	Brassicaceae	7	8.24
قدومه	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Brassicaceae	3	3.53
غریبک	<i>Gladiolus abbreviatus</i> Andrews.	Lamiaceae	8	9.41
گلایول وحشی	<i>Achillea millefolium</i> L.	Iridaceae	7	8.24
بومادران	<i>Sisymbrium subulatum</i> E.Fourn.	Asteraceae	6	7.06
خاکشیر تلخ	<i>Galium aparine</i> L.	Brassicaceae	2	2.35
بی تی راخ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Rubiaceae	7	8.24
علف سیر	Others	Brassicaceae	4	4.71
دیگر گونه‌ها	<i>Bromus tectorum</i> L.		10	11.76

دست آمد به‌طوری که به ترتیب باعث کاهش ۹۰ و ۹۳ درصد وزن خشک علف‌های هرز در مقایسه با تیمار شاهد ۱۸۰ روز بعد از کاربرد تیمارها شد (جدول ۴). در کاشمر بعد از تیمار وجین تیمارهای کاربرد علف‌کش متریبوزین مخلوط با مالچ و کاربرد متریبوزین زیر مالچ کمترین وزن خشک علف‌های هرز را داشتند که با تیمار وجین دستی اختلاف معنی‌داری نداشتند ولی در کوهسرخ از کاربرد تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ و متریبوزین به‌تنهایی

وزن خشک علف‌های هرز

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌ها اثر مکان بر وزن خشک علف‌های هرز معنی‌دار ($p \leq 0.01$) شد. لذا آنالیز داده‌های دو مکان به‌طور جداگانه انجام شد. نتایج آنالیز واریانس داده‌ها در هر دو منطقه نشان داد که وزن خشک علف‌های هرز ۱۵۰ روز و ۱۸۰ روز بعد کاربرد تیمارها تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت. در هر دو منطقه کمترین وزن خشک علف‌های هرز از تیمار وجین دستی به

(بالاترین فشار بخار) در بین علف‌کش‌های دی نیتروآیلین است (Weber, 1990)؛ بنابراین کاربرد آن‌ها به‌صورت مخلوط با مالچ، احتمالاً از طریق کاهش تلفات آن‌ها از طریق تبخیر و تصعید می‌تواند منجر به افزایش کارایی آن‌ها شود. مقایسات گروهی جهت ارزیابی روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ها انجام شد. همان‌طور که مقایسه ۱ در جدول ۸ نشان می‌دهد، کاربرد علف‌کش‌ها همراه با مالچ (علف‌کش‌ها زیر مالچ و علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) باعث کاهش معنی‌دار وزن خشک علف‌های هرز در هر دو منطقه کاشمر و کوهسرخ شد. مقایسه ۲ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ) و نیز مقایسه ۳ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) نیز نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ و نیز همراه با مالچ باعث کاهش معنی‌دار وزن خشک علف‌های هرز در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی می‌شود. این در حالی است که در مقایسه ۴ کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ با کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ مقایسه شد در هر دو منطقه کاشمر و کوهسرخ استفاده از علف‌کش‌ها در روش مخلوط با مالچ در مقایسه با روش کاربرد زیر مالچ تأثیر معنی‌داری بر وزن خشک علف‌های هرز نداشتند (جدول ۸).

ارزیابی چشمی خسارت به زعفران

نتایج نشان دادند که میزان گیاه‌سوزی تیمارهای آزمایش روی زعفران از ۱ (بدون آسیب) تا ۲ (خسارت و رنگ‌پریدگی بسیار کم) رتبه‌بندی شد (جدول ۵) و بیشترین اثرات گیاه‌سوزی در تیمارهای حاوی علف‌کش متریبوزین مشاهده شد. عباسی (Abbasi, 1996) در بررسی اثر علف‌کش‌های مختلف روی زعفران مشاهده کرد که مصرف علف‌کش متریبوزین روی گیاه زعفران اثر سوئی داشته و باعث خزان زودرس و زرد شدن برگ‌ها می‌شود.

تأثیر تیمارهای آزمایش بر زعفران در دو منطقه کاشمر و کوهسرخ متفاوت بود. در منطقه کاشمر تیمارهای علف‌کش متریبوزین به‌تنهایی و متریبوزین زیر مالچ در مرحله اول ارزیابی (۳۰ روز بعد از کاربرد) باعث رنگ‌پریدگی بسیار کم در برگ‌های زعفران شدند که این میزان از خسارت در مراحل بعدی ارزیابی (۶۰ و ۹۰ روز بعد از تیمار) به‌طور کامل بهبود یافت. سایر تیمارها در هیچ‌کدام از مراحل ارزیابی علائم گیاه‌سوزی ایجاد نکردند. در منطقه کوهسرخ تیمارهای کاربرد متریبوزین به‌تنهایی، متریبوزین زیر مالچ، متریبوزین مخلوط با مالچ، پندیمتالین به‌تنهایی، تریفلورالین به‌تنهایی و تریفلورالین زیر مالچ در مرحله اول ارزیابی (۳۰ روز بعد از کاربرد) باعث رنگ‌پریدگی جزئی در زعفران شدند که این میزان خسارت در مرحله دوم ارزیابی (۶۰ روز بعد از تیمار) فقط با کاربرد تیمارهای متریبوزین به‌تنهایی و متریبوزین زیر مالچ ادامه یافت و در ارزیابی مرحله سوم (۹۰ روز بعد

بعد از تیمار وجین کمترین وزن خشک علف‌های هرز به دست آمد که اگرچه این تیمارها تفاوت معنی‌داری باهم نداشتند ولی با تیمار وجین اختلاف معنی‌داری داشتند. بیشترین وزن خشک علف‌های هرز در هر دو منطقه ۱۵۰ روز و ۱۸۰ روز بعد کاربرد تیمارها به ترتیب از تیمار شاهد بدون کنترل و کاربرد مالچ به‌تنهایی به دست آمد که اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند (جدول ۵). کاربرد مالچ به‌تنهایی نتیجه قابل قبولی از کنترل علف‌های هرز را در هیچ‌کدام از دو مزرعه نداشت. محققین دیگر نیز گزارش کرده‌اند که مالچ با ضخامت ۶ و ۱۲ سانتی‌متر مانع از رشد علف‌های هرز می‌شود، درحالی‌که برای کنترل قابل‌قبول علف‌های هرز در کاربرد مالچ با ضخامت ۳ سانتی‌متر نیاز به کاربرد علف‌کش است (Somireddy, 2012). در هر دو مزرعه، کرت‌های تیمار شده با متریبوزین، وزن خشک کل علف‌های هرز کمتری در مقایسه با پندیمتالین و تری‌فلورالین مشاهده شد (جدول ۴). پژوهشگران دیگر در بررسی تأثیر پیش‌رویشی بعضی از علف‌کش‌های رایج بر علف‌های هرز زعفران نشان دادند که متریبوزین بیشترین تأثیر را بر وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ داشت (Abbasi, 1996; Abbasian et al., 2011; Norouzzadeh and Delghandi, 2006; Rahimian, 2013; Soufizadeh et al., 2008). وزن خشک کل علف‌های هرز

در ۱۵۰ و ۱۸۰ روز بعد از کاربرد تیمارها در مزرعه دوم (منطقه کوهسرخ) بیشتر بود (جدول ۴) که با توجه به تفاوت در اقلیم، آب‌وهوا و نوع علف هرز توجیه‌پذیر است. مطالعات دیگر نیز نشان داد که ساختار جمعیت علف‌های هرز در مزارع زعفران استان خراسان رضوی تحت تأثیر مدیریت مزرعه، ارتفاع از سطح دریا و اقلیم منطقه قرار دارد (Padarloo et al., 2018). سایر نتایج به‌دست‌آمده در هر دو مزرعه مشابه بود. در هر دو مزرعه علف‌کش متریبوزین در ترکیب با مالچ ۱۵۰ روز و ۱۸۰ روز بعد کاربرد تیمارها باعث کاهش معنی‌دار وزن خشک کل علف‌های هرز شد. اگرچه تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ، کاربرد متریبوزین زیر مالچ و متریبوزین به‌تنهایی وجود نداشت. کاربرد علف‌کش پندیمتالین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد این علف‌کش به دو روش مخلوط با مالچ و یا زیر مالچ نیز تأثیر کمتری در کنترل علف‌های هرز داشت. در کاربرد تیمارهای مربوط به علف‌کش تریفلورالین نیز نتایج مشابهی مشاهده شد. وزن خشک علف‌های هرز در تیمار کاربرد علف‌کش تریفلورالین به‌تنهایی و تیمار تریفلورالین زیر لایه مالچ در کاشمر در ۱۵۰ روز بعد از سم‌پاشی در مقایسه با تیمار تریفلورالین مخلوط با مالچ به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (جدول ۴). با توجه به نتایج مذکور، به نظر می‌رسد ترکیب علف‌کش تریفلورالین با مالچ در مقایسه با ترکیب علف‌کش‌های متریبوزین و پندیمتالین با مالچ در افزایش کارایی این علف‌کش مؤثرتر است. با توجه به اینکه علف‌کش‌های تریفلورالین و پندیمتالین نسبتاً فرار هستند و تریفلورالین یکی از فرارترین ترکیبات

از تیمار) در هیچ‌کدام از تیمارها خسارت مشاهده نشد (جدول ۶).
جدول ۵ نشان می‌دهد که استفاده از علف‌کش‌ها در مخلوط با مالچ باعث کاهش اثرات گیاه‌سوزی در زعفران می‌شود. مالچ‌های تیمار شده با علف‌کش می‌توانند اثرات گیاه‌سوزی علف‌کش‌ها در زعفران را کاهش دهند، این احتمال وجود دارد که تماس و جذب کمتر علف‌کش‌ها در این تیمارها توسط زعفران منجر به این مهم شده باشد.

تعداد گل

بر اساس مقایسات میانگین، بیشترین و کمترین تعداد گل به ترتیب از تیمار وجین و شاهد بدون کنترل در هر دو مزرعه به دست آمد (جدول ۶ و ۷). در مزرعه کاشمر تیمار مالچ به‌تنهایی باعث افزایش معنی‌دار (۲۹ درصد) تعداد گل در واحد سطح نسبت به تیمار شاهد شد (جدول ۶) اگرچه در مزرعه کوهسرخ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۷).

اجزای عملکرد زعفران

نتایج تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد اثر مکان بر کلیه اجزای عملکرد (تعداد گل، وزن گل‌تر، وزن کلاله تر و خشک، وزن تر و خشک برگ، تعداد و وزن بنه دختری و عملکرد) و اثر مکان در تیمار بر وزن تر و خشک برگ و تعداد و وزن بنه دختری معنی‌دار

جدول ۴- مقایسه میانگین زیست‌توده کل علف‌های هرز ($g.m^{-2}$) در تیمارهای مختلف در مزرعه زعفران کاشمر و کوه سرخ
Table 4- Mean comparison of weed biomass ($g.m^{-2}$) in different treatments on saffron field of Kashmar and KoohSorkh

تیمار Treatment	مزرعه ۱: کاشمر Field 1: Kashmar		مزرعه ۲: کوهسرخ Field 2: KoohSorkh	
	۱۵۰ روز بعد از تیمار 150 days after treatment	۱۸۰ روز بعد از تیمار 180 days after treatment	۱۵۰ روز بعد از تیمار 150 days after treatment	۱۸۰ روز بعد از تیمار 180 days after treatment
شاهد بدون کنترل Weedy Check	49.66 ^d	53.14 ^f	66.91 ^f	77.03 ^f
مالچ Mulch	48.95 ^{d(-1)}	52.55 ^{f(-1)}	65.20 ^{f(-18)}	75.16 ^{f(-2)}
وجین دستی Hand weeding	5.55 ^{a(-89)}	5.50 ^{a(-90)}	6.16 ^{a(-106)}	5.58 ^{a(-93)}
متریبوزین به‌تنهایی Metribuzin alone	10.50 ^{a(-79)}	10.93 ^{b(-79)}	12.91 ^{b(-96)}	13.71 ^{b(-82)}
متریبوزین زیر مالچ Metribuzin under mulch	8.53 ^{a(-83)}	8.49 ^{ab(-84)}	12.46 ^{b(-97)}	12.62 ^{b(-84)}
متریبوزین مخلوط با مالچ Metribuzin mixed with mulch	8.23 ^{a(-83)}	7.95 ^{ab(-85)}	10.79 ^{b(-99)}	10.26 ^{b(-87)}
پندیمتالین به‌تنهایی Pendimethalin alone	20.45 ^{b(-59)}	21.94 ^{cd(-59)}	22.38 ^{cd(-82)}	26.83 ^{d(-65)}
پندیمتالین زیر مالچ Pendimethalin under mulch	18.74 ^{b(-62)}	20.02 ^{cd(-62)}	21.77 ^{c(-83)}	20.56 ^{c(-73)}
پندیمتالین مخلوط با مالچ Pendimethalin mixed with mulch	19.06 ^{b(-62)}	18.43 ^{c(-65)}	21.19 ^{c(-83)}	21.02 ^{c(-73)}
تریفلورالین به‌تنهایی Trifluralin alone	27.1 ^{c(-45)}	30.71 ^{c(-42)}	28.98 ^{c(-72)}	34.36 ^{c(-55)}
تریفلورالین زیر مالچ Trifluralin under mulch	23.87 ^{bc(-52)}	24.78 ^{d(-53)}	29.12 ^{c(-72)}	28.33 ^{d(-63)}
تریفلورالین مخلوط با مالچ Trifluralin mixed with mulch	21.61 ^{b(-56)}	22.05 ^{cd(-59)}	24.61 ^{d(-78)}	24.85 ^{d(-68)}

در هر ستون میانگین‌ها با حروف مشترک بر اساس آزمون LSD دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال پنج درصد نمی‌باشند
 In each column means with same letter based on LSD test are not significantly different at 5% level of probability.
 اعداد داخل پرانتز درصد تغییرات تیمارها را نسبت به تیمار شاهد نشان می‌دهد

The number inside the bracket represents the the percentage of changes compared to the control treatment

جدول ۵- برآورد خسارت ناشی از گیاه‌سوزی در تیمارهای مختلف با استفاده از روش امتیازدهی EWRC در مزرعه زعفران کاشمر و کوهسرخ
Table 5- Damage estimation of phytointoxication (European Weed Research Council - EWRC scale) in different treatments on saffron field of Kashmar and KoohSorkh

مکان آزمایش	مزرعه ۱: کاشمر Field 1: Kashmar			مزرعه ۲: کوهسرخ Field 2: KoohSorkh			
	نمرات ارزیابی چشمی بر اساس EWRC Saffron phytointoxication (EWRC scale – Notes 1-9)			نمرات ارزیابی چشمی بر اساس EWRC Saffron phytointoxication (EWRC scale – Notes 1-9)			
	تیمارها Treatments	۳۰ روز بعد از تیمار 30 DAT ^a	۶۰ روز بعد از تیمار 60 DAT	۹۰ روز بعد از تیمار 90 DAT	۳۰ روز بعد از تیمار 30 DAT ^a	۶۰ روز بعد از تیمار 60 DAT	۹۰ روز بعد از تیمار 90 DAT
	وجین دستی Hand weeding	1 (0) ^b	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
مالچ Mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	
شاهد بدون کنترل Weedy Check	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	
پندیمتالین به‌تنهایی Pendimethalin alone	1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	
پندیمتالین زیر مالچ Pendimethalin under mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	
پندیمتالین مخلوط با مالچ Pendimethalin mixed with mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	
تریفلورالین به‌تنهایی Trifluralin alone	1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	
تریفلورالین زیر مالچ Trifluralin under mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	
تریفلورالین مخلوط با مالچ Trifluralin mixed with mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	
متریبوزین به‌تنهایی Metribuzin alone	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	2 (1-2.5)	1 (0)	
متریبوزین زیر مالچ Metribuzin under mulch	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	2 (1-2.5)	1 (0)	
متریبوزین مخلوط با مالچ Metribuzin mixed with mulch	1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1-2.5)	1 (0)	1 (0)	

a: DAT: Days after treatment

b: اعداد داخل پرانتز درصد خسارت به زعفران را نشان می‌دهد.

b: The number inside the bracket represents the percentage of damage to the saffron plant

بیشتری داشت، به طوری که در کاشمر بیشترین تعداد گل بعد از تیمار وجین ۱۴۱ و ۱۴۹ درصد افزایش نسبت به شاهد به ترتیب از تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ و متریبوزین زیر مالچ به دست آمد که این دو تیمار اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند (جدول ۶). در حالی که در کوهسرخ بیشترین تعداد گل بعد از تیمار وجین ۹۷، ۹۲ و ۸۶ درصد افزایش نسبت به شاهد به ترتیب از تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ و پندیمتالین مخلوط با مالچ به دست آمد که این تیمارها نیز باهم اختلاف معنی‌داری نداشتند (جدول ۷). صدرآبادی حقیقی و قنادی طوسی (Sadrabadi Haghghi and Ghanad Tosi, 2016) در بررسی تأثیر پیش‌رویشی بعضی علف‌کش‌های رایج بر علف‌های هرز زعفران نشان دادند که پس از وجین دستی، متریبوزین بیشترین تأثیر را بر افزایش تعداد گل‌ها دارد. کاربرد متریبوزین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد آن همراه مالچ اگرچه

با توجه به نتایج قبلی که کاربرد مالچ در مقایسه با شاهد بدون کنترل باعث کاهش معنی‌دار در وزن خشک علف‌های هرز در هیچ‌کدام از مناطق نشد، احتمالاً استفاده از مالچ در مزارع زعفران باعث کاهش دمای خاک در طول تابستان داغ این منطقه شده و به افزایش گل‌انگیزی در بنه‌ها منجر شده است. مولینا و همکاران (Molina et al., 2005) ضمن آنکه گل‌انگیزی و عملکرد گل زعفران را در ارتباط مستقیم با درجه حرارت محیط دانستند، اظهار داشتند که وقوع دماهای بالاتر و یا پایین‌تر از حد بهینه می‌تواند القای گلدهی زعفران را تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم کاهش عملکرد زعفران، وقوع درجه حرارت بیش‌ازحد در تابستان بوده که می‌تواند بر القاء گلدهی در مردادماه تأثیر منفی داشته باشد (Shabahang et al., 2013). بر اساس داده‌های جداول ۶ و ۷ در هر دو مزرعه علف‌کش متریبوزین در مقایسه با دو علف‌کش دیگر در افزایش تعداد گل تأثیر

گل‌ها به ترتیب از تیمار شاهد و تیمار مالچ به دست آمد که این دو تیمار از نظر آماری تفاوت معنی‌داری باهم نداشتند (جدول ۷).

وزن خشک کلاله

کلاله مهم‌ترین بخش اقتصادی زعفران هست (Srivastava et al., 2010). نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن خشک کلاله زعفران به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۵ درصد افزایش نسبت به شاهد در هر دو منطقه از تیمار وجین به دست آمد که با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۶ و ۷). بیشترین وزن خشک کلاله بعد از تیمار وجین در منطقه کاشمر به ترتیب از تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ، متریبوزین به‌تنهایی، پندیمتالین مخلوط با مالچ، پندیمتالین زیر مالچ و تریفلورالین مخلوط با مالچ به دست آمد. این تیمارها از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند (جدول ۶). در منطقه کوهسرخ تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ بعد از تیمار وجین بیشترین وزن خشک کلاله را به خود اختصاص داد که در مقایسه با دیگر تیمارها باعث افزایش معنی‌داری وزن خشک کلاله در واحد سطح شد (جدول ۷). در منطقه کاشمر کاربرد علف‌کش‌های تریفلورالین، پندیمتالین و متریبوزین به‌تنهایی باعث کاهش معنی‌داری وزن خشک کلاله در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها به‌صورت مخلوط با مالچ شد (جدول ۶). درحالی‌که در منطقه کوهسرخ کاربرد متریبوزین به‌تنهایی در مقایسه با متریبوزین مخلوط با مالچ باعث کاهش وزن خشک کلاله شد، اگرچه اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند؛ اما کاربرد علف‌کش‌های تریفلورالین و پندیمتالین به‌تنهایی باعث کاهش معنی‌داری وزن خشک کلاله در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ شد (جدول ۷). کمترین وزن خشک کلاله در هر دو منطقه به ترتیب از تیمار شاهد بدون کنترل و تیمار مالچ حاصل شد (جدول ۶ و ۷) با این تفاوت که کاربرد مالچ در مزرعه کاشمر در مقایسه با تیمار شاهد بدون کنترل باعث افزایش معنی‌داری وزن خشک کلاله شد (جدول ۶). اگرچه این تفاوت در مزرعه کوهسرخ معنی‌داری نداشت (جدول ۷). این احتمال وجود دارد که بهبود ساختار فیزیکی و افزایش محتوی نسبی رطوبت خاک در نتیجه کاربرد مالچ‌های گیاهی (Danga and Wakindiki, 2009; Monzon et al., Foroughifar and Pour Kasmani, 2002; 2006) نقش مؤثری در افزایش گلدهی زعفران داشته است. با در نظر گرفتن تأثیر مثبت کاربرد مالچ‌های گیاهی در تعدیل درجه حرارت محیط خاک (Limon-Ortega Danga and Wakindiki, 2009; et al., 2008; Monzon et al., 2006) پخش مالچ کلش در مهرماه می‌تواند منجر به افزایش معنی‌داری تعداد گل و نیز عملکرد گل‌تر و خشک زعفران (به ترتیب تا ۴۶، ۶۱ و ۶۵ درصد) شود (Rezvani Moghaddam et al., 2013).

علاوه بر این در بررسی روش کاربرد علف‌کش در هر دو مزرعه

باعث کاهش تعداد گل در هر دو منطقه شد، ولی این کاهش فقط در کاشمر و با تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ معنی‌دار شد. کاربرد پندیمتالین مخلوط با مالچ در هر دو منطقه باعث افزایش معنی‌داری تعداد گل در مقایسه با کاربرد این علف‌کش به‌تنهایی شد (جدول ۶ و ۷) کاربرد علف‌کش پندیمتالین زیر مالچ اگرچه در کاشمر باعث افزایش معنی‌داری تعداد گل در مقایسه با کاربرد این علف‌کش به‌تنهایی شد (جدول ۶)، ولی این افزایش در کوهسرخ معنی‌دار نشد (جدول ۷). تیمارهای شامل علف‌کش تریفلورالین در کوهسرخ تفاوت معنی‌داری از نظر تعداد گل در واحد سطح نداشتند (جدول ۷)، ولی در کاشمر کاربرد تریفلورالین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد این علف‌کش زیر مالچ و مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌داری تعداد گل در واحد سطح شد (جدول ۶). در مزرعه کاشمر کاربرد علف‌کش تریفلورالین به‌تنهایی در مقایسه با دو تیمار تریفلورالین زیر مالچ و تریفلورالین مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌داری تعداد گل در واحد سطح شد (جدول ۶). در کوهسرخ، تیمار تریفلورالین مخلوط با مالچ در مقایسه با تریفلورالین به‌تنهایی تعداد گل در واحد سطح را به‌طور معنی‌داری افزایش داد (جدول ۷). در هر دو مزرعه، کاربرد علف‌کش‌های پندیمتالین و متریبوزین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها به روش مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌داری تعداد گل شد (جدول ۶ و ۷).

وزن تر گل‌ها

تیمار وجین در هر دو مزرعه به ترتیب با ۲۸/۶ و ۳۳/۶۳ گرم در مترمربع دارای بیشترین وزن تر گل در واحد سطح بود و با کلیه تیمارها از این نظر تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۶ و ۷). گزارش‌های قبلی در ارزیابی روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز زعفران نیز نشان داد که در بین تیمارهای مورد ارزیابی بیشترین وزن گل مربوط به تیمار وجین است (Sadrabadi Haghghi and Zare Hosseini et al., 2014; Ghanad Tosi, 2016). در کاشمر در بین سایر تیمارها، متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ، پندیمتالین مخلوط با مالچ و پندیمتالین زیر مالچ به ترتیب بیشترین وزن تر گل بعد از وجین را دارا بودند که این تیمارها باهم اختلاف معنی‌داری از نظر وزن گل نداشتند (جدول ۶) در کوهسرخ تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ، متریبوزین به‌تنهایی، پندیمتالین مخلوط با مالچ و پندیمتالین زیر مالچ به ترتیب بیشترین وزن تر گل بعد از وجین را به خود اختصاص دادند که از نظر آماری این تیمارها تفاوت معنی‌داری باهم نداشتند (جدول ۷). کمترین وزن تر گل‌ها نیز در کاشمر از تیمار شاهد بدون کنترل به دست آمد که با تیمار مالچ که در مرتبه بعدی قرار دارد از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۶). درحالی‌که در کوهسرخ کمترین وزن تر

مالچ و پندیمتالین مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌دار تعداد بنه‌های دختری شد (جدول ۶). در مزرعه کوهسرخ بیشترین تعداد بنه دختری در واحد سطح به ترتیب مربوط به تیمارهای وجین، متریبوزین مخلوط با مالچ، متریبوزین زیر مالچ، پندیمتالین مخلوط با مالچ و تریفلورالین مخلوط با مالچ بود که با تیمار وجین تفاوت معنی‌داری نداشتند. کاربرد علف‌کش‌های متریبوزین، تریفلورالین و پندیمتالین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌دار تعداد بنه دختری در واحد سطح شد، درحالی‌که در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها زیر مالچ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۷). کمترین تعداد بنه دختری در کاشمر از تیمار شاهد بدون کنترل به دست آمد که بقیه تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۶) درحالی‌که در کوهسرخ کمترین تعداد بنه دختری از تیمار شاهد بدون کنترل به دست آمد که با تیمارهای مالچ، تریفلورالین به‌تنهایی و تریفلورالین زیر مالچ تفاوت معنی‌داری نداشتند (جدول ۷).

وزن کل بنه‌ها

نتایج مقایسه میانگین‌ها (جدول ۶ و ۷) نشان داد که در هر دو مزرعه بیشترین وزن کل بنه‌ها به ترتیب ۱۰۲۱/۲۷ و ۱۰۵۱/۱۳ گرم در مترمربع از تیمار وجین به دست آمد، درحالی‌که کمترین وزن بنه در مترمربع ۵۸۳/۲۱ و ۷۱۲/۶۳ گرم در مترمربع مربوط به تیمار شاهد بدون کنترل بود. تیمارهای متریبوزین مخلوط با مالچ و متریبوزین زیر مالچ در مزرعه کاشمر با ۶۸ و ۶۶ درصد افزایش در مقایسه با شاهد (جدول ۶) و تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ با ۴۱ درصد افزایش در مقایسه با شاهد در مزرعه کوهسرخ (جدول ۷) با تیمار وجین تفاوت معنی‌داری نداشتند. در تحقیقی صدرآبادی حقیقی و قنادی طوسی (Sadrabadi, Haghghi and Ghanad Tosi, 2016) نشان دادند که تیمار علف‌کش متری‌بوزین و وجین دستی موجب حصول وزن کل بنه بیشتری در واحد سطح نسبت به سایر تیمارها شد و کمترین وزن بنه در واحد سطح با عدم وجین علف‌های هرز به دست آمد. در مزرعه کاشمر تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ و متریبوزین زیر مالچ در مقایسه با کاربرد متریبوزین به‌تنهایی باعث افزایش معنی‌دار وزن کل بنه‌ها شد و تیمار پندیمتالین مخلوط با مالچ و پندیمتالین زیر مالچ نیز در مقایسه با پندیمتالین به‌تنهایی باعث افزایش معنی‌دار وزن کل بنه‌ها شد، درحالی‌که تیمارهای شامل علف‌کش تریفلورالین از این نظر تفاوت معنی‌داری باهم نداشتند (جدول ۶). در مزرعه کوهسرخ کاربرد علف‌کش‌های تریفلورالین و پندیمتالین مخلوط با مالچ با کاربرد این علف‌کش‌ها به‌تنهایی و یا زیر مالچ باعث افزایش معنی‌دار وزن بنه دختری شد و اختلاط این علف‌کش‌ها با مالچ باعث افزایش وزن کل بنه‌ها شد و متریبوزین به‌تنهایی نیز در مقایسه با کاربرد این علف‌کش مخلوط با مالچ و زیر مالچ وزن کل بنه‌ها را به‌طور معنی‌داری کاهش داد (جدول ۷).

مقایسه گروهی ۱ در جدول ۸ نشان می‌دهد، کاربرد علف‌کش‌ها همراه با مالچ (علف‌کش‌ها زیر مالچ و علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) باعث افزایش معنی‌دار میانگین گل (تعداد گل و وزن خشک کلاله)، در هر دو منطقه کاشمر و کوهسرخ شد. مقایسه ۲ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ) و نیز مقایسه ۳ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) نیز نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ و نیز همراه با مالچ باعث افزایش معنی‌دار میانگین تعداد گل و وزن خشک کلاله در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی شده است. علاوه بر این در منطقه کاشمر کاربرد علف‌کش‌ها به‌صورت مخلوط با مالچ در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ باعث افزایش میانگین تعداد گل و وزن خشک کلاله شد ولی این افزایش فقط در مورد عملکرد کلاله خشک معنی‌دار ($p \leq 0.05$) شد (جدول ۸).

وزن خشک برگ

طبق نتایج جدول ۶ بیشترین وزن خشک برگ در واحد سطح در منطقه کاشمر به ترتیب از تیمارهای وجین دستی، متریبوزین مخلوط با مالچ و متریبوزین زیر مالچ به دست آمد که این تیمارها باهم از این نظر تفاوت معنی‌داری نداشتند. کمترین وزن خشک برگ نیز مربوط به تیمار شاهد بدون کنترل بود که با دیگر تیمارها اختلاف معنی‌داری داشت. علف‌کش متریبوزین به‌تنهایی در مقایسه با کاربرد این علف‌کش زیر مالچ و مخلوط با مالچ باعث کاهش معنی‌دار وزن خشک برگ زعفران شد، همچنین کاربرد پندیمتالین به‌تنهایی با کاربرد این علف‌کش مخلوط با مالچ تفاوت معنی‌داری داشت و وزن خشک برگ را کاهش داد (جدول ۶). در مزرعه کوهسرخ تیمار شاهد کمترین وزن خشک زعفران را به خود اختصاص داده بود ولی با دیگر تیمارها به‌جز تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ تفاوت معنی‌داری نداشت (جدول ۷).

تعداد بنه‌های دختری

در هر دو منطقه تیمار شاهد بدون کنترل (۱۸۷/۹ و ۲۰۵/۹ بنه در مترمربع) و وجین دستی (۲۶۸/۰۷ و ۲۶۰/۹ بنه در مترمربع) به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد بنه دختری را به خود اختصاص دادند که با بقیه تیمارها تفاوت معنی‌داری داشتند (جدول ۶ و ۷). در مزرعه کاشمر بیشترین تعداد بنه دختری بعد از وجین دستی با ۴۰ درصد افزایش نسبت به شاهد به ترتیب متعلق به تیمار متریبوزین مخلوط با مالچ که با تیمار وجین تفاوت معنی‌داری نداشت. کاربرد علف‌کش تریفلورالین و متریبوزین به‌تنهایی باعث کاهش معنی‌دار تعداد بنه در واحد سطح در مقایسه با مخلوط این علف‌کش‌ها با مالچ شد، اما در مقایسه با کاربرد این علف‌کش‌ها زیر مالچ اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. درحالی‌که تیمار پندیمتالین به‌تنهایی در مقایسه با پندیمتالین زیر

جدول ۶- مقایسه میانگین صفات زعفران در تیمارهای مختلف در مزرعه زعفران کاشمر

تیمار Treatment	تعداد گل Flowers number (per m ²)	وزن تر گل‌ها Flower fresh weight (g.m ⁻²)	عملکرد گل‌دانه خشک Dried stigma yield (g.m ⁻²)	وزن خشک برگ Leaf dry weight (g.m ⁻²)	تعداد بنه دختری Number of replacement corm (per m ²)	وزن کل بنه‌ها Total weight of corms (g.m ⁻²)
شاهد بدون کنترل Weedy Check	26.33 ^a	9.46 ^c	0.10 ^d	101.21 ^a	187.91 ^a	583.21 ^a
مالچ Mulch	34 ^b (29)	13.42 ^b (42)	0.14 ^b (40)	108.74 ^b (7)	215.41 ^b (15)	686.60 ^b (18)
وجین دستی Hand weeding	71.66 ^b (172)	28.61 ^b (202)	0.30 ^b (200)	130.03 ^b (28)	268.07 ^b (43)	1021.27 ^b (75)
متریبوزین به تنهایی Metribuzin alone	58.33 ^b (122)	21.44 ^c (127)	0.22 ^c (120)	120.49 ^b (19)	239.65 ^b (28)	825.72 ^b (42)
متریبوزین زیر مالچ Metribuzin under mulch	63.33 ^b (141)	24.06 ^b (154)	0.23 ^b (130)	128.41 ^b (27)	251.49 ^b (34)	965.94 ^b (66)
متریبوزین مخلوط با مالچ Metribuzin mixed with mulch	65.66 ^b (149)	25.10 ^b (165)	0.26 ^b (160)	127.77 ^b (26)	262.21 ^b (40)	979.60 ^b (68)
پندیمتالین به تنهایی Pendimethalin alone	48 ^c (82)	17.89 ^c (89)	0.18 ^c (80)	111.90 ^b (11)	223.81 ^b (19)	693.18 ^b (19)
پندیمتالین زیر مالچ Pendimethalin under mulch	57.33 ^c (118)	21.69 ^b (129)	0.22 ^b (120)	122.66 ^b (21)	239.98 ^b (28)	791.89 ^b (36)
پندیمتالین مخلوط با مالچ Pendimethalin mixed with mulch	59 ^c (124)	22.66 ^b (140)	0.23 ^b (130)	120.67 ^b (19)	242.07 ^b (29)	831.08 ^b (43)
تریفلورالین به تنهایی Trifluralin alone	43.33 ^c (65)	16.16 ^c (71)	0.17 ^c (70)	108.17 ^b (7)	213.14 ^b (13)	688.26 ^b (18)
تریفلورالین زیر مالچ Trifluralin under mulch	51.66 ^c (96)	19.49 ^b (106)	0.19 ^c (90)	110.87 ^b (10)	219.08 ^b (17)	706.66 ^b (21)
تریفلورالین مخلوط با مالچ Trifluralin mixed with mulch	55.66 ^c (111)	21.31 ^c (125)	0.21 ^c (110)	114.68 ^b (13)	232.02 ^b (23)	768.30 ^b (32)

در هر ستون میانگین‌ها با حروف مشترک با اساس آزمون LSD دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال پنج درصد نمی‌باشند. In each column means with same letter based on LSD test are not significantly different at 5% level of probability.

اعداد داخل پرانتز درصد تغییرات تیمارها را نسبت به تیمار شاهد نشان می‌دهد.

The number inside the bracket represents the percentage of changes compared to the control treatment

جدول ۷- مقایسه میانگین صفات زعفران در تیمارهای مختلف در مزرعه زعفران کوهسرخ
Table 7- Mean comparison of saffron flower and corm traits in different treatments on saffron field of Kashmar

تیمار Treatment	تعداد گل Flowers number (per m ²)	وزن تر گل‌ها Flower fresh weight (g.m ⁻²)	عمکرد کلاه خشک Dried stigma yield (g.m ⁻²)	وزن خشک برگ Leaf dry weight (g.m ⁻²)	تعداد بنه دختری Number of replacement corm (per m ²)	وزن کل بندها Total weight of corms (g.m ⁻²)
شاهد بدون کنترل Weedy Check	37.66 ^a	14.76 ^a	0.16 ^a	114.96 ^a	205.9 ^a	712.63 ^a
مالچ Mulch	38.07 ⁽¹⁾	15.66 ⁽⁶⁾	0.16 ^b	119.2 ⁽⁴⁾	214.33 ⁽⁴⁾	783.4 ⁽¹⁰⁾
وجش دستی Hand weeding	84.33 ⁽¹²⁴⁾	33.63 ⁽¹²⁸⁾	0.36 ⁽¹²⁵⁾	132.83 ⁽¹⁶⁾	260.93 ⁽²⁷⁾	1051.13 ⁽⁴⁷⁾
متریبوزین به تنهایی Metribuzin alone	63.66 ⁽⁶⁹⁾	25.62 ⁽⁷⁴⁾	0.27 ⁽⁶⁹⁾	124.73 ⁽⁸⁾	256.1 ⁽²⁴⁾	941.9 ⁽³²⁾
متریبوزین زیر مالچ Metribuzin under mulch	72.33 ⁽⁹²⁾	28.76 ⁽⁹⁵⁾	0.31 ⁽⁹⁴⁾	129.88 ⁽¹³⁾	261.1 ⁽²⁷⁾	965.9 ⁽³⁶⁾
متریبوزین مخلوط با مالچ Metribuzin mixed with mulch	74.33 ⁽⁹⁷⁾	29.56 ⁽¹⁰⁰⁾	0.32 ⁽¹⁰⁰⁾	134.16 ⁽¹⁷⁾	262.26 ⁽²⁷⁾	1007.8 ⁽⁴¹⁾
پندیمتالین به تنهایی Pendimethalin alone	59.33 ⁽⁵⁸⁾	23.16 ⁽⁵⁷⁾	0.28 ⁽⁵⁶⁾	120.06 ⁽⁴⁾	234.1 ⁽¹⁴⁾	836.16 ⁽¹⁷⁾
پندیمتالین زیر مالچ Pendimethalin under mulch	69.0 ⁽⁸³⁾	27.83 ⁽⁸⁹⁾	0.30 ⁽⁸⁸⁾	121.63 ⁽⁶⁾	245.2 ⁽¹⁹⁾	888.1 ⁽²⁵⁾
پندیمتالین مخلوط با مالچ Pendimethalin mixed with mulch	70.0 ⁽⁸⁶⁾	27.56 ⁽⁸⁷⁾	0.30 ⁽⁸⁸⁾	128.26 ⁽¹²⁾	251.8 ⁽²²⁾	949.63 ⁽³³⁾
تریفلورالین به تنهایی Trifluralin alone	55.33 ⁽⁴⁷⁾	21.87 ⁽⁴⁸⁾	0.23 ⁽⁴⁴⁾	117.16 ⁽²⁾	214.96 ⁽⁴⁾	816.93 ⁽¹⁵⁾
تریفلورالین زیر مالچ Trifluralin under mulch	63.33 ⁽⁶⁸⁾	25.16 ⁽⁷⁰⁾	0.27 ⁽⁶⁹⁾	117.9 ⁽³⁾	224.36 ⁽¹⁹⁾	825.56 ⁽¹⁶⁾
تریفلورالین مخلوط با مالچ Trifluralin mixed with mulch	66.66 ⁽⁷⁷⁾	26.66 ⁽⁸¹⁾	0.29 ⁽⁸¹⁾	121.26 ⁽⁵⁾	236.5 ⁽¹⁵⁾	877.53 ⁽²³⁾

در هر ستون میانگین‌ها با حروف مشترک بر اساس آزمون LSD دارای اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال پنج درصد نمی‌باشند.
In each column means with same letter based on LSD test are not significantly different at 5% level of probability.
اعداد داخل پرانتز درصد تغییرات تیمارها را نسبت به تیمار شاهد نشان می‌دهد.

The number inside the bracket represents the the percentage of changes compared to the control treatment

جدول ۸- مقایسه میانگین وزن خشک علف‌های هرز، تعداد گل، وزن خشک کلاه، وزن و تعداد بنه بین تیمارهای مختلف بر اساس مقایسات گرومی (کاشمر)
 Table 8- Contrast comparison weed biomass, flowers number, dried stigma yield, Number and weight of corms between treatments based on orthogonal contrasts (Kashmar)

مقایسات گرومی orthogonal contrasts	وزن خشک کل علف‌های هرز ۱۵۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at 0 days after treatment ۱۵۰ days after treatment ۱۵۰ (g.m ⁻²)		وزن خشک کل علف‌های هرز ۱۸۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at ۱۸۰ days after treatment ۱۸۰ (g.m ⁻²)		تعداد گل Flowers number (per m ²)	عسکورد کلاه خشک Dried stigma yield (mg. m ⁻²)	وزن خشک برگ Leaf dry weight (g.m ⁻²)	تعداد بنه دختری Number of replacement corm (per m ²)	وزن کل بندها Total weight of corms (g.m ⁻²)
	۱۵۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at 0 days after treatment ۱۵۰ (g.m ⁻²)	۱۸۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at ۱۸۰ days after treatment ۱۸۰ (g.m ⁻²)	۱۵۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at 0 days after treatment ۱۵۰ (g.m ⁻²)	۱۸۰ روز بعد از تیمار Dry weight of total weeds at ۱۸۰ days after treatment ۱۸۰ (g.m ⁻²)					
1	41.77 vs. 32.66**	53.25 vs. 35.15**	49.88 vs. 56.77**	193.44 vs. 227.05**	113.52 vs. 120.85**	225.54 vs. 244.11**	735.72 vs. 849.07**		
2	41.77 vs. 31.56*	53.25 vs. 31.56**	49.88 vs. 57.44**	193.44 vs. 21.67**	113.52 vs. 120.65**	225.54 vs. 242.81**	735.72 vs. 836.48**		
3	41.77 vs. 33.76*	53.25 vs. 35.59**	49.88 vs. 60.11**	193.44 vs. 237.44**	113.52 vs. 121.02**	225.54 vs. 245.41**	735.72 vs. 861.7**		
4	31.56 vs. 33.76 ^{ns}	34.71 vs. 35.59 ^{ns}	57.44 vs. 60.11 ^{ns}	216.67 vs. 237.44*	120.65 vs. 121.02 ^{ns}	242.81 vs. 245.41 ^{ns}	836.48 vs. 861.7 ^{ns}		
1	38.22 vs. 30.13**	50.82 vs. 34.07**	59.44 vs. 69.27**	258.22 vs. 301.05**	131.21 vs. 138.20*	238.7 vs. 252.36**	856.41 vs. 945.18**		
2	38.22 vs. 29.82**	50.82 vs. 33.62**	59.44 vs. 67.44**	258.22 vs. 293.0**	131.21 vs. 138.1*	238.7 vs. 248.13*	856.41 vs. 925.94**		
3	38.22 vs. 30.45**	50.82 vs. 34.52**	59.44 vs. 71.11**	258.22 vs. 309.11**	131.21 vs. 138.31*	238.7 vs. 256.59**	856.41 vs. 964.42**		
4	29.82 vs. 30.45 ^{ns}	33.62 vs. 34.52 ^{ns}	67.44 vs. 71.11 ^{ns}	293.0 vs. 309.11 ^{ns}	138.1 vs. 138.31 ^{ns}	248.7 vs. 256.59*	925.95 vs. 964.42*		

ns, * and ** represent non significant, significant at 5% and 1% level probability, respectively.

۱: مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها همراه با مالچ (علف‌کش‌ها زیر مالچ و علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ)

۲: Comparison of herbicides alone versus herbicides with mulch (herbicides under mulch and herbicides mixed with mulch)

۳: مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ

۴: Comparison of herbicides alone herbicides mixed with mulch

۵: مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ

۶: Comparison of herbicides under mulch versus herbicides mixed with mulch

۷: مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ

۸: Comparison of herbicides under mulch versus herbicides mixed with mulch

با شاهد به ترتیب باعث ۸۵٪ و ۸۷٪ کاهش وزن خشک علف‌های هرز در مزرعه کاشمر و مزرعه کوهسرخ شد، این تیمار همچنین به ترتیب باعث افزایش ۱۶۰ و ۱۰۰ درصدی وزن خشک کلاله نسبت به شاهد در مزرعه کاشمر و مزرعه کوهسرخ شد. به نظر می‌رسد بعد از متریوزین، علف‌کش پندیمتالین کارایی بهتری برای استفاده در مزارع زعفران دارد. تیمار مالچ به‌تنهایی اگرچه مانع رشد علف‌های هرز نشد، ولی در مقایسه با شاهد بدون کنترل بر عملکرد زعفران به‌ویژه در مزرعه کاشمر تأثیر مثبتی داشت. به نظر می‌رسد استفاده از مالچ در مناطق گرم و خشک تأثیر بیشتری برافزایش عملکرد زعفران دارد. با توجه به اینکه کشت زعفران در مناطق نیمه‌خشک کشور مانند استان‌های خراسان و کرمان صورت می‌گیرد، کاربرد صحیح بقایای گیاهی در مناطق نیمه‌خشک می‌تواند با تأثیر مستقیم بر میزان ماده آلی خاک، منجر به افزایش عملکرد گل و درنهایت، افزایش پایداری تولید زعفران شود.

به‌طور کلی مالچ مخلوط شده با علف‌کش علاوه بر بهبود کارایی علف‌کش‌ها باعث افزایش عملکرد زعفران نیز شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبی مناسب از علف‌کش‌ها با یک‌لایه مالچ به ضخامت ۳ سانتی‌متر، می‌تواند کنترل قابل قبولی از علف‌های هرز زعفران فراهم کند. با این‌وجود پیشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در زمینه استفاده مخلوط علف‌کش‌ها و مالچ‌ها، به‌خصوص مالچ‌های از پیش مخلوط شده با علف‌کش، در مزارع زعفران انجام شود.

مقایسات گروهی نیز نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها همراه با مالچ (علف‌کش‌ها زیر مالچ و علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) باعث افزایش معنی‌دار میانگین بنه زعفران (تعداد و وزن بنه) و وزن خشک برگ زعفران در هر دو منطقه کاشمر و کوهسرخ شد (مقایسه ۱). مقایسه ۲ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ) و نیز مقایسه ۳ (مقایسه کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی در مقابل کاربرد علف‌کش‌ها مخلوط با مالچ) نیز نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ و نیز همراه با مالچ باعث افزایش معنی‌دار میانگین بنه زعفران در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها به‌تنهایی می‌شود. در منطقه کوهسرخ کاربرد علف‌کش‌های مخلوط با مالچ در مقایسه با کاربرد علف‌کش‌ها زیر مالچ تعداد بنه دختری و وزن کل بنه‌ها را به‌طور معنی‌داری ($p \leq 0.05$) افزایش داد (جدول ۸).

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی با توجه به نتایج حاصل، علف‌کش متریوزین علائم گیاه‌سوزی بیشتری بر روی زعفران در مقایسه با دو علف‌کش دیگر ایجاد کرد، اما در کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد زعفران از علف‌کش‌های دیگر بهتر بود. این یافته با نتایج تحقیقات دیگر هماهنگی دارد. تیمار متریوزین مخلوط با مالچ در هر دو مزرعه بعد از تیمار وجین هم در کاهش وزن علف‌های هرز و هم افزایش عملکرد زعفران بهترین تیمار بود. تیمار متریوزین مخلوط با مالچ در مقایسه

منابع

1. Abasspoor, M., Norouzzadeh, S., & Torabi, H. (2011). Evaluation of the efficacy of some herbicides new saffron fields, 7th Congress of Iranian Horticultural Science, Isfahan, Iran. (In Persian with English abstract)
2. Abbasi, M.E. (1996). The effect of different herbicides on saffron (*Crocus sativus* L.) weeds. M.Sc., Thesis. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3. Abbasian, M., Bazobandy, M., & Soohany Darban, A.S. (2013). Effect of Application Single and mixed herbicides on weeds and weight saffron corm at Nishapur. *Journal of Weed Ecology* 1(1): 9-20. (In Persian with English abstract)
4. Azizi-Zohan, A.A., Kamgar-Haghighi, A.A., & Sepaskhah, A.R. (2009). Saffron (*Crocus sativus* L.) production as influenced by rainfall, irrigation method and intervals. *Arch. Agronomy Soil Science* 55: 547-555.
5. Behnia, M.R. (1992). *Saffron Crop*. Tehran University Press, Tehran, pp: 151.
6. Case, L.T., & Mathers, H.M. (2006). Herbicide Treated Mulches for Weed Control in Ornamentals. *Journal Environment Horticulture* 24: 84-90.
7. Danga, B.O., & Wakindiki, I.I.C. (2009). Effect of placement of straw mulch on soil conservation, nutrient accumulation, and wheat yield in a humid Kenyan highland. *Journal Tropical Agriculture* 47: 30-36.
8. Foroughifar, H., & Pour Kasmani, M.E. (2002). *Soil Science and Management*. Ferdowsi University of Mashhad Press, Iran. 336 pp.
9. Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., & Ruberto, G. (2008). Saffron, an alternative crop for sustainable agricultural systems. *A review, Agronomy for Sustainable Development* 28: 95-112.
10. Iranian Ministry of Agricultural Statistics, Plant Protection Organization. (2020). List of important pests, diseases and weeds for major agricultural products, pesticides and recommended methods for control them. Available at: <http://maj.ir> (visited 5 February 2020).
11. Iranian Ministry of Agricultural Statistics. (2017). Department of Planning and Economy. Available at:

- <http://maj.ir> (visited 5 September 2018).
12. Izadi-Darbandi, E., & Hosseini evari, Z. (2016). Study of Flora and structure of weed communities of saffron fields in Kashmar and KhalilAbad counties. *Journal of Saffron Research* 4(2): 249-265. (In Persian with English abstract)
 13. Koocheki, A., Gholami, A., Mahvadi Damghani, A., & Tabrizi, L. (2007). *Organic Field Crop Handbook* (Translated). Ferdowsi University of Mashhad Press, Iran. 385 pp. (In Persian)
 14. Koocheki, A., Seyyedi, S.M., & Gharaei, S. (2016). Evaluation of the effects of saffron-cumin intercropping on growth, quality and land equivalent ratio under semi-arid conditions. *Scientia Horticulturae* 201: 190-198.
 15. Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M.K., & Ahuja, P.S. (2009). State of Art of Saffron (*Crocus sativus* L.) Agronomy: *A Comprehensive Review, Food Reviews International* 25: 44-85.
 16. Limon-Ortega, A., Govaerts, B., & Sayre, K.D. (2008). Straw management, crop rotation, and nitrogen source effect on wheat grain yield and nitrogen use efficiency. *European Journal of Agronomy* 29: 21-28.
 17. Mathers, H. (2003). Novel methods of weed control in containers. *HortTechnology* 13: 28-31.
 18. Mathers, H.M., & Case L.T. (2010). Microencapsulated herbicide-treated bark mulches for nursery container weed control. *Weed Technology* 24: 529-537.
 19. McGimpsey, J.A., Douglas, M.H., & Wallace, A.R. (1997). Evaluation of saffron (*Crocus sativus* L.) production in New Zealand. New Zealand, *Journal of Crop and Horticultural Science* 25:159- 168.
 20. Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., & Garcia-Luis, A. (2005). Temperature effects on flower formation in saffron (*Crocus sativus* L.). *Science Horticulture* 103: 361-379.
 21. Monzon, J.P., Sadras, V.O., & Andrade, F.H. (2006). Fallow soil evaporation and water storage as affected by stubble in sub-humid (Argentina) and semi-arid (Australia) environments. *Field Crop Research* 98: 83-90.
 22. Norouzzadeh, S., & Delghandi, M. (2006). Chemical weed control in saffron. In: *Proceedings of the 17th Iranian Plant Protection Congress*, Karaj, Iran.
 23. Padarloo, A.A., Izadi Darbandi, E., Rashed Mohassel, M.H., & Feizi, H. (2018). Study of flora and structure of weed communities of saffron (*Crocus sativus* L.) fields in the Khorasan Razavi province. *Saffron Agronomy & Technology* 6(3): 339-353. (In Persian with English abstract)
 24. Rahimian, H. (1993). *Evaluation of some herbicides in weed control of saffron fields*. Scientific and Industrial Research Organization, Mashhad, Iran.
 25. Rashed Mohassel, M.H. (1992). Weeds of South Khorasan saffron fields. *Journal of Agricultural Science and Technology* 6: 118-135.
 26. Rezvani Moghaddam, P., Khorramdel, S., Amin Ghafari, A., & Shabahang, J. (2013). Evaluation of growth and yield of saffron (*Crocus sativus* L.) affected by spent mushroom compost and corm density. *Journal of Saffron Research* 1(1): 13-26. (In Persian with English abstract)
 27. Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Molafilabi, A., & Seyyedi, S.M. (2013). The effects of different levels of applied wheat straw in different dates on saffron (*Crocus sativus* L.) daughter corms and flower initiation criteria in the second year. *Saffron Agronomy Technology* 1: 55-70. (In Persian with English abstract)
 28. Sadeghi, B. (2008). *Sustainable cropping of saffron in Iran*. Research Report. Research Institute for Food Science and Technology, Korassan Razavi. (In Persian)
 29. Sadrabadi Haghghi, R., & Ghanad Tosi, M.B. (2016). The Effect of Pre-emergence Application of some Common Herbicides on Weed Population, Vegetative Growth, Flower and Corm Characteristics of Saffron (*Crocus sativus* L.). *Journal of Plant Protection* 30(1): 118-126. (In Persian with English abstract)
 30. Shabahang, J., Khorramdel, S., Amin Ghafari, A., & Gheshm, R. (2013). Effects on management of crop residues and cover crop planting on density and population of weeds and agronomical characteristics of saffron (*Crocus sativus* L.). *Journal of Saffron Research* 1(1): 57-72. (In Persian with English abstract)
 31. Somireddy, U. (2012). Effect of Herbicide–Organic Mulch Combinations on Weed Control and Herbicide Persistence. Ph.D dissertation. Columbus, OH: Ohio State University. <https://etd.ohiolink.edu/> (visited December 24 2018).
 32. Soufizadeh, S., Zand, E., Baghestani, M.A., & Sheibany, K. (2006). Integrated Weed Management in Saffron (*Crocus sativus*), *2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology*, Mashhad, Iran.
 33. Soufizadeh, S., Zand, E., Baghestani, M.A., Kashani, F.B., & Nezamabadi, N. (2008). Integrated Weed management in saffron (*Crucos sativus*). *Proceeding of the Second International Symposium Saffron Biology and Tecnology*. July 5-8.
 34. Srivastava, R., Ahmed, H., Dharamveer, D.R.K., & Saraf, S.A. (2010). *Crocus sativus* L. A comprehensive review. *Pharmacogn Rev* 4(8): 200-208.
 35. Weber, J.B. (1990). Behavior of dinitroaniline herbicides in soils. *Weed Technology* 4: 394-406.
 36. Zare Hosseini, H., Ghorbani, R., Rashed Mohassel, M.H., & Rahimi, H. (2014). Effects of weed management strategies on weed density and biomass and saffron (*Crocus sativus*) yield. *Saffron Agronomy & Technology* 2(1): 45-58. (In Persian with English abstract)