

اثرات دما، ضخامت پوشش پلیپروپیلن و بسته‌بندی با اتمسفر

تعديل یافته بر عمر انباری کاهو (*Lactuca sativa L.*)

نسیم فخاریان - معظم حسن پور اصلی* - حبیب!... سمیع زاده لاهیجی^۱

تاریخ دریافت: ۸۷/۵/۲۲

تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۱/۸

چکیده

سبزی‌های برگی مانند کاهو بسیار فساد پذیرند به همین علت استفاده از تیمارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش فساد این محصولات مورد نیاز است. در این پژوهش اثر پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون و بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته به صورت فعال (۳ درصد اکسیژن و ۱ درصد دی‌اکسید کربن) و غیر فعال بر روی دو رقم کاهو به نامهای Cos و Crisphead که به مدت ۴ هفته، در دو دمای ۱ و ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقم Cos نسبت به رقم Crisphead قابلیت نگهداری بهتری دارد. پوشش پلیپروپیلن به کار برده شده در این پژوهش، در مقایسه با نمونه‌های تیمار نشده به میزان معنی داری عمر انباری هر دو رقم کاهو را افزایش داد. به طور کلی، کاهوهایی که با پوشش ۴۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته غیر فعال و پوشش ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال بسته بندی شده و در دمای ۱ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته بودند بهترین نتایج را در حفظ خصوصیات کمی و کیفی نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته، پوشش پلیپروپیلن و کاهو

مقدمه

افزون بر این، دارای موادی به نام لاکتوسین^۲ و لاکتوکاپرکرین^۳ می‌باشد که دارای اثر آرامبخش و خواب‌آوری هستند. این گیاه به صورت تجاری در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در شمال آمریکا، غرب اروپا، حوضه مدیترانه، استرالیا و قسمت‌هایی از آسیا کشت می‌شود (۱۴). در ایران نیز کاهو در بسیاری از مناطق تولید می‌گردد و درصدی از این تولید نیز به کشورهای حوضه خلیج فارس صادر می‌شود (۱). به علت سطح زیاد برگ‌های کاهو و زیاد بودن تبخیر آب، در صورت عدم وجود پوشش

کاهو یک سبزی باستانی می‌باشد که از ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد در حوضه مدیترانه کشت می‌شده است. کاهو ملکه گیاهان سالادی است که نام آن در بیشتر مناطق دنیا با سالاد همراه می‌باشد (۱۴). این گیاه سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری برای سلامتی انسان است همچنین به علت دارا بودن سلولز زیاد هضم غذاها را راحت می‌کند (۱).

۱- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استادیار گروه علوم باگبانی و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
Email:hassanpurm@yahoo.com *- نویسنده مسئول:

2- Lactucin
3- Lactucopicrin

سوراخ شده و سوراخ نشده همراه با سرد کردن به وسیله خلاء و اتمسفر تعديل یافته با میزان ۵ درصد اکسیژن و صفر Iceberg درصد دی اکسید کربن را بر روی کاهوی رقم ۴۰ میکرون مورد آزمایش قرار داده و نشان دادند پوشش ۴۰ میکرون پلی پروپیلن سوراخ نشده بدون اتمسفر تعديل یافته و همچنین پوشش ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته بهترین نتیجه را در حفظ کیفیت ظاهری^۴ داشته است. همچنین سرد کردن با خلاء سبب کاهش صورتی شدن رگبرگ کاهو در دوره انبار داری^۵ شده است. رینالدی و بندیتی^(۱۳) اثر پوشش پلی اتیلن با ضخامت ۷۰ میکرون و دمای ۱۰ درجه سانتی گراد را بر روی کلم (Brassica oleracea var. capitata) مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند که کلم های نگهداری شده در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد بعد از ۵ روز کیفیت و بازارپسندی خود را از دست دادند این در حالی بود که کلم های نگهداری شده در دمای یک درجه سانتی گراد تا پایان دوره آزمایش^(۲۰) ۲۰ روز کیفیت خود را حفظ کردند. در طول این مدت میزان ویتامین ث و اسیدیته به میزان جزئی کاهش نشان دادند و میزان pH نیز افزایش و سپس کاهش داشت. صورتی و همکاران^(۱۱) دو شرایط اتمسفری متفاوت را ۳ درصد اکسیژن، ۴ درصد دی اکسید کربن و ۵ درصد اکسیژن، ۵ درصد دی اکسید کربن) در مدت ۵ روز و در دمای ۵ درجه سانتی گراد بر روی برش های کلم سبز (Brassica oleracea var. acephala) اعمال کردند. نتایج نشان داد که ۳ درصد اکسیژن، ۴ درصد دی اکسید کربن بهترین نتیجه را نسبت به وضعیت دیگر و تیمار شاهد داشت. علاوه بر این میزان ویتامین ث، میزان کلروفیل و اسیدیته قبل تیتراسیون کاهش پیدا کرد ولی میزان این کاهش در تیمار ۳ درصد اکسیژن و ۴ درصد دی اکسید کربن بسیار کمتر از تیمار شاهد بود. بررسی های فوق نشان می دهد

4- Visual quality
5- Shelf-life period

مناسب و مجاورت با سایر محصولات باگی، به سرعت، پلاسیده، زرد و پیر شده، کیفیت و بازارپسندی خود را ز دست می دهد^(۱۰). کم کردن سریع دما باعث کاهش فعالیت فیزیولوژیکی و کاهش تبخیر آب در کاهو می شود^(۱۶). سرد کردن سریع مرکز کاهو، به دلیل وجود برگ های متراکم، با روش های معمولی مشکل است به همین دلیل استفاده از روش سرد کردن با خلاء^۱ توصیه شده است^(۱۲، ۱۷). هم چنین با استفاده از سیستم بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته^۲ می توان پیری را به تأخیر انداخت و عمر انباری آن را افزایش داد^(۱۶، ۱۸). با استفاده از پوشش های پلی پروپیلن با نفوذ پذیری متوسط این امکان فراهم می شود تا شرایط بهتری را برای نگهداری رطوبت نسبی در اطراف محصول و کنترل گازها ایجاد نماییم^(۴، ۳، ۲). کنتول و همکارانش^(۶) در پژوهش انجام شده روی نگهداری کیفیت پس از برداشت کاهو نشان دادند که در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵ درصد، عمر انباری کاهو، بدون استفاده از پوشش ۲۱ روز خواهد بود، در حالی که این مدت در دمای ۵ درجه سانتی گراد به ۱۴ روز تقلیل می یابد. هم چنین اکسیژن کم، میزان تنفس و اثرات اتیلن بر روی محصول را کاهش می دهد به طوری که استفاده از سیستم بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته با ۱ تا ۳ درصد اکسیژن و کمتر از ۵ درصد دی اکسید کربن را برای کاهش تنفس و جلوگیری از تولید اتیلن موثر دانسته اند. این پژوهشگران ناهنجاری فیزیولوژیکی صورتی شدن رگبرگ^۳ را نیز در کاهو مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که این ناهنجاری در اثر نگهداری طولانی مدت و بعد از بلوغ ایجاد می گردد. البته نگهداری در دمای معمولی این ناهنجاری را تشدید می کند. مارتینز و آرتز^(۱۰) اثرات پوشش های پلی پروپیلن با ضخامت های ۳۰ و ۴۰ میکرون به صورت

1- Vacuum cooling
2- Modified Atmosphere Packaging
3- pink rib

پوشش پلیپروپیلن ۳۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۱°C، پوشش پلیپروپیلن ۳۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۴°C، پوشش پلیپروپیلن ۳۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۱°C، پوشش پلیپروپیلن ۳۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۴°C، پوشش پلیپروپیلن ۴۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۱°C، پوشش پلیپروپیلن ۴۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۴°C، پوشش پلیپروپیلن ۴۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۱°C، پوشش پلیپروپیلن ۴۰ میکرون + اتمسفر تعدلیل یافته غیر فعال + ۴°C. نمونه‌ها به مدت ۴ هفته در سردخانه قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در ابتدای ورود به سردخانه و در پایان هر هفته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های مورد بررسی بعد از خروج از سردخانه به آزمایشگاه منتقل شده و پس از توزین، درصد کاهش وزن، درجه صورتی شدن رگبرگ‌ها (به روش ارزش گزاری صفر تا ۵، صفر = کمترین مقدار و ۵ = بیشترین مقدار) و میزان کلروفیل (با استفاده از استون ۸۰٪ استخراج و در نهایت میزان جذب نور توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل UV/Vis-JENWAY 6405 ساخت انگلستان) قرائت و کلروفیل کل محاسبه گردید. سپس مقداری از هر نمونه به صورت یکنواخت برداشته شده و بعد از تهیه پودر خشک و خاکستر، درصد رطوبت، درصد ماده خشک و غلظت عنصر کلسیم (با استفاده از عصاره اسیدی و شعله سنجی نوری با دستگاه فلیم فوتومتر مدل 310C Teif Azmoon Pars ساخت ایران) اندازه گیری و محاسبه شد. میزان ویتامین ث نیز به روش تیتراسیون و با استفاده از ماده دی کلروفنل ایندو فنل اندازه گیری و محاسبه گردید(۲). داده‌ها، جهت مقایسه میانگین، در محیط SAS و آنالیز آماری به روش آزمون Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتایج به دست آمده، میانگین‌هایی که دارای حروف مشابه بودند از نظر آزمون Tukey با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند.

که با استفاده از پوشش‌های پلیمری، کاهش دما و اتمسفر تعدلیل یافته می‌توان پیری را در سبزیجات به تأخیر انداخت، عمر انباری آنها را افزایش داد و هم‌چنین از افت شدید میزان املاح و ویتامین‌ها در آنها جلوگیری کرد. با توجه به اینکه میزان ضایعات کاهودر کشور در حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده است(۹)، در این پژوهش سعی شده اثرات سرد کردن اولیه، اتمسفر تعدلیل یافته، دمای انبار و پوشش‌های پلیپروپیلن با ضخامت‌های مختلف بر روی ماندگاری دو رقم کاهو مورد ارزیابی قرار گیرد.


مواد و روش‌ها

در این پژوهش که در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۵ در آزمایشگاه گروه علوم باگبانی دانشکده کشاورزی کرج و آزمایشگاه گروه علوم باگبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت، بذور دورقم کاهو (Cos) یا Romain Crispheadhead در شهریور ماه و در شرایط یکسان کشت گردید و در آبان ماه محصول برداشت شده و به آزمایشگاه منتقل گردید. آزمایش شامل ۱۰ تیمار، برای هر رقم کاهو، و سه تکرار بود که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. هر واحد آزمایشی نیز شامل ۹ عدد کاهو بود. به غیر از تیمار شاهد بقیه نمونه‌ها تحت تیمار سرد کردن اولیه با خلاء قرار گرفت، نیمی از نمونه‌ها در پوشش پلیپروپیلن با ضخامت ۳۰ میکرون و نیمی دیگر در همین نوع پوشش با ضخامت ۴۰ میکرون قرار داده شد. نیمی از هر دو نمونه پوشش، به وسیله روش بسته‌بندی با اتمسفر تعدلیل یافته فعال با ۳ درصد اکسیژن و ۱ درصد دی اکسید کربن، بسته‌بندی شد (با دستگاه بسته‌بندی با اتمسفر تعدلیل یافته (مدل A ۲۰۰ ساخت شرکت Henkelman هلند) و نیمه دیگر بسته‌ها نیز با اتمسفر تعدلیل یافته غیر بسته‌بندی گردید (۱۰). تیمارهای اعمال شده عبارتند از: تیمار شاهد + ۱°C، تیمار شاهد + ۴°C.


نتایج و بحث

درصد کاهش وزن

بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها، در اندازه‌گیری درصد کاهش وزن نشان داد که اثر رقم کاهو بر درصد کاهش وزن، در اثر انبارداری، در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪ به وجود آمده است. بیشترین کاهش وزن در تیمار شاهد، در هفته چهارم مشاهده شد، به طوری که در انتهای هفته چهارم کاهوها حدود ۴ درصد کاهش وزن پیدا کردند. تیمارهای پوششی اعمال شده همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال یا غیر فعال، کاهش وزن کاهوها را در حد ۱ درصد کاهش وزن بعد از سرد کردن اولیه، ثابت نگه داشتند (شکل ۲). تیمارهای پوششی همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال یا غیر فعال، میزان کاهش وزن را در حد اقل میزان نگه داشتند و با هم تفاوت معنی داری نشان ندادند. چنین به نظر می‌رسد که استفاده از پوشش با نفوذ پذیری متوسط به خوبی می‌تواند کاهش وزن را کنترل کرده و مانع از کم شدن وزن کاهو شود.



شکل (۱) اثر رقم بر درصد کاهش وزن کاهو




شکل (۲) اثر متقابل زمان نگهداری × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر درصد کاهش وزن کاهو

= شاهد، PP.30 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، PP.40 = map.+ PP. 30 و map.+ PP. 40 = پوشش پلی-پروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون + بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال، W0 = زمان ورود کاهوهای به انبار، W1 تا W4 = انتهای هفته اول تا انتهای هفته چهارم

میزان کلروفیل

بررسی نتایج حاصل از اندازه‌گیری کلروفیل نشان می‌دهد که اثر متقابل دمای نگهداری در تیمارهای پوششی و اتمسفری مختلف در رقم بر میزان کلروفیل در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شده است. بر اساس مقایسه میانگین‌ها، میزان کلروفیل رقم Cos نفاوت معنی داری با رقم Crisphead نشان داد به طوری که میزان کلروفیل رقم Cos در سطح بالاتری قرار داشت. تیمار پوششی ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال در دمای ۱°C باعث حفظ بهینه کلروفیل در نمونه‌ها شدند به طوری که میزان کلروفیل در این تیمارها نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی دار پیدا کرد. در تیمار شاهد، ۹٪ کاهش در میزان کلروفیل نسبت به سایر تیمارها دیده شد (شکل ۳).



شکل (۳) اثر متقابل دمای سردخانه × رقم × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر میزان کلروفیل کاهو

- شاهد، PP.30 و PP.40 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، map.+ PP. 30 و map.+ PP. 40 = پوشش پلی-پروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون+ بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال


تیمار پوششی ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال بود که میزان کاهش کلروفیل نمونه‌ها در آن ۹/۶۴٪ بوده است. میزان کلروفیل نمونه‌های رقم Crisphead نیز، در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری تفاوت معنی داری با هم نداشتند (شکل ۴).

درصد رطوبت

بررسی نتایج حاصل از تجزیه آماری اثرات متقابل زمان نگهداری در تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده

هم‌چنین اثر متقابل زمان نگهداری در رقم در تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده، بر میزان کلروفیل، تفاوت معنی داری را در سطح احتمال ۱٪ نشان داد. شکل ۴ نشان می‌دهد که در طی مدت ۴ هفته نگهداری کاهوها، میزان کلروفیل رقم Cos در تمام تیمارها به غیر از تیمار شاهد، کاهش جزئی پیدا کرده و از ۵۶۵/۱۲۵ میلی گرم به حدود ۵۶۵/۶۳۷ میلی گرم رسید. در تیمار شاهد میزان کاهش کلروفیل معنی دار بود به طوری که این میزان ۱۳/۴۴٪ رسید. می‌توان گفت بهترین تیمار در رقم Cos،

نشان می دهد که تیمارهای پوششی و اتمسفری در طول زمان، در میزان رطوبت کاهو ها مؤثر بوده اند.




شکل (۴) اثر متقابل زمان نگهداری × رقم × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر میزان کلروفیل کاهو = شاهد، PP.30 و PP.40 = پوشش پلی پروپیلن با ضخامت های ۳۰ و ۴۰ میکرون، map. 30 و map.+ PP. 40 = پوشش پلی - پروپیلن با ضخامت های ۳۰ و ۴۰ میکرون + بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال، W0 = زمان ورود کاهو ها به انبار، W1 تا W4 = انتهای هفته اول تا انتهای هفته چهارم

چروکیدگی را کاهش می دهد (۱۰). در این پژوهش نیز میزان رطوبت بالای سردخانه و پوشش های به کار برده شده میزان تبخیر و تعرق در نمونه ها را به حد اقل رسانده و باعث حفظ رطوبت کاهو ها تا پایان دوره انبار داری گردیده است.


درصد ماده خشک

بررسی نتایج نشان می دهد اثر متقابل زمان نگهداری در تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده در درصد ماده خشک در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شده است. تیمار شاهد به دلیل کاهش رطوبت، میزان ماده خشک بیشتری را نشان داد و نتایج حاصل از تجزیه واریانس آن اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان داده است. نمونه های دارای پوشش و تیمارهای اتمسفری اختلاف معنی داری را نسبت به همدیگر و نسبت به زمان انبارداری نشان ندادند(شکل ۶).

به طوری که بین تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪ به وجود آمده است. همانطور که در (شکل ۵) دیده می شود در تیمار شاهد رطوبت نمونه ها در طی ۴ هفته کاهش معنی دار پیدا کرد و از ۹۶٪ در شروع آزمایش به ۹۱٪ در انتهای هفته چهارم رسید ولی نمونه هایی که دارای پوشش بودند (با اتمسفر تعديل یافته فعال یا غیر فعال) تا انتهای زمان انبار داری نسبت به زمان شروع آزمایش، تفاوت معنی داری پیدا نکردند (شکل ۵). می توان گفت استفاده از پوشش های پلاستیکی برای بسته بندی میوه ها و سبزی ها با جلوگیری از حرکت هوا در اطراف محصول موجب حفظ رطوبت در محیط بسته شده و از خشک شدن هوا اطراف میوه و افزایش شدت تبخیر و تعرق و در نهایت کاهش رطوبت محصول جلوگیری می کند. MAP یک اتمسفر اشباع یا نزدیک به اشباع در اطراف محصول ایجاد می کند که از دست دادن آب و



شکل (۵) اثر متقابل زمان نگهداری × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر درصد رطوبت کاهو
= شاهد، PP.30 و PP.40 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، map.+ PP.30 و map.+ PP.40 = پوشش پلی-
پروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون+بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال، W0 = زمان ورود کاهوهای به انبار، W1 تا W4 = انتهای
هفته اول تا انتهای هفته چهارم



شکل (۶) اثر متقابل زمان نگهداری × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر درصد ماده خشک کاهو
= شاهد، PP.30 و PP.40 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، map.+ PP.30 و map.+ PP.40 = پوشش پلی-
پروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون+بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال، W0 = زمان ورود کاهوهای به انبار، W1 تا W4 = انتهای
هفته اول تا انتهای هفته چهارم


شکل ۷، در رقم \cos اثر زمان و تیمارهای پوششی و اتمسفری بر روی عارضه صورتی شدن رگبرگ معنی دار نبود و هیچ ناهنجاری در طی انبار مانی مشاهده نشد. در رقم Crisphead تا انتهای هفته اول عارضه قابل توجهی دیده نشد. بیشترین مقدار عارضه صورتی شدن رگبرگ در رقم

صورتی شدن رگبرگ


داده های جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که اثر متقابل زمان نگهداری در تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده در رقم بر روی ایجاد عارضه صورتی شدن رگبرگ ها در سطح احتمال ۵٪ معنی دار شده است. مطابق

عارضه حساس تر از رقم Cos باشد. می‌توان گفت دمای پایین سردخانه همراه با کاهش میزان اکسیژن در اتمسفر تعديل یافته میزان صورتی شدن رگبرگ‌ها را کاهش داده است.

Crisphead، در هفته سوم و چهارم، در تیمار شاهد و کمترین مقدار صورتی شدن رگبرگ‌ها در تیمار پوششی ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته غیرفعال دیده (شکل ۷). به نظر می‌رسد که رقم Crisphead نسبت به این



شکل (۷) اثر متقابل زمان نگهداری × رقم × تیمارهای پوششی و اتمسفری، در ایجاد عارضه صورتی شدن رگبرگ در کاهو
= شاهد، ۳۰ و ۴۰ = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، + = map.+ PP. 30 و map.+ PP. 40 = پوشش پلی-
پروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون + بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال، W0 = زمان ورود کاهوهای به انبار، W1 تا W4 = انتهای هفته اول تا انتهای هفته چهارم



شکل (۸) اثر متقابل زمان نگهداری × رقم بر میزان ویتامین ث کاهو
= زمان ورود کاهوهای به انبار، W1 تا W4 = انتهای هفته اول تا انتهای هفته چهارم


هم چنین بررسی نتایج از همین جدول نشان می‌دهد که اثر متقابل تیمارهای پوششی و اتمسفری در رقم نیز بر میزان ویتامین ث در سطح احتمال ۵٪ معنی دار شده است. بر اساس (شکل ۹) تیمارهای پوششی همراه با اتمسفر تعديل یافته به خوبی توانستند کاهش میزان ویتامین ث در کاهو را کنترل کنند به طوری که در هر دو رقم، نتایج به دست

میزان ویتامین ث

بر اساس جدول مقایسه میانگین داده‌ها اثر متقابل زمان نگهداری در رقم بر میزان ویتامین ث کاهو در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شده است. میزان ویتامین ث، در هر دو رقم، از زمان ورود به سردخانه تا انتهای هفته دوم کاهش معنی دار پیدا کرد ولی در دو هفته بعدی، افزایش وسیع کاهش جزئی داشت و تقریباً دریک میزان حفظ شد (ثابت ماند). مطابق شکل ۸ میزان ویتامین ث در رقم Cos از ۷/۵۰۶ میلی‌گرم در شروع زمان انبار داری به ۴/۹۰۶ میلی‌گرم در انتهای هفته دوم رسید و تقریباً ثابت ماند. در رقم Crisphead افت میزان ویتامین ث کمتر بود و از ۶/۲ میلی‌گرم در زمان ورود به سردخانه به ۴/۹ میلی‌گرم در انتهای دوره انبار داری رسید (شکل ۸).


تعویق می‌اندازد. در نتیجه تولید رادیکال‌های آزاد و تجزیه ویتامین ث را که برای جلوگیری از فعالیت این مواد صورت می‌گیرد، کنترل می‌کند.

آمده از این تیمارها با تیمار شاهد، اختلاف معنی دار پیدا کرد. به نظر می‌رسد اتمسفر تعديل یافته با کاهش میزان اکسیژن و افزایش دی‌اکسید کربن میزان تنفس و فعالیت‌های بیولوژیکی را کاهش داده و روند پیری را به



شکل (۹)- اثر متقابل رقم × تیمارهای مختلف، بر میزان ویتامین ث کاهو = شاهد، PP.30 و PP.40 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون، map.+ PP.30 و map.+ PP.40 = پوشش پلیپروپیلن با ضخامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون+ بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال

در رقم Cos زمان انبار داری تا هفته سوم تفاوت معنی داری در میزان کلسیم ایجاد نکرد و فقط در پایان هفته چهارم میزان کلسیم کاهش معنی داری پیدا کرد به طوری که میزان آن از ۶۴/۵۸ میلی گرم به ۵۲/۴۱۸ میلی گرم در پایان هفته چهارم رسید. در رقم Crisphead میزان کاهش کلسیم در طول مدت انبار داری تفاوت جزئی پیدا کرد که معنی دار نبود (شکل ۱۱).




شکل (۱۱)- اثر متقابل زمان نگهداری × رقم بر میزان کلسیم کاهو = زمان ورود کاهوها به انبار، W1 تا W4 = انتهای هفته اول تا انتهای هفته چهارم

در مقایسه اثر تیمارهای پوششی مختلف همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال یا غیر فعال، مشاهده می‌شود که در رقم Cos، تیمارهای پوششی و اتمسفری، تفاوت معنی داری با

میزان کلسیم

داده‌ها نشان می‌دهند که اثر متقابل دمای سردخانه در رقم، زمان نگهداری در رقم هم چنین تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده در رقم بر میزان کلسیم نمونه‌ها در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شده است. مشاهده می‌شود که میزان کلسیم در رقم Cos بیشتر از رقم Crisphead بود. دمای ۱°C در رقم Cos باعث حفظ بهتر کلسیم نسبت به دمای ۴°C گردید ولی در رقم Crisphead تفاوت معنی داری بین دو دما مشاهده نشد (شکل ۱۰).




شکل (۱۰) اثر متقابل دمای سردخانه × رقم بر میزان کلسیم کاهو.

بررسی نتایج حاصل نشان داد که اثر زمان انبار داری بر روی میزان کلسیم کاهو در سطح احتمال ۱٪ معنی دار بود.

اختلاف معنی دار نیست. در رقم Crisphead تیمارها تفاوت معنی داری با تیمار شاهد پیدا نکردند و در میزان کلسیم تغییر قابل توجهی دیده نشد (شکل ۱۲).

تیمار شاهد نداشتند و بهترین نتیجه در تیمار پوششی ۴۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال و غیر فعال بدست آمد. تیمار پوششی ۳۰ میکرون دارای اثر کمتری در حفظ میزان کلسیم بود ولی تجزیه آماری نشان می دهد که این



شکل (۱۲)- اثر متقابل رقم × تیمارهای پوششی و اتمسفری، بر میزان کلسیم کاهو شاهد، ۳۰ و PP.40 و ۴۰ میکرون، ۳۰ و ۴۰ میکرون+ map.+ PP. ۳۰ و ۴۰ = پوشش پلی-پروپیلن با خصامت‌های ۳۰ و ۴۰ میکرون+ بسته بندی با اتمسفر تعديل یافته فعال

میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال میزان زردی زیاد شده واستفاده از تیمارهای پوششی ۳۰ میکرون برای نگهداری طولانی مدت، مناسب تر تشخیص داده شد. این نتیجه با نتایج مورتی و همکارانش (۱۱) هماهنگی دارد. این محققین نتیجه گیری نمودند در کلم‌هایی که تحت تاثیر اتمسفر تعديل یافته فعال قرار گرفته‌اند، اگرچه میزان کلروفیل کاهش داشته است ولی این میزان ۴۵٪ کمتر از تیمار شاهد می‌باشد. استفاده از تیمارهای پوششی همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال یا غیر فعال به خوبی توانسته است ایجاد رنگ صورتی را در رگبرگ رقم Cos کنترل کند و مانع ایجاد رنگ صورتی در رگبرگ‌ها شود ولی در رقم افزایش این عارضه مشهود بود و پوشش ۳۰ میکرون بدون اتمسفر تعديل یافته تا حدودی بروز این عارضه را کاهش داده است. سینگ و همکارانش (۱۵) نشان دادند استفاده از اتمسفر کنترل شده با ۲/۵ درصد اکسیژن و ۲/۵ درصد دی‌اکسید کربن و دمای پایین می‌تواند صورتی شدن رگبرگ و زردی برگ‌ها را در کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر نشان داد که تیمارهای پوششی همراه با اتمسفر تعديل یافته به صورت فعال یا غیر فعال به خوبی توانسته است مانع کاهش وزن (به خصوص در رقم cos) و پلاسیدگی برگ‌های کاهو شده و درصد رطوبت کاهوها را به خوبی حفظ کنند. مارتیز و همکارانش (۱۰) نیز در آزمایشی بر روی پوشش‌های پلی‌پروپیلن و اتمسفر تعديل یافته ثابت کردند که استفاده از پوشش‌های پلی‌پروپیلن ۴۰ میکرون بدون اتمسفر تعديل یافته فعال و ۳۰ میکرون همراه با ۵ درصد اکسیژن و صفر درصد دی‌اکسید کربن می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش وزن و پژمردگی کاهو شود. هم‌چنین افزایش زردی و کاهش کلروفیل برگ‌ها نیز به وسیله استفاده از پوشش و اتمسفر تعديل یافته فعال کنترل شده و با تیمار شاهد تفاوت معنی دار پیدا کرده است. پژوهش حاضر نشان داد که بهترین مدت زمان نگهداری کاهو در سردخانه برای جلوگیری از زردی برگ‌ها، ۲۱ روز (۳ هفته) می‌باشد. در هفته آخر در تیمار پوششی ۴۰

رقم Crisphead Cos قابلیت نگهداری بهتری نسبت به رقم ۴۰ میکرون باشد. هم‌چنین مدت زمان سه هفته، در دمای ۱ درجه سانتی گراد و تیمارهای پوششی پلیپروپیلن ۴۰ میکرون با اتمسفر تعديل یافته غیرفعال و پلیپروپیلن ۳۰ میکرون همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال بهترین نتایج را در حفظ خصوصیات کمی و کیفی کاهو دارند.

سپاسگزاری

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج شده و با کمک مالی دانشگاه گیلان انجام شده است بدین وسیله از مساعدت دانشگاه گیلان سپاسگزاری می‌گردد.

میزان ویتامین ث تا انتهای هفته دوم کاهش یافت و بعد از آن تقریباً ثابت ماند. تیمارهای پوششی و اتمسفری اعمال شده نسبت به تیمار شاهد باعث حفظ بهتر میزان ویتامین ث شده است. که این نتیجه با آزمایشات رینالدی هماهنگی دارد (۱۲). در رقم Crisphead Cos دمای ۱ درجه سانتی گراد و تیمار ۴۰ میکرون همراه یا بدون اتمسفر تعديل یافته فعال باعث حفظ بهتر میزان کلسیم شده است. آدامیکی (۵) نشان داد که دمای ۱ درجه سانتی گراد همراه با اتمسفر تعديل یافته فعال (۱ درصد اکسیژن و ۳ درصد دی‌اکسید کربن) می‌تواند باعث حفظ بهتر میزان ویتامین ث و امللاح نسبت به نمونه‌های موجود در تیمار شاهد شود. با توجه به اطلاعات به دست آمده می‌توان گفت که

منابع

- بی‌نام. ۱۳۸۱. کاهو، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون. چاپ اول، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. شماره ۶۱۱۹.
- پیوست، غ. ۱۳۷۷. سبزیکاری. انتشارات چاپ و نشر ابریشم رشت. چاپ اول. ۳۶۲ ص.
- حسینی، ز. ۱۳۷۸. روش‌های متداول در تجزیه مواد غذایی. انتشارات دانشگاه شیراز. ۲۱۰ ص.
- راحمی، م.. ۱۳۸۲. فیزیولوژی پس از برداشت (ترجمه). مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه، سبزی‌ها و گیاهان زینتی. انتشارات دانشگاه شیراز. ۴۳۷ ص.
- فرجی هارمی، ر. ۱۳۷۴. میوه و سبزی و تکنولوژی نگهداری و تبدیل آن‌ها. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. ۲۶۳ ص.
5. Adamicki, F. 1989 Przechowywanie warzyw w kontrolowanej atmosferze. Biuletyn Warzywniczy Supplement I, 107-113.
6. Cantwell, M. and T. Suslow. 2002. Lettuce, Romaine or Cos. Recommendations for maintaining postharvest quality. Department of Vegetable Crops, University of California, Davis, CA 95616-8683.
7. Gorini, F., G. Borinelli and L. Uncini. 1974. Some trials of salad precooling. Acta Hort. 38: 465-490.
8. Hemphill, D. 2004. Lettuce. Commercial Vegetable Production Guides. Oregon State University Publishing. 230P.
9. Jowkar, M. M., H. Mohammadpour, Z. Farshadfar and A. Jowkar 2005. Alook at postharvest in Iran. Acta Hort 682:2177-2182.
10. Martinez, J.A., and F. Artes. 1999. Effect of packaging treatments and vacuum-cooling on quality of winter harvested Iceberg lettuce. Food Res. Inter.. 32:621-627.
11. Moretti, C. L., A. L Araùjo and L.M. Mattos. 2003. Evaluation of different oxygen, carbon dioxide and nitrogen combinations employed to extend the shelf life of fresh cut collard greens. Hortic. Bras. Vol.21, No.4.
12. Rennie, T. J., C. Vigneault, G. S. V. Raghavan, J. R. Dell. 2001. Effects of pressure reduction rate on vacuum cooled lettuce quality during storage. Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Macdonald Compus, McGill University. 21 111 Lakeshore Rd., Annede-Bellevue, QC, Canada H9X 3V9.
13. Rinaldi, M. M. and B.C. Benedetti. 2004. Effects of low density polyethylene packaging and

- temperature in the conservation of fresh cut cabbage. Eng.Agric., 24:78-83
14. Ryder, E. J. 1929. Lettuce Endive and Chicory. CABI publishing. 408 P.
15. Singh, B., C.C. Yang, D.K. Salunkhe and A.R. Rahman. 1972. Controlled atmosphere storage of lettuce. 1. Effects on quality and the respirationrate of lettuce heads. Journal of Food Sci. 37, 48-51
16. Tan,S.c. 2005. Postharvest handling of cucumber, lettuce and tomato. Department of Agriculture, western Australia, 41-96.
17. Turk, R. and E. Celik. 1993. The effect of vacuum precooling on the half cooling period and quality characteristic of Iceberg lettuce. Acta Hort. 343: 321-324.

Archive of SID

Effects of temperature, thickness of polypropylene shrink wrapping and modified atmosphere packaging on storage longevity of lettuce (*Lactuca sativa L.*)

N. Fakharian – M. Hassanpour Asil* – H. Samizadeh Lahiji¹

Abstract

Leafy vegetables such as lettuce are more susceptible to post harvest losses, thus application desirable treatments can be recommendable. Generally, type of packaging, such as modified atmosphere packaging (MAP) and wrapping can considerably suppress post harvest loss of horticultural products. In this study, the effects of polypropylene film (thickness 30 and 40 micron) wrapping and modified atmosphere packaging on two different types of lettuce 'Cos' and 'Crisphead' that stored in 1 and 4°C for 4 weeks were investigated. The results showed that type 'Cos' had better storability than 'Crisphead'. polypropylene film applied in this experiment significantly increase storage life of lettuce as compared with untreated lettuce. Overall, lettuce that packed into passive MAP with 40 micron polypropylene thickness and active MAP with 30 micron, in 1°C, considered as the best treatment for preserving qualitative and quantitative characteristics.

Key words: Lettuce, modified atmosphere packaging, polypropylene and shrink wrapping

* - Corresponding author Email: hassanpurn@yahoo.com
1 - Contribution from College of Agriculture Science, University of Guilan, Rasht