

بررسی ارتباط بین میزان ترکیبات فلی و رنگ پوست در ۳ رقم سیب قرمز در ژاپن

داود بخشی^۱ - سمانه فتح الله^۲ - اسماعیل آراکاوا^۳

تاریخ دریافت: ۸۹/۳/۳۱

تاریخ پذیرش: ۸۹/۱۰/۷

چکیده

این مطالعه در سال ۲۰۰۶ برای بررسی ارتباط بین ترکیبات فلی با شاخص‌های رنگ پوست سه رقم سیب فوجی، جاناتان و جان‌گلد در ژاپن انجام شد. شاخص روشی (L*) با کاهش رنگ قرمز در پوست جاناتان افزایش یافت. در جان‌گلد کروم (اشباع رنگ) با افزایش رنگ قرمز، افزایش نشان داد اما در فوجی تفاوت چندانی بین این پارامترها و تغییر رنگ ظاهری پوست مشاهده نشد. در هر سه رقم، آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها با افزایش رنگ قرمز (مقدار L* و هیو کاہشی) افزایش یافتند. ارتباطی بین میزان مواد فلی گوشت با رنگ پوست میوه‌های مورد مطالعه مشاهده نشد. مقدار ترکیبات فلی در گوشت فوجی بیشتر از جاناتان و جان‌گلد بود. همبستگی مثبت معنی‌داری بین آنتوسیانین و کوئرستین ۳-گالاكتوزید در هر ۳ رقم مشاهده شد. در جاناتان و جان‌گلد مقدار کروم در میوه‌هایی با آنتوسیانین بیشتر، که حاوی کوئرستین‌های زیادتری نیز بودند، بیشتر بود اما این ارتباط در فوجی مشاهده نشد. پوست سیب جان‌گلد فلاونوئید و کلروژنیک اسید بیشتری نسبت به پوست جاناتان و فوجی داشت. ارتباط معنی‌داری بین رنگ پوست و میزان فلی گوشت در میوه‌های مختلف یک رقم با رنگ‌های متفاوت، مشاهده نشد. میزان فل کل گوشت فوجی از دو رقم دیگر بیشتر بود. آنالیز ضربی همبستگی بین رنگ خارجی پوست و میزان فل نشان داد که رنگ قرمز پوست اساساً به خاطر آنتوسیانین و کوئرستین‌هاست.

واژه‌های کلیدی: سیب، رنگ پوست، ترکیبات فلی، آنتوسیانین، کوئرستین

۱ مقدمه

می‌کنند. کوئرستین‌ها، فراوان‌ترین ترکیبات فلی در پوست سیب می‌باشند (۱). فلاونوئیدها و اسیدهای فلی، از گروه‌های مهم متابولیت‌های ثانویه گیاهی هستند که در مطالعات آزمایشگاهی (درون شیشه‌ای)، دارای فعالیت آنتی‌اسیدانی می‌باشند (۲). بنابراین تعیین مقدار فلاونوئیدها و اسیدهای فلی که در رنگ میوه و در سلامتی بشر نقش دارند، بسیار پر اهمیت است. اما روش‌های شیمیابی معمول برای تعیین مقدار مواد فلی میوه، بسیار هزینه‌بردار و زمان‌بر هستند. بعلاوه، برخی از این ترکیبات رنگیزهای، بسیار نایاب‌ارند و ممکن است در حین استخراج یا پس از آن دچار تغییر شوند. بنابراین یافتن روش‌های بصری و مقایسه‌ای، برای تخمین مقادیر کلی بخاطر سرعت زیاد و هزینه کم، بسیار مطلوب و موثر خواهد بود (۸). در حال حاضر، اطلاعاتی که رابطه بین رنگ پوست و مقدار یا نسبت مواد فلی را بیان کند، وجود ندارد. علاوه بر آن، میزان ترکیبات فلی، گوشت میوه به عنوان بخش مصرفی اصلی میوه محصولات تازه‌خوری یا فرآوری شده، بررسی نشده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین رنگ پوست و میزان مواد فلی پوست و گوشت سه رقم سیب قرمز بود.

فلاؤنوئیدها و اسیدهای فلی از متابولیت‌های ثانویه‌ی مهم گیاهی هستند که دارای خاصیت آنتی‌اسیدانی می‌باشند. آنتوسیانین‌ها به عنوان گروه بسیار مهمی از فلاونوئیدها عامل ایجاد رنگ قرمز در میوه‌ی سیب هستند. در مطالعات اخیر نشان داده شده است که سیب هایی با رنگ قرمزتر دارای غلظت بیشتری از آنتوسیانین‌ها هستند (۴). جلوه ظاهری میوه یکی از معیارهای درجه‌بندی میوه‌های است. میوه‌هایی با پوست قرمزتر برای مصرف کنندگان جذاب‌تر هستند و عموماً در فروشگاه بیشتر مورد پسند قرار می‌گیرند (۳). رنگ و تغییرات انعکاس طیفی، دو مورد اساسی تتفیکیک میوه در درجه‌بندی تجاری محسوب می‌شوند (۵). در پوست میوه سیب علاوه بر آنتوسیانین‌ها در پوست، کاتچین‌ها (کاتچین و اپی کاتچین)، فلی‌های ساده (اسیدهای فلی)، پروسیانیدین‌ها، دی‌هیدروچالکون‌ها (فلوریدزین‌ها) و کوئرستین‌ها (کوئرستین ۳-گلیکوزیدها) تجمع پیدا

۱- استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باگبانی، دانشکده

کشاورزی، دانشگاه گیلان

(Email:bakhshi-d@guilan.ac.ir)

۲- نویسنده مسئول:

۳- استاد میوه کاری دانشگاه هیروساکی ژاپن

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی

درجه سانتی‌گراد با دور ۱۰۰۰۰ بمدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوز شد و بخش روشنایر عصاره از فیلتر سرسرنگی یکبار مصرف با قطر منافذ ۴/۵ میکرومتر گذارنده شد (۷).

آنالیز ترکیبات فنلی

مقدار و نوع فلاونوئیدها با روش کروماتوگرافی مایع با کارابی بالا (HPLC) دوپمپی (A) و (B) ساخت شرکت SHEISYDO ژاپن مجهر به یک شناساگر دیود در طول موج‌های ۳۵۰، ۲۸۰ و ۵۳۰ نانومتر تعیین گردید. طول ستون ۲۵۰ میلی متر و قطر ۱/۵ میلی متر پرشده با ترکیب C18 با قطر منافذ ۴/۶ میکرومتر با یک پیش‌ستون محافظ ۵۰ میلی متری نیز قبل از ستون اصلی تعییه شده بود. مجموعه ستون‌ها در محفظه گرم‌کن با دمای ۳۰ درجه سلسیوس نگهداری می‌شد. فاز حامل (حلال‌ها) مشکل از (A) فسفوک اسید ۱/۵ درصد در آب که با سرعت ۹۰ میکرولیتر در دقیقه جریان داشت و (B) فسفوک اسید ۱/۵ درصد، فرمیک اسید ۲۰ درصد و استونیتریل ۲۵ درصد در آب با سرعت جریان ۱۰ میکرولیتر در دقیقه بود. نمونه‌ها به میزان ۵ میکرولیتر به دستگاه تزریق شد.

نتایج و بحث

رنگ پوست

در جاناتان L^* (روشنی) میوه‌هایی با پوست قرمزتر کمتر بود. به عبارت دیگر، مقادیر L^* با کاهش رنگ قرمز در پوست سیب‌های جاناتان افزایش نشان داد. در رقم جاناگلد کرومای با افزایش رنگ قرمز، افزایش داشت. اما در فوجی تفاوت مشهودی بین این پارامترها و تغییر رنگ ظاهری پوست با رنگ قرمز وجود نداشت (جدول ۱). اختلاف بین پارامترهای سنجیده شده رنگ نیز در میان میوه‌های سه رقم یکسان نبود. در حالی که هیو، کرومای و L^* سرخ‌ترین میوه جاناتان به ترتیب حدود ۳۰، ۶۰ و ۷۰ درصد بیشتر از سیزترین میوه این رقم بود. این اختلاف در رقم جاناگلد به ترتیب حدود ۴۰، ۲۰ و ۳۰ درصد و در فوجی کمتر از حدود ۱۰ درصد بودند.

میزان فنل پوست

در هر سه رقم، با افزایش رنگ قرمز (مقدار L^* و زاویه هیو کاهشی)، آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها افزایش یافته‌ند. در جاناتان و جاناگلد، با افزایش رنگ قرمز، علاوه بر آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها، کاتچین‌ها و اسیدهای فنلی نیز افزایش داشتند. در حالی که در فوجی، این مواد فنلی در میوه‌هایی با رنگ متفاوت، تفاوتی نشان ندادند (جدول ۲).

در این مطالعه، میوه سه رقم تجاری سیب قرمز در ژاپن شامل فوجی، جاناتان و جاناگلد در زمان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص زمان رسیدگی با توجه به شاخص تعداد روزهای پس از مرحله تمام گل درختان انجام شد. بدین ترتیب که جاناتان در ۲۳ مهر، یعنی ۱۵۵ روز بعد از تمام گل، جاناگلد ۳۰ مهر، ۱۶۲ روز بعد از تمام گل و فوجی در ۱۰ آبان، ۱۷۳ روز بعد از تمام گل، برداشت شدند. برای هر رقم تعداد ۲۰ میوه از بخش‌های مختلف تاج مورد بررسی قرار گرفت.

سنجهش رنگ

میوه‌ها بر اساس رنگ ظاهری قرمزترین بخش پوست (قسمت قرار گرفته در معرض نور)، به ترتیب از ۱ تا ۲۰ درجه کاهش رنگ قرمز مرتب شدند (میوه با حداکثر رنگ قرمز، شماره ۱ و میوه با حداقل رنگ قرمز شماره ۲۰). بعد از این مرتب سازی میوه‌ها، با قرار NIPPON NF-90 (کرمومتر) مدل (DENSHIKU KOGYO CO., LTD b*, L*, a*، L^* سنجیده شد. رنگ سنج داری حسگر چشمی با قطر ۸ میلی متر بود و پیش از سنجش هر رقم با یک صفحه سفید استاندارد کالیبره می‌شد ($Z=93/37$ ، $y=95/22$ ، $X=93/37$). رنگ هر میوه سه بار سنجیده می‌شد و میانگین این سه اندازه‌گیری، برای محاسبه‌ی زاویه رنگ $[tan^{-1}(b^*/a^*)]$ و رنگ $[0.5(a^*2+b^*2)]$ که a^* سرخ افزایشی، b^* سبز افزایشی، $-a^*$ زرد افزایشی و $-b^*$ آبی افزایشی نشان می‌دهند، استفاده شد. مقدار L^* روشی و درخشندگی (۰=سفید) یا تاریکی (۱۰۰=سیاه) رنگ مؤئی و کرومای درخشندگی یا شدت رنگ را شرح می‌دهد (۵).

استخراج ترکیبات فنلی

بعد سنجش رنگ، پوست و گوشتش میوه‌های مذکور جهت آنالیز میزان فنل مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری از پوست و گوشش هر میوه توسط یک لوله‌ی فولادی تیز به قطر ۱۸ میلی متر انجام شد. پس از خارج کردن قطعه مورد نظر توسط این لوله از داخل میوه، پوست با ضخامت تقریبی یک میلی متر و گوشش با همین ضخامت از عمق یک سانتی‌متری جدا و در نیتروژن مایع منجمد شد و تا زمان اندازه‌گیری در فریزر -۸۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. استخراج ترکیبات فنلی با حلالی مشکل از متanol (۸۵ درصد) و استیک اسید (۱۵ درصد) صورت گرفت. پس از افزودن حلال، نمونه‌ها بمدت دو ساعت در ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. سپس در سانتریفیوز (Himac CR 15, HITACHI, Japan) در دمای صفر یخچال دار

جدول ۱- مقادیر هیو، کروم و L^* پوست ۲۰ میوه از سیب‌های ارقام جاناتان، جاناگلد و فوجی

شماره نمونه	کروم (سبزی)						هیو (سبزی)					
	جاناتان	جاناگلد	فوجی	جاناتان	جاناگلد	فوجی	جاناتان	جاناگلد	فوجی	جاناتان	جاناگلد	فوجی
۱	۱۹/۵۶	۲۶/۵۸	۳۳/۳۵	۳۶/۱۵	۵۱/۴۳	۴۳/۰۳	۱۸/۸۹	۲۹/۸۶	۴۰/۶۳	۲۹/۸۶	۱۸/۸۹	۴۳/۰۳
۲	۱۷/۷۳	۲۳/۸۳	۲۲/۲	۲۹/۲۵	۴۴/۴۹	۳۵/۴۶	۲۱/۳۲	۲۹/۵۴	۴۱/۴۷	۲۹/۵۴	۲۱/۳۲	۳۵/۴۶
۳	۱۶/۴۵	۲۳/۱۱	۴۴/۵۳	۲۹/۶۸	۴۵/۳۱	۳۷/۰۳	۲۱/۸۱	۳۰/۴۱	۴۵/۵۲	۳۰/۴۱	۲۱/۸۱	۳۷/۰۳
۴	۱۹/۱۳	۲۴/۶۸	۳۵/۸۵	۳۴/۲۲	۴۸/۸۱	۳۸/۱۵	۱۷/۰۸	۳۴/۰۹	۴۱/۷۲	۳۴/۰۹	۱۷/۰۸	۳۸/۱۵
۵	۲۳/۱۴	۳۶/۷۲	۳۹/۲۴	۴۵/۳۲	۴۷/۴۴	۳۴/۹۷	۲۷/۳۸	۴۷/۳۹	۴۵/۶۹	۴۷/۳۹	۲۷/۳۸	۳۴/۹۷
۶	۱۸/۱۷	۲۹/۱۹	۳۳/۳۸	۳۳/۵۵	۴۵/۹۹	۳۹/۹۸	۱۸/۵۴	۳۸/۰۹	۳۹/۳۹	۳۸/۰۹	۱۸/۵۴	۳۹/۹۸
۷	۲۰/۹۳	۲۸/۰۹	۳۷/۵۸	۳۶/۸۸	۴۵/۶۱	۳۵/۶۳	۲۲/۴۷	۳۸/۸۲	۴۱/۹۵	۳۸/۸۲	۲۲/۴۷	۳۵/۶۳
۸	۲۰/۹۴	۳۰/۴۵	۳۵/۹۲	۳۸/۹۵	۴۷/۴۷	۳۴/۶۲	۲۵/۴۷	۴۰/۰۱	۴۶/۴۷	۴۰/۰۱	۲۵/۴۷	۳۴/۶۲
۹	۲۳/۵۴	۶۴/۴۹	۴۶/۶۹	۴۵/۲۲	۳۷/۶۵	۳۰/۳۱	۲۶/۱۶	۵۱/۸۴	۴۹/۸۵	۵۱/۸۴	۲۶/۱۶	۳۰/۳۱
۱۰	۲۸/۸۱	۵۶/۴۹	۴۷/۵۷	۴۳/۰۷	۳۵/۹۹	۳۲/۲۱	۳۲/۳۱	۵۲/۱۱	۴۱/۵۵	۵۲/۱۱	۳۲/۳۱	۳۲/۲۱
۱۱	۴۱/۴۷	۴۰/۶۱	۴۹/۲۱	۴۶/۲۱	۳۹/۵۲	۳۴/۵۲	۴۹/۰۱	۴۰/۰۱	۴۱/۰۲	۴۰/۰۱	۴۹/۰۱	۳۹/۵۲
۱۲	۲۹/۶۶	۲۴/۵۹	۴۵/۶۳	۵۷/۱۳	۵۰/۵۷	۳۴/۰۹	۳۹/۶۲	۳۱/۶۲	۴۶/۲۸	۳۱/۶۲	۳۹/۶۲	۳۴/۰۹
۱۳	۳۶/۶۴	۲۷/۵۴	۳۴/۴۱	۵۰/۱۰	۵۰/۰۵	۳۸/۱۶	۴۸/۴۱	۳۴/۴۴	۴۱/۷۲	۳۴/۴۴	۴۸/۴۱	۳۸/۱۶
۱۴	۳۶/۷۵	۳۶/۷۵	۳۶/۹۵	۵۰/۷۲	۵۱/۳۷	۳۴/۶۲	۴۲/۴۱	۳۸/۶۲	۴۳/۵۷	۳۸/۶۲	۴۲/۴۱	۳۴/۶۲
۱۵	۳۲/۳۹	۳۲/۳۹	۲۷/۸۳	۴۰/۷۷	۵۵/۲۸	۳۴/۷۳	۳۸/۷۱	۳۵/۲۶	۴۷/۱۷	۳۵/۲۶	۳۸/۷۱	۳۴/۷۳
۱۶	۲۶/۲۱	۳۲/۶۲	۴۸/۷۹	۴۶/۱۵	۴۶/۱۵	۳۴/۹۹	۳۶/۶۵	۴۲/۲۲	۴۷/۶۲	۴۲/۲۲	۴۸/۷۹	۳۴/۹۹
۱۷	۳۳/۳۵	۳۸/۵۳	۴۶/۲۶	۳۰/۶۷	۴۰/۵۴	۳۸/۹۲	۴۱/۰۹	۴۹/۰۹	۴۱/۸۱	۴۹/۰۹	۴۱/۰۹	۳۸/۹۲
۱۸	۳۳/۷۴	۳۶/۳۱	۳۹/۷۴	۵۵/۰۹	۵۵/۰۹	۳۴/۶۸	۴۹/۱۲	۴۳/۹۴	۴۵/۶۲	۴۹/۱۲	۴۳/۹۴	۳۴/۶۸
۱۹	۳۲/۸۹	۳۹/۵۲	۴۲/۶۸	۵۴/۹۲	۴۰/۴۷	۳۷/۴۱	۴۲/۶۹	۴۴/۹۳	۴۷/۷۳	۴۲/۶۹	۴۲/۶۹	۴۴/۹۳
۲۰	۴۲/۶۹	۴۴/۲۹	۴۴/۱۱	۳۷/۴۳	۳۶/۱۶	۳۷/۳۷	۴۶/۶۴	۴۶/۶۴	۴۲/۵۸	۴۶/۶۴	۴۶/۶۴	۳۷/۳۷

حکای از آنست که غلظت آنتوسیانین‌ها در بروز رنگ ظاهری میوه مهم‌تر از کوئرستین‌ها است (جدول ۲). کلروفیل نیز نقش مهمی در رنگ میوه دارد (۶). در طول دوره بلوغ میوه معمولاً غلظت کلروفیل کاهش می‌یابد (۱). بدین ترتیب، افزایش آنتوسیانین آن و کاهش کلروفیل باعث هیو کمتر در میوه‌های قرمزتر نسبت به میوه‌های سبز می‌شود. کاهش هیو در میوه‌های قرمزتر، نشانه کاهش کلروفیل (عامل رنگ سبز) و افزایش آنتوسیانین (عامل رنگ قرمز) است. کروم (اشباع رنگ) در دو رقم جاناتان و جاناگلد در میوه‌های قرمزتر که دارای آنتوسیانین و کوئرستین‌ها بشتر بودند، بالاتر بود. البته این ارتباط در فوجی دیده نشد (جدول ۴). به عبارت دیگر، اختلاف بین قرمزترین و سبزترین میوه‌های فوجی استفاده شده در این مطالعه، معنی دار نبود (جدول ۱). احتمالاً رنگ‌گیری ضعیف رقم فوجی عامل برخی این حالت است. در سه رقم بررسی شده، مقدار ضریب همبستگی بین آنتوسیانین‌ها و دیگر ترکیبات فنلی محاسبه گردید. همبستگی مشت و معنی داری بین آنتوسیانین و کوئرستین مشاهده شد (شکل ۲). در مطالعاتی که توسط محققین دیگر انجام شده، الگوی تجمع آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها در سیب‌های ال استار و جاناگلد از لحاظ کیفی در طول نمو و رسیدگی، شباهت زیادی را نشان داد.


میزان فنل گوشت

میزان فنل گوشت میوه‌های سه رقم مورد مطالعه، تحت تاثیر رنگ خارجی میوه قرار نگرفت. هرچند مقدار کلی مواد فنلی گوشت فوجی بیشتر از جاناتان و جاناگلد بود. همبستگی مشت و معنی داری بین مقدار آنتوسیانین و کوئرستین در هر سه رقم وجود داشت. این نتایج نشان داد که یکی از پیکها (یکی از شکل ۱) که به عنوان یک پروسیانیدین شناسایی شد، همبستگی منفی با آنتوسیانین داشت. هرچند در فوجی این همبستگی معنی دار نبود (جدول ۳).

رنگ پوست میوه ناشی از مقادیر مختلف رنگیزه‌هاست. رنگ زمینه زرد/سبز سبز سبز به دلیل وجود رنگیزه‌های پالاستید کلروفیل II و کارتوئیدها است. کلروفیل‌ها، سبز و کارتوئیدها، زردند. در مقابل رنگ قرمز پوست توسط آنتوسیانین و کوئرستین‌ها ایجاد می‌شود. شدت رنگ قرمز میوه با غلظت آنتوسیانین پوست میوه تعیین می‌شود که البته این رنگ، تحت تاثیر غلظت دیگر رنگیزه‌ها مثل سایر فلاونوئیدها و کارتوئیدها قرار می‌گیرد (۵). نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که آنتوسیانین‌ها همیشه همراه با کوئرستین‌ها هستند. به نظر می‌رسد کوئرستین‌ها نقش مهمی در ظهور رنگ پوست میوه داشته باشند. بطور کلی، نسبت آنتوسیانین به کوئرستین در میوه‌ای با پوست قرمزتر نسبت به میوه‌ای با پوست کمرنگ‌تر، بیشتر می‌باشد. این امر باشند. بطور کلی، نسبت آنتوسیانین به کوئرستین در میوه‌ای با پوست

جدول ۲- میزان ترکیبات فنی (میکروگرم بر گرم وزن تو) گشت سبب‌های ارقام 'جاناتان'، 'جاناگلد' و 'فوجی'

نمونه	کاتچین			اسیدهای فنی			پروسیانیدین‌ها			دی‌هیدروجالکون			'جاناتان، 'جاناگلد' و 'فوجی'			پیوسینیدین‌ها			'جاناتان، 'جاناگلد' و 'فوجی'		
	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'	'جاناتان'	'جاناگلد'	'فوجی'
۱	۱۰/۰	۱۱۴/۱	۵۹/۲	۴/۲	۱۲/۷	۷/۶	۱۲/۵	۱۰/۵	۱۴/۱	۷۳/۴	۸۰/۸	۳۲/۱	۱۰/۱	۱۰/۸	۱۰/۰	۱۱۳/۱	۲۵/۹	۹/۳	۱۲/۴	۱۲/۴	۱
۲	۷۶/۱	۹۴/۱	۶۷/۶	۲/۵	۷/۶	۱۵/۳	۱۳/۱	۹/۵	۱۴/۱	۵۱/۱	۶۸/۵	۲۵/۹	۹/۳	۱۰/۵	۱۰/۰	۱۱۳/۱	۵/۶	۱/۳	۱۲/۴	۱۲/۴	۲
۳	۹۲/۴	۷/۰/۲	۱۱۹/۳	۹/۳	۸/۵	۹/۳	۱۳/۵	۷/۱	۱۹/۱	۵۷/۹	۴۹/۴	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۰/۰	۱۱۳/۱	۵/۳	۱/۳	۱۰/۱	۱۰/۱	۳
۴	۱۱/۰	۷۵/۱/۵	۱۱۳/۲	۴/۲	۷/۶	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۷/۱	۲۰/۵	۷۴/۴	۴۵/۱	۳۳۲/۳	۱۲/۴	۹/۳	۱۳/۹	۱۳/۹	۱/۳	۱/۳	۱۰/۰	۱۰/۰	۴
۵	۱۰/۰	۸۹/۰/۵	۷۰/۷	۸/۵	۱۲/۷	۹/۳	۱۸/۵	۱۸/۱	۱۵/۵	۵۷/۳	۴۸/۷	۲۹/۶	۱۷/۱	۱۷/۱	۱۰/۰	۱۰/۰	۱۱/۱	۱۱/۱	۱۰/۰	۱۰/۰	۵
۶	۹۱/۰/۵	۵۷/۱/۷	۶۵/۱/۱	۸/۵	۹/۳	۵/۹	۱۲/۵	۱۲/۱	۱۸/۱	۵۳/۲	۱۷/۱	۱۲/۹	۱۲/۹	۱۲/۹	۱۰/۰	۱۰/۰	۱۲/۹	۱۲/۹	۱۰/۰	۱۰/۰	۶
۷	۱۱۰/۰/۱	۱۰/۰/۴/۷	۹۱/۰/۷	۸/۸	۶/۸	۱۱/۱	۱۱/۱	۸/۵	۱۹/۵	۸/۵	۱۹/۵	۵/۶	۵/۶	۵/۶	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۷
۸	۱۱۷/۰/۵	۶۶/۰/۶	۱۱۷/۰/۲	۵/۱	۷/۶	۱۲/۵	۱۲/۱	۱۶/۱	۱۴/۱	۷۴/۴	۴۹/۳	۳۳۲/۳	۱۴/۷	۱۰/۰	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۰/۰	۱۰/۰	۱۰/۰	۱۰/۰	۸
۹	۹۹/۰/۸	۹۸/۰/۷	۱۰/۰/۱	۸/۸	۶/۸	۱۲/۷	۱۲/۲	۱۱/۱	۱۷/۱	۱۸/۱	۱۸/۱	۵/۳	۵/۳	۵/۳	۰/۰	۰/۰	۱۷/۸	۱۷/۸	۰/۰	۰/۰	۹
۱۰	۹۱/۰/۵	۸۵/۰/۷	۸۵/۰/۲	۵/۱	۵/۹	۱۱/۹	۱۱/۹	۱۱/۹	۱۱/۹	۱۱/۹	۱۱/۹	۵/۵	۵/۵	۵/۵	۰/۰	۰/۰	۱۳/۲	۱۳/۲	۰/۰	۰/۰	۱۰
۱۱	۲۴/۰/۷	۷۷/۰/۷	۱۱۲/۰/۳	۶/۸	۷/۶	۱۲/۴	۱۲/۵	۱۳/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۶/۵	۶/۵	۶/۵	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۱۱
۱۲	۹۹/۰/۵	۸۳/۰/۱	۵۴/۰/۳	۲/۴	۹/۳	۵/۹	۷/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۲/۵	۵/۳	۵/۳	۵/۳	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۱۲
۱۳	۹۱/۰/۱	۱۰/۰/۰/۳	۱۰/۰/۲	۱۰/۰/۲	۷/۵	۱۵/۳	۱۵/۳	۱۱/۱	۲۱/۱	۲۱/۱	۲۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۰/۰	۰/۰	۱۳/۸	۱۳/۸	۰/۰	۰/۰	۱۳
۱۴	۹۴/۰/۴	۸۲/۰/۰/۵	۷۱/۰/۰/۱	۱۰/۰/۲	۱۲/۷	۹/۳	۱۲/۵	۱۲/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۵/۷	۵/۷	۵/۷	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۱۴
۱۵	۱۰/۰/۲	۹۵/۰/۷	۹۵/۰/۲	۱۱/۰/۳	۱۱/۰/۲	۱۱/۰/۲	۱۱/۰/۲	۱۱/۰/۲	۱۷/۱	۱۷/۱	۱۷/۱	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۱۵
۱۶	۸۵/۰/۴	۹۰/۰/۳	۶۳/۰/۲	۵/۴	۷/۶	۱۵/۳	۱۵/۳	۱۳/۱	۱۸/۱	۱۸/۱	۱۸/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۰/۰	۰/۰	۱۵/۱	۱۵/۱	۰/۰	۰/۰	۱۶
۱۷	۸۷/۰/۵	۶۸/۰/۱	۹۴/۰/۲	۵/۱	۹/۳	۱۲/۵	۱۲/۱	۱۳/۱	۲۱/۱	۲۱/۱	۲۱/۱	۵/۵	۵/۵	۵/۵	۰/۰	۰/۰	۱۳/۹	۱۳/۹	۰/۰	۰/۰	۱۷
۱۸	۸۵/۰/۸	۸۴/۰/۳	۸۷/۰/۵	۵/۱	۱۰/۰/۲	۵/۹	۵/۹	۵/۹	۱/۵/۱	۱/۵/۱	۱/۵/۱	۲۰/۱	۲۰/۱	۲۰/۱	۰/۰	۰/۰	۱۲/۲	۱۲/۲	۰/۰	۰/۰	۱۸
۱۹	۹۳/۰/۹	۷۵/۰/۱	۷۵/۰/۴	۱۴/۰/۴	۷/۶	۹/۳	۹/۳	۱۵/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۱۴/۱	۲۰/۱	۲۰/۱	۲۰/۱	۰/۰	۰/۰	۱۱/۵	۱۱/۵	۰/۰	۰/۰	۱۹
۲۰	۹۳/۰/۷	۷۲/۰/۷	۷۷/۰/۲	۱۲/۰/۴	۱۲/۰/۲	۱۲/۰/۲	۱۲/۰/۲	۱۲/۰/۲	۱۲/۱/۱	۱۲/۱/۱	۱۲/۱/۱	۵/۵/۱	۵/۵/۱	۵/۵/۱	۰/۰	۰/۰	۱۰/۰	۱۰/۰	۰/۰	۰/۰	۲۰
۲۱	۹۵/۰/۲	۸۰/۰/۸	۸۰/۰/۳	۸/۰/۰/۵	۸/۰/۰/۳	۸/۰/۰/۳	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۳۲/۱/۱۴	۰/۰	۰/۰	۱۰/۰	۱۰/۰	۰/۰	۰/۰	۲۱
																					میانگین



شکل ۱- کروماتوگرام سیب جاناغلد با غلظت نسبتاً بالای آنتوسیانین.

پیک‌های دارای عدد به INS، استاندارد داخلی، ۱۱ و ۲۰ کاتچین‌ها، ۳۶ کلروژنیک اسیدهای فنلی، ۷ و ۸ پروسیانیدین، ۱۰، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ کوئرستین گلوکوزیدها (کوئرستین‌ها)، ۱۴ و ۱۷ فلوریدزین (دهیدروکسی چالکون‌ها) مربوط است.


جدول ۴- ضریب همبستگی (r) بین رنگ مرئی و میزان فنل پوست ۳ رقم سیب ($n=20$, $r5\% = 0.44$, $r1\% = 0.56$)

	جاناتان						
	فوجی			جاناگلد			
	کروم	هیو	کروم	هیو	کروم	هیو	
۰/۰۲	۰/۰۴	۰/۳۱	۰/۱۳	۰/۴۱(−)	۰/۴۰(−)		اسیدهای فنلی
ns	ns	ns	ns	ns	ns		کاتچین‌ها
۰/۰۱ ns	۰/۰۱ ns	۰/۰۲ ns	۰/۰۲ ns	۰/۱۲ ns	۰/۱۱ ns		پروسیانیدین‌ها
۰/۰۱ ns	۰/۱۲ ns	۰/۰۵ ns	۰/۱ ns	۰/۰۱ ns	۰/۱ ns		دی‌هیدروچالکون‌ها
۰/۰۲ ns	۰/۰۱ ns	۰/۰۲ ns	۰/۰۸ ns	۰/۰۱ ns	۰/۰۱ ns		آنتوسیانین‌ها
۰/۱۴*	۰/۱۶ ns	۰/۴۴*	۰/۴۵*	۰/۶۹(+)*	۰/۶۹(+)*		کوئرستین‌ها
۰/۴۴*	۰/۱ ns	۰/۴۵*	۰/۴۵*	۰/۵۳(+)*	۰/۴۷(+)*		ترکیبات فنلی
۰/۰۴ ns	۰/۰۷ ns	۰/۲۳ ns	۰/۱۸ ns	۰/۶۵(+)*	۰/۵۸(+)*		

* و ** به ترتیب نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح پنج و یک درصد و ns نشان دهنده معنی‌دار نبودن اختلاف هستند.

شناسایی شده از گروه پروسیانیدین (پیک شماره ۱۰ در شکل ۱) دیده شد. احتمالاً این ماده پیش‌ساز یا یکی از پیش‌ماده‌های آنتوسیانین است. هرچند این امر نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تر دارد. ارتباط معنی‌داری بین رنگ پوست و میزان فنل گوشت در میوه‌های ارقام مورد بررسی وجود نداشت. این نشان می‌دهد که موقعیت میوه در تاج که برای قرارگیری در معرض نور مهم است، میزان فنل گوشت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. میزان کل فنل میوه‌ی مجزا و در نتیجه متوسط این ماده‌ها در فوجی بیشتر بود. اگرچه عوامل محیطی به‌ویژه نور، برای سنتز فنل‌ها در پوست مهم می‌باشد (۵)، به نظر می‌رسد که بیوسترن فنل‌ها با زمینه‌ی ژنتیکی و شرایط محیطی تعیین می‌شود.

با توجه به اینکه آنتوسیانین‌ها و کوئرستین‌ها، محصولات نهایی مسیر بیوسترن فلاونوئیدها هستند وجود چنین ارتباطی کاملاً منطقی و توجیه پذیر است زیرا عوامل درونی و فیزیولوژیکی نظیر آنزیم‌های دخیل در ساخت آن‌ها بسیار شبیه هم هستند. پوست سیب جاناگلد نسبت به سیب جاناتان و فوجی فلاونوئید و کلروژنیک اسید بیشتری داشت. این نتایج با یافته‌های بخشی و آرکاوا (گزارش منتشر نشده) مبنی بر اینکه میوه‌های اشعه‌دهی شده جاناتان، آنتوسیانین زیادی تولید کردند اما میزان اسیدهای فنلی آن-هالفراش نیافت، مغایرت دارد. این اختلاف ممکن است به خاطر اختلاف در طول دوره‌ای که میوه‌هادر معرض نور هستند، باشد. همبستگی منفی و معنی‌داری بین آنتوسیانین و یکی از پیک‌های



شکل ۲- همبستگی بین آنتوسبیانین و کوئرستین ۳-گالاكتوزید با پیک شماره‌ی ۱۰ در فوجی، جاناتان و جاناگلد

یکسان بود. میزان فنل کل گوشت فوجی به طور قابل توجهی، بیشتر از جاناتان و جاناگلد بود. آنالیز ضربی همبستگی بین رنگ خارجی پوست و میزان فنل‌ها نشان داد که رنگ قرمز پوست اساساً به خاطر آنتوسبیانین و کوئرستین‌هاست.

بطور کلی در هر سه رقم، ارتباط مثبتی بین رنگ و میزان فنل پوست وجود داشت. پوست و گوشت ارقام مورد بررسی، حاوی سطوح مختلفی از مواد فنلی بود. با افزایش رنگ قرمز در دو رقم جاناتان و جاناگلد، کاتچین‌ها و اسیدهای فنلی افزایش یافتهند، در حالی که این سطوح فنلی در رقم فوجی برای میوه‌هایی با رنگ خارجی مختلف،

منابع

- Abbott J.A. 1999. Quality measurement of fruit and vegetables. *Journal of Postharvest Biology and Technology*. 15: 207–225.
- Awad M.A., Jager A., and Westing L.M. 2000. Flavonoid and chlorogenic acid levels in apple fruit: characterisation of variation. *Journal of Scientia Horticulturae*. 83: 249-263.
- Awad M., Wagenmakers P., and Jaager A. 2001. Effect of light on flavonoid and chlorogenic acid levels in the skin

- of Jonagold apples. *Journal of Scientia horticulturae*. 88: 289-298.
- 4- Honda Ch., Kotoda N., Wada M., Kondo S., Kobayashi Sh., Soejima J., Zhang Z., Tsuda T., and Moriguchi T. 2002. Anthocyanin biosynthetic genes are coordinately expressed during red coloration in apple skin. *Journal of Plant physiology and biochemistry*. 40: 955-962.
- 5- Lancaster J.E. 1992. Regulation of skin color in apple. *Journal of Critical Reviews in Plant Sciences*. 10(6): 487-502.
- 6- Merzlyak M., Solovchenko A., and Gitelson A. 2003.. Reflectance spectral features and non-destructive estimation of chlorophyll, carotenoid and anthocyanin content in apple fruit. *journal of Postharvest Biology and Technology*. 27: 197-211.
- 7- Perkins-Veazie P. 1992. Physiological changes during ripening of raspberry fruits. *Hort Science*. 27(4): 331-333.
- 8- Steinmetz K.A., and Potter J.D. 1996. Vegetables, fruit and cancer prevention: a review. *Journal of the American Dietetic Association*. 96: 1027-1039.

Archive of SID