



کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (*Alstroemeria sp.*) در شرایط این ویترو

امیرغفار شهریاری^{۱*} - عبدالرضا باقری^۲ - احمد شریفی^۳ - نسرین مشتاقی^۲

تاریخ دریافت: ۸۹/۶/۲۲

تاریخ پذیرش: ۹۰/۲/۶

چکیده

آلسترومریا به عنوان یکی از گل های مهم شاخه بریده در دنیا عمدتاً به روش این ویترو و با استفاده از ریزنمونه ریزوم تکثیر می شود. مشکل اصلی استفاده از این ریزنمونه، آلودگی بالای قارچی و باکتریایی می باشد بطوری که تهیه ریزنمونه استریل را با مشکل مواجه می کند. از این رو در این پژوهش تاثیر ترکیبات ضد عفونی کننده مختلفی چون هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، پنی سیلین، سفوتاکسیم و قارچ کش کاربندازیم بر کنترل آلودگی ریزنمونه های حاصل از ریزوم ارقام کارالیس و بردنوکس مورد بررسی قرار گرفت. ریز نمنه ها پس از ضد عفونی با ترکیبات مختلف در محیط کشت MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و ۰/۲ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) کشت شدند. بعد از سه هفته درصد آلودگی ریزنمونه ها برای تیماری های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار ریزنمونه ها با استفاده از قارچ کش کاربندازیم به میزان ۰/۴ درصد و ضد عفونی با استفاده از الکل ۷۰ درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم ۳ درصد به مدت ۲۰ دقیقه برای رقم کارالیس و ترکیب ضد عفونی با الکل ۷۰ درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم ۳ درصد به مدت ۲۰ دقیقه و سپس انتقال به محیط کشت حاوی ۲۰۰ میلی گرم در لیتر پنی سیلین و استرپتومایسین برای رقم بردنوکس دارای کمترین میزان آلودگی بود. کنترل آلودگی در هر دو رقم بردنوکس و کارالیس تحت تاثیر کاربرد نانو ذرات نقره قرار نگرفت.

واژه های کلیدی: آلسترومریا، هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، آنتی بیوتیک، کاربندازیم

مقدمه

روش های معمول تکثیر این گیاه زینتی و تولید گیاهان عاری از ویروس، استفاده از روش های کشت این ویترو در این گیاه اهمیت زیادی پیدا کرده است. برای تکثیر این ویتروی آلسترومریا معمولاً از ریزنمونه های جوانه انتهایی شاخه (۱۶)، جوانه جانبی (۱۲) و ریزوم (۵، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴ و ۲۰) استفاده می گردد. با این حال سرعت باززایی جوانه انتهایی ریزوم (نوک ریزوم) از سایر ریزنمونه ها بیشتر گزارش شده است (۱۳). آلودگی های قارچی و باکتریایی از مشکلات اصلی استفاده از اندام های زیر زمینی به عنوان ریز نمنه است (۱۱ و ۱۵). هنگامی که هدف کشت بافت تکثیر تجاری گیاهان باشد، آلودگی های قارچی و باکتریایی می تواند لطمات جبران ناپذیری به آن وارد آورد (۱۷). استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطحی یکی از روش های ممکن برای کاهش این آلودگی ها است. برای گند زدایی سطحی عموماً از الکل ۷۰ درصد، هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم و کلرید جیوه استفاده می شود. آنتی بیوتیک ها نیز برای کنترل آلودگی های داخلی و خارجی موثر هستند. آلودگی های داخلی معمولاً چندین هفته بعد از کشت ظاهر می شوند. این آلودگی ها ممکن است از لحاظ ظاهری دیده نشوند، اما بر روی رشد، تقسیم و

آلسترومریا (*Alstroemeria sp.*) گیاهی دگرگشن بوده که خاستگاه آن آمریکای جنوبی است. این جنس دارای گونه های فراوانی در خانواده آلسترومریاسه است که امروزه تعدادی از آنها به عنوان گیاهان زینتی برای تولید گل های شاخه بریده، گیاهان باغی، باغچه ای و یا گلدانی پرورش داده می شوند (۵). در حال حاضر آلسترومریا به علت داشتن گل های زیبا و بادوام در بازارهای جهانی گل و گیاه به عنوان یکی از مهم ترین و پرفرودارترین گل های زینتی شاخه بریده به شمار می رود (۱۱). آلسترومریا به طور معمول با استفاده از ریزوم تکثیر می شود، اما آلودگی های ویروسی، سرعت کم تکثیر و محدودیت های فصلی، سبب محدود شدن استفاده از این روش شده است (۲۰). در حال حاضر برای فایق آمدن بر مشکلات

۱، ۲ و ۴- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار گروه بیوتکنولوژی،

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

*-نویسنده مسئول: Email: shahriari.ag@gmail.com

۳- مری گروه پژوهشی فناوری کشت بافت و ازدیاد گیاهان جهاد دانشگاهی مشهد

به منظور تهیه ریزنمونه، گیاهچه‌ها از بستر کشت خارج و ریزوم‌ها به وسیله یک چاقوی تیز تاگره اول برش داده شدند. پس از برش دهی ریزوم‌ها (شکل ۱، الف). عمل شستشوی جوانه‌های انتهایی (نوک ریزوم) با استفاده از آب جاری انجام شد و سپس تیمارهای ضد عفونی اعمال گردید.

تیمارهای مختلف ضد عفونی

جهت ضد عفونی ریزنمونه‌ها از ترکیبات ضد عفونی کننده مختلف شامل: هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، قارچ کش کاربندازیم و نیز آنتی بیوتیک‌های استرپتومایسین، پنی سیلین و سفوتاکسیم در پنج مرحله با انجام آزمایشات جداگانه استفاده شد. ابتدا برای بررسی اثر مقادیر مختلف هیپوکلریت سدیم بر میزان آلودگی ارقام کارالیس و بردئوکس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار که هر تکرار حاوی ۲۰ ریزنمونه بود، انجام شد. در این مرحله ارقام به عنوان فاکتور اول و تیمارهای ضد عفونی به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد (جدول ۱، مرحله یک). در مرحله دوم به منظور بررسی توام وایتکس و کلرید جیوه بر کنترل آلودگی ارقام بردئوکس و کارالیس از کلرید جیوه با سه غلظت مختلف پس از ضد عفونی ریزنمونه‌ها با هیپوکلریت سدیم استفاده گردید (جدول ۱، مرحله دوم). با توجه به مرگ کامل ریزنمونه‌های مربوط به رقم بردئوکس، تجزیه واریانس داده‌ها برای رقم کارالیس به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و هر تکرار حاوی ۲۰ ریزنمونه انجام شد. با توجه به موفق نبودن کنترل آلودگی توسط تیمارهای قبلی و گزارش‌های موفق استفاده از نانو ذرات نقره در کنترل آلودگی در برخی از گیاهان (۲) در این مرحله، ابتدا از آزمایش مقدماتی با غلظت‌ها و زمان‌های مختلف نانو ذرات نقره انجام شد و بر اساس آستانه تحمل، عدم سیاه شدگی و زنده مانی ریزنمونه‌ها، ضد عفونی ریزنمونه با مقادیر ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره برای رقم کارالیس و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر برای رقم بردئوکس انجام شد و اثر آن‌ها بر کنترل آلودگی نسبت به تیمار الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه در طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و هر تکرار حاوی ۲۰ ریزنمونه بررسی گردید (جدول ۱، مرحله سوم).

در مرحله بعدی آزمایش، اثر مقادیر آنتی بیوتیک‌های مختلف شامل پنی سیلین، استرپتومایسین و سفوتاکسیم بر کنترل آلودگی ریزنمونه‌ها نسبت به تیمار الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه در طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار و هر تکرار با ۲۰ ریزنمونه در رقم بردئوکس مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب غلظت آنتی بیوتیک‌های مورد آزمایش، بر اساس نتایج آزمایش‌های مقدماتی صورت گرفت.

سبز شدن ریزنمونه‌ها تاثیر می‌گذارند (۱۷). از آنتی بیوتیک‌های متعددی جهت کنترل آلودگی‌های با منشا داخلی، به صورت منفرد یا ترکیبی استفاده شده است (۱۷). با این وجود احتمال دارد که ریزنمونه‌ها به آنتی بیوتیک حساس باشند. علاوه بر این، به علت استفاده از غلظت‌های بالای آنتی بیوتیک، احتمال وقوع جهش‌های نقطه‌ای و نیز اختلال در زنجیره انتقال الکترونی میتوکندری نیز گزارش شده است (۲). اخیراً استفاده از نانو ذرات نقره نیز برای ضد عفونی ریزنمونه‌ها در گیاه سنبل الطیب (*Valeriana officinalis*) گزارش شده است (۲).

بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی کشت بافت گیاه آلسترومریا مربوط به بررسی غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی ریزنمونه ریزوم بوده است و علیرغم گزارش‌های مختلف مبنی بر وجود آلودگی بالا در کشت این ویترو، تحقیقات اندکی در خصوص تعیین بهترین روش‌های تهیه ریزنمونه استریل در این گیاه انجام شده است (۵ و ۱۴). هیپوکلریت سدیم بر ضد عفونی برخی از ارقام آلسترومریا موثر بوده است، با این وجود در بعضی از ارقام نیز تاثیر چندانی بر روی میزان آلودگی نداشته است (۱). تاکنون در این گیاه استفاده از سایر مواد ضد عفونی کننده جهت تهیه ریزنمونه استریل گزارش نشده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد عفونی کننده‌های مختلفی چون هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، آنتی بیوتیک‌های پنی سیلین، استرپتومایسین و سفوتاکسیم و قارچ کش کاربندازیم بر روی کنترل درصد آلودگی ریزنمونه حاصل از ریزوم گیاه آلسترومریا بوده است.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی و تهیه ریزنمونه

در این پژوهش دو رقم آلسترومریا کارالیس^۱ و بردئوکس^۲ از گلخانه گیاهان زینتی سعادت شهر استان فارس تهیه گردید و به گلخانه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی مشهد انتقال داده شد. گیاهان در جعبه‌های حاوی مخلوط ۲ به ۱ کوکوپیت و پرلیت کشت شدند و بعد از رشد کافی از طریق ریزوم تکثیر شدند. با توجه به تاثیر شرایط رشدی گیاه مادری بر درصد آلودگی ریزنمونه‌ها در شرایط این ویترو، ارقام در شرایط مطلوب دمای ۲۰±۲ درجه سانتیگراد و فتوپریودی ۱۶ به ۸ روشنایی و تاریکی نگهداری شدند. در طول دوره رشد گیاهان با محلول غذایی کریستالون ۰/۲ درصد و آهن ۰/۱ درصد آبیاری شدند و پس از رشد کافی که تعداد مناسب ریزوم بدست آید (حداقل یک ماه) از آنها برای انجام پژوهش استفاده شد.

1- Caralis

2- Bordeaux

جدول ۱- مراحل مختلف آزمایش انجام شده برای کاهش آلودگی ریزنمونه های حاصل از ریزوم.


مراحل آزمایش	ارقام	تیمارهای ضد عفونی اعمال شده
اول	بردنوکس و کارالیس	الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۲/۵٪ به مدت ۲۵ دقیقه الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه
دوم	بردنوکس و کارالیس	وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۰۳ درصد به مدت ۱۰ دقیقه وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۰۶ درصد به مدت ۱۰ دقیقه وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۱ درصد به مدت ۱۰ دقیقه
سوم	بردنوکس و کارالیس	الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و نانو ذرات نقره به مقدار ۲۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت ۴۰ دقیقه الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و نانو ذرات نقره مقدار ۳۰۰ میلی گرم به مدت ۲۰ دقیقه الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و نانو ذرات نقره ۵۰ میلی گرم در لیتر به مدت ۴۰ دقیقه الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و ۱۰۰ میلی گرم در نانو ذرات نقره به مدت ۲۰ دقیقه
چهارم	بردنوکس	الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کشت بر روی محیط کشت حاوی ۲۰۰ میلی گرم در لیتر از آنتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتومایسین
پنجم	کارالیس	الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کشت بر روی محیط کشت حاوی ۴۰۰ میلی گرم در لیتر سفوتاکسیم تیمار گیاهان آلسترومریا با ۴ گرم در لیتر کاربندازیم در گلخانه در فواصل زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت قبل از تهیه ریز نمونه و ضد عفونی ریز نمونه ها در آزمایشگاه پس از شستشو با آب جاری با استفاده از الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه.

هفته های پنجم و هفتم به ترتیب ساقه زایی (شکل ۱، ب) و ریشه زایی را آغاز کردند (شکل ۱، ج). داده های حاصل از مراحل مختلف آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شد و مقایسه میانگین ها به غیر از داده های حاصل از مرحله پنجم، با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث

مرحله اول: تیمار هیپوکلریت سدیم. نتایج تجزیه واریانس داده های این آزمایش بیانگر تاثیر معنی دار ($P < 0/05$) تیمارهای ضد عفونی حاوی هیپوکلریت سدیم به عنوان عامل تغییر بر درصد آلودگی بود (جدول ۲). نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین و کمترین درصد آلودگی به ترتیب در تیمارهای ضد عفونی حاوی ۲ و ۳ درصد هیپوکلریت سدیم بدست آمد (به ترتیب ۹۲ و ۶۷ درصد). اثر رقم نیز بر درصد آلودگی معنی دار بود، به نحوی که رقم کارالیس در تیمارهای ضد عفونی هیپوکلریت سدیم آلودگی کمتری نسبت به رقم بردنوکس داشت (به ترتیب ۷۲/۴ و ۸۹ درصد).

نتایج این بررسی ها نشان داد که غلظت های اندک هرکدام از آنتی بیوتیک ها در کنترل آلودگی موثر نمی باشد. از آنجا که شرایط نگهداری گیاه مادری بر میزان آلودگی در شرایط این ویترو تاثیر می گذارد در مرحله پنجم آزمایش، از قارچ کش کاربندازیم برای ضد عفونی بستر کشت گیاهان در گلخانه استفاده شد و سپس در آزمایشگاه، تیمار ضد عفونی با هیپوکلریت سدیم اعمال گردید (جدول ۱). مقایسه اثر کاربندازیم بر کنترل آلودگی نسبت به تیمار فاقد کاربندازیم (الکل ۷۰ درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم ۳ درصد به مدت ۲۰ دقیقه) با استفاده از آزمون t به روش مقایسات جفت شده انجام شد. در همه مراحل فوق، ریز نمونه ها پس از شستشو در آب جاری و اعمال تیمارهای ضد عفونی در محیط کشت MS حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BA (بنزیل آدنین) و ۰/۲ میلی گرم در لیتر NAA (نفتالن استیک اسید) و شرایط نوری ۱۶ ساعت در دمای 25 ± 2 درجه سانتی گراد کشت شدند. در همه مراحل آزمایش به استثنای مرحله چهارم، واکنش ریزنمونه ها پس از چهار هفته انجام شد. در این مرحله، جهت جلوگیری از اثر منفی آنتی بیوتیک بر ادامه رشد، آنتی بیوتیک از محیط کشت واکشت حذف شد. در کلیه آزمایش ها بعد از گذشت سه هفته از اعمال تیمارهای ضد عفونی، میزان آلودگی تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. ریزنمونه های فاقد آلودگی که با هیپوکلریت و نانو ذرات نقره ضد عفونی شده بودند، در




شکل ۱- نحوه تهیه ریزنمونه نوک ریزوم (الف)، رشد ریزنمونه ها و تولید شاخساره در هفته پنجم (ب) و ریشه دار شدن گیاهچه ها در هفته هفتم (ج).

جدول ۲- جدول تجزیه واریانس درصد آلودگی ریزنمونه های ریزوم، تحت تاثیر غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و رقم

منابع تغییر	درجه آزادی	مجموع مربعات
ضد عفونی	۲	۱۹۲۸/۷**
رقم	۱	۱۲۳۳/۳**
ضد عفونی × رقم	۲	۱۱۶/۷*
خطا	۱۲	۲۰۰/۶
کل	۱۷	۳۴۷۹/۶

** و * : به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۱٪ و ۵٪



تیمارهای ضد عفونی هیپوکلریت سدیم

شکل ۲- اثر متقابل رقم و مقادیر مختلف هیپوکلریت سدیم بر کنترل درصد آلودگی ریزنمونه ریزوم.

(۱): الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه، (۲): الکل

۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۲/۵٪ به مدت ۲۵ دقیقه، (۳): الکل ۷۰٪ به مدت

۱ دقیقه و وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه. میانگین های با حروف مشترک دارای

اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد نیستند.

مرحله دوم: تیمار کلرید جیوه. کلرید جیوه به عنوان یک ضد

عفونی کننده سطحی عمدتاً همراه با هیپوکلریت سدیم استفاده می شود و کنترل طیف باکتری ها و قارچ ها و کارایی ضد عفونی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از این مرحله نشان داد، که استفاده از کلرید جیوه، در فرایند ضد عفونی ریزنمونه ها با استفاده از وایتکس ۳ درصد باعث بهبود کنترل آلودگی در رقم کارالیس شد به نحوی که در

اثر متقابل تیمار ضد عفونی و رقم معنی دار بود به گونه ای که در تمام سطوح تیمار های ضد عفونی رقم کارالیس آلودگی کمتری نسبت به رقم بردتوکس داشت (شکل ۲). عموماً ریزنمونه هایی که از اندام های زیر زمینی مانند ریزوم، پیاز و طوقه تهیه می شوند به شدت آلوده بوده و تهیه ریزنمونه استریل در آن ها بسیار مشکل است. هیپوکلریت سدیم به عنوان یک ضد عفونی کننده عمومی توانایی کنترل محدود این آلودگی ها را دارد (۱ و ۱۲). پدرسون و براند (۱۵) از محلول هیپوکلریت سدیم (۱ تا ۵ درصد) در مدت زمان های ۱، ۵ و ۱۰ دقیقه استفاده کردند و نتایج نشان داد بهترین نتیجه زمانی بدست می آید که ضد عفونی در ۳ مرحله (۱، ۵ و ۱۰ دقیقه) انجام شد. بهلولی زنجانی و همکاران (۱) نیز از هیپوکلریت سدیم برای ضد عفونی ریزوم پنج رقم آلسترومریا استفاده کرد. نتایج وی نشان داد که هیپوکلریت سدیم بر کاهش آلودگی رقم جامایکا تاثیر داشت و بر روی سایر ارقام تاثیر چندانی نداشت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نیز بر کنترل نسبی آلودگی توسط هیپوکلریت سدیم دلالت

همکاران (۲) برای ضد عفونی ریزنمونه گره سنبل الطیب (*Valeriana officinalis* L.) از ترکیب ضد عفونی کننده های الکل، هیپوکلریت سدیم و نانوذرات نقره استفاده کردند. آنها گزارش کردند که استفاده از غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر این ماده کارایی ضد عفونی الکل و هیپوکلریت سدیم را افزایش می دهد. اما هنوز گزارش های زیادی در مورد تاثیر نانو ذرات نقره بر کاهش آلودگی وجود ندارد و باید پژوهش های بیشتری با استفاده از گیاهان و ریزنمونه های متفاوت انجام شود تا در نهایت تاثیر یا عدم تاثیر این ماده بر میزان آلودگی مشخص شود.

مرحله چهارم: تیمار آنتی بیوتیک ها. آلودگی های باکتریایی که منشا داخلی دارند و در درون بافت ریز نمونه هستند معمولاً با استفاده از ضد عفونی کننده های سطحی از بین نمی روند. آنتی بیوتیک ها در مواردی می توانند در کنترل آلودگی های ریزنمونه ها مفید باشند و درصد آلودگی ریزنمونه ها را کاهش دهد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از آنتی بیوتیک ها در فرایند ضد عفونی ریزنمونه ها با استفاده از هیپوکلریت سدیم ۳ درصد باعث بهبود کنترل آلودگی شد. استفاده از ترکیب آنتی بیوتیک های استرپتومایسین و پنی سیلین (هر کدام ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) در مقایسه با آنتی بیوتیک سفوتاکسیم (۴۰۰ میلی گرم در لیتر) اثر بهتری در کنترل آلودگی داشت، بطوری که کاربرد توام این دو آنتی بیوتیک در مقایسه با کاربرد جداگانه آنتی بیوتیک سفوتاکسیم از نظر درصد آلودگی و درصد سبزشدگی وضعیت بهتری داشت (جدول ۴). اما ریز نمونه های سبز شده در محیط کشت حاوی پنی سیلین و استرپتو مایسین پس از واکشت در محیط کشت فاقد آنتی بیوتیک، تولید شاخساره های کوتاه نمودند و ریشه زایی آنها نیز بعد از زمان طولانی آغاز شد.

از مشکلات عمده کشت بافت گیاهی، آلودگی های باکتریایی است و معمولاً کنترل این نوع آلودگی ها بویژه از نوع داخلی مشکل است و هفته ها بعد از کشت بر روی محیط کشت ظاهر می شوند (۱۷). از آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، ریفامپیسین، پنی سیلین و سفوتاکسیم به تنهایی یا به صورت ترکیبی در محیط کشت برای کنترل آلودگی های باکتریایی دارای منشای داخلی در کشت این ویترو استفاده شده است (۱۷). همچنین از این آنتی بیوتیک ها در فرایند ضد عفونی به صورت قبل و یا بعد از ضد عفونی سطحی برای کنترل آلودگی های باکتریایی استفاده شده است (۱۶). صالحی و خوشخوی (۱۸) برای کنترل آلودگی باکتریایی در رز مینیاتوری از محلول جنتامایسین با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بعد از ضد عفونی سطحی استفاده کردند. در مطالعه ای بر روی لیلیوم، بعد از ضد عفونی کردن قطعات پیاز با الکل و هیپوکلریت سدیم، آن ها را بر روی محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک استرپتومایسین و پنی سیلین هر کدام با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر کشت نمودند و نتیجه مناسبی در کنترل آلودگی کسب کردند (۴).

تیمار ۰/۰۳ درصد کلرید جیوه، میزان آلودگی ریزنمونه ها ۵۰ درصد بود (جدول ۳). بین سطوح مختلف کلرید جیوه از نظر کنترل آلودگی اختلاف معنی داری وجود داشت. لازم به توضیح است که با افزایش میزان کلرید جیوه بکار رفته برای ضد عفونی از ۰/۰۳ درصد به ۰/۱ درصد، رشد گیاهچه ها کاهش یافت، بطوری که در تیمار ۰/۱ درصد، ریز نمونه ها فقط سبز شدند و بندرت شاخه تولید کردند. همچنین ریز نمونه هایی که در غلظت ۰/۰۳ درصد کلرید جیوه ضد عفونی شده بودند شاخه هایی تولید کردند که از لحاظ ظاهری ضعیف تر بوده و به سختی ریشه تولید می کردند. در رقم بردنوکس علی رغم کنترل کامل آلودگی ریزنمونه ها، تمام غلظت های اعمال شده باعث عدم رشد ریزنمونه ها شد. آزمون تترازولیم، مرگ ریزنمونه ها را تایید نمود. گزارش هایی در مورد تاثیر کلرید جیوه بر مرگ ریز نمونه ها وجود دارد. در پژوهشی از غلظت ۰/۱ درصد کلرید جیوه در زمان های متفاوت برای اندازه گیری میزان آلودگی، زنده مانی و مرگ و میر جوانه های انگور استفاده شد (۱۰). نتایج نشان داد که کلرید جیوه بطور نسبی آلودگی باکتریایی و قارچی ریزنمونه ها را کنترل می کند اما درصد زنده مانی ریزنمونه ها را کاهش می دهد، بطوری که در یکی از ارقام باعث مرگ کامل ریز نمونه ها شد. بنظر می رسد برخی گیاهان نسبت به کلرید جیوه حساس باشند و تعیین مقدار مناسب این ماده نقش بسیار مهمی در تهیه ریزنمونه سالم و زنده دارد. علم و همکاران (۳) از کلرید جیوه ۰/۱ درصد برای کاهش آلودگی ریز نمونه حاصل از گره گیاه همیشه سبز چند ساله *Operculina turpethum* استفاده نموده و نتایج مثبتی از نظر کنترل آلودگی گزارش کردند. به نظر می رسد که در گیاه آسترومریا غلظت بالاتر از ۰/۱ درصد باعث مرگ ریز نمونه ها می شود و استفاده از غلظت های کمتر و زمان های کوتاه تر می تواند راه حلی برای کاهش آلودگی در این گیاه باشد.

مرحله سوم: تیمار نانوذرات نقره. اخیراً قابلیت استفاده از نانوذرات در کنترل آلودگی های محیط کشت در کشت بافت گیاهی در حال بررسی است. بنظر می رسد این ترکیبات به علت وجود نسبت سطح به حجم زیاد، قابلیت کنترل آلودگی های سطحی و داخلی را داشته باشند (۱۹). نتایج این پژوهش در مورد تاثیر این ترکیبات بر کنترل آلودگی نشان داد که بین تیمار های ۵۰ میلی گرم در لیتر با ۵۸ درصد آلودگی و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر با ۵۷ درصد آلودگی در رقم کارالیس، همچنین بین غلظت های ۲۰۰ میلی گرم در لیتر با ۷۲ درصد آلودگی و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر با ۷۰ درصد آلودگی در رقم بردنوکس تفاوت معنی داری وجود ندارد (سطح معنی دار ۵ درصد). همچنین از لحاظ درصد آلودگی نیز تفاوت معنی داری بین استفاده از نانو ذرات نقره و عدم استفاده از آن (تیمار شاهد شامل الکل ۷۰ درصد به مدت ۱ دقیقه و وایتکس ۳ درصد به مدت ۲۰ دقیقه) وجود ندارد (سطح معنی دار ۵ درصد). این در حالی است که عابدی و

جدول ۳- اثر تیمار کلرید جیوه بر درصد آلودگی ریزنمونه های حاصل از ریزوم، طول شاخساره و تعداد شاخساره های تولید شده در رقم کارالیس

تیمار های ضد عفونی	درصد آلودگی	طول شاخه	تعداد شاخه
وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه	۶۰ a	۳/۱۶ a	۴/۰۰ a
وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۰۳ درصد به مدت ۱۰ دقیقه	۵۰ b	۱/۵۰ b	۱/۹۰ b
وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۰۶ درصد به مدت ۱۰ دقیقه	۴۶ bc	۱/۰۸ bc	۰/۷۵ c
وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه و کلرید جیوه ۰/۱ درصد به مدت ۱۰ دقیقه	۴۰ c	۰/۴۶ c	۰/۲۰ d

میانگین های با حروف مشترک دارای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد نیستند.

جدول ۴- اثر آنتی بیوتیک های سفوتاکسیم، پنی سیلین و استرپتومایسین بر درصد آلودگی، سبزی شدگی و سیاه شدگی ریزنمونه رقم بردنوکس

تیمار های ضد عفونی	نوع و غلظت آنتی بیوتیک در محیط کشت	درصد آلودگی	درصد سبزی شدگی	درصد سیاه شدگی
الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه	عدم استفاده از آنتی بیوتیک	۷۴ a	۱۵ c	۱۱ a
الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه	سفوتاکسیم (۴۰۰ میلی گرم در لیتر)	۶۲ b	۲۵ b	۱۳ a
الکل ۷۰٪ به مدت ۱ دقیقه، وایتکس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه	پنی سیلین و استرپتومایسین (۲۰۰ میلی گرم در لیتر)	۴۰ c	۵۰ a	۱۰ a

میانگین های با حروف مشترک دارای اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد نیستند.

سیکلوهاگزامید با غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر برای کاهش آلودگی ریزنمونه ها در محیط کشت استفاده شده اما تاثیری بر کاهش آلودگی نداشته است (۱). به نظر می رسد تاثیر کاربندازیم بر کاهش آلودگی رقم کارالیس به این علت بوده است که این قارچ کش تا حدی توانسته فلور قارچی ریزنمونه و بسترکشت را کنترل نموده و شرایط ضد عفونی را با استفاده از الکل و هیپوکلریت سدیم فراهم کند.

نتیجه گیری

هنگامی که هدف کشت بافت تکثیر تجاری گیاهان باشد، کنترل آلودگی و تهیه ریزنمونه استریل از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از مواد ضد عفونی کننده یکی از مهم ترین روش های کنترل آلودگی باکتریایی و قارچی در کشت این ویترو است. بر اساس نتایج این پژوهش، هیپوکلریت سدیم به طور متوسط میزان آلودگی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش داد. استفاده از کلرید جیوه به عنوان مکمل وایتکس، آلودگی را به میزان بیشتری کنترل کرد (متوسط ۵۵ درصد) ولی اثرات منفی بر روی رشد ریزنمونه ها و تولید شاخساره داشت. نانوذرات در هر دو رقم تاثیر چندانی بر کنترل آلودگی نداشت. تیمار ریزنمونه های حاصل از رقم کارالیس با قارچ کش قبل از ضد عفونی سطحی و همچنین استفاده از آنتی بیوتیک پنی سیلین و استرپتومایسین در محیط کشت، میزان آلودگی ریزنمونه ها را به

تاکنون گزارشی در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها در کنترل آلودگی های باکتریایی ریزنمونه نوک ریزوم های آلسترومریا ارائه نشده است، اما نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده ترکیبی آنتی بیوتیک ها با غلظت پایین تر در مقایسه با استفاده از یک آنتی بیوتیک با غلظت بالا دارای نتایج بهتری است. استفاده از سایر آنتی بیوتیک ها که ریزنمونه ریزوم حساسیت کمتری نسبت به آن ها داشته باشد می تواند راه حل دیگری برای کاهش آلودگی های باکتریایی باشد.

مرحله پنجم: قارچ کش کاربندازیم. کاربندازیم قارچ کشی

سیستمیک با طیف وسیع کنترل قارچ ها است و از آن به عنوان یک قارچ کش عمومی استفاده می شود. نتایج برخی گزارش ها نشان می دهد که تیمار گیاهچه ها قبل از ضد عفونی با این قارچ کش می تواند کارایی ضد عفونی را افزایش دهد (۲۱). آزمون مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون t نشان داد که کاربندازیم تاثیر معنی داری (۱۳/۰ = t) بر کاهش درصد آلودگی ریزنمونه ها دارد. به نحوی که تیمار رقم کارالیس با قارچ کش کاربندازیم به میزان ۴ گرم در لیتر در فواصل زمانی ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت قبل از تهیه ریزنمونه، میزان آلودگی را از ۶۰ درصد در تیمار شاهد (تیمار فاقد کاربندازیم و ضد عفونی با استفاده از الکل ۷۰ درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم ۳ درصد به مدت ۲۰ دقیقه) به ۴۷ درصد کاهش داد. تاکنون گزارشی در خصوص اثر تیمار گیاهچه ها با استفاده از قارچ کش کاربندازیم قبل از ضد عفونی در کشت بافت آلسترومریا وجود ندارد اما از قارچ کش

سپاسگزاری

نگارندگان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بخاطر تامین بخشی از هزینه های تحقیق و همچنین از گروه کشت بافت و ازدیاد گیاهان جهاد دانشگاهی مشهد بخاطر فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می نمایند.

صورت معنی داری کاهش داد. به نظر می رسد استفاده از قارچ کش ها و آنتی بیوتیک ها می تواند روش جدیدی برای کنترل آلودگی ریزنمونه های حاصل از نوک ریزوم گیاه آلسترومریا باشد که این نیازمند پژوهشی است که طیف وسیعی از قارچ کش ها و آنتی بیوتیک ها را در بر گیرد.

منابع

- ۱- بهلولی زنجانی س. حمیداوغلی ی. و حاتم زاده ع. ۱۳۸۴. بررسی کشت درون شیشه ای گیاه آلسترومریا. پایان نامه کارشناسی ارشد. ۱۰۰ص.
- 2- Abedi G., Salehi H., and Khosh-khui M. 2008. A novel nanomaterial for removal of bacterial contaminants in valerian (*Valeriana officinalis* L.) tissue culture. *Acta. Physiol. Plant* 30:709-714.
- 3- Alam M.J., Alam I., Sharmin S.A., Rahman M.M., Anisuzzaman M., and Alam M.F. 2010. Micropropagation and antimicrobial of *Opeculina turpethum* an endangered medicinal plant. *Plant Omics Journal* 3:40-46.
- 4- Altan F., Burun B., and Sahin N. 2010. Fungal contamination observed during micropropagation of *Lilium candidum* L. and the effect of chemotherapeutic substance applied after sterilization. *African Journal of Biotechnology* 9:991-995.
- 5- Bond S., and Alderson P.G. 1993. The influence of apical dominance on the *in vitro* multiplication of the rhizome of *Alesteromeria*. *J. Hort. Sci.* 68:905-910.
- 6- Chiari A., and Bridgen M.P. 2000. Rhizome splitting: a new micropropagation technique to increase *in vitro* propagule yield in *Alstroemeria*. *Plant Cell Tissue and Organ Culture* 62:39-46.
- 7- Gabryszewska E. 1995. Plant regeneration of *Alstroemeria in vitro*. *Acta. Agrobotanica* 48:95-104.
- 8- Gabryszewska E., and Hempel M. 1985. The influence of cytokinins and auxins on *Alesteromeria* in tissue culture. *Acta. Hort.* 167:295-300.
- 9- Hakkaart F.A., and Versluijs J.M.A. 1988. Virus elimination by meristem tip culture from a range of *Alesteromeria* cultivars. *Neth. J. Plant Pathol.* 94:49-56.
- 10- Kashif M., Sajid G.M., and Anwar R. 2005. Effect of duration of mercuric chloride treatment on culture viability, contamination and mortality of various accessions of grapes. *Sarhad. J. Agric.* 21:25-28.
- 11- Khaleghi A., Sahrarou A., Rasoulnia I.N., and Ataei R. 2008. *In vitro* propagation of *Alstromeria* cv. Fuego. *American Eurasian Journal of Agriculture and Environmental Science* 3:492-497.
- 12- Lin H.S., De Jue M.J., and Jacobsen E. 1997. Direct shoot regeneration from excised leaf explants of *in vitro* grown seedlings of *Alstromeria* L. *Plant Cell Tissue and Organ Culture* 16:770-774.
- 13- Lin H.S., De Jue M.J., and Jacobsen E. 2000. The application of leafy explant micropropagation protocol in enhancing the multiplication efficiency of *Alstroemeria*. *Scientia Horticulture* 87:307-318.
- 14- Lin W.C., and Monette P.L. 1987. *In vitro* propagation of *Alstroemeria Alsaan*. *Plant Cell Tissue and Organ Culture* 9:29-35.
- 15- Pederson C., and Brandt K. 1992. A method for disinfection of underground rhizome tips of *Alesteromeria* and *Heliconia*. *Acta. Hort.* 325:499-504.
- 16- Pedraz Santos M.E., Lopez Peralta M.C., Gonzalez Hernandez V.A., Engleman Clark E.M., and P. Sanchez Garcia. 2005. *In vitro* regeneration of *Alstroemeria* cv Yellow King by direct organogenesis. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 84: 189-198.
- 17- Reed B. M., Buckley P.M., and Dewilde T.N. 1994. Detection and eradication of endophytic bacteria from micropropagated mint plants. *In Vitro Cell. Dev. Biol.* 31:53-57.
- 18- Salehi H., and Khosh-Khui M. 1997. A simple procedure of disinfection of 'Baby Masquerade' of miniature rose explants. *Sci. Hortic.* 68:145-148.
- 19- Sondi I., and Salopek-Sondi B. 2004. Silver nano particles as antimicrobial agent: A case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. *J. Colloid Interface. Sci.* 275:177-182.
- 20- Van Zaayen A. 1995. *Virus and Virus-Like Diseases of Bulb and Flower Crops*. Wiley Publishers, Chichester, West Sussex, UK, 237-249.
- 21- Zhang L.Z., Wei N., Wu Q.X., and Liping M. 2007. Anti-oxidant response of *Cucumis sativus* L. to fungicide carbendazim. *Pesticide Biochemistry and Physiology* 89: 54-59.