



تأثیر چند نوع بستر و غنی‌سازی بر برخی خصوصیات قارچ دارویی شی‌تاکه (*Lentinula edodes*)

محدث رضا بیرانوند^۱ - ناصر عالم زاده انصاری^۲ - سید کریم موسوی^۳ - عیدی بازیگر^۴

تاریخ دریافت: ۸۹/۹/۲۵

تاریخ پذیرش: ۹۱/۲/۵

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نوع بستر و غنی‌سازی آن بر کارآیی بیولوژیکی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قارچ دارویی شی‌تاکه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار طی سال ۱۳۸۸ در شهرستان خرم‌آباد لرستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل (الف) نوع بستر در سه سطح (۱- کاه و کلش نخود، ۲- خاک‌اره و ۳- کاه و کلش گندم) و (ب) نوع غنی‌ساز در چهار سطح (۱- باگاس نیشکر، ۲- ملاس چندر، ۳- سوس برج و ۴- شاهد بدون غنی‌ساز) بود. کارآیی بیولوژیکی قارچ دارویی شی‌تاکه روی بستر خاک‌اره به ترتیب ۴۸ و ۷۲ درصد بیشتر از کارآیی آن روی بستر کاه و کلش حبوبات و گندم بود. غنی‌ساز سبوس برج در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش ۵۵ درصد کارآیی بیولوژیکی قارچ شی‌تاکه گردید. غنی‌سازهای باگاس نیشکر و ملاس چندر در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش معنی‌دار کارآیی بیولوژیکی قارچ دارویی شی‌تاکه نگردیدند. در بین بسترهای مورد مطالعه بیشترین درصد هیدرات کربن در اندام قارچ مربوط به بستر خاک‌اره به میزان ۵۷/۷ درصد بود. بالاترین سطح هیدرات کربن قارچ (۶۳/۳ درصد) به غنی‌ساز سبوس برج مربوط بود که نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و همچنین نسبت به دو غنی‌ساز دیگر کاملاً معنی‌دار بود. تأثیر نوع بستر بر میزان چربی قارچ معنی‌دار نبود. بالاترین سطح چربی (۳/۳ درصد) به غنی‌ساز سبوس برج مربوط بود. غنی‌ساز سبوس برج نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و غنی‌سازهای ملاس چندر و باگاس نیشکر به ترتیب، ۵۰ و ۵۷ درصد موجب افزایش چربی قارچ گردید.

واژه‌های کلیدی: قارچ دارویی شی‌تاکه، کارآیی بیولوژیکی، بستر، غنی‌ساز

جهان دارا می‌باشد (۹).

مقدمه

رویز و همکاران (۱۰) تأثیر بسترهای مختلف را بر روی اندازه قارچ تولیدی، میزان عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ شی‌تاکه بررسی کردند، که در ان پژوهش از خاک‌اره چوب درختان بلوط به عنوان بستر اصلی و از نسبتهای مختلف کاه و کلش گندم (صفر، ۸، ۱۶ درصد) به عنوان غنی‌ساز استفاده نمودند، و در نهایت به این نتیجه دست یافتدند که ترکیب خاک‌اره چوب درختان بلوط با ۱۶ درصد کاه و کلش گندم دارای بیشترین میزان کارآیی بیولوژیکی، عملکرد و بیشترین اندازه اندام میوه‌ای بود (۸).
یانگ و وورال (۱۲) تحقیقی را در خصوص تاثیر بسترهای مختلف (خاک‌اره، تفاله سبب و مخلوط خاک‌اره و تفاله سبب) بر روی قارچ شی‌تاکه انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل بالا بودن میزان نیتروژن در تفاله سبب و بالا بودن میزان کربن در خاک‌اره، قارچ شی‌تاکه دارای بیشترین سرعت میسیلیومرانی، پین‌دهی و بیشترین میزان تشکیل اندام میوه‌ای بود.

عصاره قارچ دارویی شی‌تاکه حاوی چندین پلی‌ساکارید دارویی شناخته شده است که در درمان بیماران خاص فوق العاده موثر می‌باشند، یک نمونه از این پلی‌ساکاریدها شناخته شده هیدروکربین لنتینان می‌باشد، که این ماده به فرمول شیمیایی $(C_6H_{10}O_5)_n$ از اندام میوه‌ای قارچ استخراج گردیده و خاصیت ضد سرطانی و آنتی‌تومور بودن آن به اثبات رسیده است (۱۱). تولید قارچ دارویی شی‌تاکه به دلیل اهمیت غذایی فراوان و خصوصیت دارویی آن بعد از قارچ دکمه‌ای (*Agaricus bisporus*) مقام دوم را از نظر تولید در

۱- کارشناس ارشد یاغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

۲- دانشیار گروه علوم یاغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

۳- مریب پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

(*)- نویسنده مسئول: (Email: skmousavi@gmail.com)

۴- اسدآبادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

پرورش داده می‌شود. یافتن بسترهای مناسب برای کاشت کیسه‌های آن و تحت شرایط کنترل شده قابل پرورش باشد برای تولید در داخل کشور بسیار مناسب خواهد بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید. تعداد تکرار در این آزمایش به دلیل حساسیت فوق العاده قارچ به عوامل بیماری‌زا به تعداد ۶ تکرار انتخاب گردید که در این حالت هر کدام از بسترهای به محض آلوهه شدن حذف می‌گردید و در نهایت در مرحله تکمیل شدن رشد رویشی ۴ تکرار برای هر تیمار انتخاب گردید. تیمارهای آزمایش شامل فاکتورهای (الف) نوع بسته در سه سطح ۱- کاه و کلش نخود، ۲- خاکاره و ۳- کاه و کلش گندم و (ب) نوع غنی‌ساز در چهار سطح ۱- باگاس نیشکر (به نسبت ۳۰ درصد وزن خشک بستر)، ۲- ملاس چغندر (به نسبت ۲۵ درصد وزن خشک بستر) و ۴- شاهد بدون غنی‌ساز بود.

اسپان مورد نیاز قارچ دارویی شی تاکه از مؤسسه تولید قارچ سپیدان تهران تهیه و تا زمان شروع به کار در طبقات پایین یخچال و دمای ۳-۵ درجه سانتی گراد نگهداری شد. اسپان این قارچ در این دما به مدت ۱-۲ ماه قابل نگهداری می‌باشد برای تکثیر اسپان از بذور گندم استفاده گردید، به این طریق که ابتدا دانه‌های گندم خوب شسته شدند و سپس همراه با آب به مدت ۱۵ دقیقه خوب جوشانیده شدند و سپس ۱۰-۲۰ دقیقه دیگر در آب جوش باقی مانده تا کاملاً نرم شدند و پس از خنک شدن بر روی یک پارچه توری و خروج آب اضافی به آنها مقدار ۲ درصد سولفات کلسیم هیدراته و ۵/۰ درصد کربنات کلسیم به آنها اضافه گردید. سولفات کلسیم برای جلوگیری از چسبیدن دانه‌ها به هم و کربنات کلسیم برای تامین pH مناسب می‌باشد. بعد از این مرحله مقدار ۳۰۰-۲۰۰ گرم را در هر کیسه پلاستیکی برشته و آنها را در داخل اتوکلاو به مدت ۲ ساعت و در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد گذاشتند و پس از استریل اقدام به مایه‌کوبی نموده و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در داخل انکوباتور نگهداری گردید که پس از ۲ هفته میسلیوم سطح دانه‌ها را تقریباً پوشاند و برای تلقیح بستر کاملاً آماده شدند (۱).

بسترهای کاشت شامل خاکاره که از کارخانه‌های صنایع چوب، کاه و کلش گندم و نخود که از روستاهای اطراف شهرستان تهیه شد و تهیه غنی‌سازها شامل باگاس نیشکر از طریق کارخانه کاغذ پارس خوزستان و ملاس چغندر را از کارخانه الكل سازی ویسیان تهیه شد، سبوس برنج نیز از کارخانه‌های شالیکوبی مناطق برنج کاری ویسیان آماده گردید.

پس از تهیه بسترهای غنی‌سازها ابتدا اقدام به خرد نمودن کاه

نوائز و همکاران (۲۰۰۵) میزان عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ شی تاکه را بر روی بسترهای مختلف شامل خاکاره، تراشه‌های چوب و شلتوك برنج و مخلوطی از هر کدام از این بسترهای مورد بررسی قرار دادند، و در نهایت نتیجه‌گیری نمودند که بسترهای با ترکیب خاکاره، تراشه‌های چوب و شلتوك برنج با هم به دلیل داشتن سطوح بالای پروتئین و کربوهیدرات در شلتوك برنج و خاکاره دارای بیشترین میزان کارآیی بیولوژیکی و بهترین عملکرد بود.


لچنر و آبرتو (۴) میزان عملکرد و کارآیی بیولوژیکی قارچ شی تاکه را بر روی بسترهای مختلفی که شامل؛ کاه و کلش گندم، ترکیب خاکاره با بلغور گندم و ترکیب کاه و کلش گندم و بلغور گندم و جو بود مورد بررسی قرار دادند که در نهایت مشخص گردید که قارچ شی تاکه بر روی بسترهای خاکاره با بلغور گندم و جو دارای بیشترین میزان عملکرد و بالاترین کارآیی بیولوژیکی بود.

فیلیپویس و همکاران (۷) دوره رشد و نمو محصول، عملکرد، کارآیی بیولوژیکی و سرعت میسلیوم رانی در قارچ شی تاکه را بر روی بسترهای مختلف که شامل؛ کاه و کلش گندم، کاه و کلش ذرت و خاکاره درختان بلوط بود مورد مطالعه قرار دادند و نتایج تحقیق آنان نشان داد که تولید اندام میوه‌ای و کارآیی بیولوژیکی در بسترهای کاه و کلش گندم دارای بالاترین میزان بود. این محققان بیان نمودند که هرچه میزان نیتروژن در بستر بیشتر باشد فعالیت آنزیم‌های تجزیه کننده بستر بیشتر شده و در نتیجه سرعت رشد میسلیوم‌ها افزایش خواهد یافت و در نهایت بسترهای عملکرد محصول بیشتر خواهد شد، همچنین آنان اظهار نمودند که میزان عملکرد و دوره رشد محصول رابطه عکسی با میزان N:C بستر خواهد داشت. همچنین این محققان بیان نمودند که وجود بیشترین میزان پروتئین در اندام میوه‌ای قارچ تولید شده در بسترهای خاکاره به خاطر طولانی بودن دوره رشد محصول بر روی این بستر که منجر به جذب بهتر مواد غذایی گردیده است می‌باشد.

قارچ شی تاکه از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار است، میزان و نسبت عناصر موجود در قارچ به شدت تحت تأثیر بسترهای می‌گیرند (۱۱). کاه و کلش گندم، خاکاره، و کاه و کلش جوبات از جمله بسترهایی هستند که به صورت عموم و رایج موجود بوده و تهیه آنها در تمام نقاط کشور به راحتی امکان‌پذیر است. در این تحقیق با بکارگیری امکانات موجود در منطقه سعی بر آن شده است که بهترین بسترهای موجود را هم از لحاظ تولید با عملکرد بالا و هم از نظر خصوصیت کیفی قارچ تولیدی شناسایی و معرفی گردد و با توجه به این که تمام غنی‌سازهای موجود از میان مواد آلی بکار گرفته شده است و هیچ‌گونه استفاده‌ای از مواد شیمیایی نگردیده بنابراین استفاده از کشاورزی ارگانیک را نیز می‌توان یکی از اهداف این تحقیق دانست. از انجامی که تولید **SIRIUS** این قارچ در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن و چین روی کنده‌های درختان و در هوای آزاد

وزن گردید و داخل لوله‌های ویژه دستگاه ریخته شد و به هر رابط یک عدد قرص کاتالیزور (سولفات پتاسیم + سولفات مس) اضافه گردید، به منظور افزایش دمای جوش ۱۰ میلی‌لیتر اسید‌سولفوریک غلیظ اضافه گردید و سپس لوله‌ها در محل ویژه برای انجام مرحله هضم با استفاده از حرارت قرار گرفتند که این مرحله حدود ۱/۵-۲ ساعت به طول انجامید، پس از اینکه نمونه‌ها سبز متمایل به روش گردیدند برای خنک شدن نمونه‌ها آنها را در مکانی قرار داده و روی هر کدام ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر ریخته شد تا نمونه‌ها برای انجام عمل تقطیر با استفاده از جاذب ازت، اسید‌فسفریک و سود غلیظ و تیتراسیون آماده شدند، با قرار دادن هر کدام از لوله‌ها در محل مخصوص دستگاه عدد ۴/۳۸ مربوطه که نشانگر درصد نیتروژن بود قرائت و از ضریب تبدیل ۰/۳۸ برای تبدیل به میزان پروتئین استفاده شد (۲).

اندازه گیری میزان چربی قارچ با استفاده از دستگاه سوکسله انجام گردید. که در این روش مقدار ۵ گرم نیز پودر قارچ برای هر نمونه آماده شده و با استفاده از مقدار ۱۴۰ سی‌سی محلول شیمیابی بنز-۲-پتولیوم که به عنوان حلال چربی مورد استفاده قرار گرفت، نمونه با استفاده از کاغذ صافی و کارتوش درون بالون هضم قرار گرفته و درون دستگاه سوکسله قرار گرفت که بعد از ۴ ساعت از دستگاه خارج و درون انکوباتور قرار دادیم و بعد از آن به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه درون دیسیکاتور قرار گرفت و سپس وزن را یادداشت کرده و بر اساس فرمول میزان چربی محاسبه می‌گردد (۳).



شکل ۱- فلاش‌های مختلف برداشت قارچ شی تاکه

برای اندازه گیری میزان هیدرات کربن قارچ از روش رنگ‌سنگی استفاده گردید که در این روش میزان کل هیدرات کربن از طریق حل شدن در یک معرف (فنل‌سولفوریک اسید) و تولید رنگ سبز-آبی اندازه گیری می‌شود. طیف جذبی محلول پس از خنک شدن در محدوده ۶۲۰ نانومتر اندازه گیری شد. بین میزان جذب و مقدار هیدرات کربن رابطه خطی وجود دارد. با این روش می‌توان میزان کل هیدرات کربن موجود در نمونه را به دست آورد.

در این تحقیق برای تجزیه آماری اطلاعات از نرم‌افزار

کلش گندم و حبوبات به اندازه ۴-۵ سانتی‌متر کرده و پس از آن کار توزین دقیق بسترها و غنی‌سازها انجام و وزن آنها محاسبه شد و پس از خشک کردن در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت وزن خشک را محاسبه و به این طریق میزان رطوبت بسترها در غنی‌ساز به دست آمد. بعد از این مرحله اقدام به قرار دادن بسترها در داخل کیسه‌هایی از پارچه‌ای که دارای منافذ ریزی برای خروج رطوبت اضافی بودند قرار داده نموده و به مدت ۲۴ ساعت با استفاده از آب شرب که کاملاً تمیز و بهداشتی بوده اقدام به خیس نمودن بسترها نمودیم و بعد از آن نوبت به غنی‌سازها رسیده که بر اساس وزن تر بستر و میزان رطوبت ۷۰ درصد میزان غنی‌ساز مورد نیاز بر اساس وزن خشک محاسبه گردید و در کیسه‌های مخصوص قرار داده شد. به جز در مورد غنی‌ساز ملاس چندن مابقی غنی‌سازها را به مقدار مورد نظر بستر کاملاً مخلوط نموده و در کیسه‌های مخصوص این کار که قبلاً آماده شده بود ریخته، سپس در داخل یک بشکه تمیز که مقدار ۱۵۰ لیتر آب در داخل آن ریخته بودیم قرار داده و روی حرارت گذاشته شد تا بعد از جوش آمدن در حدود ۷۰ دقیقه بستر به همراه غنی‌ساز کاملاً ضدغونی گردید. در مورد ملاس چندن به دلیل محلول بودن آن به طور جداگانه با جوشاندن ضدغونی گردید و سپس با بستر مورد نظر مخلوط گردید. بعد از ضدغونی بسترها و غنی‌سازها آنها روی یک پارچه تمیز پهن نموده تا خنک شده و با توجه به اینکه در این وضعیت میزان رطوبت تیمارها کم و زیاد شده بود مجدداً وزن گردیده و به مقدار لازم به تیمارها رطوبت با استفاده از آب شرب اضافه گردید. بعد از اینکه بسترها به همراه غنی‌سازها آماده شدند با توجه به وزن بستر به همراه غنی‌ساز (۳ کیلوگرم) با ۵ درصد اسپان قارچ (۰/۱۵ گرم) با آن کاملاً مخلوط گردیده و آماده برای انتقال به آتاق انکوباسیون شدند. قبل از انتقال در کف کیسه‌های کشت ۴ سوراخ به قطر تقریبی ۲-۳ میلی‌متر به منظور خروج رطوبت اضافی ایجاد گردید و روی کیسه‌ها اتیکت که حاوی اطلاعات مورد نیاز تیمار از جمله نوع بستر و غنی‌ساز، زمان تلقیح، نوع تیمار و تکرار درج گردید.

نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از یک دستگاه ترازوی دیجیتالی دقیق با دقیق ۰/۰۱ گرم اندازه گیری شد. برای تعیین وزن خشک نمونه‌ها را در داخل پاکت مخصوص گذاشته و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۶۰-۷۰ درجه سانتی‌گراد خشک شده و اقدام به اندازه گیری وزن خشک آنها گردید. برای محاسبه کارآبی بیولوژیکی قارچ دارویی شی تاکه از فرمول زیر استفاده شد.

$$\text{برداشت شده} = \frac{\text{وزن خشک بستر به کار رفته}}{\text{وزن تر اندام میوه ای}} \times 100$$

برای تعیین مقدار پروتئین قارچ از دستگاه اندازه گیری نیتروژن (کجلدال) استفاده گردید. ابتدا قارچ‌های خشک شده کاملاً پودر شده سپس ۰/۳ گرم از هر نمونه قارچ پودر شده با ترازوی دیجیتالی

مشابه در خصوص ژایر بستر بر کارآبی بیولوژیکی قارچ گرفتند، خاک اره درختان بلوط به عنوان بستر بیشترین کارآبی بیولوژیکی را در قارچ شی تاکه تولید نمودند.

بالاترین سطح کارآبی بیولوژیکی قارچ (۷۵/۵ درصد) به غنی‌ساز سبوس برنج اختصاص داشت، و غنی‌ساز سبوس برنج در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش ۵۵ درصد کارآبی بیولوژیکی قارچ شی تاکه گردید.

کارآبی بیولوژیکی غنی‌ساز سبوس برنج به طور معنی‌داری بیشتر از شاهد بدون غنی‌ساز و سایر مواد غنی‌ساز مورد استفاده گردید، بر عکس غنی‌ساز سبوس برنج غنی‌سازهای باگاس نیشکر و ملاس چغندر در مقایسه با شاهد بدون غنی‌ساز سبب افزایش معنی‌دار کارآبی بیولوژیکی قارچ دارویی شی تاکه نگردیدند (جدول ۳). روسی و همکاران (۸) با انجام آزمایش کارآبی بیولوژیکی قارچ شی تاکه روی بستر باگاس نیشکر با غنی‌ساز سبوس برنج به نتیجه مشابه دست یافت. در این آزمایش غنی‌ساز سبوس برنج بیشترین کارآبی بیولوژیکی (۹۸/۴ درصد) را تولید نمود.

MSTATC و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون LSD با سطح احتمال ۵ درصد استفاده گردید. برای رسم نمودارها از برنامه Excel استفاده شد.

نتایج و بحث

کارآبی بیولوژیکی قارچ

بر اساس نتایج آنالیز واریانس تأثیر بستر، غنی‌ساز و بر کارآبی بیولوژیکی قارچ دارویی شی تاکه کاملاً معنی‌دار بود ولی اثر مقابل آنها معنی‌دار نبود (جدول ۱). در بین بسترهای مورد استفاده بالاترین سطح کارآبی بیولوژیکی (۷۴/۶ درصد) مربوط به بستر خاک اره بود، و کارآبی بیولوژیکی بستر یادشده به طور معنی‌داری بیشتر از بسترهای دیگر بود به طوری که کارآبی بیولوژیکی قارچ دارویی شی تاکه روی بستر خاک اره به ترتیب ۷۲ و ۴۸ درصد بیشتر از کارآبی بیولوژیکی آن روی بستر کاه و کلش جبویات و گندم بود، بین بسترهای کاه و کلش گندم و جبویات از نظر کارآبی بیولوژیکی قارچ شی تاکه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (جدول ۲). رویز و همکاران (۱۰) نتیجه

جدول ۱ - نتایج تجزیه واریانس داده‌های کارآبی بیولوژیکی، درصد هیدرات کربن، درصد چربی و درصد پروتئین خام قارچ شی تاکه

منابع تغییرات	درجہ آزادی	کارآبی بیولوژیکی	درصد هیدرات کربن	درصد چربی	درصد پروتئین خام	میانگین مربعات
بستر	۲	۴۳۰/۶	۱۸۲/۲۸۱	*	*	۴/۶۸۸
غنی‌ساز	۳	۲۰۹۴/۷	۴۹۴/۰۶۸	**	۴/۴۶۷	۵۰/۴۶۷ **
اثر مقابل بستر × غنی‌ساز	۶	۲۴۹/۴	۱۷/۵۵۵	ns	۰/۰۹۳	۱/۸۹۶ ns
خطا	۳۶	۲۳۱/۷	۵۳/۳۸۸	*	۰/۱۲۳	۰/۹۷۳
ضریب تغییرات (درصد)	۱	۲۷/۱	۱۳/۵۱	*	۱۴/۴۸	۸/۰۶

*: معنی‌داری در سطح ۵ درصد، **: معنی‌داری در سطح ۱ درصد و ns: غیرمعنی‌دار

جدول ۲ - میانگین کارآبی بیولوژیکی، درصد هیدرات کربن، درصد چربی و درصد پروتئین خام قارچ شی تاکه روی بسترهای مختلف

نوع بستر	کارآبی بیولوژیکی (درصد)	درصد هیدرات کربن	درصد چربی	درصد پروتئین خام
کاه و کلش گندم	۵۰/۳۰ b	۵۱/۰۳ b	۲/۲۴۴ b	۱۲/۸۶ a
خاک اره	۷۴/۶۲ a	۵۷/۲۱ a	۲/۴۶۲ ab	۱۱/۹۳ b
کاه و کلش نخود	۴۳/۲۸ b	۵۲/۵۳ ab	۲/۵۴۴ a	۱۱/۹۳ b

در هر ستون تفاوت حروف گویای اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد براساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.

جدول ۳ - میانگین کارآبی بیولوژیکی، درصد هیدرات کربن، درصد چربی و درصد پروتئین خام قارچ شی تاکه برای غنی‌سازهای مختلف

نوع بستر	کارآبی بیولوژیکی (درصد)	درصد هیدرات کربن	درصد چربی	درصد پروتئین خام
شاهد بدون غنی‌ساز	۴۸/۲۹ b	۴۸/۳۹ b	۲/۰۵۸ b	۱۰/۵۶ c
باگاس نیشکر	۵۳/۴۰ b	۵۲/۱۷ b	۲/۱۰۸ b	۱۱/۳۹ b
ملاس چغندر	۴۷/۲۱ b	۵۲/۴۹ b	۲/۲۰۰ b	۱۱/۷۸ b
سبوس برنج	۷۵/۵۰ a	۶۳/۳۰ a	۳/۳۰۰ a	۱۵/۲۲ a

در هر ستون تفاوت حروف گویای اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد براساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.

دیگر کاملاً معنی دار بود. غنی ساز سبوس برنج نسبت به شاهد بدون غنی ساز، غنی ساز با گاکس نیشکر و ملاس چفتدر به ترتیب ۲۰، ۳۰ و ۲۱ درصد میزان هیدرات کربن را در قارچ افزایش داد، و دو غنی ساز با گاکس نیشکر و ملاس چفتدر نسبت به هم و همچنین نسبت به شاهد بدون غنی ساز تفاوت معنی داری نداشتند (جدول ۳). مانعیرو و راسی (۲۰۰۲) بیان نمودند که بالا بودن میزان هیدرات کربن، اسیدهای آمینه و مواد معدنی در سبوس برنج عامل مهم افزایش تاثیر آن در راندمان قارچ و بالا بودن هیدرات کربن می باشد.

بالاترین سطح میزان هیدرات کربن قارچ (۶۴/۹۳ درصد) مربوط به تیمار خاکاره و سبوس برنج بود و کمترین میزان هیدرات کربن (۴۳/۳۸ درصد) مربوط به تیمار کاه و کلش گندم بدون غنی ساز بود (شکل ۳). بالا بودن میزان کربن در بستر خاکاره (۱۲) و سبوس برنج (۶)، می تواند علت افزایش میزان هیدرات کربن در این تیمار باشد.

میزان چربی اندام میوه ای


تاثیر بستر، غنی ساز و بر میزان چربی قارچ دارویی شی تاکه کاملاً معنی دار بود ولی اثربخشی آنها معنی دار نبود (جدول ۱). بیشترین میزان چربی قارچ (۲/۵ درصد) مربوط به بستر کاه و کلش حبوبات و کمترین میزان چربی (۲/۲ درصد) مربوط به کاه و کلش گندم بود (جدول ۲). سولولمان ویسر (۲۰۰۲) میزان چربی را در قارچ دارویی شی تاکه ۳-۴ درصد به دست آورد، که با توجه به پایین بودن میزان چربی در بسترهای مورد آزمایش می توان چنین نتیجه گرفت که بسترهای توانایی لازم در افزایش میزان چربی قارچ را نداشته اند.

بالاترین سطح کارآیی بیولوژیکی (۹۱/۹ درصد) به تیمار بستر خاکاره با غنی ساز سبوس برنج مربوط بود (شکل ۲). نواتر و همکاران (۲۰۰۵)، تأثیر متقابل بستر و غنی ساز را بر کارآیی بیولوژیکی قارچ دارویی شی تاکه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل معنی دار بود. بیشترین کارآیی بیولوژیکی قارچ مربوط به بستر خاکاره و غنی ساز سبوس برنج بود.


میزان هیدرات کربن قارچ دارویی شی تاکه

تاثیر بستر، غنی ساز و بر درصد هیدرات کربن قارچ دارویی شی تاکه کاملاً معنی دار بود ولی اثربخشی آنها معنی دار نبود (جدول ۱). در بین بسترهای مورد مطالعه بستر خاکاره با تولید قارچ دارای ۵۷/۷ درصد هیدرات کربن دارای بیشترین میزان هیدرات کربن بود. بستر خاکاره ۱۳ درصد نسبت به بستر کاه و کلش حبوبات و ۷ درصد نسبت به کاه و کلش گندم میزان هیدرات کربن بیشتری در قارچ تولید نمود. بر اساس آزمون مقایسه میانگین LSD در سطح ۵ درصد، دو بستر دیگر یعنی کاه و کلش گندم و حبوبات از نظر درصد هیدرات کربن قارچ تولیدی با هم تفاوت معنی داری نداشتند (جدول ۲). یانگ و وورال (۱۲) بالا بودن میزان کربن در ترکیب خاکاره را دلیل بر افزایش میزان هیدرات کربن قارچ و افزایش میزان راندمان قارچ شی تاکه دانستند.

بر اساس نتایج آزمون میانگین LSD بالاترین میزان هیدرات کربن قارچ (۶۳/۳ درصد) مربوط به غنی ساز سبوس برنج بود که نسبت به شاهد بدون غنی ساز و همچنین نسبت به دو غنی ساز




شکل ۲- میانگین کارآیی بیولوژیکی قارچ شی تاکه روی بسترهای مختلف با مواد غنی ساز متفاوت تفاوت حروف گویای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد بر اساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.



شکل ۳- میانگین هیدرات کربن قارچ شی‌تاكه روی بسترهای مختلف با مواد غنی‌ساز متفاوت. تفاوت حروف گویای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد براساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.

بالاترین میزان چربی در قارچ دارویی شی‌تاكه (۳/۵ درصد) مربوط به تیمار بستر خاک اره و غنی‌ساز سبوس برنج و کمترین میزان چربی (۱/۹ درصد) مربوط به تیمار بستر خاک اره و غنی‌ساز ملاس چفتورقد بود (شکل ۴). افزایش میزان چربی در تیمار فوق به خاطر بالا بودن میزان اسیدهای چرب در سبوس برنج بوده و ملاس چفتورقد از میزان اسیدهای چرب پایین‌تر بوده است (۵).

بالاترین سطح چربی (۳/۳ درصد) مربوط به غنی‌ساز سبوس برنج بود. بر اساس آزمون مقایسه میانگین LSD غنی‌ساز سبوس برنج به طور معنی‌داری نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و دو غنی‌ساز دیگر باعث افزایش میزان چربی قارچ گردید، غنی‌ساز سبوس برنج نسبت به شاهد بدون غنی‌ساز و غنی‌سازهای ملاس چفتورقد و باگاس نیشتر به ترتیب ۵۷ و ۵۰ درصد موجب افزایش چربی قارچ گردید (جدول ۳). بالا بودن میزان اسیدهای چرب در سبوس برنج می‌تواند علت اصلی افزایش چربی قارچ حاصل از این غنی‌ساز باشد (۵).



شکل ۴- میانگین درصد چربی قارچ شی‌تاكه روی بسترهای مختلف با مواد غنی‌ساز متفاوت. تفاوت حروف گویای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد براساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.

خاک ارده و غنی ساز سبوس برج میزان پروتئین (۱۰/۰۲) درصد) مربوط به تیمار خاک ارده و ملاس چغندر می باشد (شکل ۵). بر اساس نتایج آزمایشات نوانز و همکاران (۲۰۰۵) و فیلوبسیس و همکاران (۷) بالا بودن میزان اسیدهای آمینه در سبوس برج و بالا بودن سطوح هیدرات کربن در بستر خاک ارده و نیز طولانی بودن دوره رشد بر روی بستر خاک ارده علت اصلی بالا بودن میزان پروتئین در این تیمار می تواند باشد.


براساس نتایج این پژوهش به طور کلی بستر خاک ارده برای کاشت قارچ دارویی شی تاکه به روش کاشت کیسه ای با توجه به نتیجه آزمایش بسیار مطلوب است، اما این بستر بایستی قبل از این که مورد استفاده قرار گیرد خوب ضد عفونی گردیده و در نهایت غنی سازی شود. غنی ساز سبوس برج به دلیل داشتن مواد آلی و معدنی مهم از جمله اسیدهای آمینه می تواند برای تولید قارچ دارویی شی تاکه یک غنی ساز بسیار مثمر ثمر باشد. استفاده از بستر کاه و کلش گندم نسبت به کاه و کلش حبوبات از راندمان تولید بهتری برخوردار می باشد. استفاده از غنی سازهای باگاس نیشکر و ملاس چغندر در بیشتر صفات اندازه گیری شده تفاوت معنی داری با شاهد بدون غنی ساز نداشتند.

میزان پروتئین اندام میوه ای قارچ

تأثیر بستر، غنی ساز و بر میزان چربی قارچ دارویی شی تاکه کاملاً معنی دار بود ولی اثر متقابل آنها معنی دار نبود (جدول ۱). بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین LSD بالاترین میزان پروتئین (۱۲/۸) درصد) مربوط به بستر کاه و کلش گندم بود، و بین بسترها خاک ارده و کاه و کلش حبوبات تفاوت معنی داری از نظر تولید پروتئین وجود نداشت (جدول ۲). فیلوبسیس و همکاران (۷) طولانی بودن رشد و نمو قارچ را بر روی بستر خاک ارده علت بالا بودن میزان پروتئین قارچ روی این بستر بیان نمودند.

بالاترین درصد پروتئین (۱۵/۲۲) مربوط به غنی ساز سبوس برج بود، و دو غنی ساز باگاس نیشکر و ملاس چغندر نسبت به شاهد معنی دار بودند؛ ولی نسبت به همیگر اختلاف معنی دار نداشتند، در نهایت اینکه غنی ساز سبوس برج نسبت به شاهد بدون غنی ساز و غنی ساز باگاس نیشکر و ملاس چغندر به ترتیب ۴۴، ۲۹ و ۳۴ درصد میزان پروتئین بالاتری تولید نمودند (جدول ۳). نوانز و همکاران (۲۰۰۵) میزان بالا بودن سطوح پروتئین را در سبوس برج علت اصلی افزایش راندمان قارچ دانستند، که ما در این آزمایش به نتیجه مشابه ای دست یافته ایم.

بیشترین سطح پروتئین قارچ (۱۵/۵۸) مربوط به تیمار



شکل ۵- میانگین پروتئین خام قارچ شی تاکه روی بسترها مختلف با مواد غنی ساز متفاوت. تفاوت حروف گویای اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد براساس آزمون مقایسه میانگین LSD است.

منابع

- محمدی گل تپه ا. و پورجم ا. ۱۳۸۴. اصول پرورش قارچ های خوارکی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ۶۲۶ صفحه.
- Gu Y.H., and Belury M.A. 2005. Selective including of apoptosis in murine skin carcinoma cells (CH72) by an ethanol extract of Lentinula edodes. Cancers Letters. 220: 21-28.
- Konuk M., Afyon A., and Yagiz D. 2006. Chemical composition of some naturally growing and edible mushroom. Botanical Jurnal, 38(3):799-804.

- 4- Lechner B.E., and Papinutti V.L. 2007. Production of lignocellulosic enzymes during growth and fruiting of the edible fungus *Lentinula edodes* on wheat straw. Process Biochemistry. 41: 594-598.
- 5- Lee C.C., Wong D.W.S., and Robertson G.H. 2001. Cloning and characterization of two cellulose genes from *Lentinula edodes*. FEMS Microbiology Letters, 205: 355-360.
- 6- Lin C.C., Hsieh P.C., Mau J.L., and Teng D.F. 2005. Construction of an intergeneric fusion from shizosaccharomyces pombe and *Lentinula edodes* for xylan degradation and polyol production. Enzyme and Microbial Technology, 36: 67-117.
- 7- Philippoussis A., Diamantopoulou P., and Israilides C. 2007. Productivity of agricultural residues used for the cultivation of the medicinal fungus *Lentinula edodes*. International Biodeterioration and Biodegradation 59: 216-219.
- 8- Rossi I.H., Monterio A.C., Machado J.O., Andrioli J.L., and Barbosa J.C. 2003. Shiitake (*Lentinula edodes*) production on a sterilized bagasse substrate enriched with rice bran and sugarcane molasses. Brazilian Journal of Microbiology. 34: 66-71.
- 9- Royse D.J., and Sanchez-Vazquez J.E. 2001. Influence of substrate wood chip particle size on shiitake (*Lentinula edodes*) yield. Bioresource Technology, 76: 229-233.
- 10- Royse D.J., and Sachez J.E. 2007. Ground wheat straw as a substitute for oak wood chips used in shiitake (*Lentinula edodes*) substrate formulae. Bioresource Technology, 98: 2137-2141.
- 11- Wasser S.P. 2005. Shiitake (*Lentinus edodes*) pages 653-664. in Encyclopedia of Dietary Supplements Marcel Dukker Ink.
- 12- Yang C.S., and Worrall J.J. 1992. Shiitake and oyster mushroom production on apple pomace and sawdust. HortScience 27: 1131-1133.