

تغییرات کربوهیدرات برگ و میوه شلیل رقم ردد گلد در طول فصل رشد در شرایط آب و هوایی گرگان

کامبیز مشایخی^۱- حسین صادقی^۲- وحید اکبرپور^{۳*}- صادق آتشی^۴- یوسف قاسمی^۵- سید جواد موسوی زاده^۶

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۰/۱۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱۳

چکیده

چرخش کربوهیدرات بین بخش‌های رویشی و زایشی درختان میوه از عوامل تعیین کننده عملکرد و کیفیت میوه می‌باشد. به طوری که در زمان‌های مختلف فصل رشد دچار تغییرات می‌شود. ازین‌رو هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی نحوه تغییر کربوهیدرات در طول یک فصل رشد بین برگ و میوه شلیل است. بدین منظور ابتدا ۸ درخت شلیل رقم رد گولد بصورت تصادفی در باغ انتخاب گردید و پس از اتیکت گذاری، دو درخت دو به دو با هم ترکیب گردید تا نمونه‌برداری جهت انجام آزمایش‌ها با چهار تکرار انجام شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بیشترین وزن تر و خشک برگ به ترتیب با $\frac{9}{3}$ و $\frac{2}{3}$ گرم در آخرین مرحله برداشت حاصل گردید. نسبت وزن تر به خشک برگ روند نزولی را طی می‌کند که می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که میزان بیomas برگ در مراحل ابتدایی برداشت کم بوده و به تدریج افزایش می‌یابد. میزان کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل ab در آخرین مرحله برداشت در حداقل مقدار خود قرار داشت. میزان قند کل برگ در مرحله دوم و سوم برداشت روندی صعودی داشت و در مرحله پایانی مجدد روند نزولی را نشان داد. مقدار کلروفیل میوه نیز همگام با بلوغ و رسیدن میوه کاهش یافته است و آتونوسیانین میوه نیز روند صعودی را نشان داد. قند کل میوه در مرحله سوم یا همان دو هفته بعد از سخت شدن هسته نسبت به مراحل قبل کاهش یافت اما مجدداً در مرحله پایانی مقدار آن افزایش یافت. تغییرات میزان ساکارز نشان می‌دهد که در اوائل رشد میوه مقدار آن نسبت به مراحل بعدی بیشتر است و با نزدیک شدن به مراحل پایانی مقدار آن کاهش می‌یابد در حالی که میزان قند کل در مرحله چهارم نسبت به مرحله سوم برداشت افزایش یافته است.

واژه‌های کلیدی: شلیل، کربوهیدرات، قند کل، کلروفیل، ساکاروز

مقدمه

۶۰ درصد اندازه نهایی بررسید ادامه می‌یابد (۲۲). در مراحل اولیه رشد برگ‌ها میزان سنتز کلروفیل، پروتئین و ترکیبات ساختاری بالا بوده تا مقدار انرژی مورد نیاز برای فعالیت‌های متابولیکی بالا در اوائل فصل را تأمین کند (۱۲). در اوائل فصل رشد قسمت‌های رویشی و زایشی گیاه تا تکامل سطح فتوستتری برگ‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند (۱۵). برگ‌های انتهایی با اندازه کامل کربوهیدراتها را به سمت جوانترین برگ‌ها صادر می‌کنند و برگ‌های پایین کربوهیدراتها را به ساخته‌ها و ریشه‌ها می‌فرستند و برگ‌های میانی در هر دو جهت کربوهیدراتها را انتقال می‌دهند (۶). مقدار ساکارز در میوه هلو جوان کم است اما افزایش سریعی ۷۰ درصدی در مرحله بلوغ نسبت به قند محلول کل اتفاق می‌افتد (۱۶). از طرفی گزارش کردن که بیشترین تجمع ساکارز در طول مرحله بلوغ اتفاق می‌افتد در همه واریته‌ها در اوایل تا اواخر مرحله بلوغ و همچنین در بعضی واریته‌ها فروکتوز همراه با ساکارز تجمع می‌یابد (۱۷). در تحقیق حاضر به بررسی نحوه تغییر و چرخش

برگ‌ها منبع اصلی تجمع و تثبیت دی اکسید کربن در گیاهان هستند سرعت فتوستتر معمولاً در برگ‌های جوان پایین است و با افزایش سطح برگ افزایش می‌یابد (۲۴). در مراحل اولیه رشد برگ‌ها خودشان عنوان یک مصرف کننده عمل می‌کنند و مقدار رشد آنها به ذخیره مواد وارد شده بستگی دارد و بعد از آن برگ‌ها به یک صادر کننده تبدیل می‌شوند. مصرف کنندگی برگ‌ها تا زمانی که به ۳۰ تا

۱- به ترتیب دانشیار و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باگبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲- به ترتیب استادیار و مریب گروه علوم باگبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

(*)- نویسنده مسئول: (Email: v_akbarpour@yahoo.com)

۵- پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان، ساری

۶- دانشجوی دکتری گروه علوم باگبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

مтанول اسیدی در هاون ساییده شده و بعد از اینکه بمدت ۲۴ ساعت در یخچال در تاریکی قرار گرفت در دستگاه سانتریوفیوژ مدل (2800uv/vis) در دور ۴۰۰۰ بمدت ۱۰ دقیقه قرار گرفت. سپس نمونه در طول موج ۵۲۰ نانومتر قرائت شد.

استخراج قندهای محلول: استخراج قندهای محلول با استفاده از روش اوموکولی (۲۷) انجام شد. در این روش ۴۰ میلی گرم از بقایای بافتی در لوله‌های پلی اتیلنی با ۵ میلی لیتر اتانول ۸۰٪ مخلوط و به مدت ۵ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۷۰°C قرار گرفت. عصاره‌های الكلی به دست آمده به مدت ۱۵ دقیقه در ۱۰۰۰×g سانتریوفیوژ گردید و محلول شفاف به دست آمده حاوی قندهای محلول به یک بشر منتقل شد و عمل فوق چهار مرتبه دیگر نیز بر روی بقایای بافتی به جا مانده تکرار گردید. در نهایت عصاره الكلی با در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد تغليظ شده و حجم آن به یک پنجم حجم اولیه رسید و از آن برای اندازه‌گیری انواع قندهای محلول استفاده شد.

اندازه‌گیری قند کل: برای اندازه‌گیری قند کل ۰/۰۰ میلی لیتر از عصاره تغليظ شده با ۳ میلی لیتر معرف آنترون مخلوط و به مدت ۲۰ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت. میزان جذب نور هر یک از نمونه‌ها پس از سرد شدن در طول موج ۶۲۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. منحنی استاندارد با استفاده از گلوكز در غلظت‌های مختلف ساخته می‌شود. نمونه فاقد گلوكز به عنوان شاهد در نظر گرفته می‌شود. در نهایت مقدار آن به صورت میکروگرم بیان بدست می‌آید (۲۸).

اندازه‌گیری ساکاروز: بدین منظور مقدار ۱/۰ میلی لیتر از عصاره الكلی تغليظ شده با ۱/۰ میلی لیتر محلول هیدروکسید پتاسیم ۳۰ درصد مخلوط شده و به مدت ۱۰ دقیقه در حمام آب گرم در دمای ۱۰۰°C قرار داده شد. پس از سرد شدن لوله‌ها ۳ میلی لیتر معرف آنترون به آن افزوده و به مدت ۲۰ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت. سپس جذب نور هر یک از محلول‌ها در طول موج ۶۲۰ نانومتر خوانده شد (۲۹). منحنی استاندارد نیز با استفاده از ساکارز به دست آمده و از نمونه فاقد ساکارز به عنوان نمونه شاهد استفاده گردید.

محتوای قام فنلی (فنل کل): محتوای قام فنلی با استفاده از واکنش گر فولین-سیوکالتیو اندازه‌گیری شد (۵). ۰/۵ میلی لیتر از هر عصاره (۱۰ میلی گرم / میلی لیتر) با ۵/۰ میلی لیتر محلول واکنش گر فولین-سیوکالتیو و ۰/۰۵ میلی لیتر از محلول ۱۰٪ کربنات سدیم مخلوط شده و سپس جذب آن در ۷۶۰ نانومتر پس از همزدن به مدت ۱ ساعت در مقابل بلانک قرائت شد. اسید‌گالیک بعنوان استاندارد برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شده و محتوای قام فنلی بر اساس اکی والان گالیک اسید در یک گرم عصاره خشک بیان گردید.

کربوهیدرات در طول یک فصل رشد بین اندامهای رویشی یا برگ و زایشی یا همان میوه گیاه پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها

تحقیق حاضر در گرگان با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و طول جغرافیایی ۵۳ درجه طی یکسال زراعی صورت گرفت. جهت انجام آزمایش ابتدا ۸ درخت شلیل رقم رد گولد بصورت تصادفی در باغ انتخاب گردید و اتیکت گذاری شد. سپس نمونه دو درخت دو به دو با هم ترکیب گردید تا مراحل آزمایشگاهی با چهار تکرار انجام شود. در هر مرحله از دو بخش میوه و برگ‌های قرار گرفته روی شاخه‌های یکسانه نمونه گیری شد. جهت نمونه گیری میوه و برگ از چهار جهت گیاه و به طور تصادفی انجام شد.

زمان نمونه گیری از مرحله تشکیل میوه (fruit set) شروع شد و بطور کلی از برگ‌ها در ۵ زمان مختلف و میوه نیز در ۴ زمان به صورت زیر برداشت شدند:

زمان نمونه گیری از برگ: ۱- اولین مرحله شروع تشکیل میوه ۲- مرحله دوم ۲ هفته بعد از تشکیل میوه ۳- مرحله سوم ۵ هفته بعد از تشکیل میوه یا در زمان سخت شدن هسته. ۴- مرحله چهارم نیز ۳ هفته بعد از مرحله سخت شدن هسته. ۵- در نهایت مرحله پایانی نیز ۶ هفته بعد از سخت شدن هسته میوه و زمانی که میوه به مرحله رسیدگی کامل رسید، انجام گردید.

زمان نمونه گیری از میوه: از آنجا که میوه در مرحله تشکیل میوه کوچک بوده و اندازه‌گیری صفات در این مرحله محدود نبود بنابراین اولین مرحله برداشت میوه همزمان با مرحله دوم برگ آغاز شد و مراحل بعدی نیز به ترتیب همزمان با نمونه گیری از برگ بود.

اندازه‌گیری صفات

جهت اندازه‌گیری وزن تر و خشک از ۱۵ عدد برگ میانی هر شاخه و از میوه نیز ۱۰ عدد انتخاب شده و در نهایت میانگین هر برگ بدست آمد.

اندازه‌گیری کلروفیل و کاروتینوئید: بعد از خرد کردن نمونه‌ها با آسیاب ۱ گرم نمونه تازه را وزن کرده و با ۲۰۰ سی سی استن ۸۰ درصد درهاؤن چینی له کرده سپس در سانتریوفیوژ در دور ۵۰۰۰ به مدت ۵ دقیقه قرار گرفت. در ادامه عصاره الكلی صاف شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل (2800uv/vis) در طول موجه‌ای ۴۸۰، ۵۱۰، ۵۴۵، ۶۴۳ نانومتر قرائت شدند. استن ۸۰ درصد به عنوان نمونه شاهد استفاده گردید.

اندازه‌گیری آنتوسیانین: ۱ گرم نمونه میوه با ۱۰ میلی لیتر

با استفاده از رویه Reg انجام شد. نمودارها در برنامه اکسل انجام شد.

نتایج و بحث

زمان‌های برداشت بر تمامی صفات مورد بررسی برگ دارای اثر معنی‌داری در سطح ۰/۰۱ بود (جدول ۱). بیشترین وزن تر و خشک برگ به ترتیب با ۹/۳ و ۳/۳ گرم در آخرین مرحله برداشت حاصل گردید (شکل ۱). بدینه است همزمان با رشد گیاه در طول فصل رشد، برگ‌ها به عنوان یک منبع فتوستراتی به عنوان تأمین کننده انرژی برای رشد بخش‌های رویشی گیاه و بخش‌های زایشی ضروری می‌باشند. نسبت وزن تر به خشک برگ روند نزولی را طی می‌کند که می‌تواند بیانگر این مطلب باشد که میزان بیوماس برگ در مراحل ابتدایی برداشت کم بوده و به تدریج افزایش می‌یابد.

اندازه گیری محتوای فلاونوئید: تهیه عصاره خشک به روش قبلی است. ۰/۵ سی سی از عصاره متانولی + ۱/۵ سی سی متانول + ۱/۰ سی سی آلومینیوم کلرید ۱۰٪ در اتانول (۱۰ گرم آلومینیوم کلرید در ۱۰۰ سی سی اتانول و آب مقطر) + ۰/۰ سی سی استات پتاسیم یک مولار (۲/۴۱ گرم در ۱۰ سی سی آب مقطر) + ۲/۸ سی سی آب مقطر. برای تهیه شاهد نیز به جای عصاره متانولی متانول خالص ریخته شد. سپس مخلوط در نیم ساعت تاریکی قرار گرفته و در طول موج ۴۱۵ نانو متر خوانده می‌شود (۲۶).

تجزیه و تحلیل آماری

نوع طرح بکار رفته در این تحقیق طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام گرفت. همبستگی‌ها با استفاده از رویه CORR و رگرسیون ساده خطی

جدول ۱- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده برگ شلیل


منبع تغییرات	وزن تر	وزن خشک	وزن تر	df	وزن خشک	کل	قند کل	ساکارز	فلن	فلاؤنوتید	کاروتینوئید a.b	کلروفیل b	کلروفیل a	کلروفیل a.b	فلن
تیمار	۴/۳**	۰/۵۳**	۱۱۹۰ **	۱۴۲/۱ **	۰/۰۳۷**	۰/۰۸**	۰/۰۲۱**	۰/۰۱۷**	۰/۰۵۳**	۴/۳**	۳۰/۷**	۴	۴/۳**	۳۰/۷**	۴
خطا	۰/۰۹	۰/۰۴	۲۲	۱۲/۶	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۰۷	۰/۰۱۸	۰/۰۰۴	۰/۰۹	۰/۰۲۷	۱۵	۰/۰۴	۰/۰۹	۱۵
CV	۱۴/۳	۶/۲	۷/۷	۵/۶	۳	۹/۳	۱۲/۵	۱۷/۸	۱۷/۸	۱۴/۳	۷/۴				

-**- معنی‌داری در سطح یک درصد می‌باشد.


جدول ۲- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده میوه شلیل

منبع تغییرات	وزن تر	وزن خشک	وزن تر	df	وزن خشک	کلروفیل a	کلروفیل b	کلروفیل a.b	ساکارز	فلن	فلاؤنوتید	آتوسیانین	قند کل	ساکارز	فلن
تیمار	۳۸۴۳**	۱۵/۸**	۱۸/۱**	۳	۱۵/۸**	۰/۰۵**	۰/۰۰۵**	۰/۰۰۲**	۱۷۴۷ **	۲۶۴ **	۱۲۲ **	۰/۰۳ns	۱۴۶۴ **	۱۷۴۷ **	۲/۴
خطا	۳۳۱۴	۱/۱	۱/۱	۱۲	۱/۱	۰/۰۰۳	۰/۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱	۱۷/۱	۱۱/۸	۲/۸	۰/۰۱۹	۰/۰۰۱	۱۷/۱	۲/۴
CV	۱۶/۹	۱۲	۱۴		۱۰	۶	۱۱	۸/۴	۶	۷/۵	۶	۲۴	۶/۱	۷/۵	۶/۱


ns و **- به ترتیب بدون معنی‌داری و معنی‌داری در سطح یک درصد می‌باشد.




شکل ۲- تغییرات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل a.b برگ



شکل ۱- تغییرات وزن تر، خشک و نسبت وزن تر به خشک برگ



شکل ۴- تغییرات قند کل و ساکاراز برگ در طول فصل رشد



شکل ۵- تغییرات کاروتینوئید برگ در طول فصل رشد

داد (شکل ۴). علت وقوع این روند می‌تواند به دلیل افزایش رشد میوه و یا به عبارتی افزایش محل مصرف یا قدرت سینک نسبت به محل تولید^۳ باشد. از آنجا که در اوایل فصل رشد به دلیل بیشتر بودن نسبت بخش رویشی گیاه به میوه کلیه مواد سنتز شده توسط برگ در اختیار خود برگ‌ها و اندام‌های رویشی قرار می‌گیرند. ولی در ادامه با افزایش مقدار میوه و یا به عبارتی بخش زایشی گیاه این مواد ساخته شده به سمت میوه‌ها حرکت می‌کند.

همبستگی گرفته شده بین میزان قند کل و میزان کلروفیل a,b نشان می‌دهد که بین آنها رابطه یا همبستگی معکوس وجود دارد (شکل ۵). یعنی با وجود افزایش کلروفیل و تاثیر مستقیم آن بر میزان کربوهیدرات مقدار قند کل برگ کاهش یافته است. این کاهش در میزان کربوهیدرات برگ به علت کاهش میزان کلروفیل و فعالیت فتوسنتزی برگ نیست زیرا همان طور که بیان شد مقدار کلروفیل نیز در مرحله پایانی برداشت در بیشترین مقدار خود بود. بنابراین در اثر افزایش قدرت جذب میوه، محصولات فتوسنتزی و یا کربوهیدرات‌ها شدت بیشتری از برگ تخلیه می‌گردد و مقدار آنها در برگ کاهش یافته است و نه بدلیل کاهش میزان فتوسنتز برگ. در واقع میزان کربوهیدرات‌ها گیاه تحت تاثیر سیستم منبع و مقصد گیاه قرار می‌گیرد (۲۵).

میزان ساکاروز نیز در مراحل ابتدایی برداشت نسبت به مرحله دوم و سوم در سطح پایین‌تری (۳۵ میکروگرم) قرار داشت در حالی که در مرحله سوم (۷۲ میکروگرم) به حداقل میزان خود رسیده و در مرحله پایانی مجددًا کاهش یافته است. می‌توان چنین استنباط نمود که میزان ساکاروز حاصل از فتوسنتز در مرحله سوم که همان مرحله سفت شدن هسته است در برگ تجمع یافته و یا به عبارت دیگر به دلیل عدم نیاز میوه به ترکیبات قندی در این مرحله، کربوهیدرات با سرعت کمتری به سمت میوه انتقال می‌یابد.


3- Sink to source

تروگن (۲۲) بیان کرد که در مراحل اولیه رشد، برگ‌ها عنوان یک مصرف کننده عمل می‌کنند و مقدار رشد آنها به ذخیره مواد وارد شده بستگی دارد و بعد از آن برگ‌ها به یک صادر کننده کربوهیدرات تبدیل می‌شوند. و این حالت مصرف کننده آنها تا زمانی که برگ‌ها به ۶۰-۳۰ درصد اندازه نهایی برسند، ادامه دارد. به عبارت دیگر برگ‌ها با طی شدن فصل رشد علاوه بر تامین مواد و انرژی مورد نیاز خود با افزایش رشد میوه باید انرژی لازم برای میوه‌ها را نیز برطرف نمایند، به همین منظور نسبت وزن خشک برگ‌ها در اواخر فصل رشد افزایش می‌یابد. میزان کلروفیل a, b و کلروفیل ab در آخرین مرحله برداشت در حداقل مقدار خود قرار داشت و با مراحل قبلی از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری بود (شکل ۲). برگ‌ها منبع اصلی تجمع و ثبت دی اکسید کربن هستند و مقدار فعالیت آنها به نیاز گیاه بستگی دارد. از آنجایی که نیاز گیاه به دلیل افزایش بخش زایشی افزایش یافته برگ‌ها نیز میزان کلروفیل بیشتری را جهت سنتز فتوسنتز^۳ در کربوهیدرات‌های تولید می‌کند. سرعت فتوسنتز یا نرخ فتوسنتز در برگ‌های جوان پایین بوده و با افزایش سطح برگ افزایش می‌یابد (۲۴). از آنجایی که با نزدیک شدن به مراحل پایانی برداشت وزن برگ افزایش می‌یابد، می‌تواند بیانگر افزایش سطح برگ و در نتیجه افزایش میزان کلروفیل گردد. حسن و لیچ (۱۱) بیان کردند که وزن خشک و سطح برگ ارتباط مستقیمی با هم دارند. مقدار کاروتینوئید برگ در هر دو مرحله سوم و چهارم برداشت حداقل (۰.۶ میلی گرم بر گرم وزن تر) بود و در آخرین مرحله برداشت مجددًا میزان آن کاهش یافت (شکل ۳).

ممکن است تبدیل کاروتینوئید به سایر رنگدانه‌ها در مراحل پایانی اتفاق بیافتد. میزان قند کل برگ در مرحله دوم و سوم برداشت روندی صعودی داشت و در مرحله پایانی مجددًا روند نزولی را نشان

1 - Sink

2 - Photosynthesis rate




شکل ۶- تغییرات میزان فنل و فلاونوئید برگ در طول فصل رشد

نشان می‌دهد که مقدار این رنگیزه ابتدا با ۲۷٪ میکرومول بالا بوده و در مرحله دوم و سوم روندی نزولی را طی می‌کند و در نهایت با ۳۷٪ میکرومول افزایش می‌یابد (شکل ۹).

بالا بودن مقدار آنتوسیانین در مرحله اول ممکن است به دلیل اندازه کوچک میوه و گسیل کربوهیدرات‌ها به سمت میوه باشد و وجود این مازاد کربوهیدرات‌برای میوه سبب شده که ترکیبات قندی در مسیر سنتر رنگیزه آنتوسیانین مورد استفاده قرار گیرند.


قند کل میوه در مرحله سوم یا دو هفته بعد از سخت شدن هسته نسبت به مراحل قبل کاهش یافت اما مجدداً در مرحله پایانی مقدار آن افزایش یافت (شکل ۱۰). از طرفی کاهش میزان قند میوه با نزدیک شدن به مراحل پایانی رسیدگی می‌تواند مربوط به افزایش حجم میوه و موقع پدیده رقت^۳ بوده و از طرف دیگر ممکن است همان‌گونه که بیان شد مربوط به تبدیل آن به رنگیزه آنتوسیانین باشد. زیرا آنتوسیانین‌ها از یک بخش قندی و یک ترکیب حلقوی که آنتوسیانیدین است تشکیل شده است و وجود قند بعنوان یک پیش ماده جهت سنتر آنها ضروری است. عواملی که سبب افزایش محتویات قند در یک بافت گیاهی می‌شوند اغلب ساخته شدن آنتوسیانین‌ها در آن بافت را افزایش می‌دهند (۱۰). سولفنالی و همکاران (۲۰) بیان کردند که کربوهیدرات‌تاثیر بسزایی در بیوستتر آنتوسیانین از طریق فعال کردن ژن‌های تولیدکننده آنتوسیانی (PAP1) در گیاه آراییدوپسیس گردید. تغییرات میزان ساکارز نشان می‌دهد که در اوائل رشد میوه مقدار آن نسبت به مراحل بعدی بیشتر است و با نزدیک شدن به مراحل پایانی مقدار آن کاهش می‌یابد در حالی که میزان قند کل در مرحله چهارم نسبت به مرحله سوم براحتی افزایش یافته است.




شکل ۵- همبستگی بین میزان کلروفیل a.b و قند کل برگ

به دلیل وجود منحنی رشد سیگموئید مضاعف^۱ میوه شلیل در این مرحله ترکیباتی نظیر پکتین، کلسیم، ترکیبات سلولوزی و لیگنینی که بیشتر در ساختار هسته به کار می‌روند از برگ‌ها به سمت میوه انتقال می‌یابند و سبب می‌شود که ترکیبات قندی در برگ تجمع یابند. مقدار ترکیبات تام فنلی نیز در مرحله چهارم براحتی با ۲۱٪ اکی والان گالیک اسید بر گرم ماده خشک در برگ بیشتر از سایر زمان‌ها بود و در مرحله نهایی براحتی نیز در کمترین مقدار خود قرار داشت. همچنین مقدار فلاونوئید نیز با رسیدن به مراحل پایانی براحتی روند کاهشی را نشان می‌دهد و در اولین مرحله در بالاترین مقدار خود قرار دارد (شکل ۶).


زمان‌های براحتی در مورد تمامی صفات مورد بررسی در میوه دارای اثر معنی‌داری در سطح ۰/۰۱ بود (جدول ۲). همان‌گونه که در شکل ۷ نشان داده شده وزن تر و خشک میوه نیز به مرور زمان افزایش یافته و در مرحله براحتی نهایی، میوه‌ها به ترتیب با وزن ۵۳۶ گرم و ۷۴ گرم حداکثر وزن را به خود اختصاص دادند. نسبت وزن تر به خشک میوه در اولین مرحله براحتی (۲ هفته بعد از میوه بستن)^۲ کمتر از سه مرحله دیگر بود که نشان می‌دهد میوه در اوایل فصل برخلاف برگ میزان مواد جامد محلول بیشتری داشته و مقدار آب میوه کم است. مقدار کلروفیل میوه نیز همگام با بلوغ و رسیدن میوه کاهش یافته است و آنتوسیانین میوه نیز روند صعودی را نشان داد. معمولاً در مراحل انتهایی آنزیم‌های تجزیه کننده کلروفیل فعلی شده و برای افزایش کیفیت میوه مقدار کلروفیل را کاهش می‌دهند (شکل ۸). بیشترین میزان کاروتتوئید (۱۸٪ میلی گرم بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین (۳۷٪ میلی گرم بر گرم وزن تر) در مرحله آخر براحتی میوه مشاهده گردید. با توجه به روند تغییرات میزان آنتوسیانین میوه،




شکل ۸- تغییرات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل a.b میوه



شکل ۷- تغییرات وزن تر، خشک و نسبت وزن تر به خشک میوه



شکل ۱۰- تغییرات قند کل و ساکارز میوه در طول فصل رشد




شکل ۹- تغییرات کاروتونئید و آنتوسیانین میوه در طول فصل رشد


می‌تواند مربوط به یک سری از تغییرات شیمیایی و آنزیمی مانند تجزیه گلیکوزیدها بوسیله گلیکوزیدازها، اکسید شدن ترکیبات فنلی توسط فنل اکسیدازها و پلیمریزه شدن ترکیبات فنلی آزاد باشد. فلاونوئیدها که خود جزو مواد فنلی دسته‌بندی می‌شوند (۲). همانند مواد فنلی مقدار آنها در طول مرحله رسیدگی میوه کاهش می‌یابد. در مقاله منتشر نشده از محقق مشخص شد که مقدار مواد تام فنلی و فلاونوئید در پوست سبز گردو^۱ با افزایش ارتفاع و کاهش میانگین دمای روزانه کاهش یافت. به عبارتی کاهش دما با افزایش این ترکیبات رابطه مستقیم دارد. بنابراین شاید بتوان بیان داشت که در اوائل مرحله برداشت میوه (اوائل بهار) میانگین دمای روزانه پایین‌تر و یا هوای خنک‌تر، میزان این ترکیبات بیشتر بود و با رسیدن میوه و افزایش دمای هوا مقدار این مواد کاهش یافته است. بخشی و همکاران (۱) بیان کردند که بیوستتر فنل‌ها با زمینه ژنتیکی و محیطی تعیین می‌شود.

بنابراین می‌توان چنین بیان داشت که در این مرحله قندهای دیگری مانند گلوكز فروکتوز و غیره به غیر از ساکارز افزایش یافته‌اند. از طرفی رابطه مستقیمی بین مقدار قند کل برگ و میوه و همچنین ساکارز برگ و میوه وجود دارد (شکل ۱۱ و ۱۲). می‌توان چنین استباط کرد که همگام با نیاز میوه، برگ‌ها در جهت رفع نیاز میوه به قند عمل کرده و فعالیت فتوسنتری خود را افزایش می‌دهند. یعنی تا زمانی که درخواست کربوهیدرات وجود داشته باشد سنتر آن نیز در برگ ادامه خواهد یافت. به عبارتی فعالیت بخش منبع به میزان تقاضای مقصد بستگی دارد.

محتوای تام فنلی نیز در اولین مرحله برداشت میوه با اکی‌والان گالیک اسید بر گرم ماده خشک بیشتر از سایر زمان‌های برداشت بود و با رسیدن میوه به مراحل نهایی برداشت یک روند نزولی را طی نمود (شکل ۱۳). نتایج این بخش از تحقیق با نتایج رومربینی و همکاران (۱۹) مطابقت دارد. آنها دریافتند که همزمان با نزدیک شدن به مراحل پایانی برداشت مقدار مواد تام فنلی در بخش گوشت میوه هلو کاهش یافت. آنها بیان کردند که علت این کاهش




شکل ۱۲- همبستگی بین ساکاراز برگ و میوه




شکل ۱۱- همبستگی بین میزان قند کل برگ و میوه

بین میزان مواد تام فلئی بین برگ و میوه نشان داد که همبستگی مستقیمی بین آنها وجود دارد (شکل ۱۴). یعنی با کاهش مواد فلئی برگ مواد تام فلئی میوه نیز کاهش می‌یابد. احتمالاً مواد فلئی تمایل به تجمع در بافت‌های اپیدرمی گیاه دارند زیرا که وظایف اصلی این ترکیبات حفاظت از گیاه در برابر اشعه ماسورا بنفس، حشرات و بیماری‌ها می‌باشد و همین می‌تواند عاملی برای بیشتر بودن مقدار این ترکیبات در بخش پوست میوه باشد (۶). گزارش شده است که میزان فلاؤنوئید در پوست، غنی تر از عصاره میوه پرتقال و نارنگی است. از آنجائیکه نور در بیوسنتر ترکیبات فلئی و فلاؤنوئیدی تأثیر دارد و در واقع این مواد نقش محافظتی در برابر نور به ویژه طول موج کوتاه دارند، این ترکیبات در قسمت پوست بیشتر هستند (۱۸).

از نظر محیطی تأثیر دما بر ستز برخی از فلاؤنوئیدها غیرمستقیم است، زیرا سبب افزایش قطر میوه و درون بر میوه و کاهش فلاؤنوئیدها در انر رقیق شدن محتويات آن می‌شود (۴). بر این اساس در مناطق گرم و خشک رشد میوه از نظر وزن، حجم و محیط سریع تر انجام می‌گیرد در صورتی که از نظر ضخامت پوست و میزان نیتروژن متفاوت می‌باشد. همچنین میزان برخی فلاؤنوئیدها در تیرماه در مقایسه با درختان کشت شده در مناطق سردتر و مرطوب تر به عنوان مثال مناطق ساحلی پایین تر است (۲۱). در همین رابطه تحقیقات انجام شده روی برخی فلاؤنوئیدهای مرکبات نشان داد که تولید آن‌ها در مناطقی با آب و هوای خنک بیشتر از مناطق گرم می‌باشد زیرا طول دوره تقسیم سلولی بیشتر می‌شود و در این مرحله عوامل تولید برخی فلاؤنوئیدها بیشتر می‌شود (۴). همچنین همبستگی گرفته شده



شکل ۱۴- همبستگی بین میزان مواد فلئی برگ و میوه



شکل ۱۳- تغییرات میزان فلئی و فلاؤنوئید میوه در طول فصل رشد

نتیجه گیری

هسته کاهش چشمگیری داشت ولی مجدداً افزایش پیدا کرد. این در حالی است که مقدار ساکارز میوه همچنان تا مرحله پایانی کاهش می‌پابد. این نتیجه دال بر افزایش انواع دیگری از قند به غیر از ساکارز در این مرحله می‌باشد. ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی میوه نیز در مراحل اولیه رشد آن بالا بوده و با رسیدن میوه کاهش می‌پابد. شاید بتوان چنین بیان کرد که یکی از عوامل حساسیت میوه به عوامل بیماری‌زا و یا تنفس‌ها در میوه‌های کاملاً رسیده کاهش مقدار این این دو ترکیب باشد.

در طول روند رسیدگی میوه و رشد رویشی درخت تغییرات محسوسی در وزن آنها و همچنین میزان مواد قندی مشاهده می‌شود. همچنین ارتباط مستقیمی بین تغییرات صورت گرفته در برگ و میوه شلیل دیده می‌شود. زیرا همان طور که گفته شد تغییرات صورت گرفته در برگ برای مثال میزان کلروفیل و به دنبال آن میزان تولید قند به مقدار نیاز بخشن زایشی و یا میوه بستگی دارد. همان طور که مشاهده شد مقدار قند کل در دو هفته بعد از مرحله سخت شدن

منابع

- ۱- بخشی د، فتح اللهی س. و آرآکاوا ا. ۱۳۸۹. بررسی ارتباط بین ترکیبات فنلی و رنگ پوست در ۳ رقم سیب قرمز در ژاپن. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). ۲۴: ۲۵۱-۲۵۸.
- 2- Calabro M.L., Galtieri V., Cutroneo P., Tommasini S., Ficarra P., and Ficarra R. 2004. Study of the extraction procedure by experimental design and validation of a LC method for determination of flavonoids in Citrus bergamia juice. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35: 349-363.
- 3- Daie J. 1985. Carbohydrate partitioning and metabolism in corps. Hort. Review. 7: 69-108.
- 4- Davise F.S., and Albrigo L.G. 1994. Citrus . CAB international press, wallington , UK . P .9814 .
- 5- Dewanto V., Wu X., Adom K.K., and Liu R.H. 2002. Thermal processing enhances the nutritional value of tomatoes by increasing total antioxidant activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 50 pp. 3010–3014
- 6- Dickson R.E. and Isebrand J.G. 1991. Leaves as regulators of stress responses, p. 3–34. In: H.A. Mooney, W.E. Winner, and E.J. Pell (eds.). Response of plants to multiple stresses. Academic Press, San Diego. complay lunhknow, pp.1-2, 6-15.
- 7- Dixon R.A., and Paiva N.I. 1995. Stress-induced phenylpropanoid metabolism. Plant Cell. 7: 1085-1097.
- 8- Ericsson A. 1979. Effect of fertilization and irrigation on the seasonal change of carbohydrate reserves in different age-classes of needle on 20-year old Scot tree (*Pinus sylvestris*). Journal of Plant Physiology. 45:270-280.
- 9- Gifford R.M., Evans L.T. 1981. Photosynthesis, Carbon partitioning, and yield. Annual Review of Plant Physiology. 32:485-509.
- 10- Hopkins W.G. 1999. Introduction to Plant Physiology. vol 1 and 2, John Wiley and Sons, New York.
- 11- Hassan F.U., and Leitch M.H. 2001. Dry matter accumulation in Linseed (*Linum usitatissimum* L.). Journal of agronomy and crop science. 187. (2): 83-87.
- 12- Kozlowski T.T. 1992. Carbohydrate sources and sinks in woody plants. Journal of Botany Revue. 58:107–222.
- 13- Kramer P., and Kozlowski T. 1979. Physiology of Woody Plants. Academic Press Inc., New York, NY, USA. 811 pp.
- 14- Lloyd D.G. 1980. Sexual strategies in plants. An hypothesis of serial adjustment of maternal investment during one reproductive session. New Phytologist. 86: 69-79.
- 15- Marchi S., Sebastiani L., Gucci R., and Tognetti R. 2005. Changes in sink–source relationships during shoot development in olive. Journal of American Society of Horticultural Sciences. 130: 631–637.
- 16- Moriguchi T., Sanada T. and Yamaki S. 1990. Seasonal fluctuations of some enzymes relating to sucrose and sorbitol metabolism in peach fruit. Journal of American Society of Horticultural Sciences.115: 278-281.
- 17- Moriguchi T., Ishizawa Y. and Sanada T. 1990. Differences in sugar composition in prunus persica fruit and the classification by the principal component analysis. Journal of Japanese Society of Horticultural Sciences. 59: 307-312.
- 18- Ooghe W.C., Ooghe S.J., Detavernier C.M., and Huygebaert A. 1994. Characterization of Orange juice (*Citrus sinensis*) by flavanone glucoside. Journal of Agricultural Food Chemistry. 42: 2183-2190.
- 19- Remorini D., Tavarini S., Degl E., Loreti F., Massai R., Guidi L. 2008. Effect of root stock and harvesting time on the nutritional quality of peel and flesh of peach fruits. Food chemistry. 110. 2: 361-367.
- 20- Solfenalli C., Poggi A., Loreti E., Alpi A., and Perata P. 2006. Sucrose specific induction of the anthocyanin biosynthesis pathway in *Arabidopsis*. Plant Physiology. 140: 637-646.
- 21- Srivastava A.W., and Shym S. 2002 Citrus: climate and soil. International book distributing
- 22- Turgeon R. 1989. The sink–source transition in leaves. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 40:119–138.
- 23- Turgeon R. and Webb J.A. 1973. Leaf development and phloem transport in *Cucurbita pepo*: Transition from

- import to export. *Planta*.113: 179–191.
- 24- Turgeon R., and Webb J.A. 1975. Leaf development and phloem transport in *Cucurbita pepo*: Carbon economy. *Planta* 123: 53–62.
- 25- Wareing P.F., Patrick J. 1975. Source- sink relation and partition of assimilates in the plant. In Photosynthesis and productivity in different Environments, IBP 3. Ed.J.P Cooper. Cambridge University Press. Pp 481-499.
- 26- Chang C.C., Yang M.H., Wen H.M., and Chern J.C. 2002. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. *Journal of Food and Drug Analysis*. 10: 178 – 82
- 27- Omokolo N.D., Tsala N.G., and Djocgoue P.F. 1996. Changes in carbohydrate, amino acid and phenol content in cocoa pods from three clones after infection with *Phythphthora megakarya* Bra. and Grif. *Annals of Botany*. 77:153 – 158.
- 28- Sadasivam S., and Manickam A. 1992. In: Biochemical Methods for Agricultural Sciences, Wiley Eastern Ltd., New Delhi, pp.184-185.
- 29- Somogyi M. 1952. Notes on sugar determination. *Journal of Biological Chemistry*. 194: 19-23.

Archive of SID