

تأثیر تلچیح آکتینومیست‌ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه‌ای

علی پاکدین^۱ - محمد فارسی^{*۲} - حسن مرعشی^۳

تاریخ دریافت: ۸۷/۶/۳۰

تاریخ پذیرش: ۸۸/۴/۱۴

چکیده

قارچ خوارکی تکمه‌ای سفید یک تجزیه کننده ثانویه می‌باشد و بایستی فعالیت میکرووارگانیسم‌های دیگر، مواد اولیه خام را برای رشد آن تجزیه نمایند. آکتینومیست‌ها به دلیل توانایی شان در تجزیه مولکول‌های پیچیده مخصوصاً سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین، در تهیه کمپوست مورد استفاده قارچ خوارکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بیوماس میکروبی آکتینومیست‌ها حاوی میزان بالای نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوارکی می‌باشد. از آکتینومیست‌های متعلق به جنس‌های *Nocardoides*, *Thermomonospora*, *Saccharomonospora*, *Streptomyces*, *Glycomyces*, *Microbispora*, *Saccharopolyspora* کشت برای بررسی رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه‌ای استفاده شد. اندازه‌گیری رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلچیح شده با آکتینومیست‌های مذکور نشان داد که این تلچیح می‌تواند موثر بوده و باعث افزایش رشد میسلیوم قارچ خوارکی نسبت به محیط شاهد گردد. آکتینومیست‌های جنس *Aspergillus* نسبت به جنس‌های دیگر آکتینومیست‌ها از رشد میسلیوم قارچ حمایت نمودند.

واژه‌های کلیدی: آکتینومیست، بیوماس میکروبی، کمپوست، قارچ خوارکی تکمه‌ای، *Agaricus bisporus*

(باکتریها و قارچ‌های متعلق به کلاس قارچ‌های ناقص) نمی‌باشند، از اینرو برای رشد بهینه به یک محیط رشد انتخابی و با کیفیت عالی نیاز دارند (۵ و ۲۱).

در فرایند تهیه کمپوست برای رشد قارچ تکمه‌ای سفید، میکرووارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست‌ها، قارچها و آکتینومیست‌های گرمادوست دخالت دارند و در گرم شدن خود به خودی مواد آلی نقش اصلی را ایفا می‌نمایند (۸ و ۲۰). بسیاری از گونه‌های گرمادوست در دماهای ۶۵ و حتی ۸۲ درجه سانتی‌گراد از کمپوست جداسازی شده‌اند (۳). در این میان آکتینومیست‌ها، مخصوصاً گونه‌های گرمادوست، بعنوان اجزای اصلی میکروفلور کمپوست‌ها شناخته شده‌اند. آکتینومیست‌ها به دلیل توانایی شان در تجزیه مولکول‌های پیچیده مخصوصاً سلولز، لیگنوسلولز و لیگنین در تهیه کمپوست حائز اهمیت می‌باشند (۱۴ و ۱۵). آکتینومیست‌ها به قارچ‌ها دما و pH بالاتری را تحمل می‌کنند (۹). دو جنس آکتینومیست‌های گرمادوست در کمپوست می‌باشند. جمعیت آکتینومیست‌های گرمادوست در فاز دوم (قله حرارتی یا مرحله

افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت زمین‌های قابل کشت محصولات کشاورزی نیازمند تولید هرچه بیشتر غذا از طریق منابع جایگزین مانند قارچها می‌باشد. تولید قارچ در سرتاسر دنیا در حال افزایش بوده و امروزه در تمامی طول سال برای استفاده در مقادیر زیاد در دسترس می‌باشد (۲ و ۱۰). کمپوست حاصلخیز، اسپاون مرغوب و کنترل خوب شرایط محیطی سه عامل مهم دخیل در میزان عملکرد قارچ خوارکی تکمه‌ای سفید می‌باشند. بهینه‌سازی هر یک از این عوامل می‌تواند میزان عملکرد را افزایش دهد. قارچ‌های پرورشی، مانند قارچ خوارکی تکمه‌ای، به علت وجود مواد غذایی متنوع در مواد خام کمپوست و مزیت رقابتی ارگانیسم‌های ساده‌تر در هضم کردن این مواد، قادر به رقابت با این ارگانیسم‌های پستتر

۱- دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
۲- به ترتیب استاد و استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(Email: mihfarsi@yahoo.com)

*) نویسنده مسئول:

ظرفی فلور میکروبی کمپوست با توجه به ترکیب متفاوت آن در کشورهای مختلف دارای گوناگونی فراوانی می‌باشد. با توجه به اینکه رابطه مثبت شدیدی بین میزان رشد میسلیوم در بستر کشت با عملکرد قارچ در واحد سطح وجود دارد، این تحقیق به منظور شناخت اثر حمایتی چند جایه از آکتینومیستها بر رشد میسلیوم قارچ خوارکی انجام شد.

مواد و روش‌ها

جداهای های آکتینومیست

در این تحقیق از آکتینومیستهای متعلق به جنس‌های *Thermomonospora*, *Saccharomonospora*, *Streptomyces*

Microbispora, *Saccharopolyspora*, *Nocardiooides*, *Glycomyces* مورد استفاده توسط روش‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی (رنگ‌آمیزی اسید-فست جزئی، هیدرولیز اوره، احیای نیترات، کاتالاز و تست مقاومت به لیزوزیم) و روش تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن rRNA 16S در آزمایشات قبلی توسط نویسندهان این مقاله شناسایی شده بودند (۱).

نژاد قارچ خوارکی تکمه‌ای

از نژاد هیبرید تجاری قارچ خوارکی تکمه‌ای سفید بهنام IM008 در این تحقیق استفاده شد. این هیبرید تجاری در یک برنامه اصلاحی در آزمایشگاه زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی در جهاد دانشگاهی مشهد تولید شده است. به منظور اندازه گیری رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه‌ای روی کمپوست تلچیح شده با آکتینومیستهای مورد نظر، از اسپاون تجاری این نژاد استفاده شد. برای اندازه گیری میزان رشد میسلیوم قارچ روی بستر کشت تهیه شده با عصاره آکتینومیستها از کشت مادری نژاد IM008 که در محیط کشت کمپوست آغاز رشد کرده بود، استفاده گردید (۱).

پاستوریزاسیون) به سرعت غالب می‌شود (۲۳).

فعالیت میکروبی، مواد خام اولیه شامل کاه و کلش و سایر زوائد آلی را به کمپوست قارچ تبدیل می‌کند. محصول نهایی این میکرووارگانیسم‌ها (زنده و یا مرده) در کمپوست بیوماس میکروبی نامیده می‌شود. بیوماس میکروبی حاوی میزان بالای نیتروژن می‌باشد و از آنجایی که میکرووارگانیسم‌ها مواد معدنی را در حین کمپوست‌سازی در خود جمع می‌کنند، یک منبع خوب از نظر مواد معدنی برای رشد قارچ محسوب می‌شود (۴، ۵ و ۲۲). علاوه بر این برخی از جداهای های آکتینومیستها قادرند تا ۴۰٪ لیگنین سوبسترا را به صورت محلول درآورند (۱۳).

بهمود فرایند تهیه کمپوست و بدست آوردن کمپوست عالی برای پرورش قارچ با بهینه کردن ترکیب فلور میکروبی کمپوست می‌تواند عملکرد قارچ را افزایش دهد. در تلاش‌هایی به منظور سرعت پخشیدن به فرایند تهیه کمپوست و همچنین افزایش عملکرد قارچ خوارکی، تعدادی از میکرووارگانیسم‌های گرمادوست به طور مصنوعی به کمپوست اضافه شده اند. پوپ و همکاران (۱۷) قارچ‌های گرمادوست را در حین تهیه کمپوست اضافه کردند، محققین دیگر در آزمایشات جداگانه آکتینومیستها را با کمپوست در زمان مایه‌زنی مخلوط کردن و در هر دو مورد افزایش در عملکرد را گزارش نموده‌اند (۲۵).

شرایط دینامیک میکرووارگانیسم‌ها در کمپوست می‌تواند بسیاری از تفاوت‌های موجود در نتایج گزارشات کاربرد مکمل‌های کمپوست و آزمایشات علمکرد را توضیح دهد. انجام مطالعات در زمینه دستورزی محیط میکروبیولوژیکی و تأثیراتی که این میکرووارگانیسم‌ها بر تولید قارچ دارند باید قبل از مسائلی نظری مصرف شدن کمپوست و اثر افزودنی‌ها بر کمپوست مدد نظر قرار گیرد. از آنجا که میکرووارگانیسم‌های گوناگونی که در کمپوست‌سازی دخالت دارند نقش عمده‌ای در کیفیت نهایی کمپوست و عملکرد آن ایفا می‌نمایند، می‌توان با شناسایی و دستورزی میکروفلور کمپوست در طی مراحل مختلف فرایند کمپوست‌سازی و مهیا کردن زمینه رشد برای ارگانیسم‌های مطلوب، به اهداف مورد نظر دست یافت. با توجه به این که تحقیقات در این زمینه بیشتر توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، نتایج حاصله در دسترس دیگران قرار نمی‌گیرد. از

(جدول ۱)- جنس‌های آکتینومیست استفاده شده در تلچیح کمپوست و تهیه محیط کشت با بیوماس میکروبی

جنس	شماره ایزووله
<i>Streptomyces</i>	۱۷۹۸، ۲۲، ۱۴، ۱۲۰
<i>Saccharomonospora</i>	۱۸، ۲
<i>Thermomonospora</i>	۵، ۴
<i>Nocardiooides</i>	<i>A₇A₄</i>
<i>Saccharopolyspora</i>	۱۳
<i>Microbispora</i>	۱۵
<i>Glycomyces</i>	۱۹

سانتی‌متری توزیع شدند. محیط کشت PDA بدون اضافه کردن بیوماس آکتینومیستی به عنوان شاهد استفاده شد. برای هر تیمار تعداد ۶ پتری دیش تهیه شد. در این آزمایش مقدار رشد میسلیوم به صورت روزانه اندازه گیری و ثبت شد. پس از رتبه بندی ۱۶ جدایه آکتینومیست از رشد میسلیوم قارچ خوارکی، تعداد ۱۰ تا از بهترین ها انتخاب و همراه با محیط بدون عصاره آکتینومیست به عنوان شاهد در قالب طرح بلوکی کامل با ۶ تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. میزان رشد میسلیوم قارچ خوارکی در دو نوبت، ۴ و ۱۰ روز پس از تلقیح اندازه گیری شد. داده های هر نوبت توسط برنامه آماری JMP تجزیه واریانس و میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند.

نتایج و بحث

تلقیح کمپوست با آکتینومیستها و بررسی میزان رشد میسلیوم قارچ

پس از گذشت ۴ روز از تلقیح کمپوست با اسپاون، ایزوله های آکتینومیست مورد استفاده از نظر حمایت از رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه ای با هم اختلاف بسیار معنی داری داشتند (جدول ۲). تا ۴ روز، آکتینومیست های جنس استرپتومایسنس (ایزوله های ۱ و ۹) بیشترین حمایت را از رشد میسلیوم نمودند (جدول ۳). پس از گذشت ۱۰ روز نیز اختلاف بین جدایه های آکتینومیست هنوز هم معنی دار بود. اما در این تاریخ مقدار رشد میسلیوم در کمپوست تلقیح شده با استرپتومایسنس ایزوله ۱ به صورت معنی داری از بقیه کمپوست ها بیشتر شده بود، ولی با کمپوست کنترل (کمپوست سترون نشده) اختلاف معنی داری نداشت (جدول ۳). معنی دار شدن تاریخ اندازه گیری به دلیل تداوم رشد میسلیوم بر روی کمپوست تا زمان اندازه گیری دوم می باشد. در مجموع، پس از گذشت ۱۰ روز بیشترین میزان رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه ای در کمپوست های تلقیح شده با ایزوله های جنس استرپتومایسنس بوده اگر چه میزان رشد میسلیوم در گونه های مختلف این جنس مقداری متفاوت می باشد (جدول ۳). استرپتومایسنس ها به افزایش درجه حرارت در تونل پاستوریزاسیون مقاوم می باشند، به طوری که با افزایش درجه حرارت به بیش از ۶۰ درجه سانتی گراد تولید اسپور مقاوم می نمایند، اسپورهای آکتینومیست های گرمادوست در برابر دماهای بالا مقاوم می باشند (۶). با سرد کردن کمپوست به ۵۰ - ۴۸ درجه سانتی گراد به منظور آمونیاک زدایی آن، این اسپورها جوانه زده و دوباره فعال می شوند. یکی از دلایل وفور استرپتومایسنس ها در کمپوست آماده مایه زنی همین مقاومت آنها در برابر درجه حرارت مرحله پاستوریزاسیون می باشد. گونه های جنس استرپتومایسنس آنزیم زاینزا

اندازه گیری رشد خطی میسلیوم قارچ

به منظور اندازه گیری میزان رشد روزانه میسلیوم قارچ در پتری دیش و در سطح کمپوست، قطر میسلیوم رشد کرده در دو ناحیه عمود بر هم اندازه گیری شد. میانگین قطرهای پرگره اندازه گیری شده به عنوان میزان رشد میسلیوم در نظر گرفته شد (۲).

تلقیح کمپوست با آکتینومیستها و بررسی میزان رشد میسلیوم قارچ

کمپوست پاستوریزه در دو روز متوالی هر روز به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد سترون شد (۱۳). بین این دو تیمار، کمپوست به مدت ۴ ساعت در دمای ۴۸ درجه سانتی گراد نگهداری شد. بعد از سترون، به مقدار وزن ازدست رفته، آب استریل به کمپوست اضافه شد. کمپوست استریل شده پس از تلقیح با ۱۰ جدایه آکتینومیست گرمادوست به صورت انفرادی، به مدت ۵ روز در محدوده دمایی ۴۹ تا ۴۷ درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس دمای کمپوست به ۲۴ درجه سانتی گراد کاهش داده شد. برای اندازه گیری میزان رشد میسلیوم قارچ در کمپوست از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف درب دار استفاده شد. در این ظروف ۲۰۰ گرم کمپوست انکوبه شده و ۱۰ عدد اسپاون قارچ با فاصله کافی قرار داده شد و برای رسیده دوانی میسلیوم در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. میزان رشد میسلیوم قارچ در هر ظرف کمپوست در روزهای چهارم و دهم پس از تلقیح با اسپاون اندازه گیری گردید (۲).

میزان رشد میسلیوم قارچ روی محیط کشت تهیه شده با عصاره آکتینومیستی

به منظور بررسی اثر بیوماس آکتینومیست ها بر رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه ای، تعداد ۱۶ جدایه آکتینومیست (جدول ۱) به صورت انفرادی در ۲۵۰ میلی لیتر محیط کشت مایع کمپوست آغاز گشته با محیط کشت CYM (۱۸) به مدت ۴۸ ساعت روی شیکر انکوباتور با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و ۲۰۰ rpm کشت داده شدند. محیط کشت در ۱۰۰۰ rpm به مدت ۶ دقیقه سانتریفیوژ شد و پلت آکتینومیست جدا شد. پلت های آکتینومیست به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۲۰ - ۲۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند تا آکتینومیست ها منحمد شوند. با استفاده از دستگاه فریز درایر، Zirbus Technology (VaCo5) آکتینومیست ها تا رسیدن به وزن ثابت آبگیری شدند. برای تهیه محیط کشت جامد اندازه گیری رشد میسلیوم، مقدار ۱/۰ گرم از آکتینومیست های خشک شده به ۱۰۰ میلی لیتر محیط کشت PDA اضافه شد. محیط ها به خوبی بر روی همزن مغناطیسی هم زده شدند و در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه سترون شدند. بعد از اتوکلاو کردن، محیط کشت ها در پتری دیش های سترون ۱۰

بتواند به اندازه ترکیبی از انواع ایزوله‌ها و قارچها از رشد میسلیوم قارچ حمایت نماید نکته بسیار مثبتی است. در کمپوست استریل نشده ایزوله‌ها و قارچهای زیادی فعالیت می‌کنند. تعدادی از آکتینومیستها و قارچهایی که در کمپوست استریل نشده رشد می‌نمایند برای رشد میسلیوم قارچ مضر می‌باشد. اثرات منفی آنها می‌تواند مانع از بروز کامل اثرات مثبت آکتینومیستها و قارچهای مفید شود. علاوه براین ممکن است که اثرات متقابل بین این میکرووارگانیسم‌ها نیز برای رشد میسلیوم قارچ خوراکی مفید نباشد. همانطور که از نتایج این آزمایش بر می‌آید اگر بتوان با معرفی یک یا تعداد محدودی از آکتینومیستهای مفید به کمپوست برای رشد میسلیوم قارچ تکمه‌ای، تجزیه کمپوست را هدفمند نمود، عمل آوری کمپوست خیلی بیشتر از آن چیزی خواهد شد که امروزه تولید کنندگان ما تجربه می‌نمایند.

تولید می‌کند که در اثر هیدرولیز زایلن را به زایلوژ، زایلوبیوز و آرایبیوز تجزیه می‌نماید. حداکثر فعالیت این آنزیم نیز در درجه حرارت ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد و در اسیدیته ۶ تا ۷ می‌باشد (۱۲). گونه‌های این جنس منبع خوبی برای آنزیم سلولاز نیز می‌باشند (۱۴). میکروفلور کمپوست در حین کمپوست سازی دارای فعالیت لاکازی نمی‌باشد، اما قارچ خوراکی تکمه‌ای دارای سیستم نسبتاً فعال لیگنولیتیک و سلولولیتیک قوی می‌باشد (۷).

نکته قابل تأمل در این آزمایش عدم تفاوت معنی دار بین رشد میسلیوم قارچ در حضور ایزوله شماره ۱ و کمپوست استریل نشده بود (جدول ۳). در کمپوست استریل نشده همه ایزوله‌های استخراج شده در این آزمایش همراه با انواع دیگری از ایزوله‌ها که استخراج نشده‌اند و انواع متعددی از قارچها حضور دارند. اینکه یکی از این ایزوله‌ها

(جدول ۲)- تجزیه واریانس اندازه گیری اول و دوم به صورت مجزا

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات اندازه گیری پس از ۴ روز	میانگین مربعات اندازه گیری پس از ۱۰ روز
بلوک	۵	۶,۷۸*	۱۵,۲۳**
ایزوله	۹	۲۸,۳۴**	۹,۱۸**
خطا	۴۵	۳,۰۴	۹,۹۱

(جدول ۳)- میانگین رشد قطر برگنه (mm) در دو تاریخ یاد داشت برداری

شماره ایزوله	تیمار	بعد از ۴ روز	بعد از ۱۰ روز	اختلاف رشد
۹	<i>Streptomyces</i>	۱۸,۷۸	۲۱,۲۵	۲,۴۷
۱	<i>Streptomyces</i>	۱۶,۹۲	۲۵,۹	۸,۹۸
کنترل	Control	۱۶,۴۷	۲۵,۳۱	۸,۸۴
۸	<i>Streptomyces</i>	۱۵,۲۳	۱۹,۳۲	۳,۹۹
۱۸	<i>Saccharomonospora</i>	۱۴,۰۵	۱۸,۶۷	۴,۶۲
۱۷	<i>Streptomyces</i>	۱۳,۹۳	۲۰,۲	۶,۲۷
۱۳	<i>Saccharopolyspora</i>	۱۳,۷۸	۲۲,۲۸	۸,۵
۱۶	<i>Saccharomonospora</i>	۱۲,۰۸	۱۷,۸۸	۵,۸
۷	<i>Nocardioides</i>	۱۱,۲۸	۱۵,۲۷	۳,۹۹
۲۲	<i>Streptomyces</i>	۱۱,۲۰	۱۵,۴۷	۴,۲۷
LSD 5%		۲,۰۱	۳,۵۶	

(جدول ۴)- تجزیه واریانس مرکب داده‌های حاصل از اندازه گیری رشد میسلیوم در کمپوست استریل تلچیح شده با ایزوله‌های آکتینومیست متفاوت در مجموع دو تاریخ

منابع تغییر	Prob > F	MS	SS	DF
بلوک	,۰,۲۷	۱۷,۸۵	۸۹,۲۴	۵
تاریخ	<۰,۰۰۰۱	۱۱۴۳,۹۲	۱۱۴۳,۹۲	۱
نژاد	<۰,۰۰۰۱	۱۰۶,۴۴	۹۵۸,۰۰	۹
تاریخ * ایزوله	<۰,۰۰۵۲	۱۸,۰۷	۱۶۲,۶۱	۹
خطا		۶,۳۵۲۹	۶,۰۳,۵۳	۹۵
کل			۲۹۵۷,۳۱	۱۱۹

(جدول ۵)- مقایسه میانگین ها برای رشد پرگنه در کمپوست تلکیح شده با آکتینومیسیت در مجموع دو اندازه گیری

شماره ایزوله	تیمار	میانگین (mm)
کنترل	Control	۲۱,۹۱ ^a
۱	<i>Streptomyces</i>	۲۱,۴۱ ^{ab}
۹	<i>Streptomyces</i>	۱۹,۰۲ ^{abc}
۱۳	<i>Saccharopolyspora</i>	۱۸,۰۳ ^{bcd}
۸	<i>Streptomyces</i>	۱۷,۲۳ ^{cd}
۱۷	<i>Streptomyces</i>	۱۷,۰۷ ^{cd}
۱۸	<i>Saccharomonospora</i>	۱۶,۳۶ ^{cde}
۱۶	<i>Saccharomonospora</i>	۱۴,۹۸ ^{de}
۲۲	<i>Streptomyces</i>	۱۳,۳۳ ^e
۷	<i>Nocardoides</i>	۱۳,۲۸ ^e

محیط های غذایی تلکیح شده با ایزوله های مختلف متفاوت می باشد. رشد بیشتر در هر محیط نشان از حمایت ترکیبات موجود در اجسام آن آکتینومیسیت از رشد میسلیوم قارچ خوارکی دارد، چون محیط زمینه برای همه PDA بوده است. این آکتینومایسیت ها در کمپوست رشد می نمایند و وقتی که کربن کمپوست به اتمام می رسد می میرند و اجسام آنها مورد تغذیه میسلیوم قارچ خوارکی قرار می گیرد.

در شکل (۲) میزان رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمیلی بر حسب سانتی متر در مدت زمان ۱۷ روز و ضرایب رگرسیون این نمودارها همراه با حدود اطمینان ۹۵٪ هر ضریب در جدول (۴) آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود ضریب رشد میسلیوم در ایزوله های مختلف متفاوت می باشد. در شکل (۳) میزان رشد میسلیوم در بهترین محیط کشت نسبت به شاهد آورده است.

بررسی رشد میسلیوم قارچ روی محیط کشت حاوی بیوماس آکتینومیسیت


در شکل (۱) میزان رشد میسلیوم قارچ در مدت ۱۷ روز روی محیط کشت PDA حاوی بیوماس ایزوله های مختلف در مقایسه با شاهد نشان داده شده است. همانطور که در شکل (۲) ملاحظه می شود میزان رشد میسلیوم در پتری دیش تلکیح شده با ایزوله شماره ۵ (سمت راست) در طی ۱۷ روز، بیش از دو برابر میزان رشد میسلیوم در محیط کشت PDA عاری از آکتینومایسیت می باشد. در شکل (۳) و جدول (۶) نیز همین نتیجه گیری مصدق دارد، بطوریکه ضریب رگرسیون (میزان رشد میسلیوم در هر روز) در محیط کشت تلکیح شده با ایزوله شماره ۵ بیش از دو برابر میزان رشد میسلیوم در محیط PDA می باشد. همانطور که از جدول شماره (۴) ردیف های ۱ و ۱۷ بر می آید این اختلاف در میزان رشد بسیار معنی دار است.

در شکل (۱) ب مشاهده می شود که میزان رشد میسلیوم قارچ در




الف ب

(شکل ۱)- (الف) مقایسه رشد میسلیوم در بهترین محیط کشت (راست) و محیط کشت شاهد (چپ) بعد از گذشت ۱۷ روز، (ب) مقایسه رشد میسلیوم قارچ در محیط کشت های مختلف (۱۷ روز)



(شکل ۲)- میزان رشد میسلیوم قارچ در محیط های کشت حاوی بیوماس آکتینومیست، T : شاهد (محیط کشت PDA)، اعداد نشانگر شماره ایزوله می باشد



(شکل ۳)- میزان رشد میسلیوم در بهترین محیط نسبت به شاهد

(جدول ۶)- فرمول تابعیت خطی میزان رشد میسلیوم (بر حسب سانتی متر و زمان بر حسب روز) همراه با حدود اطمینان ۹۵٪ برای ضریب رگرسیون

ردیف	شماره ایزوله	فرمول رایطه خطی مقدار رشد	حد پایین	حد بالا
۱	۵	$Y_i = 0.71 + 0.33 \text{ Day}$	۰,۳۱۶	۰,۳۳۴
۲	۲۰	$Y_i = 0.92 + 0.28 \text{ Day}$	۰,۲۷۰	۰,۲۸۸
۳	۱۹	$Y_i = 0.91 + 0.27 \text{ Day}$	۰,۲۶۰	۰,۲۸۴
۴	۱	$Y_i = 0.82 + 0.27 \text{ Day}$	۰,۲۶۳	۰,۲۷۹
۵	۸	$Y_i = 0.76 + 0.26 \text{ Day}$	۰,۲۵۳	۰,۲۶۸
۶	۱۴	$Y_i = 1.12 + 0.26 \text{ Day}$	۰,۲۴۶	۰,۲۶۷
۷	۲۲	$Y_i = 1.01 + 0.25 \text{ Day}$	۰,۲۴۳	۰,۲۶۳
۸	۱۷	$Y_i = 1.15 + 0.25 \text{ Day}$	۰,۲۴۰	۰,۲۶۲
۹	۹	$Y_i = 1.065 + 0.23 \text{ Day}$	۰,۲۱۱	۰,۲۵۳
۱۰	۲	$Y_i = 0.94 + 0.23 \text{ Day}$	۰,۲۱۹	۰,۲۴۲
۱۱	A7	$Y_i = 0.99 + 0.22 \text{ Day}$	۰,۲۰۸	۰,۲۳۲
۱۲	۱۵	$Y_i = 0.83 + 0.21 \text{ Day}$	۰,۲۱۰	۰,۲۱۸
۱۳	۴	$Y_i = 1.15 + 0.21 \text{ Day}$	۰,۲۰۵	۰,۲۲۳
۱۴	۱۳	$Y_i = 1.34 + 0.18 \text{ Day}$	۰,۱۵۴	۰,۱۸۱
۱۵	۱۸	$Y_i = 1.29 + 0.21 \text{ Day}$	۰,۲۰۰	۰,۲۲۱
۱۶	A4	$Y_i = 0.85 + 0.19 \text{ Day}$	۰,۱۸۴	۰,۱۹۳
۱۷	Control	$Y_i = 1.33 + 0.14 \text{ Day}$	۰,۱۲۸	۰,۱۵۱

معدنی کردن مواد آلی میزان دسترسی گیاه و یا میسلیوم قارچ به مواد غذایی در دسترس را افزایش می دهند (۱۱ و ۱۶). به نظر می رسد علاوه بر اینکه آکتینومیستهای جنس ترمومنوسپورا و استرپتومایسیس (آزمایش برسی میزان رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلخیق شده با آکتینومیست) دارای توانایی تجزیه خوب کمپوست می باشند، قادرند موادمعدنی و نیتروژن مورد نیاز قارچ را در حين فرایند تهیه کمپوست در خود انباسته کرده و در زمان رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه ای در دسترس آن قرار دهند. بنابراین قارچ خوارکی می تواند سریعتر پنجه دوانی کند که منجر به کاهش مدت زمان لازم برای برداشت اول می شود. از طرفی غالب شدن میسلیوم قارچ خوارکی در مدت زمان کوتاه سبب می شود که باکتری ها و قارچ های دیگر قادر به رقابت با آن نبوده و در نتیجه باعث کم شدن محصول نشوند.

با توجه به اینکه نتایج حاصل از میزان رشد میسلیوم روی کمپوست استریل شده و نتایج حاصل از رشد میسلیوم بر روی محیط کشت تهیه شده با بیوماس میکروبی تا اندازه قابل قبولی مطابقت دارد (جدول ۳ و ۴)، در مطالعات بعدی اندازه گیری میزان رشد میسلیوم روی محیط کشت تهیه شده با بیوماس میکروبی می تواند معیار خوبی برای سنجش اثر تلخیق کمپوست با آکتینومیستهای مورد نظر باشد. این روش ساده تر و کم هزینه تر بوده و در مدت زمان کوتاهی با تعداد

با توجه به شکل (۳) و جدول (۴) آکتینومیست نژاد شماره ۵ که از جنس ترمومنوسپورا می باشد، نسبت به بقیه نژادهای مورد آزمایش به صورت معنی داری از رشد میسلیوم قارچ خوارکی تکمه ای بیشتر حمایت نموده است. در این آزمایش آکتینومیستهای جنس استرپتومایسیس از نظر حمایت از میزان رشد میسلیوم قارچ بعد از جنس ترمومنوسپورا قرار گرفتند. در یک تحقیق پیرامون فراوانی نسبی اسپورهای نژادهای مختلف در توپل کمپوست سازی مشخص شد که انبوهای اسپورهای سه گونه از جنس ترمومنوسپورا در هوای توپل تاخیم در زمان مایه زنی کمپوست حضور دارند (۲۴). به نظر می رسد که گونه های این جنس می توانند شرایط محیطی مرحله پاستوریزاسیون را به خوبی تحمل نمایند. گونه ترمومنوسپورا کوروواتا آنزیم بتازایلوزیداز تولید می نماید. حدکثر فعالیت این آنزیم در درجه حرارت ۶۸ - ۶۰ سانتی گراد و در اسیدیته ۶ تا ۷ می باشد (۱۹)، همان شرایطی که کمپوست در توپل پاستوریزاسیون قرار می گیرد. آکتینومیست جنس ترمومنوسپورا در آزمایش تلخیق کمپوست با ایزولهای آکتینومیستی استفاده نشده بود. بنابراین امکان مقایسه اثر آن با آکتینومیستهای جنس استرپتومایسیس ممکن نیست. این ایزوله پس از آزمایش تلخیق کمپوست استخراج شده بود که در آزمایش بیوماس میکروبی مورد استفاده قرار گرفت. آکتینومیستهای جنس استرپتومایسیس و ساکارومایسیس با

مناسب در پایان این فاز دست یافت.
به دلیل ماهیت دینامیک میکرووارگانیسم‌ها، بررسی برهمکنش آکتینومیستها و قارچ‌های گرمادوست موجود در کمپوست ضروری می‌باشد. با انجام این بررسی‌ها می‌توان علاوه بر شناخت شرایط مساعد برای رشد میکرووارگانیسم‌های دخیل در تهیه کمپوست به یک ترکیب مناسب از آنها برای تلچیح کمپوست و افزایش عملکرد آن دست یافت. قبل از ارائه هر نوع راهکاری، آزمایشات تکمیلی برای بررسی اثر توام بیوماس میکروبی آکتینومیست‌های جنس ترمومونوسپورا و استرپتومایسنس همراه با تعدادی از قارچ‌های مفید ضروری است.

بیشتری از تیمارها قابل اجرا می‌باشد.
با توجه به نتایج این تحقیق، آکتینومیست‌ها بویژه جنس استرپتومایسنس و ترمومونوسپورا دارای نقش مهمی در تهیه کمپوست و تجزیه مواد خام اولیه به یک محیط رشد عالی و انتخابی برای میسلیوم قارچ خوارکی تکمه‌ای می‌باشند. بقایای آکتینومیست‌ها که در مرحله مایهزنی در کمپوست آماده وجود دارند یک منبع خوب از نیتروژن و ریزمعذی‌های لازم برای رشد میسلیوم قارچ می‌باشند. با بهینه‌کردن شرایط برای رشد آکتینومیست‌ها در حین کمپوست‌سازی و همچنین تلچیح مصنوعی کمپوست با آکتینومیست‌ها در اوایل فاز دوم تهیه کمپوست می‌توان به یک کمپوست خوب و با بیوماس میکروبی

منابع

- ۱- پاکدین ع، فارسی م. و مرعشی ح. ۱۳۸۶. شناسایی و بهینه سازی میکروفلور کمپوست قارچ خوارکی تکمه‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد
- ۲- فارسی م. و گردان ح.ر. ۱۳۸۶. پرورش و اصلاح قارچ‌های خوارکی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
- 3- Beffa T., Blanc M., Lyon P.F., Vogt G., Marchiani M., Fischer J.L., and Aragno M. 1996. Isolation of *Thermus* strains from hot composts (60 to 80 degrees C). *Appl. Environ. Microbiol.*, 62(5):1723-1727.
- 4- Beyer D.M. 2003. Basic procedures for *Agaricus* mushroom growing. Penn State's College of Agricultural Sciences, Agricultural Research and Cooperative Extension.
- 5- Chang S., and Miles P.G. 2004. Mushrooms cultivation, Nutritional value, Medicinal effect, and environmental Impact, second edition.2nd ed. Bocaraton, CRC press.
- 6- Fergus C.L. 1967. Resistance of spores of some thermophilic actinomycetes to high temperature. *Mycopathologia*, 23 (3):205-208.
- 7- Fermor T.R., and Smith J.F. 1984. Lignocellulose degradation in mushroom composts. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 9 (4):355-356.
- 8- Fordyce C. 1970. Relative numbers of certain microbial groups present in compost used for mushroom (*Agaricus bisporus*) propagation. *App. Microbiol.*, 196-199.
- 9- Godden B., Ball A.S., Helvenstein P., McCarthy A.J., Penninckx M.J. 1992. Towards elucidation of the lignin degradation pathway in actinomycetes. *J. Gen. Microbiol.*, 138(11):2441-2448.
- 10- Goyal R., Grewal R.B., and Goyal R.K. 2006. Nutritional attributes of *Agaricus bisporus* and *Pleurotus sajor caju* mushrooms. *Nutrition and health*, 18(2): 179-184.
- 11- Higa T. 1996. Effective microorganisms - Their role in Kyusei Nature Farming. In: J.F. Parr, et al. (eds.), Proceedings of the 3rd International Nature Farming Conference. USDA; Washington, 20-23.
- 12- Holtz C., Kaspari H., and Klemme J.H. 1991. Production and properties of xylanases from thermophilic actinomycetes. *Antonie van Leeuwenhoek*, 59(1):1-7
- 13- Iiyama K., Stone B.A., and Macauley B.J. 1994. Compositional changing in compost during composting and growth of *Agaricus bisporus*. *App. and Environ. Microbiol.* 6(5):1538-1546.
- 14- Jang H.D., and Chen K.S. 2003. Production and characterization of thermostable cellulases from *Streptomyces* transformant T3-1. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 19:263-268.
- 15- Lacey J. 1997. Actinomycetes in composting. *Ann. Agric. Environ. Med.*, 4:113-121.
- 16- Piyadasa E.R., Attanayake K.B., Ratnayake A.D.A. and Sangakkara U.R. 1995. The role of effective microorganisms in releasing nutrients from organic matter. In: H.A.H. Sharifuddin, A.R. Anuar & M.F. Shahbuddin, (eds.) Proceedings of the Second Conference on Effective Microorganisms (EM), at Kyusei Nature Farming Center, Saraburi, Thailand, November, 1993. 7-14.
- 17- Pope S., Knaust H., and Knaust K. 1963. Production of compost by thermophilic fungi. *Mushroom Sci.*, 5: 123-126.
- 18- Raper C.A., Raper J.R., and Miller R.E. 1972. Genetic analysis of the life-cycle of *Agaricus bisporus*. *Mycologia*, 64:1088-1117.
- 19- Singer R., and Harris B. 1987. *Mushrooms And Truffles Botany, cultivation, and utilization*.2nd rev., and enl. Ed.: Koeltz Scientific Books. Koenigstein, Federal Republic of Germany.
- 20- Storm P.F. 1985. Identification of thermophilic bacteria in solid-waste composting. *App. and Environ. Microbiol.*,

1:906-913.

- 21- Stuzenberger F., and Bodine A.B. 1998. Thermostable B-xylosidase from *Thermomonospora curvata*. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 20(1):55-60.
- 22- Suman B.C., and Sharma V.P. 2005. Mushroom Cultivation, Processing and uses. Agrobios, (India), 349 pp.
- 23- Tendler M.D., and Burkholder P.R. 1960. Studies on the thermophilic actinomycetes I. Methods of cultivation. App. Microbiol., 9:394-399.
- 24- Van den Bogart H.G., Van den Ende G., Van Loon P.C., and Van Griensven L.J. 1993. Mushroom worker's lung: serologic reactions to thermophilic actinomycetes present in the air of compost tunnels, 122(1):1-8.
- 25- Wiegant W.M. 1992. Growth characteristics of the thermophilic fungus *Scytalidium thermophilum* in relation to production of mushroom compost. Appl. Environ. Microbiol., 58(4):1301-1307.

Archive of SID



Investigation of the effects of actinomycetes inoculation and their biomass in compost on the growth of edible mushroom mycelia

A. Pakdin¹ - M. Farsi^{2*} - H. Marashi³

Abstract

Edible white button mushroom is a secondary decomposer and the activity of other micro-organisms is necessary to decompose the raw compounds for its growth. Actinomycetes bacteria due to their ability to decompose the compound molecules such as cellulose, lingo-cellulose and lignin, play an important role in the composting process for the mushroom. Bacterial biomass of actinomycetes contains a high rate of nitrogen and minerals, necessary for growth of the mushroom. To investigate the effects of actinomycetes on growth of mushroom mycelia, isolates of the genus of *Streptomyces*, *Saccharomonospora*, *Thermomonospora*, *Nocardoides*, *Saccharopolyspora*, *Microbispora*, *Glycomyces* were used for inoculating of sterile compost and preparing bacterial biomass. The result showed that inoculating of compost with actinomycetes could have a significant effect on the growth of mushroom mycelia, compared to the control. Isolates belonging to the genus *Streptomyces* supported a higher growth of the mushroom mycelia.

Key words: Actinomycetes, Bacterial biomass, Compost, Edible button mushroom, *Agaricus bisporus*

1,2,3 - Contribution from Agricultural Biotechnology Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
(*- Corresponding author Email: mihfarsi@yahoo.com)