



اثر سه روش آبیاری میکرو بر عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت خیار

سید حسین صدرقاين^۱

تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۲

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱/۲۷

چکیده

به منظور بررسی اثر سه روش آبیاری میکرو بر عملکرد محصول خیار یک طرح تحقیقاتی طی دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین به مرحله اجرا در آمد. سه روش آبیاری میکرو به عنوان عامل اصلی و سه سطح تأمین آب به عنوان عامل فرعی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک-های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد روش آبیاری قطره ای با سطح تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی، روش آبیاری تیپ در عمق سی سانتی متری خاک با سطح تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ در سطح خاک باسطح خاک با سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی به ترتیب بیشترین عملکرد محصول را داشتند، اما بین میانگین عملکرد این تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف نشان داد، تیمارهای روش آبیاری تیپ در عمق و در سطح خاک با سطح تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ در عمق سی سانتی متری و در سطح خاک با سطح آبیاری ۷۵ درصد نیاز آبی بیشترین میانگین کارایی مصرف آب این تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به عبارتی تیمار روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی بیشترین میانگین عملکرد و کارایی مصرف آب را داشته و با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نداشته است. با توجه به نتایج حاصله می توان برای حصول حداقل کارایی مصرف آب و عملکرد بالای محصول تیمار روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی را به کشاورزان در شرایط کمیاب آب توصیه نمود.

واژه های کلیدی: آبیاری قطره ای، کارایی مصرف آب، خیار، عملکرد، ورامین

ارایه شده می باشد (۱). الیس و همکاران (۳) برنامه آبیاری خیار را در طی دوره زمانی ۸۶-۹۸ مورد مطالعه قرار دادند. در سال اول، زمان آبیاری با استفاده از تانسیومتر و مقدار آب براساس استاندارد USDA آبیاری تعیین شد. نتایج نشان داد با برنامه آبیاری اعمال شده هیچ نوع تنفسی به گیاه وارد نشده است، لذا درسالهای بعد حجم آبیاری که براساس استاندارد USDA مشخص می شد در درصدهای مختلف به گیاه تحت مطالعه داده شد. بعد از ۴ سال بررسی نتایج نشان داد بهترین ترکیب افزایش عملکرد، راندمان مصرف آب و حداقل تعداد آبیاری، زمانی حاصل می شود که آبیاری در زمانی که ۴۰ درصد آب قبل استفاده گیاه مصرف شده، صورت گیرد و در این زمان فقط ۷۰ درصد آب برآورد شده به گیاه داده شود. آن ها در نهایت تجدید نظری در ضریب گیاهی خیار انجام دادند تا مقادیر نیاز آبی محاسبه شده با نیاز خالص آبی خیار فاصله زیادی نداشته باشد. خیار یکی از محبوب ترین سبزی های موجود در جهان است. خیار در مقایسه با غلات دارای نیاز آبی بالاتری می باشد (۵ و ۶). مائو و همکاران (۶) نتیجه گرفتند که عملکرد میوه خیار به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر حجم کل آب آبیاری در طول فصل رشد گیاه است به طوری که بین عملکرد و میزان آب به کار رفته برای محصول خیار یک رابطه خطی وجود

مقدمه

افزایش تولید محصولات کشاورزی با هدف فائق آمدن بر تقاضای روزافزون به غذا از دو طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش سطح زیرکشت امکان پذیر می باشد. بهره جستن از هر یک از این طرق دارای مسایل و مشکلات خاص خود می باشد. محدودیت منابع تولید به خصوص محدودیت منابع آبی، افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیرکشت را محدود می سازد. خشکسالی های اخیر این موضوع را حادتر می نماید به نحوی که با افزایش روزافزون کمبود آب خطر کاهش سطح زیرکشت نیز روز به روز افزایش می باید. به عبارت دیگر در شرایط کنونی، در درجه اول حفظ و پس از آن افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی مستلزم استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی است. در این راستا استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور افزایش راندمان آبیاری اجتناب ناپذیر و ترویج این تکنولوژی ها مستلزم انجام تحقیقات چند جانبه (از لحاظ فنی و اقتصادی) بر روی سیستم های

۱- مری پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
Email: sadr_ghaen@yahoo.com

محصولات دراقتصاد خانوار کشاورز، انگیزه ای برای انجام این تحقیق شد.

مواد و روش‌ها

با استفاده از تجارب اجرای طرح در سال ۱۳۷۸ و عدم کارایی لوله‌های تراوا، در سال ۱۳۷۹ تیمارهای استفاده از لوله‌های تراوا از آزمایش حذف و تیمار آبیاری با استفاده از نوارهای آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک به آزمایش اضافه شد. بنابراین در سال دوم اجرای طرح، سه روش آبیاری با استفاده از نوارهای آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک، استفاده از نوارهای آبده تیپ در سطح خاک و استفاده از لوله‌های قطره‌چکان‌دار به عنوان عامل اصلی و سه سطح تأمین آب ۷۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی به عنوان عامل فرعی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جدول ۱ تیمارهای تحت بررسی در این طرح را نشان می‌دهد. در جدول مذکور نمادهای A_1 و B_1 به ترتیب معرف روش آبیاری و سطح تأمین آب می‌باشند.

جدول ۲ نتیجه تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده در آبیاری را نشان می‌دهد. نتایج تجزیه آب نشان می‌دهد که آب مورد استفاده هیچ‌گونه محدودیتی ندارد.

طرح آزمایشی در چهار تکرار اجرا شد. بدین منظور ۳۶ کرت آزمایشی به مساحت هریک ۲۲/۵ مترمربع آماده گردید (طول هر کرت ۵ متر و عرض آن ۴/۵ متر). در هر کرت سه ردیف به فاصله ۱/۵ متر کشت گردید. فاصله بوته‌ها روی هر ردیف کشت ۰/۵ متر، تعداد بوته در هر ردیف ۱۰ عدد و تعداد بوته در هر کرت ۳۰ عدد بود. در تیمارهای روش تیپ از نوارهای ۲۰۰ میکرون با فاصله مجازی آبده ۳۰ سانتی‌متر با دبی ۴ لیتر در ساعت در هر متر طول لوله و در تیمار روش لوله‌های قطره‌چکان‌دار از لوله‌های ۱۶ میلی‌متر با قطره‌چکان ۴ لیتر در ساعت با فواصل نیم‌متری استفاده گردید.

دارد. همچنین آن‌ها دریافتند که کاهش حجم آب آبیاری در طول مرحله میوه‌دهی خیار سبب کاهش قابل ملاحظه عملکرد خیار می‌گردد. در روش آبیاری قطره‌ای، به علت این که در هر بار آبیاری حجم کمی از خاک مرتبط می‌گردد، تغییرات رطوبتی خاک در ناحیه توسعه ریشه در طول فصل رشد ناچیز است. در نتیجه این امر، می‌توان مقادیر آب آبیاری به علاوه بارندگی را معادل تبخیر تعرق گیاه در نظر گرفت (البته این امر تا زمانی است که آب مازاد بر نیاز آبی گیاه از ناحیه توسعه ریشه گیاه خارج نگردیده باشد). در این شرایط، عمق بهینه آبیاری را باید بر این میزان تبخیر تعرق استاندارد گیاه که منجر به حصول حداقل عملکرد محصول می‌شود، در نظر گرفت (۲). سیم سکا و همکاران (۸) دریافتند که با کاربرد روش آبیاری قطره‌ای برای محصول خیار، میزان عمق آب آبیاری از ۶۰۰ به ۹۰۰ میلی‌متر کاهش یافت. آن‌ها همچنین برای عملکرد و عمق آب آبیاری خیار یک رابطه غیر خطی از نوع درجه دو ارایه نمودند. ژونگ و همکاران (۹) گزارش نمودند که میزان حجم آبیاری به طور معنی‌داری بر رشد گیاه و تولید محصول خیار تأثیر گذار است. آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که اندازه گیری میزان آب تبخیر شده از تشت تبخیر استاندارد، یک روش ساده، مناسب و کم هزینه برای تعیین میزان عمق آب آبیاری در روش آبیاری قطره‌ای برای محصول خیار است. در طبقه بندی محصولات کشاورزی، محصولات سبزی و صیفی در گروه محصولات نقدی (Cash Crops) قرار می‌گیرند. خصوصیت باز این گروه از محصولات این است که محصول تولید شده به عنوان محصول نهائی در بازار عرضه شده و همچنین دوره زمانی برگشت سرمایه در این گروه از محصولات بسیار کوتاه می‌باشد و به همین خاطر کشاورزان تمایل زیادی به کشت این گروه از محصولات دارند. از سوی دیگر محصولات سبزی و صیفی نسبت به کمبود آب بسیار حساس بوده و هرگونه نقصان در آبیاری محصول منجر به کاهش شدید عملکرد می‌گردد. لزوم استفاده بهینه از منابع آبی، حساسیت زیاد محصولات سبزی و صیفی به کمبود آب و اهمیت این گروه از

جدول ۱- معرفی تیمارهای تحت بررسی

تیمار	ردیف	روش آبیاری	تیمارهای تحت بررسی	سطح تأمین آب
A_1B_1	۱	نوار آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	نوار آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	۵۰ درصد نیاز آبی
A_1B_2	۲	نوار آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	نوار آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	۷۵ درصد نیاز آبی
A_1B_3	۳	نوار آبده تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	نوار آبده تیپ در سطح خاک	۱۰۰ درصد نیاز آبی
A_2B_1	۴	نوار آبده تیپ در سطح خاک	نوار آبده تیپ در سطح خاک	۵۰ درصد نیاز آبی
A_2B_2	۵	نوار آبده تیپ در سطح خاک	نوار آبده تیپ در سطح خاک	۷۵ درصد نیاز آبی
A_2B_3	۶	نوار آبده تیپ در سطح خاک	نوار آبده تیپ در سطح خاک	۱۰۰ درصد نیاز آبی
A_3B_1	۷	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	۵۰ درصد نیاز آبی
A_3B_2	۸	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	۷۵ درصد نیاز آبی
A_3B_3	۹	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	لوله قطره‌چکان‌دار در سطح خاک	۱۰۰ درصد نیاز آبی

جدول ۲- نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده

میزان آنیون ها و کاتیون ها (میلی اکی والان در لیتر)

نسبت جذب سدیم SAR	طبقه بندی	کاتیون ها			آنیون ها			هدایت الکتریکی (ds/m)		
		کل	سدیم Na ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	کل	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	
		۸/۱	۸/۵	۲/۳	۲/۲	۶/۱	۸/۲	۱/۵	۴/۷	۰/۷
C ₁ S ₁	۱/۲									

بیماری خاصی بوتهها را تهدید ننمود و بالطبع مبارزه ای علیه آفات و بیماری ها در هیچ یک از تیمارها صورت نگرفت. برای مبارزه با علف های هرز در ۸ نوبت وجین کرتهای به روش مکانیکی صورت گرفت. مولدن (۷) میزان ماده تولیدی گیاه به ازاء واحد آب مصرفی را کارایی مصرف آب تعریف نمود و رابطه زیر را برای محاسبه آن ارایه کرد.

$$WUE = Y/W$$

در این رابطه، Y می تواند بیانگر کل ماده تولیدی یا کل ماده خشک تولید شده توسط گیاه و یا عملکرد اقتصادی (عملکرد دانه یا عملکرد بیولوژیکی و یا هر دو) باشد. W می تواند مقادیر مختلف آب شامل مقدار آب تعرق یافته توسط گیاه، مقدار تبخیر تعرق، مقدار کل آب مصرفی (مجموع مقادیر بارندگی و آبیاری)، مقدار آب مفید مصرفی و یا مجموع آب مفید و غیر مفید مصرفی می باشد (۴).

نتایج عملکرد تیمارها

در جدول ۳ میانگین عملکرد تیمارهای تحت آزمایش به تفکیک چین های مختلف برداشت محصول و در کل آزمایش ارایه شده است.

پس از آماده سازی زمین، نصب و راه اندازی، به منظور افزایش رطوبت خاک زراعی تا حد ظرفیت مزروعه، سیستم های آبیاری به مدت ۸ ساعت برای تمام تیمارها کار کرد. بررسی رطوبت خاک در عمق کاشت نشان داد رطوبت برای کاشت بذر مناسب و از این رو سه عدد بذر خیار (رقم سوپر دومینوس) در هر یک از حفره های تعییه شده کشت گردید. اولین و دومین مرحله واکاری پس از بازدید از مزروعه و بررسی سطح سبز در هر سه روش آبیاری انجام شد. درصد سبز تیمارهای روش آبیاری قطره ای کمتر از سایر تیمارها بود که دلیل آن ایجاد سله در روش آبیاری قطره ای و حساسیت زیاد بذر خیار به سله می باشد، مرحله سوم واکاری تنها در تیمارهای مربوط به این روش آبیاری صورت گرفت. بدین ترتیب قبل از استقرار کامل بوته ها و رسیدن به مرحله ۴ برگ حقیقی، سطح سبز لازم برای آزمایش در کلیه تیمارها حاصل شد. پس از استقرار کامل بوته ها، تیمارهای سطوح آبیاری با استفاده از تشت تبخیر و تعیین مقادیر نیاز آبی و تأمین ۷۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی برای هر یک از سه تیمار روش آبیاری میکرو اعمال و حجم آب ورودی به هر تیمار به وسیله کنترور حجمی اندازه گیری و ثبت گردید. شایان ذکر است که پیش از اعمال تیمارهای سطوح تأمین آب، تأمین آب مورد نیاز گیاه در کلیه تیمارها به طور یکسان انجام شد. بررسی های تکمیلی مزروعه در زمان استقرار کامل بوته ها و شروع برنامه آبیاری بیانگر این موضوع بود که آفت یا

جدول ۳- میانگین عملکرد تیمارها به تفکیک چین های برداشت محصول و در کل آزمایش (کیلوگرم بر هکتار)

چین	تاریخ	A ₁ B ₁	A ₁ B ₂	A ₁ B ₃	A ₂ B ₁	A ₂ B ₂	A ₃ B ₁	A ₃ B ₂	A ₅ B ₃
اول	۸۰/۴/۷	۱۲۵۵/۸	۸۰/۴/۴	۵۵۵/۶	۷۹۰	۷۷۳/۳	۵۰۱/۷	۵۴۵	۱۰۱۳/۳
دوم	۸۰/۴/۹	۸۷۰/۹	۸۷۳/۳	۷۰۵/۹	۷۵۱/۷	۸۵۳/۲	۶۶۹/۶	۸۸۸/۳	۵۶۳
سوم	۸۰/۴/۱۱	۱۰۹۰/۲	۱۲۹۰/۱	۱۳۴۴/۱	۱۳۵۲/۹	۱۶۹۷/۴	۱۶۲۱/۳	۱۳۴۷	۹۷۷/۷
چهارم	۸۰/۴/۱۳	۲۹۱۰/۹	۲۹۱۰/۹	۳۸۳۰	۲۳۵۶/۳	۴۱۲۹/۲	۳۶۱۵/۹	۱۷۴۸/۴	۲۵۳۷/۸
پنجم	۸۰/۴/۱۶	۱۲۸۶/۴۴	۱۰۰۲/۴	۱۲۲۷/۷	۹۶۴/۲	۹۷۶/۸	۸۱۶/۴	۵۹۳/۸	۱۱۲۰/۴
ششم	۸۰/۴/۱۸	۱۴۱۹/۴	۱۶۲۶/۴	۱۵۶۵/۴	۱۳۰۴/۴	۲۲۵۸/۲	۱۱۹۸/۳	۵۹۷/۱۱	۱۲۸۷/۳
هفتم	۸۰/۴/۲۰	۱۵۹۹/۶	۳۱۶۷/۸	۳۱۶۷/۸	۱۷۶۵/۹	۲۸۲۷/۸	۲۹۹۷/۸	۹۳۶/۱۱	۲۱۷۴/۴
هشتم	۸۰/۴/۲۳	۱۲۲۲/۷	۱۵۸۰/۲	۱۹۲۱/۷	۷۲۳/۹	۱۰۱۲/۲	۱۷۵۹/۲	۷۵۷/۱۱	۱۱۹۱/۲
نهم	۸۰/۴/۲۶	۱۷۲۶/۶	۳۳۲۵/۶	۳۹۲۰	۱۷۹۰	۲۲۵۸/۲	۳۰۵۱/۱	۹۸۰	۲۳۲۴/۴
دهم	۸۰/۴/۲۷	۱۰۶۰/۶	۱۲۱۶/۳	۱۴۵۶/۶	۱۲۹۷/۲	۱۷۷/۷	۱۷۴۷/۲	۴۰۳/۹	۱۲۲۱/۳
یازدهم	۸۰/۴/۲۹	۱۳۰۸/۵	۱۰۰۳/۳	۱۴۸۸/۸	۸۱۶/۷	۹۵۳/۳	۱۰۱۷/۸	۱۲۴۶/۷	۱۵۰۳/۳
جمع	۱۵۷۵۵	۱۹۴۹۶	۲۱۱۸۴	۱۳۳۹۴	۲۰۳۶۶	۱۹۵۹۶	۸۸۹۰	۱۶۳۵۲	۲۱۵۶۴

جدول ۴- میزان آب مصرفی تیمارها به تفکیک چین‌های برداشت محصول(مترا مکعب بر هکتار)

A ₃ B ₃	A ₃ B ₂	A ₃ B ₁	A ₂ B ₃	A ₂ B ₂	A ₂ B ₁	A ₁ B ₃	A ₁ B ₂	A ₁ B ₁	چین
۱۵۳۹/۸۳	۱۱۴۹/۹۷	۷۴۰/۷۸	۱۵۲۳/۰۳	۱۲۵۶/۹۰	۷۶۹/۰۵	۱۵۲۷	۱۱۴۵/۸۴	۸۸۴/۹۱	اول
۵۳/۰۷	۳۹/۸۷	۲۶/۵۳	۵۳/۰۷	۳۹/۸۷	۲۶/۵۳	۵۳/۰۷	۳۹/۷۳	۲۶/۵۳	دوم
۵۹/۲	۴۴/۴	۲۹/۶	۵۹/۲	۴۴/۴	۲۹/۶۰	۵۹/۲	۴۴/۴	۲۹/۶	سوم
۶۸	۴۹/۰۷	۳۲/۶۷	۶۵/۳۳	۴۸/۹۳	۳۲/۶۷	۶۵/۳۳	۴۸/۹۳	۳۲/۶۷	چهارم
۹۷/۸۷	۷۳/۲	۴۸/۹۳	۹۷/۸۶	۷۳/۲	۴۸/۹۳	۹۷/۸۷	۷۳/۲	۴۸/۹۳	پنجم
۵۷/۰۷	۴۲/۸	۲۸/۵۳	۵۷/۰۷	۴۲/۸	۲۸/۵۳	۴۶	۴۲/۸	۲۸	ششم
۴۸/۹۳	۳۶/۶۷	۲۴/۴	۴۸/۹۳	۳۶/۶۷	۲۴/۴۰	۴۸/۹۳	۳۶/۶۷	۲۴/۴	هفتم
۷۳/۴۶	۵۵/۰۷	۳۶/۶۷	۷۳/۴۶	۵۵/۰۷	۳۶/۶۷	۷۳/۴۷	۵۵/۰۷	۳۶/۶۷	هشتم
۷۱/۳۳	۵۳/۶	۳۵/۷۳	۷۱/۳۳	۵۴/۶۷	۳۵/۷۳	۷۰/۴	۵۳/۶	۳۵/۷۳	نهم
۱۸/۴	۱۳/۷۳	۹/۲	۱۸/۴	۱۳/۷۳	۹/۲	۱۸/۴	۱۳/۷۳	۹/۲	دهم
۴۴/۸	۳۳/۶	۲۰/۲۷	۴۴/۸	۳۳/۶	۲۰/۲۷	۴۴/۸	۳۳/۶	۲۰/۲۷	یازدهم
۲۱۳۲	۱۵۹۲	۱۰۳۳/۳	۲۱۱۲/۵	۱۶۹۹/۸	۱۰۶۱/۶	۲۱۰۴/۵	۱۵۸۷/۶	۱۱۷۶/۹	جمع

سانتی‌متری خاک از دو تیمار دیگر آبیاری کارایی بهتری داشته و چون تبخیر از سطح خاک را کاهش داده، در تأمین نیاز آبی خیار کارایی بهتری داشته است.

اثر سطوح تأمین آب بر میانگین عملکرد

جدول ۶ میانگین عملکرد محصول را در کرت‌های فرعی آزمایش نشان می‌دهد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که میانگین عملکرد محصول در تیمار سطح تأمین آب به میزان ۵۰ درصد نیاز آبی به طور معنی‌داری کمتر از میانگین عملکرد در دیگر تیمارهای سطوح آبیاری می‌باشد. براساس این آزمون اختلاف معنی‌داری بین میانگین عملکرد تیمارهای سطوح تأمین آب به میزان ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی مشاهده نشید. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش حجم آب آبیاری میزان عملکرد افزایش یافته است و بالاترین میزان عملکرد از تیمار تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی حاصل شده است، این نتایج با نتایج مائو و همکاران (۵) مطابقت دارد.

میزان آب مصرفی

جدول ۴ میزان آب مصرفی هریک از تیمارها در فاصله زمانی بین چین‌های مختلف و همچنین در کل مدت آزمایش را نشان می‌دهد. میزان آب مصرفی تا چین اول در ردیف اول جدول و میزان آب مصرفی در حد فاصل بین چین‌ها در ردیف‌های بعدی جدول ارایه گردیده است.

اثر روش آبیاری بر میانگین عملکرد

جدول ۵ میانگین عملکرد محصول را در کرت‌های اصلی آزمایش نشان می‌دهد. براساس آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری بین عملکرد محصول در تیمار روش‌های مختلف آبیاری مشاهده نشد. بالاترین مقدار عملکرد از تیمار آبیاری تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک به میزان ۱۸۸۱۱ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد از تیمار آبیاری قطره‌ای در سطح خاک به میزان ۱۵۶۰۲ کیلوگرم در هکتار حاصل شد. این نتایج نشان می‌دهد که تیمار آبیاری تیپ در عمق ۳۰

جدول ۵- گروه‌بندی میانگین عملکرد محصول در کرت‌های اصلی آزمایش بر اساس آزمون دانکن

تیمار روش آبیاری	میانگین عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)	گروه
آبیاری تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	۱۸۸۱۱	A
آبیاری تیپ در سطح خاک	۱۷۷۸۶	A
آبیاری قطره‌ای در سطح خاک	۱۵۶۰۲	A

جدول ۶- گروه‌بندی میانگین عملکرد محصول در کرت‌های فرعی آزمایش بر اساس آزمون دانکن

سطح تأمین آب	میانگین عملکرد (کیلوگرم بر هکتار)	گروه
۱۰۰ درصد نیاز آبی	۲۰۷۸۱/۳	A
۷۵ درصد نیاز آبی	۱۸۷۳۸/۳	A
۵۰ درصد نیاز آبی	۱۲۶۷۹/۴	B

اثر روش آبیاری بر میانگین کارایی مصرف آب


جدول ۷ میانگین کارایی مصرف آب در کرت‌های اصلی را نشان می‌دهد. تفاوت مشاهده شده بین میزان کارایی مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری در سطح ۱ درصد معنی‌دار می‌باشد. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میزان کارایی مصرف آب در روش آبیاری قطره‌ای به طور معنی‌داری از دو روش دیگر آبیاری میکرو کمتر می‌باشد. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که بین میانگین کارایی مصرف آب در روش آبیاری تیپ در عمق و در سطح خاک و همچنین بین میانگین کارایی مصرف آب در روش آبیاری تیپ در سطح خاک و قطره‌ای اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین کارایی مصرف آب
میانگین کارایی مصرف آب در کرت‌های فرعی در جدول ۸ ارایه شده است. براساس نتایج آزمون دانکن، میانگین کارایی مصرف آب در تیمار تأمین آب ۱۰۰ درصد نیاز آبی به‌طور معنی‌داری کمتر از دو تیمار دیگر سطح آبیاری می‌باشد. بین میانگین کارایی مصرف آب در تیمارهای تأمین آب به میزان ۵۰ و ۷۵ درصد نیاز آبی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

اثر متقابل روش آبیاری و سطح تأمین آب بر میانگین

عملکرد

شکل ۱ میانگین عملکرد محصول در کلیه تیمارهای تحت آزمایش را نشان می‌دهد. براساس نتایج آزمون دانکن میانگین عملکرد تیمارهای تأمین آب در سطح ۱۰۰ درصد نیاز آبی در هر سه روش آبیاری و تأمین آب در سطح ۷۵ درصد نیاز آبی در روش‌های آبیاری تیپ در عمق و در سطح خاک تفاوت معنی‌داری ندارند. میانگین عملکرد تیمارهای تأمین آب ۵۰ درصد نیاز آبی در روش‌های آبیاری تیپ در عمق خاک و در سطح خاک و تیمار تأمین آب در سطح ۷۵ درصد نیاز آبی در روش آبیاری قطره‌ای تفاوت معنی‌داری ندارند. میانگین عملکرد در تیمار تأمین آب ۵۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری قطره‌ای به طور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که کمترین میزان عملکرد در هر سه روش آبیاری میکرو از تیمار ۵۰ درصد تأمین نیاز آبی حاصل شده و این بیانگر آن است که خیار گیاهی نسبتاً حساس به تنفس آبی می‌باشد و با کاهش حجم آب آبیاری، عملکرد محصول کاهش می‌یابد. این نتایج با نتایج ژونگ و همکاران (۷) مطابقت دارد.




شکل ۱- عملکرد محصول در تیمارهای مختلف

جدول ۷- گروه‌بندی میانگین کارایی مصرف آب در کرت‌های اصلی براساس آزمون دانکن

تیمار روش آبیاری	میانگین کارایی مصرف آب(کیلوگرم بر متر مکعب)	گروه
آبیاری تیپ در عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک	۱۱/۹۱	A
آبیاری تیپ در سطح خاک	۱۱/۲۹	AB
آبیاری قطره‌ای در سطح خاک	۹/۶۶	B

جدول ۸- گروه‌بندی میانگین کارایی مصرف آب در کرت‌های فرعی براساس آزمون دانکن

گروه	میانگین کارایی مصرف آب(کیلوگرم بر متر مکعب)	سطح تأمین آب
A	۱۱/۵۴	۵۰ درصد نیاز آبی
A	۱۱/۵۱	۷۵ درصد نیاز آبی
B	۹/۸۲	۱۰۰ درصد نیاز آبی


شکل ۲- کارایی مصرف آب در تیمارهای تحت آزمایش (کیلوگرم بر مترمکعب)

نداشته‌اند. نتایج مقایسه عملکرد در تیمارهای سطح تأمین آب نشان داد که تنها میانگین عملکرد در تیمار سطح تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی به طور معنی‌داری کمتر از میانگین عملکرد تیمارهای سطح تأمین ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی می‌باشد. کاهش معنی‌دار عملکرد در تیمار ۵۰ درصد نیاز آبی بیانگر این است که خیار گیاهی نسبتاً حساس به تنش رطوبتی بوده و کمبود نیاز آبی باعث کاهش معنی‌دار عملکرد می‌گردد. مقایسه میانگین عملکرد کلیه تیمارهای تحت آزمایش نشان داد، تیمارهای روش آبیاری قطره‌ای با سطح تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی، روش آبیاری تیپ در عمق خاک با سطح تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ در سطح خاک را داشته‌اند ولی بین میانگین عملکرد این ترتیب بیشترین عملکرد را داشته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که برای حصول بالاترین عملکرد در زراعت خیار با استفاده از سیستم‌های آبیاری میکرو در شرایط عدم کمبود منابع آبی، تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه ضروری می‌باشد.

تجزیه واریانس میانگین کارایی مصرف آب نشان داد که میانگین کارایی مصرف آب در روش آبیاری قطره‌ای به طور معنی‌داری کمتر از روش آبیاری تیپ در عمق خاک است. روش آبیاری تیپ در سطح خاک از این لحاظ تفاوت معنی‌داری با دو روش دیگر آبیاری نداشت. نتایج مقایسه کارایی مصرف آب در سطوح مختلف تأمین آب نشان داد که میانگین کارایی مصرف آب در تیمار سطح ۱۰۰ درصد تأمین

اثر متقابل روش آبیاری و سطح تأمین آب بر میانگین کارایی مصرف آب

شکل ۲ میانگین کارایی مصرف آب در کلیه تیمارهای تحت آزمایش را نشان می‌دهد. براساس نتایج آزمون دانکن میانگین کارایی مصرف آب در تیمارهای روش آبیاری قطره‌ای در دو سطح تأمین ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۵۰ و ۷۵ درصد نیاز آبی تفاوت معنی‌داری ندارند. میانگین کارایی مصرف آب در دو تیمار روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی و تیمار روش آبیاری قطره‌ای در سطح تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی، تنها با تیمار روش آبیاری تیپ در عمق خاک با سطح تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی تفاوت معنی‌دار داشته و بین سایر تیمارهای تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

تجزیه واریانس میزان عملکرد خیار نشان داد که بین روش‌های مختلف آبیاری در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. این نتیجه بیانگر آن است که هر سه روش آبیاری میکرو از کارایی قابل قبولی برخوردار بوده و در تأمین نیاز آبی خیار نقش موثری داشته‌اند و اختلاف معنی‌داری بر عملکرد محصول خیار

معنی داری مشاهده نشد. با عنایت به نتایج حاصله و با توجه به کمبود منابع آبی در اکثر دشت های کشور برای حصول حداکثر کارایی مصرف آب و عملکرد بالای محصول روش آبیاری تیپ در سطح خاک با سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی، از سایر تیمارها ارجح تر بوده و قابل توصیه به کشاورزان در شرایط کمبود آب می باشد. در صورتی که کمبود منابع آبی وجود نداشته باشد و حصول حداکثر تولید مدنظر باشد، روش آبیاری تیپ در عمق خاک با تأمین ۱۰۰ درصد نیاز آبی قابل توصیه می باشد.

نیاز آبی به طور معنی داری کمتر از دو تیمار دیگر سطح تأمین آب می باشد و بین میانگین کارایی مصرف آب دو تیمار سطح تأمین ۷۵ و ۵۰ درصد نیاز آبی تفاوت معنی داری وجود ندارد. مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف نشان داد که به ترتیب تیمارهای روش آبیاری تیپ در عمق و سطح خاک با سطح تأمین ۵۰ درصد نیاز آبی و روش آبیاری تیپ به ترتیب در عمق و سطح خاک در سطح تأمین ۷۵ درصد نیاز آبی بیشترین میانگین کارایی مصرف آب را داشته اند، اما بین میانگین کارایی مصرف آب این تیمارها تفاوت

منابع

- ۱- صدرقاین س.ح، راضی ز، رفعتی م. و شهریاری د. ۱۳۸۱. ارزیابی فنی - اقتصادی سیستم های آبیاری میکرو (تراوا، لوله های دو جداره و قطره ای) و بررسی کاربرد این سیستم ها در مقایسه با آبیاری سطحی در زراعت خیار. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. شماره ۸۱/۳۷ سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
- 2- Amer K.A., Midan S.A., and Hatfield J.L. 2009. Effect of deficit irrigation and fertilization on cucumber. *Agronomy J.* Vol. 101(6):1556-1564.
- 3- Ellis J.E., Kruse G., and Mcsay A.E. 1989. Scheduling irrigation for cucumber. *Hort science HJHSAR*, 24(3): PP.448-452.
- 4- Lamm F.R., Rogers D.H., and Manges H.L. 1994. Irrigation scheduling with planned soil water depletion. *Transaction of ASAE* 37(5): 1491–1497.
- 5- Li J., and Wang X. 2000. The present studying situation and existing problems of water-saving irrigation index for vegetable. (In Chinese) *Agric. Res. Arid Areas* 18:118–123.
- 6- Mao X., Liu M., Wang X., Liu C., Hou Z., and Shi J. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain. *Agric. Water Manage.* 61:219–228.
- 7- Molden D. 1997. Accounting for water use and productivity. SWIM Paper 1. International Irrigation Management Institute, Colombo, Sri Lanka. 16 pp.
- 8- Simsek M., Tonkaz T., Kacira M., Comlekcioglu N., and Dogan K. 2005. The effects of different irrigation regimes on cucumber (*Cucumis sativus* L.) yield and yield characteristics under open field conditions. *Agric. Water Manage.* 73:173–191.
- 9- Zhong Y., Khan M.A., and Shahidi F. 2007. Compositional characteristics and antioxidant properties of fresh and processed sea cucumber (*Cucumaria frondosa*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 55: 1188–1192.



Effect of Three Methods of Micro Irrigation Systems on Cucumber Water Use Efficiency and Yield

H. Sadreghaen¹

Received: 23-11-2011

Accepted: 15-4-2012

Abstract

In order to study of the effects of irrigation methods and different water supply levels on the yield of cucumber, an experiment was conducted in Varamin Agriculture Research Center. The statistical model was a split plot design based on RCBD. The main factor was irrigation methods in three different levels (as Tape in 30cm depth, Tape in surface of soil and surface drip irrigation). The sub factor was different water application levels (as 100, 75 & 50 percent of water requirement). The results indicated that, surface drip irrigation and Tape in 30 cm depth method with 100 % water application level and Tape in surface with 75 % water application level had the highest yield respectively. there were no significant differences between mean yields. The methods of Tape in depth and Tape in surface with 75% and 50% water application levels had the highest water use efficiency. The results showed that the Tape in surface with 75% water application is the best treatment and it can be recommended to farmers in water scarcity conditions.

Keywords: Micro Irrigation, Water Use Efficiency, Cucumber, Yield, Varamin

1- Lecture of Agricultural Engineering Research Institute
Email: sadr_ghaen@yahoo.com