

## تأثیر پتاسیم و شوری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته در محیط پرلیت

وحید مظفری<sup>۱\*</sup> - لیلا امیدی<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۱/۱۰

### چکیده

به منظور بررسی تأثیر پتاسیم و شوری بر برخی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرنده)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شوری (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم) و پتاسیم (صفر و ۱ میلی مولار پتاسیم از منبع نترات پتاسیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در محیط پرلیت انجام شد. جهت بررسی غلظت پرولین و قندهای احیاء کننده در دو زمان مختلف (سه و شش روز پس از اعمال شوری) طرح به صورت فاکتوریل اسپلیت با سه تکرار تجزیه گردید و در آن شوری × پتاسیم به عنوان فاکتور اصلی در قالب طرح کاملاً تصادفی و زمان به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نمونه برداری های مربوط به غلظت پرولین و قندهای احیاء کننده، سه و شش روز پس از اعمال شوری انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد، با افزایش شوری (کلرید سدیم) از صفر به ۱۰۰ میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی و ریشه به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۵ درصد افزایش معنی داری یافت. با افزایش پتاسیم از صفر به ۱ میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی از ۰/۸۸۵ به ۱/۰۰۷ گرم در هر گلدان رسید. کاربرد ۱ میلی مولار پتاسیم، ارتفاع گیاه و تعداد برگ را به طور معنی داری افزایش داد. افزایش شوری موجب افزایش معنی دار سدیم و کاهش منیزیم گیاه گردید. غلظت پرولین و قندهای احیاء کننده سه روز پس از اعمال شوری افزایش معنی داری حاصل نمود در حالی که پتاسیم غلظت پرولین را کاهش داد. همچنین، عامل زمان به طور معنی داری غلظت قندهای احیاء کننده را تحت تأثیر قرار داد به طوری که با گذشت ۷۲ ساعت غلظت قندهای احیاء کننده کاهش معنی داری حاصل نمود اما در مورد غلظت پرولین این گونه نبود.

واژه های کلیدی: پتاسیم، شوری، پرلیت، پرولین، قندهای احیاء کننده

### مقدمه

و انتقال املاح به واسطه فشار تورژسانس در آوند چوبی می باشد (۲۴). پسته (*Pistacia vera* L.) گیاهی نیمه گرمسیری از خانواده Anacardiaceae و جنس *Pistacia* می باشد. کاهش رشد پسته با افزایش شوری آب و خاک توسط محققان مختلف گزارش گردیده است (۱ و ۱۸). کاهش رشد پسته در اثر آب آبیاری شور می تواند مربوط به سمیت یون های کلرید و سدیم (۳۱)، افزایش فشار اسمزی محلول خاک (۳۶)، تأثیر سوء املاح بر فتوسنتز (۱۷)، سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین (۳۰) و فعالیت های آنزیمی (۴۱) باشد. برخی محققین نشان دادند، کاربرد بعضی از عناصر غذایی از جمله پتاسیم (۲۵ و ۲۶)، می تواند از تأثیر سوء شوری خاک و یا آب بکاهد و یا به عبارت دیگر مقاومت نسبی گیاه را به تنش شوری خاک افزایش دهد. زینگ و همکاران (۴۲) نشان دادند، کاربرد پتاسیم موجب افزایش غلظت پتاسیم برگ، عملکرد و بهبود کیفیت مغز پسته گردید. خوش گفتار منش و سیادت (۳) گزارش نمودند هنگامی که شیب قابل

در بخش وسیعی از جهان به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک، شوری آب و خاک از عوامل محدود کننده رشد گیاه و تولید محصولات زراعی به شمار می آیند. برخی مطالعات نشان می دهند که ۲۰ تا ۵۰ درصد کل اراضی کشاورزی آبیاری شده تحت تأثیر غلظت های بالای نمک هستند، در نتیجه به طور قابل ملاحظه ای ارزش اقتصادی خود را از دست می دهند (۱۹). پتاسیم شاخص ترین عنصر محلول در بین ترکیب های معدنی است و نقش عمده ای در پایین نگه داشتن پتانسیل اسمزی استوانه مرکزی سلول های ریشه بازی می کند. پایین بودن پتانسیل اسمزی، لازمه تعادل آب داخل گیاه

۱ و ۲ - استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  
\* - نویسنده مسئول:  
(Email: vmozafary@yahoo.com)

به نظر می‌رسد قندها با تأمین کربن مورد نیاز جهت تشکیل پرولین، به‌طور غیرمستقیم در تطابق اسمزی گیاه با شرایط تنش، نقش مهمی را ایفا می‌کنند (۳۵).

حکم‌آبادی (۲) در پژوهشی ضمن اندازه‌گیری میزان پرولین برگ پسته که تحت تنش شوری قرار گرفته بود، گزارش کرد میزان تجمع پرولین در برگ در تیمار ۱۵۰ میلی مولار و ۲۲۵ میلی مولار کلرید سدیم در سی‌امین روز بعد از اعمال تیمار، به ترتیب ۱/۸ و ۲/۴ برابر و شصتمین روز به ترتیب ۱/۷ و ۲/۳ برابر بیشتر از میزان تجمع آن در تیمار شاهد بود. نتایج تحقیقات مظفری (۷) نشان داد، با افزایش شوری عصاره اشباع از ۳ به ۷/۵ دسی‌زیمنس بر متر غلظت پرولین برگ پسته بطور معنی‌داری از ۰/۱۶ به ۰/۲۲ میلی‌گرم بر گرم وزن برگ تازه افزایش یافت. اما با افزایش بیشتر شوری تغییر معنی‌داری در غلظت پرولین ایجاد نشد. مطالعات واکر و همکاران (۴۰) نشان داد که قرار گرفتن پسته در معرض تنش شوری به میزان ۱۷۵ میلی مولار کلرید سدیم باعث افزایش میزان ساکارز و قندهای احیاء‌کننده (گلوکز و فروکتوز) می‌شود. شهریارپور (۵) نشان داد که شوری باعث کاهش ۳۱ درصدی غلظت قندهای احیاء‌کننده در برگ پسته گردید. با توجه به اهمیت اقتصادی پسته و استقرار بسیاری از باغ‌های پسته در اراضی شور، بررسی راههایی که بتوان مقاومت این گیاه را به تنش شوری افزایش داد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقیقات انجام شده با بعضی از گیاهان نشان می‌دهد که پتاسیم قادر است در این راستا مثرتر واقع شود.

## مواد و روش‌ها

به‌منظور بررسی تأثیر پتاسیم و شوری بر برخی پارامترهای رشد و خصوصیات شیمیایی پسته (رقم بادامی زرد)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با دو فاکتور شوری (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلریدسدیم) و پتاسیم (۰ و ۱ میلی مولار پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در محیط پرلیت در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان انجام شد که در نهایت ۳۶ گلدان مورد استفاده قرار گرفت. غلظت پرولین و قندهای احیاء‌کننده در دو زمان مختلف (سه و شش روز پس از اعمال شوری) و در دو گلدان متفاوت با سه تکرار اندازه‌گیری شد. جهت بررسی این دو صفت، طرح به‌صورت فاکتوریل اسپلیت تجزیه گردید و در آن شوری × پتاسیم به‌عنوان فاکتور اصلی در قالب طرح کاملاً تصادفی و زمان به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. محلول غذایی بر اساس جدول هوگلند که با توجه به هدف آزمایش تغییراتی در آن صورت گرفت (هوگلند تصحیح شده) ساخته شد (۲۱).

بذرهای پسته رقم بادامی زرد از مؤسسه تحقیقات پسته تهیه و پس از جداسازی پوست سخت با قارچ‌کش ضدعفونی گردید و جهت

توجهی از غلظت سدیم وجود داشته باشد، میزان تجمع و انتقال پتاسیم در گیاه افزایش می‌یابد. بن‌ماهپول و همکاران (۱۳) در تحقیقی تأثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گلخانه‌ای گیاه پسته را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شوری تأثیری منفی بر رشد اندام هوایی گیاه پسته داشت در حالی که رشد ریشه را بهبود بخشید. در تحقیقات دیگر مشخص شد که به‌رغم اثرات سودمند افزایش نسبت K/Na در داخل گیاه، کوددهی پتاسیم نمی‌تواند موجب کاهش اثرات زیان‌آور شوری گردد (۱۱، ۱۲ و ۱۶).

برخلاف وجود شواهد زیادی مبنی بر کاهش جذب و انتقال پتاسیم در حضور غلظت زیاد سدیم، اطلاعات اندکی نیز نشان می‌دهد که اضافه نمودن پتاسیم به خاک‌های سدیمی، رشد و عملکرد گیاه را بهبود می‌بخشد (۲۰). این محققین عنوان نمودند که پسته در مقابل شوری دو استراتژی در پیش می‌گیرد؛ نخست اینکه به‌سرعت رشد اندام هوایی و ریشه را به‌منظور به‌دست آوردن توانایی ذخیره سازی انرژی جهت مقابله با این تنش کاهش می‌دهد و سپس با توسعه ریشه سعی در سازگار نمودن گیاه می‌نماید. محمدخانی (۶) در پژوهشی اثر غلظت‌های صفر تا ۶۰ میلی مولار کلرید سدیم را در رشد ارقام بادامی ریز، قزوینی، سرخس و بنه مورد بررسی قرار داد. تحقیقات وی نشان داد که اثر نوع پایه و کلرید سدیم بر روی ماده خشک کل گیاه، تعداد برگ، طول ساقه و همچنین ماده خشک هر یک از اندام‌های برگ، ساقه و ریشه در دو سال آزمایش معنی‌دار بود به‌طوری که با افزایش غلظت کلرید سدیم محلول غذایی، مقدار ماده خشک برگ، ساقه و ریشه کاهش یافت. شهریارپور (۵) مشخص نمود که شوری‌های بالا موجب کاهش رشد پسته همانند سایر گیاهان مقاوم به شوری می‌گردد. به‌طوری که افزایش شوری در سطوح بالا، منجر به کاهش معنی‌دار وزن خشک برگ، ساقه و ریشه، سطح برگ و ارتفاع ساقه و همچنین افزایش نسبت وزن خشک شاخسار به ریشه گردید. نتایج به‌دست آمده توسط حکم‌آبادی (۲) در پسته نیز نشان داد، افزایش غلظت کلریدسدیم در آب آبیاری به بیش از ۷۵ میلی مول در لیتر کلرید سدیم، باعث کاهش شدیدی در میزان بیوماس کل گیاه و همین‌طور وزن خشک و تر ریشه، ساقه و برگ گردید.

تنظیم اسمزی یک روش مهم سازگار شدن گیاهان در شرایط تنش شوری گزارش شده است چرا که با این عمل به حفظ تورژسانس و حجم سلول کمک می‌کند و از پاشیدگی سلول جلوگیری می‌نماید (۴۰). پرولین یک اسیدآمینو محافظت‌کننده بافت گیاهی است که در شرایط شور در گیاه تجمع می‌یابد (۱۵). افزایش غلظت پرولین عمومی‌ترین و فراوان‌ترین پاسخی است که به‌محض آبکشی ناشی از کمبود آب یا افزایش فشار اسمزی مشاهده می‌شود. پرولین به‌جز تنظیم اسمزی، نقش‌های دیگری نیز از قبیل جاروب کردن رادیکال هیدروکسیل، تنظیم pH سلولی، پایدار کردن ساختار پروتئین و محافظت در برابر سرما و تنظیم پتانسیل ردوکس دارد (۹). همچنین

## نتایج و بحث

### تأثیر پتاسیم و شوری بر برخی شاخص‌های رشد

نتایج تجزیه واریانس وزن خشک اندام هوایی و ریشه در جدول ۲ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شوری و پتاسیم وزن خشک اندام هوایی را تحت تأثیر معنی‌دار قرار داد. لیکن وزن خشک ریشه فقط تحت تأثیر شوری قرار گرفت و پتاسیم تأثیر معنی‌داری بر این پارامتر نداشت. مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن نشان داد، با افزایش شوری (کلرید سدیم) از صفر به ۱۰۰ میلی‌مولار، وزن خشک اندام هوایی و ریشه به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۵ درصد افزایش معنی‌داری یافت، اما در شوری بالاتر (۲۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم) تغییر معنی‌داری حاصل نشد. (شکل ۱، الف و ب). با کاربرد ۱ میلی‌مولار پتاسیم، ارتفاع گیاه به‌طور معنی‌داری افزایش و از ۷/۱۵ به ۱۱/۴۱ سانتی‌متر رسید (شکل ۲، الف و ب). اندازه‌گیری پارامتر تعداد برگ نیز نشان داد که تیمار پتاسیم به‌طور مؤثر و معنی‌داری آن را افزایش داد. مظفری (۷) نشان داد، میانگین وزن خشک، سطح برگ و ارتفاع نهال پسته با افزایش شوری کاهش و با به‌کارگیری عنصر پتاسیم میانگین پارامترهای یاد شده به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. در تحقیقی که توسط آشورات و همکاران (۸) انجام گرفت مشخص شد، کاربرد پتاسیم عملکرد مغز پسته را بیش از ۲۰ درصد بهبود بخشید. هم‌چنین بن‌می‌مون و همکاران (۱۴) نیز نشان دادند که مصرف پتاسیم موجب افزایش وزن تازه مغز و بهبود کیفیت درصد خندانی گیاه پسته گردید. تاج‌آبادی‌پور (۱) با کاربرد صفر تا ۲۲۵ میلی‌گرم پتاسیم در کیلوگرم خاک در گلدان تأثیر معنی‌داری بر وزن خشک برگ، ساقه و ریشه پایه‌های مختلف پسته به‌دست نیاورد و چنین اظهار داشت که احتمالاً پتاسیم عصاره‌گیری شده با آمونیم استات (۷۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) برای رشد بهینه پایه‌های پسته کافی بوده است.

### تأثیر پتاسیم و شوری بر غلظت پرولین (سه و شش روز پس از اعمال شوری)

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۳) نشان داد که پس از ۷۲ ساعت، شوری و پتاسیم تأثیر معنی‌داری بر میزان پرولین داشت. هم‌چنین برهم‌کنش شوری و پتاسیم نیز در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد (جدول ۴) پس از گذشت سه روز از اعمال سطوح مختلف شوری، غلظت پرولین در سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌مولار کلریدسدیم، به ترتیب ۳ و ۳/۶ برابر نسبت به شاهد (صفر میلی‌مولار کلریدسدیم) افزایش معنی‌داری حاصل نمود. سانور و همکاران (۳۴) در تحقیقی نشان دادند که دوازده ساعت پس از تیمار با کلرید سدیم، غلظت پرولین نسبت به گیاهان

جوانه‌زدن به مدت پنج روز میان پارچه‌های مرطوب در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. سپس مقدار ۶۰۰ گرم پرلیت در هر یک از گلدان‌های پلاستیکی ریخته شد. پس از آن در هر گلدان سه عدد بذر جوانه‌زده شده در عمق دو سانتی‌متری کشت گردید. تا هفته چهارم پس از کاشت، آبیاری گلدان‌ها تا حد ظرفیت زراعی با آب مقطر انجام شد. از هفته پنجم به‌بعد طبق نقشه طرح، تیمارهای پتاسیم و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم (جدول ۱)، کلر (NaCl ۰/۱ میکرومولار) و هم‌چنین عناصر کم‌مصرف (سولفات منگنز ۱۱/۸۳، سولفات مس ۱، اسید بوریک ۲۴/۲۵، سولفات روی ۳/۴۷، آمونیوم مولیبدات ۰/۰۴ و ۱/۵۴ Fe-EDTA میکرومولار) بر اساس محلول هوگلند تصحیح شده تهیه و اعمال گردید.

جهت جلوگیری از تجمع عناصر مورد استفاده هر ۱۵ روز یک‌بار آب‌شویی تمام گلدان‌ها انجام و سپس مجدداً تیمارها اعمال گردید. در هفته دهم پس از کاشت، تیمارهای شوری با غلظت‌های صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم اعمال گردید. با گذشت سه روز پس از اعمال شوری، اولین برداشت از بافت تازه گیاهی (برگ‌ها) انجام و به‌همین ترتیب شش روز پس از آن نیز، دومین برداشت صورت گرفت (دو برداشت با بازه زمانی ۷۲ ساعت). نمونه‌های مذکور به‌منظور اندازه‌گیری آنزیم پرولین به‌روش بیت و همکاران (۱۰) و قندهای احیاء‌کننده به روش نلسون (۲۸) به آزمایشگاه منتقل گردید. در پایان هفته یازدهم تعداد بوته در گلدان، ارتفاع بوته، تعداد برگ در هر بوته، وزن مرطوب و وزن خشک اندام هوایی و ریشه و وزن خشک کل گیاه (اندام هوایی + ریشه) اندازه‌گیری شد. در عصاره‌های حاصل از کل گیاه درصد عناصر سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه Flame Photometer و هم‌چنین میزان کلسیم و منیزیم به کمک دستگاه جذب اتمیک اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش، داده‌های به‌دست آمده از اندازه‌گیری‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری MSTATC و با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم‌چنین نمودارهای مربوطه با استفاده از برنامه Excel رسم گردید.

جدول ۱- غلظت محلول نهایی عناصر پرمصرف در تیمارهای مختلف پتاسیم بر حسب میلی‌مولار


تیمارهای پتاسیم (میلی‌مولار)		نام ترکیب
تیمار K <sub>۱</sub> (K=۱)	تیمار K <sub>۰</sub> (K=۰)	
۱	-	KNO <sub>3</sub>
۰/۵	۰/۵	MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O
۰/۵	۱	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> .4H <sub>2</sub> O
۱	۱	NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>

شاهد به ۲/۹ برابر رسید. تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که تجمع پرولین در گیاه پسته، به‌عنوان یک پاسخ عمومی به تنش شوری است (۱، ۲، ۴، ۷ و ۳۸). در مقابل، افزایش یک میلی‌مولار پتاسیم، مقدار پرولین برگ را حدود ۲۴ درصد نسبت به شاهد کاهش داد.


جدول ۲- نتایج تجزیه واریانس برخی شاخص‌های رشد تحت تأثیر تیمارهای پتاسیم و شوری

صفات	میانگین مربعات				
منبع تغییرات	درجه آزادی	وزن خشک اندام هوایی	وزن خشک ریشه	تعداد برگ	ارتفاع گیاه
شوری	۲	۰/۰۸۵*	۰/۰۶۴*	۷/۲**	۴/۲۷ns
پتاسیم	۱	۰/۱۶۵*	۰/۰۳۴ns	۳۶/۶**	۱۶۳/۴**
شوری × پتاسیم	۲	۰/۰۵۳ns	۰/۰۱۴ns	۲/۱ns	۲/۹۲ns
خطا	۳۰	۰/۰۲۳	۰/۰۱۷	۲/۵	۳/۶۷
CV%		۱۶/۱۳	۱۳/۳۱	۱۸/۷	۲۰/۶

ns معنی‌دار نیست، \* معنی‌دار در سطح ۵ درصد، \*\* معنی‌دار در سطح ۱ درصد.



شکل ۱- تأثیر سطوح مختلف شوری بر وزن خشک اندام هوایی (الف) و ریشه (ب)



شکل ۲- تأثیر سطوح مختلف پتاسیم بر وزن خشک اندام هوایی (الف) و ارتفاع گیاه (ب)

صفر به ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم، غلظت پرولین برگ به ترتیب از ۰/۸۲۰ به ۲/۸۰۰ و ۲/۷۹۳ میکرومول بر گرم وزن تر رسید. پرولین اسید آمینه‌ای است که در پاسخ به شوری افزایش نشان می‌دهد، در حقیقت محققین معتقدند که کلرید سدیم مسیر بیوسنتزی پرولین و توانایی آنتی‌اکسیدانی سلول گیاهی را تحریک و انباشتگی آن باعث القای مقاومت به شوری می‌گردد (۷ و ۱۵). مظفری (۲۵) عنوان نمود که با افزایش سدیم و یا با کاهش پتاسیم غلظت پرولین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش حاصل کرد.

برهم‌کنش پتاسیم و شوری نشان داد، در نبود پتاسیم، با افزایش شوری از صفر به ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم، غلظت پرولین بیش از پنج برابر افزایش حاصل نمود در حالی که در حضور یک میلی مولار پتاسیم و با افزایش شوری غلظت پرولین حدود ۱/۴ برابر افزایش یافت. پس از گذشت سه روز از زمان نمونه برداری اول، مجدداً از سه تکرار بعدی نمونه‌گیری به عمل آمد و فقط سطوح مختلف شوری بر غلظت پرولین معنی‌دار شد و اثرات متقابل، غلظت پرولین برگ را تحت تأثیر معنی‌دار قرار نداد. نتایج مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد (جدول ۴) که با افزایش شوری از

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس پرولین و قندهای احیاءکننده تحت تأثیر تیمارهای شوری و پتاسیم (برداشت اول و دوم)

منبع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات		صفات	
		غلظت پرولین	غلظت قندهای احیاءکننده		
		سه روز پس از اعمال شوری	شش روز پس از اعمال شوری		
شوری	۲	۱۱/۳۵**	۱۶۱۲۸۷/۴**	۷/۸**	۷۵۴۳/۱
پتاسیم	۱	۲/۱۴*	۸۳۹۸/۱ns	۰/۰۳ns	۳۷/۳**
شوری × پتاسیم	۲	۱/۴۲*	۶۳۹۶/۹ns	۰/۸۰ns	۳۹۰/۲ns
خطا	۱۲	۰/۲۴۹	۲۰۳۸۸/۳	۰/۴۵	۸۹۸۳/۷
CV%		۱۹/۵	۲۰/۴	۲۹/۳	۲۳

ns معنی‌دار نیست \*، معنی‌دار در سطح ۵ درصد \*\*، معنی‌دار در سطح ۱ درصد

جدول ۴- مقایسه میانگین غلظت پرولین (میکرومول بر گرم وزن خشک) تحت تأثیر کاربرد شوری و پتاسیم

میانگین	سطوح پتاسیم (میلی مولار)		سطوح شوری (میلی مولار کلرید سدیم)
	۱	۰	
	غلظت پرولین (سه روز پس از اعمال شوری)		
	۱/۰۱۲B	۲/۲۱۷d	۰/۸۰۷d
	۳/۰۳۲A	۲/۳۱۷c	۳/۷۴۷ab
	۳/۶۳۸A	۳/۱۱۳bc	۴/۱۶۳a
میانگین	۲/۲۱۶B	۲/۹۰۶A	
	غلظت پرولین (شش روز پس از اعمال شوری)		
	۰/۸۲۰B	۱/۰۰۷a	۰/۶۳۳a
	۲/۸۰۰A	۲/۹۵۳a	۲/۶۴۷a
	۲/۷۹۳A	۲/۳۳۳a	۳/۲۵۳a
میانگین	۲/۰۹۸A	۲/۱۷۸A	

میانگین‌هایی که در یک حرف مشترکند طبق آزمون دانکن از لحاظ آماری معنی‌دار نیستند.



اول (۳۰ روز) و هم در زمان نمونه برداری دوم (۶۰ روز) میزان کل قندهای محلول موجود در برگ با افزایش غلظت کلرید سدیم افزایش شدیدی پیدا نمود. همچنین این نتایج پس از گذشت شش روز بعد از اعمال شوری نشان داد (جدول ۳) تنها پتاسیم غلظت قندهای احیاءکننده را تحت تأثیر معنی دار قرار داد و برعکس برداشت اول، شوری تأثیر معنی داری نداشت. با افزایش یک میلی مولار پتاسیم غلظت قندهای احیاءکننده از  $409/8$  به  $412/7$  میکروگرم بر گرم وزن تر رسید (شکل ۳، ب). برهم کنش شوری و پتاسیم نیز معنی دار بود به طوری که بیشترین مقدار قندهای احیاءکننده در تیمار  $K_0S_3$  (شوری ۲۰۰ میلی مولار و پتاسیم صفر) به دست آمد که ۱۸ درصد بیشتر از شاهد بود.


#### تأثیر زمان بر غلظت قندهای احیاءکننده و پرولین

نتایج تجزیه واریانس غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده نشان داد (جدول ۴)، تأثیر فاکتور زمان بر غلظت قندهای احیاءکننده در سطح یک درصد معنی دار بود، به طوری که غلظت قندهای احیاءکننده پس از گذشت سه روز نسبت به زمان اول نمونه برداری (روز ششم) به طور معنی داری کاهش حاصل نمود (شکل ۴، الف). به نظر می رسد این کاهش غلظت نشان دهنده نوعی سازگاری گیاه با تنش شوری باشد. با وجود کم شدن پرولین از مقدار  $2/56$  به  $2/14$  میکرومول بر گرم وزن تر پس از گذشت ۷۲ ساعت، این کاهش در سطح ۵ درصد معنی دار نبود (شکل ۴، ب).

در حالی که نارایان (۲۷) گزارش کرد که گیاهان با پتاسیم کافی در مقایسه با گیاهان با کمبود پتاسیم، پرولین بیشتری انباشته می کنند و این روند بیانگر این حقیقت است که پتاسیم از طریق افزایش غلظت پرولین و کاهش قندهای احیاءکننده و در نتیجه به وسیله تطابق اسمزی تحمل گیاه به تنش خشکی را افزایش می دهد. از طرف دیگر لیو و زو (۲۳) مشاهده کردند که پتاسیم بر غلظت پرولین تأثیر معنی داری نداشت. در این پژوهش نیز با کاربرد عنصر پتاسیم، تنش وارد شده به گیاه در نتیجه سدیم اضافی کنترل شده و در نتیجه در گیاه پرولین اضافی تولید نشد.

#### تأثیر پتاسیم و شوری بر غلظت قندهای احیاءکننده (سه و شش روز پس از اعمال شوری)

نتایج تجزیه واریانس غلظت قندهای احیاءکننده (جدول ۳) نشان داد که پس از گذشت سه روز از اعمال تیمارهای شوری، غلظت قندهای احیاءکننده تحت تأثیر معنی دار قرار گرفت در حالی که کاربرد پتاسیم و اثر متقابل شوری و پتاسیم معنی دار نبود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد، شوری موجب افزایش غلظت قندهای احیاءکننده از  $514/2$  در شاهد به  $758/1$  در سطح دوم و  $825/9$  میکروگرم بر گرم وزن تر در سطح سوم شوری (۲۰۰ میلی مول کلریدسدیم) شد (شکل ۳، الف). نتایج پژوهش حکم آبادی (۲) در پسته نشان داد که میزان قندهای محلول موجود در برگ به طور معنی داری تحت تأثیر شوری قرار گرفت. این محقق نشان داد که هم در زمان نمونه برداری




شکل ۳- تأثیر شوری (الف) و پتاسیم (ب) بر غلظت قندهای احیاءکننده

جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس پرولین و قندهای احیاءکننده تحت تأثیر تیمارهای شوری، پتاسیم و زمان

میانگین مربعات		صفات	
پرولین	قندهای احیاءکننده	درجه آزادی	منبع تغییرات
۱۸/۸**	۱۱۷۸۶۹/۴**	۲	شوری
۱/۳*	۳۶۵۶/۰ns	۱	پتاسیم
۳/۰*	۲۲۳۷/۷ns	۲	شوری×پتاسیم
۳/۰ns	۱۵۷۳۳/۹ns	۱۲	خطای ۱
۱/۶ns	۷۴۷۴۶/۱**	۱	زمان
۰/۸ns	۵۰۹۵۸/۸ns	۲	شوری×زمان
۰/۸ns	۴۷۷۴/۶ns	۱	پتاسیم×زمان
۱/۴ns	۴۵۵۰/۴ns	۲	شوری×پتاسیم×زمان
۵/۴ns	۱۳۶۳۸/۵ns	۱۲	خطای ۲
۲۸/۵	۲۱/۰۳		%CV

ns معنی دار نیست \*، معنی دار در سطح ۵ درصد \*\*، معنی دار در سطح ۱ درصد



شکل ۴- تأثیر زمان بر غلظت قندهای احیاءکننده (الف) و پرولین (ب)

پتاسیم برگ را افزایش داد و جذب یون‌هایی نظیر نیتروژن و کلسیم را بهبود بخشید و در نهایت سبب افزایش پایداری غشاء سلول گردید. افزایش شوری هم‌چنین موجب افزایش معنی‌دار میزان سدیم کل گیاه شد، به طوری که غلظت سدیم از ۰/۸۵ درصد در شاهد به ۱/۶۲ درصد در بالاترین سطح شوری (۲۰۰ میلی‌مولار کلرید سدیم) رسید (شکل ۵، ب). افزایش غلظت سدیم بر اثر شوری توسط پژوهش‌گران متعددی گزارش شده است (۲، ۱۸، ۳۲). کاربرد تیمارهای پتاسیم و شوری بر افزایش یا کاهش غلظت کلسیم در سطح ۵ درصد معنی‌دار نبود، حال آن‌که تیمارهای شوری و پتاسیم هر یک به تنهایی غلظت

#### تأثیر پتاسیم و شوری بر غلظت برخی عناصر غذایی

نتایج تجزیه واریانس (جدول ۵) غلظت برخی از عناصر غذایی نشان داد با افزایش پتاسیم، غلظت پتاسیم گیاه در سطح یک درصد افزایش معنی‌دار حاصل نمود. به گونه‌ای که مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که کاربرد یک میلی‌مولار پتاسیم، غلظت این عنصر را نسبت به شاهد ۱۴ درصد افزایش داد (شکل ۵، الف). در بسیاری از تحقیقات، افزایش پتاسیم سبب افزایش غلظت این عنصر در گیاه شده است (۱۴، ۲۹ و ۴۲). کایا و همکاران (۲۲) دریافتند که اضافه نمودن نیترات پتاسیم به محیط ریشه غلظت

بررسی و گزارش نمودند که با افزایش شوری میزان منیزیم ریشه و ساقه کاهش یافت.

### نتیجه گیری


نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که شوری موجب افزایش غلظت سدیم در کل گیاه گردید. کاربرد عنصر پتاسیم توانست در کاهش اثرات منفی شوری مؤثر واقع شود، به طوری که سبب افزایش غلظت عناصر پتاسیم و منیزیم شد و همچنین تعداد برگ و ارتفاع گیاه را افزایش داد.

عنصر منیزیم را تحت تأثیر قرار دادند. شوری غلظت منیزیم را از ۰/۱۶۳ درصد در شاهد به ۰/۱۲۸ درصد در شوری ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم به طور معنی داری کاهش دهد. لیکن غلظت منیزیم با کاربرد پتاسیم افزایش حاصل نمود و از ۰/۱۳۵ به ۰/۱۵۵ درصد رسید (شکل ۵، الف). با توجه به نقش منیزیم به عنوان یک کاتیون مبادله گر و تنظیم کننده pH شیره سلولی (۲۴)، احتمالاً برای جلوگیری از اثرات تخریبی سدیم، کاربرد پتاسیم منجر به افزایش غلظت منیزیم در کل گیاه شده است. محققان به این نتیجه رسیده اند که شوری ناشی از کلرید سدیم باعث کاهش غلظت منیزیم در برگ مرکبات شده، اما این کاهش همیشه به دلیل افزایش شوری نبوده است (۳۳). همچنین تائینی و همکاران (۳۸) اثرات تنش شوری بر ژنوتیپ های زیتون را

جدول ۵- نتایج تجزیه واریانس غلظت عناصر غذایی در گیاه پسته

صفات منبع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات		
		سدیم (%)	پتاسیم (%)	کلسیم (%)
شوری	۲	۱/۸۷**	۰/۰۰۷ns	۰/۰۰۱ns
پتاسیم	۱	۰/۰۴۷ns	۰/۰۸۸**	۰/۰۰۰۱ns
شوری × پتاسیم	۲	۰/۰۰۷ns	۰/۰۰۷ns	۰/۰۰۰۱ns
خطا	۳۰	۰/۰۶۵ns	۰/۰۰۵ns	۰/۰۰۰۱ns
CV%		۲۱/۵	۱۱/۲	۲۰/۵

ns معنی دار نیست، \* معنی دار در سطح ۵ درصد، \*\* معنی دار در سطح ۱ درصد.



شکل ۵ - تأثیر پتاسیم بر غلظت پتاسیم و منیزیم کل گیاه (الف) و تأثیر شوری بر غلظت سدیم کل گیاه (ب)



شوری نسبت به زمان اول نمونه برداری، غلظت قندهای احیاء کننده به طور معنی داری کاهش حاصل نمود که این روند در مورد پرولین مشاهده نگردید.

برای مقابله گیاه پسته با تنش شوری (جهت تنظیم اسمزی) غلظت پرولین و قندهای احیاء کننده در گیاه افزایش یافت. این چنین به نظر می رسد که گیاه پسته به سرعت سعی در سازگار نمودن خود با شرایط شور دارد به گونه ای که پس از گذشت شش روز از اعمال

## منابع

- ۱- تاج آبادی پور .۱. ۱۳۸۳. تأثیر کاربرد پتاسیم بر مقاومت نسبی ۳ رقم پسته به تنش آبی و شوری. رساله دکتری بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
- ۲- حکم آبادی ح. ۱۳۸۲. عکس العمل برخی پایه های درختان پسته به زیادی بور و کلرید سدیم در آب آبیاری. رساله دکتری، بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
- ۳- خوشگفتارمنش ا.ح. و سیادت ح. ۱۳۸۱. تغذیه معدنی سبزیجات و محصولات باغی در شرایط شور. نشر آموزش کشاورزی. معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. تهران، ایران.
- ۴- رضوی نسب ا. ۱۳۸۶. اثر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد و ترکیب شیمیایی پسته و مورفولوژی پسته. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.
- ۵- شهریاری پور ر. ۱۳۸۶. تأثیر فسفر، روی و شوری بر رشد و ترکیب شیمیایی پسته. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.
- ۶- محمدخانی ع. ۱۳۷۶. پسته. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
- ۷- مظفری و. ۱۳۸۴. بررسی نقش پتاسیم، کلسیم و روی در کنترل عارضه سرخشکیدگی پسته. رساله دکتری، بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
- 8- Ashworth L.Jr., Gaona S.A., and Surber E. 1985. Nutritional diseases of pistachio trees: Potassium and phosphorous deficiencies and chloride and boron toxicities. *Phytopathology*. 75:1084-1091.
- 9- Aspinall D., and Paleg L.G. 1981. *Physiology and biochemistry of drought resistance in plants*. Academic Press, New York.
- 10- Bates S., Waldren R.P., and Teare I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant and Soil* 39:205-207.
- 11- Bar-Tal A., Feigenbaum S., and Sparks D.L. 1991. Potassium-salinity interactions in irrigated corn. *Irrig. Sci.* 12:27-35.
- 12- Bernstein L., Francois L.E., and Clark R.A. 1974. Interactive effects of salinity and fertility on yields of grains and vegetables. *Agron. J.* 66:412-421.
- 13- Benmahioul B., Daguin F., and Kaid-Harche M. 2009. Effects of salt stress on germination and *in vitro* growth of pistachio (*Pistacia vera* L.). *C. R. Biologies* 322:752-758.
- 14- Ben Mimoun M., Loumi O., Ghrab M., Latiri K., and Hellali R. 2004. Foliar Potassium Application on Pistachio Tree. IPI regional workshop on Potassium and Fertigation development in West Asia and North Africa; Rabat, Morocco, 24-28 November.
- 15- Berteli F., Corrales E., Guerrero C., Ariza M., Pilego F., and Valpuesta V. 1995. Salt stress increases ferredoxin-dependent glutamate synthase activity and protein level in the leaves of tomato. *Physiol. Plant. Copenhagen*. 93: 259-264.
- 16- Cerda A., Pardines J., Botella M.A., and Martinez V. 1995. Effect of potassium on growth, water relations and the inorganic and organic solute contents for two maize cultivars grown under saline conditions. *J. Plant Nutr.* 18:839-851.
- 17- Downton W.J.S., and Loveys B.R. 1981. Abscisic acid content and osmotic relations of salt stressed grapevine leaves. *Aust. J. Plant Physiol.* 8: 443-452.
- 18- Ferguson L., Poss J.A., Grattan S.R., Grieve G.M., Wang D., Wilson C., Donvan T.J., and Chao C.T. 2002. Pistachio rootstocks influence scion growth and ion relations under salinity and boron stress. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* 127: 194-199.
- 19- Flowers T.J. 1999. salinization and horticultural production. *Sci. Hort.* 78:1-4.
- 20- Grattan S.R., and Grieve C.M. 1999. Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops. *Sci. Hort.* 78,127-157.

- 21- Hoagland D.R., and Arnon D.I. 1938. The water culture method for growing plants without soil. Univ. Calif. Agric. Experiment Station Circular 347:1-32.
- 22- Kaya C., Higgs D., and Kirnak H. 2001. The effects of high salinity (NaCl) and supplementary phosphorus and potassium on physiology and nutrition development of spanish. Bulg. J. Plant Physiol. 27(3-4),47-59.
- 23- Liu J., and Zhu J.K. 1997. Proline accumulation and salt stress induced gene expression in a salt hypersensitive mutant of arabis. Plant Physiol. 114: 591-596.
- 24- Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2<sup>nd</sup> ed. Academic Press, London, U.K.
- 25- Mozaffari V., and Malakouti M.J. 2006. Responses of Badami-Zarand pistachio rootstock and die-back disease (*Paecilomyces variotii*) in different Na/K and salinity ratios under greenhouse conditions. 27th international horticulture congress, Seoul, South Korea.
- 26- Mozaffari V., Pour Khosravani R., and Mohammadi nasab A. 2009. The Response of Mature Pistachio Trees to Different Sources of Potassium in Saline and Calcareous Soils. International Symposium on Pistachios & Almonds Sanliurfa, Turkey.
- 27- Narayan A. 1992. Nutritional approaches for drought management in agriculture crops. A review. Plant Physiol. Biochem.,19: 59-64.
- 28- Nelson N. 1944. A photometric adaptation of the somogyi method for the determination of sugars. J. Biol. Chem. 153:375 -380.
- 29- Nessim M.G., Magda A., Hussein A., and Moussa A. 2008. The Effects of Irrigation Water Salinity, Potassium Nitrate Fertilization, Proline Spraying and Leaching Fraction on the Growth and Chemical Composition of Corn Grown in Calcareous Soil. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology. Turkey, 787-803.
- 30- Nieman R.H. 1965. Expansion of bean leaves and its suppression by salinity. Plant Physiol.,40: 156-161.
- 31- Parsa A.A., and Karimian N. 1975. Effect of sodium chloride on seedling growth of two major varieties of Iranian pistachio. J. Hort. Sci.,50:41 -46.
- 32- Picchioni G.A., Miyamoto S., and Storey J.B. 1990. Salt effects on growth and ion uptake of pistachio rootstock seedlings. J. Am. Soc. Hort. Sci. 115:647 -653.
- 33- Ruiz D., Martinez V., and Cerda A. 1997. Citrus response to salinity: growth and nutrient uptake. Tree Physiol. 17:141 -150.
- 34- Sanoure A., Thorin D., and Davey M. 1999. NaCl and CuSO<sub>4</sub> treatments trigger distinct oxidative defence mechanisms in *Nicotiana plumbaginifolia* L. Plant Cell Environ. 22: 387-396.
- 35- Stewart G.R., and Lee J.A. 1974. The role of proline accumulation in halophytes. Planta, 120:279 -289.
- 36- Sepaskhah A.R., and Maftoun M. 1988. Relative salt tolerance of pistachio cultivars. J. Hort. Sci. 63: 157-162.
- 37- Shahriaripour R., Tajabadipour A., Mozaffari V., Dashti H., and Adhami E. 2009. Effects of Salinity and Soil Zinc Application on Growth and Chemical Composition of Pistachio Seedlings. J. Plant. Nutr. 33:8, 1166-1179.
- 38- Tattini M., Bertoni P., and Caselli S. 1992. Genotypic response to sodium chloride salinity of four major olive cultivars. Plant Soil. 106:105 -111.
- 39- Volkmar K.M., Hu Y., and Steppuhn H. 1997. Physiological responses of plants to salinity: A review. Can. J. Plant Sci. 78: 19-27.
- 40- Walker R.R., Torokfalvy E., and Behboudian M.H. 1988. Photosynthetic rates and solute partitioning in relation to growth of salt treated pistachio plants. Aust. J. Plant Physiol. 15:787 -798.
- 41- Weimberg R. 1970. Enzyme levels in pea seedlings grown on highly salinized media. Plant Physiol. 46: 466-470.
- 42- Zeng Q., Brown P.H., and Holtz B.A. 1999. Potassium Fertilization and Diagnostic Criteria for Pistachio Trees. Better Crops. 83:10 -12.

## Effects of Potassium and Salinity Application on Morphological and Physiological Parameters of Pistachio Seedling in Perlite

V. Mozafari<sup>1\*</sup> - L. Omid<sup>2</sup>

Received: 6-2-2011

Accepted: 30-1-2012

### Abstract

A factorial greenhouse experiment as completely randomized design with six replications was conducted to study the effects of potassium and salinity application on morphological and physiological parameters of pistachio seedling (cv. Badami-e-Zarand) in perlite. Treatments were 2 levels of K (0 and 1 mM KNO<sub>3</sub>) and 3 levels of salinity (0, 100 and 200 mg NaCl kg<sup>-1</sup> soil). Proline and reducing sugars contents were measured on two separate times (3 and 6 days after salinity application). A factorial split was analyzed to test the trend of these factors so that salinity × potassium and time were as main and sub factors respectively. Results showed that as salinity increased shoot and root dry weights 17% and 15% increased, respectively. As increasing K concentration from 0 to 1 mM, increased dry weight shoot from 0.885 to 1.007 per pot. 1 mM K application increased the leaf number and stem height. As salinity increased significantly increased Na and decreased Mg of plant. Proline and reducing sugars contents increased three days after application of salinity treatments while K decreased proline concentration. Reducing sugars content significantly affected by time factor so that reducing sugars concentration reduced after 3 days but it wasn't correct about proline content.

**Keywords:** Potassium, Salinity, Perlite, Proline, Reducing sugar

1,2- Assistant Professor and Former MSc Student, Department of Soil Science, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran  
(\* - Corresponding Author Email: vmozafary@yahoo.com)