

ارزیابی کارایی ارقام مختلف گندم از لحاظ جذب و مصرف فسفر در خاک فسفات

المیرا ایرانشهر^۱ - ابراهیم سپهر^{۲*}

تاریخ دریافت: ۹۰/۶/۲۹

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱/۲۷

چکیده

به منظور غربالگری ارقام مختلف گندم از لحاظ کارایی جذب و مصرف فسفر، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با ۲۰ رقم گندم و دو منبع کود فسفات شامل فسفر محلول (PS) از منبع KH_2PO_4 و فسفر نامحلول از منبع سنگ فسفات (RP) در سه تکرار با هم مقایسه شدند. ارقام از لحاظ عملکرد اندام هوایی، مقدار و غلظت فسفر کل، کارایی جذب و مصرف فسفر و شاخص فسفر کارایی اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد نشان دادند. در بین ارقام مورد بررسی، مرودشت با شاخص پاسخ به کود برابر $8/3$ کودپذیری بالا در حالی که رقم هامون با شاخص $5/6$ گرم کودپذیری نسبتاً پایینی را نشان داد. شاخص کارایی جذب فسفر (PACE) بطور متوسط برای ارقام گندم $0/04$ بدست آمد که از این نظر رقم کرج ۱ و آزادی به ترتیب با $0/07$ و $0/02$ پایین‌ترین و بالاترین کارایی را داشتند. متوسط کارایی مصرف فسفر (PUTE)^۴ برای ارقام گندم در حالت مصرف سنگ فسفات $0/82$ و در حالت مصرف فسفر محلول $0/31$ بود و دامنه این شاخص از $0/6$ (رقم آزادی) تا $1/12$ گرم ماده خشک بر میلی گرم فسفر (مغان) تغییر کرد. از لحاظ شاخص فسفر کارایی (PE)^۵ ارقام مرودشت و کرج ۱ با $4/5$ پایین‌ترین و رقم آزادی با $14/5$ درصد بالاترین کارایی را داشتند. شاخص فسفر کارایی با غلظت فسفر گیاه همبستگی ضعیف و غیر معنی داری ($R^2=0/18$) ولی با مقدار کل فسفر گیاه همبستگی مثبت و معنی-داری ($R^2=0/77$) در سطح یک درصد نشان داد.

واژه‌های کلیدی: گندم، فسفر، سنگ فسفات، کارایی جذب، مصرف فسفر

مقدمه

کشاورزان برای پایدار ماندن عملکرد همه ساله باید کودهای فسفاته زیادی مصرف کنند و این در حالی است که پیش بینی می‌شود منابع سهل الوصول کودهای فسفاته در دنیا رو به پایان است از طرف دیگر به علت مصرف بی‌رویه کودهای فسفاته، مشکلات زیست محیطی از قبیل پدیده یوتروفیکاسیون، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و در نتیجه افزایش قیمت کودها و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید مزید بر علت می‌باشند (۲۸). با وجود این مشکلات، ارقام گیاهی مختلف زمانی که تحت شرایط کمبود فسفری قرار می‌گیرند سازوکارهای متفاوتی را از خود نشان می‌دهند و عواملی از قبیل خصوصیات ریشه (مورفولوژی ریشه، اندازه ریشه و ریشه‌های ریز)، همزیستی میکوریزی، فرایندهای ریزوسفری (pH ریزوسفر، فعالیت فسفاتاز و آزاد شدن اسیدهای آلی از ریشه) باعث ایجاد اختلاف در جذب فسفر بین گونه-های گیاهی می‌گردند. گیاهان فسفر کارا برای رشد بهتر دو مکانیسم اصلی را بکار می‌برند که شامل: افزایش در جذب فسفر از خاک و افزایش در مصرف فسفر (شامل مکانیسم‌های داخلی در سطح سلولی) می‌باشد (۲۲). لذا امروزه دانشمندان به سمت مطالعه گیاهان و ژنوتیپ‌هایی رفته‌اند که توانایی بالایی در جذب و مصرف فسفر داشته و بتوانند فسفر را از شکل‌های نامحلول آن مانند آپاتیت که در خاک-های آهکی رسوب کرده جذب نمایند و عملکرد نسبی قابل قبولی

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و غلظت آن در گیاهان بین $0/4 - 0/2$ درصد است. به واسطه نقش ویژه فسفر در فرایند انتقال انرژی، تقسیم سلولی و هم‌چنین شرکت در فرایندهای رشد و تکامل ریشه، گلدهی، تشکیل میوه و دانه و افزایش مقاومت به امراض، دومین عنصر کلیدی از نظر تغذیه گیاه و از جمله عناصر مهم در تولید محصول به شمار می‌رود (۱). قابلیت کم جذب فسفر یکی از محدودیت‌های عمده رشد گیاه است. ممکن است برخی گیاهان در اثر کمبود فسفر حتی اگر فسفر کل در خاک بیشتر از مقدار مورد نیاز باشد صدمه ببینند. علت مقدار کم فسفر محلول خاک (کمتر از ۵ میکرومول) این است که فسفر با کانی‌های خاک تشکیل پیوند داده و به شکل‌های آلی و غیرقابل استفاده گیاه تبدیل می‌شود (۲۰). بنابراین

۱ و ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی،

دانشگاه ارومیه

(Email: e.sepehr@urmia.ac.ir)

(* - نویسنده مسئول)

3- Phosphorus Acquisition efficiency
4- Phosphorus Utilization efficiency
5- Phosphorus Efficiency

brassica نشان دادند که در اغلب ارقام فسفرکارا تحت شرایط کمبود فسفر، توزیع ماده خشک و فسفر به طرف ریشه‌ها بیشتر می‌باشد، همچنین طبق گفته از ترک و همکاران (۲۲) نشان دادند که اختلافات بزرگی بین ارقام گندم دوروم و نان از لحاظ فسفرکارایی وجود داشت و نیز بیان کردند که مقدار فسفر شاخساره پارامتر خوبی برای ارزیابی فسفرکارایی غلات است.

در سال‌های اخیر استفاده از سنگ فسفات در خاک‌های مناطق گرمسیری به عنوان یک فاکتور مهم در مقایسه با مصرف کودهای فسفاته محلول درآمده است و مصرف مستقیم سنگ فسفات از لحاظ اقتصادی باصرفه‌تر از مصرف کودهای فسفاته برای محصولات زراعی خاص بوده است. در برخی کشورهای در حال توسعه هم منابع سنگ فسفاتی وجود دارد که اگر بجای کودهای فسفاته بکار روند از لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی خواهد شد (۶). لذا با توجه به اهمیت انتخاب ارقام کارا در جذب و مصرف فسفر و تحقیقات اندک در ایران، آزمایش مذکور به منظور ارزیابی کارایی ارقام مختلف گندم در جذب و مصرف فسفر در استفاده از سنگ فسفات (منبع نامحلول فسفر) انجام شده است.

مواد و روش‌ها

این آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی با ۲۰ رقم گیاه گندم بهاره (جدول ۴) و دو منبع کود فسفاته شامل فسفر محلول از منبع فسفات پتاسیم (KH_2PO_4) و فسفر نامحلول از منبع سنگ فسفات (RP) در بستر شنی (River sand) با حاصلخیزی پایین و در سه تکرار به صورت گلخانه‌ای در دانشکده کشاورزی ارومیه در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. پس از هوا خشک شدن شن مورد نظر، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر شن از لحاظ pH در سوسپانسیون ۱:۵ خاک و محلول ۰/۰۱ مولار کلرید کلسیم و قرائت بوسیله دستگاه pH متر HANNA مدل HI۹۰۱۷، فسفر قابل استفاده به روش اولسن و همکاران (۲۶) و میزان عناصر کم مصرف با روش عصاره‌گیری توسط DTPA لیندسی و نرول (۱۸) تجزیه شده و نتایج در جدول ۱ نشان داده شده است.

تولید کنند. باتن (۴) انتخاب رقم کارا را یک متغیر مکمل و حتی جایگزین برای مصرف کودها در کشاورزی بیان کرد. گاهونیا و همکاران (۱۱) با مطالعه ویژگی‌های مورفولوژی ریشه به عنوان ابزاری موثر در ارقام گیاهی فسفرکارا، به این نتایج رسیدند که سیستم ریشه‌ای بزرگ و وسیع موجب تماس بیشتر ریشه با خاک می‌شود که در جذب فسفر از خاک موثر می‌باشد، قطر ریشه در جذب فسفر خاک مهم است به این صورت که قطر کمتر ریشه می‌تواند تماس بیشتری با خاک در واحد سطح ریشه فراهم نماید و در نتیجه موجب جذب بیشتر فسفر از خاک می‌شود، ریشه‌های موئین جذب فسفر از خاک ریزوسفر را به دلیل افزایش سطح موثر ریشه تا چندین برابر افزایش می‌دهند، چارج میکوریزا (VAM) به استخراج فسفر از خاک ریزوسفیری کمک می‌کند، هم‌چنین گزارش شده است که اسیدهای آلی رها شده از ترشحات ریشه‌ای شامل آنیون‌هایی مثل مالات، فومارات، اگزالات و به ویژه سترات هستند که موجب افزایش حلالیت پذیری فسفر از فرم نامحلول به فرم جذب شده و محلول می‌گردند. گاهونیا و نیلسن (۱۰) با بررسی کارایی جذب ارقام مختلف گندم و جو، بیان کردند که تفاوت ارقام مختلف در گسترش منطقه تخلیه اطراف ریشه و غلظت بحرانی فسفر آن منطقه است و ترشحات ریشه ارقام گیاهی نقش مهمی را در افزایش حلالیت فسفر و جذب آن توسط گیاه بازی می‌کنند. طبق گفته جونز و همکاران (۱۴) تحرک عناصر ریزوسفیری از قبیل فسفر و آهن زمانی که pH خاک کمتر است محتمل‌تر است، هم‌چنین نشان دادند که افزایش فعالیت فسفاتاز در خاک ریزوسفیری، هیدرولیز استرهای فسفات را افزایش می‌دهد و فسفر معدنی جهت جذب را آزاد می‌کند. ونس و همکاران (۳۰) با تحقیق بر روی اثر ریشه‌های خوشه‌ای در جذب فسفر از خاک نشان دادند که ریشه‌های خوشه‌ای علاوه بر تغییرات میکوریزی باعث افزایش جذب فسفر در اغلب گونه‌های گیاهی بخصوص *Proteaceae* از قبیل لوپین می‌شود چون که مقادیر زیادی از اسیدهای آلی، پروتون و اسید فسفاتاز جهت حل کردن فسفر باند شده به کمپلکس‌های آلی و معدنی از ریشه‌های خوشه‌ای تراوش می‌کنند. طبق گزارشات اختر و همکاران (۲) با بررسی و مقایسه توزیع بیومایس و فسفر ریشه و شاخساره بین ارقام گیاهی *Diversa*

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر شن

بافت	pH	Olsen-P	Fe	Mn	Zn	Cu
			← (mg/kg) →			
شن ریز	۷/۴	۳	۵/۰۶	۲/۷۸	۰/۷۶	۰/۲۸

شاخساره ارقام به روش کالریتری (رنگ زرد مولیبدات و وانادات) و سترمن (۳۲) اندازه‌گیری شدند. از داده‌های بدست آمده، مقدار فسفر کل، شاخص پاسخ به کود و شاخص‌های فسفر کارایی محاسبه شدند:

PC: غلظت فسفر شاخساره (mg / g DW) ؛ SDW: عملکرد خشک شاخساره (g) ؛ PS: فسفر محلول از منبع فسفات پتاسیم؛ RP: فسفر نامحلول از منبع سنگ فسفات تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از طریق نرم افزار SAS و رسم نمودارها از طریق Excel انجام گرفت.

نتایج و بحث

ارقام از لحاظ عملکرد اندام هوایی، شاخص پاسخ به کود، غلظت و مقدار فسفر کل، شاخص فسفر کارایی، کارایی در مصرف فسفر و کارایی جذب فسفر در سطح یک درصد تفاوت معنی داری نشان دادند (جدول ۲ و ۳).

$$TP = PC \times SDW$$

$$FR = SDW_{PS} - SDW_{RP}$$

$$PACE = \left(\frac{TP \text{ in } P_0}{TP \text{ in } P_s} \right)$$

$$PUTE = \left(\frac{SDW}{TP} \right)$$

$$PE = \left(\frac{SDW \text{ in } RP}{SDW \text{ in } PS} * 100 \right)$$

$$PUTE \times CPE = PACE$$

شن عبور داده شده از الک ۲mm، در گلدان‌های سه کیلوگرمی ریخته شد، سپس ۲۰ رقم گندم در دو منبع کودی فسفات پتاسیم و سنگ فسفات و در سه تکرار در گلدان‌ها کاشته شدند. سایر عناصر غذایی در واحد mg/kg به شرح زیر به گلدانها اضافه شد: ۱۰۰ N از NH_4NO_3 ، ۸۹ K از KCl و K_2SO_4 ، ۴۱ Ca از $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ ، ۳/۹۵ Mg از $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ، ۳/۲۶ Mn از $MnSO_4 \cdot H_2O$ ، ۲/۰۵ از $Cu \cdot ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ ، ۰/۵۱ از $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ، ۰/۱۲ B از H_3BO_3 ، ۰/۱۱ Co از $Na_3[CO(NO_3)_6]$ ، ۰/۰۸ Mo از $(NH_4)_6MO_7O_{24} \cdot 4H_2O$ و ۵ Fe از سکوسترین آهن ۶٪. بطوری که نیتروژن در ۳ مرحله و سایر عناصر غذایی در یک مرحله و قبل از کشت مصرف شدند. مراقبت‌های زراعی لازم برای تمامی تیمارها به طور یکنواخت اعمال گردید. آبیاری بصورت وزنی به هنگام رسیدن گلدان‌ها به ۸۰ درصد FC انجام گرفت. از ۱۴ بذر کاشته شده در هر گلدان، هشت بذر برای ادامه کشت در گلدان‌ها گذاشته شد. پس از هشت هفته بوته‌ها برداشت و اندام هوایی پس از خشک شدن در آون ۷۰ درجه سانتیگراد توزین شده و پس از آسیاب شدن، غلظت فسفر

TP: مقدار فسفر کل شاخساره (mg) (۲۲):

FR : شاخص پاسخ به کود (g) (۹) و (۳۳):

PACE: شاخص کارایی جذب فسفر (۲۳):

PUTE: شاخص کارایی مصرف فسفر (g SDW / mg P) (۲۹):

PE: شاخص فسفر کارایی (%) (۲۲):

CPE^۲: فسفر کارایی محاسبه شده (۲۸):

جدول ۲- تجزیه واریانس شاخص‌های عملکرد اندام هوایی، غلظت فسفر، مقدار فسفر کل شاخساره گیاه و کارایی مصرف فسفر تحت تاثیر تیمارهای مختلف رقم و سطح کودی

میانگین مربعات				درجه آزادی	منابع تغییرات
عملکرد اندام هوایی	غلظت فسفر شاخساره	مقدار فسفر شاخساره	کارایی مصرف فسفر		
۰/۹۷**	۰/۶۵**	۳۱/۷۱**	۰/۰۴**	۱۹	رقم
۱۳۲۳/۵۵**	۱۲۱/۳۶**	۱۵۹۰/۰۶**	۷/۶۶**	۱	سطح کودی
۰/۶۲**	۰/۳۳**	۲۶/۲۹**	۰/۰۷**	۱۹	رقم×سطح کودی
۰/۱۴	۰/۰۱	۱/۲۴	۰/۰۰۲۱	۸۰	خطا
۹/۴۱	۵/۴۱	۸/۹۹	۸/۰۸		ضریب تغییرات (%)

**معنی دار در سطح ۱٪

- 1- Response to fertilizer
- 2- Calculated P efficiency

جدول ۳- تجزیه واریانس شاخص های کارایی جذب فسفر، کودپذیری، فسفر کارایی و فسفر کارایی محاسبه شده

میانگین مربعات				درجه آزادی	منابع تغییرات
فسفر کارایی محاسبه شده	فسفر کارایی	شاخص کودپذیری	کارایی جذب فسفر		
۰/۰۰۰۲۲**	۰/۰۰۲۲**	۱/۲۵**	۰/۰۰۰۵۶**	۱۹	رقم
۰/۰۰۰۰۱۸	۰/۰۰۰۰۲۱	۰/۳۱	۰/۰۰۰۰۴۰	۴۰	خطا
۱۵/۹۴	۱۵/۱	۸/۳۴	۱۷/۲۱		ضریب تغییرات (%)

**معنی دار در سطح ۱٪

عملکرد اندام هوایی (Shoot yield)

عملکرد اندام هوایی (وزن خشک) در حالت مصرف سنگ فسفات از ۰/۲۴ (رقم کرج ۱) تا ۱/۱۸ گرم به گلدان (رقم آزادی) با میانگین ۰/۶۸ گرم متغیر بود و با مصرف فسفر محلول میانگین عملکرد اندام هوایی به طور معنی داری به ۷/۳ گرم افزایش یافت و ارقام کرج ۱ و مرودشت به ترتیب با ۵/۶ و ۸/۷ گرم کمترین و بیشترین عملکرد اندام هوایی را در حالت مصرف فسفر محلول داشتند (جدول ۴). در گزارشاتی مشابه سپهر و همکاران (۲۸) با مقایسه عملکرد اندام هوایی ارقام مختلف غلات در خاک آهکی با فسفر قابل دسترس پایین ولی فسفر کل بالا؛ گوش و همکاران (۹)؛ ازترک و همکاران (۲۲)؛ لیو و همکاران (۱۷) و اسپرن و رنگل (۲۳) با مقایسه عملکرد شاخساره غلات در مقادیر مختلف فسفر محلول نشان دادند که با مصرف فسفر محلول عملکرد اندام هوایی ارقام گیاهی افزایش معنی داری یافتند. بالمی (۵) گزارش داد که کاهش فرایندهای وابسته به فتوسنتز یا کاهش تغییر و تبدیلات موثر در فرایند گرفتن نور منجر به کاهش عملکرد اندام هوایی ارقام در حالت کمبود فسفر شده است. زیانگ - ون و همکاران (۳۴) نشان دادند که اختلافات در اندازه برگ و ارتفاع گیاه بین ارقام مختلف سویا منجر به ایجاد عملکردهای متفاوت شاخساره بین ارقام سویا شده است در حالی که لیو و همکاران (۱۶) نشان دادند که تفاوت در جذب فسفر بین ارقام مختلف گندم منجر به ایجاد اختلاف بین عملکردهای شاخساره ارقام شده است.

شاخص پاسخ به کود (FR)

متوسط شاخص کودپذیری برای ارقام گندم مورد مطالعه، ۶/۶ گرم بود که در بین ارقام، مرودشت با شاخص پاسخ به کود برابر ۸/۳ کودپذیری بالا و ارقام کرج ۱ و هامون به ترتیب با شاخص ۵/۳ و ۵/۶ گرم کودپذیری نسبتاً پایینی را نشان دادند، به طور کلی ارقام مرودشت، آزادی، نیک نژاد، داراب ۲، کرج ۲، رسول، مغان ۱، کاوه، آریا و شعله دارای شاخص پاسخ به کود بالاتر از میانگین و ارقام گلستان، بیات، اینیا، اترک، شیراز، دز، نوید، هیرمند، هامون و کرج ۱ دارای شاخص پاسخ به کود پایین تر از میانگین بودند (جدول ۴). در تحقیقی مشابه سپهر و همکاران (۲۸) گزارش دادند که در بین ارقام

گندم نان

رقم M-81-13، از بین ارقام گندم دوروم رقم آریا و از بین ارقام جو رقم M-80-16 شاخص کودپذیری بالایی را نشان دادند و در آزمایش دیگر گوش و همکاران (۹) با مقایسه شاخص پاسخ به کود ۲۵ رقم گندم زمستانه دریافتند که ارقام C-1252, Kirikpinar-79 و Kiziltan-40/98 غیر کودپذیر و ارقام Yakar-99, Ikizce-96 و Mizrak-98 کودپذیر بودند.

غلظت و مقدار فسفر گیاه

غلظت فسفر در شاخساره ارقام مختلف در حالت فسفر محلول و سنگ فسفات متفاوت بود و بین ۰/۹ و ۱/۶۸ میلی گرم با میانگین ۱/۲۶ در حالت مصرف سنگ فسفات و بین ۲/۱ و ۴/۱ میلی گرم با میانگین ۳/۳ میلی گرم بر گرم ماده خشک در حالت مصرف فسفر محلول بدست آمد و بطور میانگین در حالت مصرف سنگ فسفات، غلظت فسفر در شاخساره ارقام ۲/۶ برابر کمتر از حالت مصرف فسفر محلول بود. در حالت مصرف سنگ فسفات ارقام آزادی، بیات، شیراز، گلستان و دز بیشترین و ارقام مغان ۱، آریا، هیرمند، هامون و کرج ۲ کمترین غلظت فسفر را در شاخساره داشتند و با مصرف فسفر محلول، ارقام شعله، اترک، نیک نژاد و گلستان غلظت فسفر شاخساره را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دادند (جدول ۴). در گزارشی دیگر سپهر و همکاران (۲۸) با بررسی غلظت فسفر شاخساره غلات مختلف در خاک آهکی به نتیجه مشابهی رسیدند و نشان دادند که غلظت فسفر شاخساره غلات در حالت محدودیت فسفر ۲/۲-۱/۲ میلی گرم بر گرم ماده خشک و در حالت کفایت فسفری بین ۵-۴ میلی گرم بر گرم ماده خشک بود. لیو و همکاران (۱۶) نشان دادند که در حالت محدودیت فسفری غلظت فسفر شاخساره ارقام مختلف گندم زیر غلظت بحرانی فسفر شاخساره بود. ازترک و همکاران (۲۲) مشاهده کردند که در حالت محدودیت فسفری غلظت فسفر شاخساره ارقام گندم نان و دوروم ۵۰ درصد کاهش یافت. اسپرن و رنگل (۲۳) گزارش دادند که غلظت پایین فسفر شاخساره در ارقام چاودار و تربیتکاله با عملکرد اندام هوایی بالا نسبت به ارقام گندم به اثر رقت در نتیجه افزایش رشد است.

جدول ۴- عملکرد اندام هوایی، شاخص کودپذیری (FR) و غلظت فسفر (PC) ارقام گندم

نام رقم	عملکرد اندام هوایی (g/pot)		شاخص کود پذیرى (g/pot)		غلظت فسفر در اندام هوایی (mg / g DW)	
	PS	RP	PS	RP	PS	RP
مرودشت	۸/۷	۰/۳۷	۸/۳	۱/۱۸	۲/۱	۱/۱۸
رسول	۷/۴	۰/۸۳	۶/۶	۱/۲۲	۲/۹	۱/۲۲
آزادی	۸/۳	۱/۱۸	۷/۱	۱/۶۸	۳/۳	۱/۶۸
نیک نژاد	۸/۲	۱/۰۴	۷/۱	۱/۲۷	۳/۹	۱/۲۷
کرج ۲	۷/۹	۰/۵۹	۷/۳	۱/۰۲	۳/۰	۱/۰۲
داراب ۲	۷/۹	۰/۴۷	۷/۴	۱/۲۴	۳/۴	۱/۲۴
مغان ۱	۷/۵	۰/۸۱	۶/۷	۰/۹۰	۲/۴	۰/۹۰
کاوه	۷/۴	۰/۶۷	۶/۷	۱/۳۳	۲/۶	۱/۳۳
آریا	۷/۴	۰/۴۹	۶/۹	۱/۰۲	۳/۱	۱/۰۲
شعله	۷/۴	۰/۶۱	۶/۷	۱/۳۹	۴/۱	۱/۳۹
گلستان	۷/۳	۰/۹۱	۶/۴	۱/۴۳	۳/۷	۱/۴۳
بیات	۷/۳	۰/۸۱	۶/۵	۱/۶۱	۳/۵	۱/۶۱
اینیا	۷/۲	۰/۷۲	۶/۴	۱/۱۲	۳/۰	۱/۱۲
اترک	۷/۱	۰/۶۴	۶/۴	۱/۳۴	۴/۱	۱/۳۴
شیراز	۷/۱	۰/۵۵	۶/۵	۱/۴۶	۳/۹	۱/۴۶
دز	۷/۰	۰/۸۴	۶/۱	۱/۴۶	۳/۴	۱/۴۶
نوید	۷/۰	۰/۷۳	۶/۳	۱/۱۲	۳/۶	۱/۱۲
هیرمند	۶/۸	۰/۵۰	۶/۳	۱/۰۷	۳/۱	۱/۰۷
هامون	۶/۲	۰/۶۳	۵/۶	۱/۱۰	۳/۵	۱/۱۰
کرج ۱	۵/۶	۰/۲۴	۵/۳	۱/۱۶	۳/۵	۱/۱۶
میانگین	۷/۳	۰/۶۸	۶/۶	۱/۲۶	۳/۳	۱/۲۶
LSD _{0.01} (بین ارقام)	۰/۴۳		۰/۹۱		۰/۱۴	
LSD _{0.05} (بین سطوح کودی)	۰/۱۴		—		۰/۰۴	
CV (%)	۹/۴۱		۸/۳۴		۵/۴۱	

و همکاران (۱۶) بر روی ۱۹۸ رقم گندم در دو نوع خاک با قدرت تثبیت کنندگی بالا نشان دادند که با مصرف فسفر محلول، مقدار فسفر شاخساره ارقام افزایش یافت. در مطالعاتی توسط باتن (۳) بر روی ۲۳ رقم گندم و یا توسط اسپرن و رنگل (۲۳) بر روی ۱۰۶ رقم غلات مشاهده شد که اختلافات بالایی بین ارقام از لحاظ مقدار فسفر کل وجود داشت و این اختلافات به اندازه ریشه، مورفولوژی ریشه و تغییرات ریزوسفر ریشه نسبت داده شد. در گزارشی از ترک و همکاران (۲۲) نشان دادند که بین عملکرد خشک شاخساره ارقام گندم و مقدار فسفر شاخساره همبستگی معنی داری است و پارامتر مقدار فسفر کل شاخساره ارقام گیاهی به میزان زیادی تحت تاثیر گونه گیاه، میزان رشد و تولید محصول قرار می گیرد.

بالاترین میزان جذب فسفر توسط ارقام گندم در حالت مصرف سنگ فسفات ۱/۹۸ (رقم آزادی) و کمترین آن ۰/۲۸ میلی گرم (کرج ۱) بود که بطور میانگین ۰/۸۸ بدست آمد و با مصرف فسفر محلول این میانگین به ۲۳/۹ میلی گرم افزایش یافت. مشاهده شد که مقدار جذب فسفر در ارقام آزادی، گلستان، نیک نژاد، بیات، دز، رسول و کاوه بیشتر از مقدار فسفر در ارقام مغان ۱، آریا، کرج ۲، هیرمند، هامون، نوید، اینیا، کرج ۱ و مرودشت در حالت مصرف سنگ فسفات است که این نشان می دهد ارقام آزادی، گلستان، نیک نژاد، بیات، دز، رسول و کاوه در جذب فسفر از سنگ فسفات توانایی بالاتری را داشتند (جدول ۵).

در تحقیقاتی مشابه سپهر و همکاران (۲۸) در غلات؛ زیانگ - ون و همکاران (۳۴) بر روی ارقام سویا؛ گونش و همکاران (۹) بر روی ارقام گندم زمستانه در دو محیط رشد گلخانه و مزرعه ای و لیاو

جدول ۵- فسفر کل گیاه، شاخص کارایی مصرف، کارایی جذب و فسفر کارایی ارقام مختلف گندم

شاخص فسفر کارایی محاسبه شده (CPE)	شاخص فسفر کارایی بر حسب درصد	شاخص کارایی جذب فسفر	شاخص کارایی مصرف فسفر (g SDW / mg P)		فسفر کل (mg /pot)		نام رقم
			PS	RP	PS	RP	
۰/۰۲	۴/۳	۰/۰۲	۰/۴۱	۰/۸۵	۲۱/۳	۰/۴۶	مرودشت
۰/۰۴	۱۱/۲	۰/۰۵	۰/۳۵	۰/۸۲	۲۱/۳	۱/۰۱	رسول
۰/۰۴	۱۴/۵	۰/۰۷	۰/۳۱	۰/۶۰	۲۷/۰	۱/۹۸	آزادی
۰/۰۳	۱۲/۷	۰/۰۴	۰/۲۵	۰/۷۹	۳۲/۲	۱/۳۲	نیک نژاد
۰/۰۳	۷/۶	۰/۰۳	۰/۳۴	۰/۹۹	۲۳/۴	۰/۶۱	کرج ۲
۰/۰۲	۶/۰	۰/۰۲	۰/۳۰	۰/۸۱	۲۶/۷	۰/۵۹	داراب ۲
۰/۰۵	۱۰/۸	۰/۰۴	۰/۴۲	۱/۱۲	۱۸/۰	۰/۷۳	مغان ۱
۰/۰۴	۹/۱	۰/۰۵	۰/۳۸	۰/۷۵	۱۴/۵	۰/۹۰	کاوه
۰/۰۲	۶/۶	۰/۰۲	۰/۳۳	۰/۹۹	۲۲/۶	۰/۵۱	آریا
۰/۰۲	۸/۳	۰/۰۳	۰/۲۴	۰/۷۲	۳۰/۴	۰/۸۴	شعله
۰/۰۳	۱۲/۵	۰/۰۵	۰/۲۷	۰/۷۱	۲۷/۳	۱/۳۳	گلستان
۰/۰۳	۱۱/۱	۰/۰۵	۰/۲۸	۰/۶۲	۲۵/۶	۱/۳۰	بیات
۰/۰۳	۱۰/۱	۰/۰۴	۰/۳۳	۰/۸۹	۳۱/۵	۰/۸۱	اینیا
۰/۰۲	۹/۱	۰/۰۳	۰/۲۴	۰/۷۷	۲۹/۱	۰/۸۵	اترک
۰/۰۲	۷/۸	۰/۰۳	۰/۲۶	۰/۶۸	۲۷/۳	۰/۸۰	شیراز
۰/۰۴	۱۲/۰	۰/۰۵	۰/۳۰	۰/۶۸	۲۳/۴	۱/۲۳	دز
۰/۰۳	۱۰/۶	۰/۰۳	۰/۲۸	۰/۸۹	۳۴/۹	۰/۸۳	نوید
۰/۰۲	۷/۳	۰/۰۳	۰/۳۲	۰/۹۴	۲۱/۲	۰/۵۴	هیرمند
۰/۰۳	۱۱/۱	۰/۰۳	۰/۲۹	۰/۹۱	۲۱/۵	۰/۷۰	هامون
۰/۰۲	۴/۵	۰/۰۲	۰/۳۹	۰/۸۶	۱۴/۲	۰/۲۸	کرج ۱
۰/۰۳	۹/۳۱	۰/۰۴	۰/۳۱	۰/۸۲	۲۳/۹	۰/۸۸	میانگین
۰/۰۱	۲/۳۱	۰/۰۱	۰/۰۵		۱/۲۷		LSD _{0.01} (بین ارقام)
—	—	—	۰/۰۱		۰/۴۰		LSD _{0.05} (بین سطوح کودی)
۱۵/۹۴	۱۵/۱	۱۷/۲۱	۸/۰۸		۸/۹۹		CV(%)

کارایی جذب فسفر (PACE)

فیزیولوژی ریشه وابسته است، همانطوری که ونگ و همکاران (۳۱) با ارزیابی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی ریشه ارقام کتان، گندم و لوبین گزارش دادند که گیاه لوبین از طریق ترشحات ریشه، گندم از طریق رهاسازی پروتون و گسترش ریشه و گیاه کتان با افزایش فعالیت فسفاتاز ریزوسفر توانایی جذب فسفر بالایی را داشتند، هم-چنین لیو و همکاران (۱۷) مشاهده کردند که در حالت محدودیت فسفر بیومایس ریشه، نسبت ریشه به شاخساره، طول ریشه، فعالیت اسیدفسفاتاز و سطح تماس ریشه برای هر دو رقم فسفرکارا و غیرکارای ذرت افزایش ولی ترشح اسید آلی و pH ریزوسفر ریشه ها کاهش یافت. پیرس و همکاران (۲۷) با بررسی نقش کربوکسیلات و تاثیر آن بر روی جذب فسفر و رشد گیاه *Lupinus albus* L. گزارش دادند که توانایی ریشه ها در افزایش ترشح کربوکسیلات نوعی سازگاری برای جذب فسفر در خاکهایی با فسفر قابل دسترس پایین

متوسط شاخص کارایی جذب فسفر برای ارقام ۰/۰۴ بود و در بین ارقام مورد مطالعه، ارقام آزادی و دز به ترتیب با ۰/۰۷ و ۰/۰۵ نسبت به بقیه کارایی بالایی نشان دادند و ارقام کرج ۱ و مرودشت با ۰/۰۲ غیر کاراترین ارقام در جذب فسفر بودند، بطور کلی ارقام آزادی، دز، بیات، گلستان، رسول و کاوه دارای کارایی جذب فسفر بالاتر از میانگین و ارقام کرج ۱، مرودشت، آریا، داراب ۲، کرج ۲ و هیرمند کارایی جذب فسفر پایین تر از میانگین داشتند که نشان می دهد ارقام آزادی، دز، بیات، گلستان، رسول، نیک نژاد و کاوه در جذب فسفر کاراتر هستند (جدول ۵). مارشتر و همکاران (۲۱) گزارش دادند که اختلافات ژنتیکی بین ارقام از لحاظ جذب فسفر، مهم ترین فاکتور تعیین کننده در کارایی عنصر است که به خصوصیات مورفولوژی و

این مطالعه رقم جو (M-80-16) با ۰/۴۲ کمترین فسفر کارایی را داشت و ارقام گندم قدس، روشن و S-18-80 به همراه یولاف به عنوان ارقام فسفرکارا معرفی شدند. در گزارش مشابه، اسپرن و رنگل (۲۳) با ارزیابی فسفر کارایی گندم، چاودار و تریتیکاله در استفاده از مقادیر مختلف فسفر محلول بر اساس عملکرد خشک شاخساره و در حالت محدودیت فسفر دریافتند که ارقام چاودار و تریتیکاله کارایی بالایی دارند و در بین ارقام گندم فقط ارقام Wawht 2055، Wawht 2128 و Soglen کارا بودند. در آزمایش دیگر با ارزیابی فسفر کارایی غلات مختلف (گندم، چاودار و تریتیکاله) در استفاده از منبع فسفات آهن اسپرن و رنگل (۲۴) بیان کردند که ارقام چاودار و تریتیکاله کارا تر از ارقام گندم بودند و از لحاظ فسفر کارایی اختلافات زیادی بین ارقام گندم وجود داشت. مطالعات ایشان نشان داد که هیچ رقمی بر اساس ۴ شاخص (عملکرد خشک شاخساره در فسفر کم، عملکرد نسبی شاخساره، کارایی جذب و مصرف فسفر) کارا نبود، بر اساس سه شاخص (عملکرد خشک شاخساره در فسفر کم، عملکرد نسبی شاخساره و کارایی جذب فسفر) از بین ارقام چاودار Pc00361، Bevy، کارا و رقم Machete غیر کارا بود، بر اساس دو شاخص (عملکرد خشک شاخساره در فسفر کم، عملکرد نسبی شاخساره) از بین ارقام گندم 80-55، Westonia، Chinese، Wawht 2147 از بین ارقام تریتیکاله AT48-94، TX93-78-1 و از بین ارقام چاودار رقم Bulgarian pento، کارا ولی ارقام Cadoux، Boricuta، Abacus، Perenjori، Kalingri، Insignia، Cunderdin غیر کارا بودند. گاهونیا و همکاران (۱۰) با ارزیابی فسفر کارایی بین ارقام گندم زمستانه و جو بهاره و زمستانه گزارش دادند که فسفر کارایی ارقام جو بهاره و گندم زمستانه بیشتر از ارقام جو زمستانه بود بطوری که در بین ارقام جو بهاره، رقم Hamu و در بین ارقام گندم زمستانه، رقم Canut به ترتیب با ۳۵ و ۴۱ درصد بالاترین فسفر کارایی را داشتند، همچنین نشان دادند که اختلافات فسفر کارایی به طول تارهای ریشه و ترشحات ریشه ارقام مختلف مربوط است.

شاخص فسفر کارایی با مقدار کل فسفر جذب شده در حالت مصرف سنگ فسفات همبستگی مثبت و معنی داری ($R^2 = 0.77$) در سطح یک درصد داشت (شکل ۱) در تحقیق دیگر از ترک و همکاران (۲۲) گزارش دادند که ضریب همبستگی بین فسفر کارایی و مقدار کل فسفر جذب شده برابر با ($R^2 = 0.81$) بود. سپهر و همکاران (۲۸) نیز به نتیجه مشابهی رسیدند و بیان کردند که همبستگی مثبت ($R^2 = 0.66$) بین فسفر کارایی و مقدار کل فسفر است و دریافتند که مقدار فسفر شاخساره، پارامتر مناسبی برای مقایسه ارقام گیاهی گندم در طول دوره رشد است. در حالت مصرف سنگ فسفات بین فسفر کارایی و غلظت فسفر شاخساره همبستگی ضعیف ($R^2 = 0.18$) وجود داشت که با نتایج جونز و همکاران (۱۳) مطابقت دارد.


است. منسک و همکاران (۱۹) گزارش دادند که کارایی جذب فسفر مهم‌تر از کارایی مصرف فسفر است در حالی که از ترک و همکاران (۲۲) نشان دادند که هر دو نوع کارایی جذب و مصرف فسفر به طور یکسان اهمیت دارند.

کارایی مصرف فسفر گیاه (PUTE)


ارقام گیاهی که با غلظت‌های پایین فسفر شاخساره، بتوانند فعالیت‌های متابولیکی را در بافتها و اندام‌های خود طوری تنظیم کنند که وزن خشک بالایی را به ازای هر واحد فسفر جذب شده تولید کنند کارایی مصرف فسفر بالایی را دارند. این شاخص در حالت مصرف سنگ فسفات از ۰/۶ (آزادی) تا ۱/۱۲ گرم ماده خشک بر میلی گرم فسفر (مغان ۱) تغییر کرد و از این نظر ارقام مغان ۱، آریا، کرج ۱، مرودشت، کرج ۲، هامون، هیرمند، اینیا و نوید کارا تر بودند اما ارقام آزادی، بیات، دز، گلستان، شیراز، شعله و نیک نژاد کارایی پایینی داشتند. مشاهده شد که با افزایش فسفر محلول، کارایی مصرف فسفر در تمامی گونه‌ها کاهش یافت بطوری که از ۰/۲۴ (اترک و شعله) تا ۰/۴۲ (مغان ۱) با میانگین ۰/۳۱ گرم بدست آمد (جدول ۵). همانطوری که سپهر و همکاران (۲۸) گزارش دادند که با افزایش مصرف کود فسفات در خاک آهکی با فسفر قابل دسترس پایینی کارایی مصرف فسفر غلات از ۰/۵۵ به ۰/۲۱ کاهش یافته است و ارقام جو، یولاف، چاودار و تریتیکاله کارایی مصرف فسفر بالایی از ارقام گندم نان و دوروم داشتند. در تحقیقی مشابه فاگریا و همکاران (۷) گزارش دادند که با مصرف فسفر محلول، کارایی مصرف فسفر ارقام برنج از ۲/۹ به ۱/۰۴ گرم کاهش یافت. اسپرن و رنگل (۲۳) با ارزیابی کارایی مصرف فسفر ارقام مختلف غلات در مقادیر مختلف فسفر محلول گزارش دادند که ارقام چاودار و تریتیکاله کارایی مصرف فسفر بالایی از ارقام گندم داشتند. فاگریا و همکاران (۸) گزارش دادند که گونه های گندم جدید کارایی مصرف فسفر بالاتری را نسبت به سایر گونه های قدیمی گندم داشتند.

فسفر کارایی (PE)

متوسط شاخص فسفر کارایی برای ارقام ۹/۳۱ بود و ارقام آزادی و نیک نژاد به ترتیب با ۱۴/۵ و ۱۲/۷ درصد بالاترین فسفر کارایی و ارقام مرودشت و کرج ۱ با ۴/۵ درصد پایین ترین فسفر کارایی را داشتند، در حالت کلی ارقام رسول، آزادی، نیک نژاد، مغان ۱، گلستان، بیات، اینیا، دز، نوید و هامون فسفر کارایی بالاتر از میانگین ولی ارقام مرودشت، کرج ۲، داراب ۲، کاوه، آریا، شعله، اترک، شیراز، هیرمند و کرج ۱ فسفر کارایی پایینی تر از میانگین را داشتند (جدول ۵). در تحقیقی دیگر توسط سپهر و همکاران (۲۸) نیز رقم آزادی با فسفر کارایی ۰/۹۷ نسبت به بقیه ارقام در جذب فسفر کارا تر بود، در



شکل ۲- همبستگی بین فسفر کارایی (PE) و فسفر کارایی محاسبه شده (CPE)



شکل ۱- همبستگی بین فسفر کارایی (PE) و مقدار کل فسفر (TP) گیاه در حالت مصرف سنگ فسفات

فسفر معدنی محلول استفاده کردند نشان دادند که رقم *Westonia* کارا ولی رقم *Cadoux* غیر کارا بودند.

نتیجه گیری

بطور کلی بین ارقام مختلف گندم از لحاظ جذب و مصرف فسفر تفاوت‌های فاحشی مشاهده گردید. ارقام کرج ۱، مرودشت، آریا، داراب ۲، کرج ۲ و هیرمند ماده خشک بالایی به ازای جذب فسفر کم تولید کردند لذا از لحاظ مصرف فسفر کارا بودند، در مقابل ارقام آزادی، بیات، دز، گلستان، رسول، نیک نژاد و کاوه فسفر بالایی جذب کرده و از لحاظ جذب فسفر کارا بودند. ارقام کودپذیر نظیر مرودشت، آزادی، نیک نژاد، داراب ۲، کرج ۲، رسول، مغان ۱، کاوه، آریا و شعله برای سیستم های کشاورزی پرنهاده (High-input) ولی ارقام کارا نظیر رسول، آزادی، نیک نژاد، مغان ۱، گلستان، بیات، اینیا، دز، نوید و هامون برای سیستم های کشاورزی کم نهاده (low-input) توصیه می شوند البته با توجه به اینکه ارقام آزادی و نیک نژاد هم کودپذیری بالا و هم فسفر کارایی بالایی دارند پس در هر دو سیستم می توانند کشت شوند. امید است که در آینده با شناخت مکانیسم های فسفر کارایی، ژن های کد کننده آنها در گیاهان و معرفی ارقام فسفر کارا، از مصرف بی رویه کودهای فسفات، از دست رفتن هزینه های گزاف و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری شود و از طرف دیگر به حفظ منابع فسفره نیز کمک شود همچنین گامی مثبت در مدیریت مصرف صحیح کودهای فسفات و حفاظت از محیط زیست برداشته شود.

بین فسفر کارایی و فسفر کارایی محاسبه شده همبستگی معنی داری ($R^2=0/71$) وجود داشت (شکل ۲) که بیانگر این است که عملکرد نسبی شاخساره شامل هر دو کارایی جذب و مصرف فسفر است و یک شاخص مناسب برای ارزیابی فسفر کارایی است که با نتیجه لیاو و همکاران (۱۵) مطابقت دارد. سپهر و همکاران (۲۸) نیز بین فسفر کارایی و فسفر کارایی محاسبه شده همبستگی معنی داری ($R^2=0/86$) ولی بین غلظت فسفر شاخساره و فسفر کارایی همبستگی ضعیف ($R^2=0/12$) نشان دادند. به منظور ارزیابی شاخص های مربوط به فسفر کارایی، اختر و همکاران (۲) نشان دادند که کارایی جذب و مصرف فسفر دو فاکتور مهم در ارزیابی و انتخاب ارقام *Diversa brassica* هستند. زیانگ-ون و همکاران (۳۴) نشان دادند که عملکرد خشک شاخساره در حالت کمبود فسفر و عملکرد نسبی خشک شاخساره از فاکتورهای موثر و ساده برای نمایش فسفر کارایی ارقام مختلف سویا بودند. های-وی و همکاران (۱۲) به منظور ارزیابی فسفر کارایی ارقام گیاهی *Rapeseed (Brassica napus L.)* گزارش دادند که عملکرد اندام هوایی و وزن خشک ریشه شاخص های موثر برای ارزیابی فسفر کارایی ارقام است. فسفر کارایی به فاکتورهای زیادی از قبیل محیط رشد و اشکال شیمیایی فسفر خاک نیز وابسته است (۱۶). همانطوری که گونش و همکاران (۹) گزارش دادند نتایج فسفر کارایی در دو محیط گلخانه و مزرعه با هم مطابقت ندارند و هیچ همبستگی بین فسفر کارایی ارقام بین دو محیط وجود نداشت و برای نشان دادن تاثیر اشکال شیمیایی فسفر خاک بر روی فسفر کارایی ارقام مختلف گندم، اسپرن و رنگل (۲۵) وقتی که از منبع فسفر آلی (فیتات) استفاده کردند نشان دادند که ارقام گندم *Westonia* و *Cadoux* فسفر کارا بودند اما زمانی که از فسفات آهن یا

منابع

- ۱- ملکوتی م.ج.، کشاورز پ. و کریمیان ن. ۱۳۸۷. روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کودی برای کشاورزی پایدار، انتشارات تربیت مدرس، تهران، ایران.
- 2- Akhtar M.Sh., Oki Y., and Adachi T. 2008. Phosphorus and biomass distribution, and p-efficiency by Diversa Brassica cultivars exposed to adequate and p-stress environment. J. Environ. Sci. Technol. Vol.13 No 1, pp.111-119.
- 3- Batten G.D. 1986. The uptake and utilization of P and nitrogen by diploid, tetraploid wheats (triticum spp.). Annals Bot. 58: 49-59.
- 4- Batten G.D. 1992. A review of P efficiency in wheat . Plant Soil. 149: 163-168.
- 5- Balemi T. 2009. Effect of phosphorus nutrition on growth of potato genotypes with contrasting Phosphorus efficiency. African Crop sci. J. Vol. 17, No. 4 , pp. 199-212.
- 6- Chien S.H., and Menon R.G. 1995. Factors affecting the agronomic effectiveness of phosphate rock for direct application. Fertilizer Res. 41: 227-234.
- 7- Fageria N.K., Wright R.J., and Baligar V.C. 1988. Upland rice genotypes evaluation for P use efficiency. J. Plant Nutr. 20: 499-509.
- 8- Fageria N.K., and Baligar V.C. 1999. Rice cultivar evaluation for P use efficiency. Plant Soil. 111: 105-109.
- 9- Gunes A., Inal A., Alpaslan M., and Cakmak I. 2006. Genotypic variation in phosphorus efficiency between Wheat cultivars grown under greenhouse and field conditions. Soil Sci Plant Nutr. 52: 470- 478.
- 10- Gahoonia T.S., and Nielsen N.E. 1996. Variation in acquisition of soil P among wheat and barley genotypes. Plant Soil. 178: 223-230.
- 11- Gahoonia T.S., and Nielsen N.E. 2004. Root traits as tools for creating phosphorus efficient crop varieties. Plant Soil. 260: 47-57.
- 12- Hai-Wei Z., Yu H., Xiang-Sheng Y., and Fang-Sen X. 2008. Evaluation of phosphorus efficiency in Rapeseed (*Brassica napus* L.) recombinant inbred lines at seeding stage. Acta Agron. Sin. 34(12): 2152-2159.
- 13- Jones G.P.D., Jessop R.S., and Blair G.J. 1992. Alternative methods for the selection of P efficiency in wheat. Field Crops Res. 30: 29-40.
- 14- Jones D.L., Hodge A., and Kuzyakov Y. 2004. Plant and mycorrhizal regulation of rhizodeposition. New Phytol. 163(3): 469-480.
- 15- Liao M., Hocking P.J., Dong B., Delhaize E., Richardson A.E., and Ryan P.R. 2005. Screening for genotypic variation in phosphorus-uptake efficiency in cereals on Australian soils. Plant Nutrition for Food Security, Human Health and Environmental Protection, Tsinghua University Press. Beijing, China. Pp: 114-115
- 16- Liao M., Hocking P.J., Dong B., Delhaize E., Richardson A.E., and Ryan P.R. 2008. variation in early phosphorus-uptake efficiency among wheat genotypes grown on two contrasting Australian soil. Aust. J. Agr. Res. 59: 157-166.
- 17- Liu Y., Mi G., Chen F., Zhang J., and Zhang F. 2004. Rhizosphere effect and growth of two maize (*Zea mays* l.) genotypes with contrasting p efficiency at low p availability. Plant Sci. 167: 217-223.
- 18- Lindsay W.L., and Norvell W.A. 1978. Development of DTPA soil test for Zinc, iron, manganese and copper. Soil. Sci. Soc. Am. J. 42: 421-428.
- 19- Manske G.G.B., Ortiz-Monasterio J.I., Van Ginkel M., Gonzalez R.M., Rajaram S., Molina E., and Vlek P.L.G. 2000. Traits associated with improved P-uptake efficiency in CIMMYT's semidwarf spring bread wheat grown on an acid andisol in Mexico. Plant Soil. 221: 189-204.
- 20- Marschener H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Edition. London. Academic Press.
- 21- Marschener H. 1998. Role of root growth, arbuscular mycorrhiza, and root exudates for the efficiency in nutrient acquisition. Field Crops Res. 56: 203-207.
- 22- Ozturk L., Eker S., Torun B., and Cakmak I. 2005. Variation in phosphorus efficiency among 73 bread and durum wheat genotypes grown in a phosphorus-deficient calcareous soil. Plant Soil. 269: 69-80.
- 23- Osborne L.D., and Rengel Z. 2002a. Screening cereals for genotypic variation in efficiency of P uptake and utilization. Aust. J. Agric. Res. 53: 837-844.
- 24- Osborne L.D., and Rengel Z. 2002b. Genotypic differences in wheat for uptake and utilization of P from iron phosphate. Aust. J. Agric. Res. 53: 837-844.
- 25- Osborne L.D., and Rengel Z. 2002c. Growth and P uptake by wheat genotypes supplied with phytate as the only P source. Aust. J. Agric. Res. 53: 845-850.
- 26- Olsen S.R., Cole C.V., Watanable F.S., and Dean L.A. 1954. Estimation of available P in soils by extraction with sodium bicarbonate. Cir. No 939. USDA, U. S. Government printing office. Washington DC.
- 27- Pearse S.J., Veneklaas E.J., Cawthray G.R., Bolland M.D.A., and Lambers H. 2006. carboxylate release of wheat canola and 11 grain legume species as affected by phosphorus status. Plant Soil . 288: 127-139.
- 28- Sepehr E., Malakouti M.J., Kholdebarin B., Samadi A., and Karimian N. 2009. Genotypics variation in P efficiency

- of selected Iranian cereals in greenhouse experiment. *Int. J. Plant. Prod.* 3: 17-28.
- 29- Scott D.P.J.B., Charlos A.Mc., and Curtis J.R. 1995. Nutrient-use efficiency: a litterfall index, a model, and a test along a nutrient-availability gradient in North Carolina peatlands. University of Chicago press.
- 30- Vance C., Uhde-Stone C., and Allan D.L. 2002. Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource. *New Phytol.* 157: 423-447.
- 31- Wang X., Tang C., Guppy C.N., and Sale P.G. 2008. Phosphorus acquisition characteristics of cotton (*Gossypium hirsutum* L.), wheat (*Triticum aestivum* L.) and white lupin (*Lupinus albus* L.) under P deficient conditions. *Plant Soil.* 312: 117-128.
- 32- Westerman R.L. 1990. Soil Testing and Plant Analysis. 3rd edition. American Society of Agronomy and Soil Science of America, Madison, Wisconsin.
- 33- Williams L.E. Fertilizer use efficiency and influence of rootstock on uptake and accumulation of nutrients in winegrapes grown in the coastal valleys of California. *Proc. Fert. Res. Educ. Prog. Conf.*, 8th, Tulare. 14 Nov 2000. Calif. Dept. Food Agric. Fert. Res. Educ. Prog., Sacramento.
- 34- Xiang-wen P., Wen-bin L., Qiu-ying Z., Yan-hua L., and Ming-shan L. 2008. Assessment phosphorus efficiency characteristics of soybean genotypes in phosphorus-deficient soils. *Agri. Sci. China. J.* 7(8): 958-96.

Archive of SID

Evaluation of Phosphorus Acquisition and Utilization Efficiency of Wheat Genotypes in Rock Phosphate

E. Iranshahr¹ - E. Sepehr^{2*}

Received: 20-9-2011

Accepted: 15-4-2012

Abstract

A factorial completely randomized design experiment with three replications was carried out in greenhouse to evaluate the phosphorus (P) acquisition and utilization efficiency of 20 wheat genotypes in a river sand fertilized with rock phosphate (RP) and soluble P (PS). Results showed significant differences in shoot dry weight (SDW), shoot P concentration, shoot P content, P acquisition (PACE), P utilization (PUTE) and P efficiency. Marvdasht and Hamun with 8.3 and 5.6 g dry weight showed the highest and lowest response to soluble P fertilizer application, respectively. The average of PACE for all genotypes was 0.04 which Azadi and Karaj1 were the most and least efficient in P acquisition compared to other genotypes. PUTE ranged from 0.6 (Azadi) to 1.12 (Moghan 1) with the average of 0.82 (RP) and 0.31 g DW mg⁻¹ P (PS). Among wheat genotypes, Karaj 1 (4.5%) and Azadi (14.5%) showed the lowest and highest P efficiency, respectively. There was no correlation ($R^2=0.18$) between P efficiency and shoot P concentration of genotypes, but the relationship between P efficiency and shoot P content was highly significant ($R^2=0.77$).

Keywords: Wheat, Phosphorous, Rock phosphate, Acquisition, Utilization efficiency

1,2 - MSc Student and Assistance Professor of Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Urmia University
(* - Corresponding Author Email: e.sepehr@urmia.ac.ir)