



بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سلیکوز در کارگران شاغل در کارگاههای سپلیس کوبی

دکتر ایرج محبی^۱ و دکتر محمد خالد رضابی^۲

چکیده

زمینه و هدف: گرد و غبارهای ارگانیک و یا غیر ارگانیک شایع‌ترین علل شناخته شده بیماریهای بینایینی ریه هستند که در بین آنها گرد و غبار حاوی سلیکس یکی از مهمترین عوامل ایجاد‌کننده بیماری سلیکوز به عنوان یک بیماری بینایینی ریه است. تناس استنشاقی با گرد و غبار حاوی سلیکس از نوع کریستال در صنایع مختلف در دنیا اتفاق می‌افتد ولیکن شدت تماس در کشورهای مختلف متفاوت است.

روش بررسی: بیماری سلیکوز یک بیماری ناتوان کننده و غیر قابل برگشت است که در موارد شدید منجر به مرگ افراد مبتلا می‌شود. در این مطالعه ۱۷ بیمار مبتلا به سلیکوز شدید از نوع حاد و تشیدید یافته از نظر تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی و جنبه‌های اپیدمیولوژیک بررسی گردیدند.

یافته‌ها: در مقایسه با تابع علمی موجود در سطح دنیا، یافته‌های مطالعه حاضر را میتوان از نظر شدت و وحامت بیماری در زمرة موارد بسیار نادر قرارداد چراکه در بررسیهای وسیع در طی پنج سال گذشته گزارش‌هایی که طغیان سلیکوز شدید را در این حد اعلام نماید، یافت نشد.

نتیجه گیری: مرگ ۹ نفر (۵٪) بیماران که همگی در زمرة کارگران جوان طبقه بنده می‌شوند در طی زمان مطالعه اگرچه در دنیا نادر است ولیکن می‌توان آن را هشداری جدی برای سیاست‌گذاران نظام سلامت کار در تمام نهادهای دولتی و خصوصی تلقی نمود تا مقوله صیانت از سلامت نیروی کار را با تأمل بیشتری مورد توجه قرار دهد.

کلید واژه‌ها: پنوموکونیوزیس، سلیکا، سلیکوزیس، ستدرم دیسترنس تنفسی بالغین (ARDS)، پنوموتوراکس، سازمان جهانی کار (ILO)

باشد. هرچند در کشورهای توسعه نیافته ریسک تماس بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی است. سلیکوزیس یک بیماری ناتوان کننده، غیر قابل برگشت و در بعضی موارد کشنده است (۹). پاتوفیزیولوژی سلیکوزیس ریوی بخوبی مورد شناسایی قرار گرفته بطوریکه بعد از استنشاق ذرات گرد و غبار سلیکیکا، ممکن است این ذرات در آلوئولها، بافت‌های ریوی و عروق لنفاویک یافت شوند. ماکروفاژهای آلوئولی و بافت بینایینی ریه با احتباس این ذرات، منجر به فعال شدن و ایجاد عوامل لیزوزومال، اینترلوكین T-a-TNF و متابولیتها اسید آراشیدونیک می‌شوند. ایجاد بیماری

مقدمه

شایع‌ترین علل مشخص بیماریهای بینایینی ریه ناشی از تماس‌های شغلی و یا محیطی با گرد و غبارهای ارگانیک یا غیر ارگانیک است و گرد و غبار حاوی سلیکا بعنوان یکی از مهمترین سوم استنشاقی محیط‌های کاری، عاملی جهت ایجاد سلیکوزیس می‌باشد (۲). تماس‌های شغلی با گرد و غبار حاوی سلیکا در بسیاری از صنایع در سطح دنیا اتفاق می‌افتد ولیکن کاهش سطح تماس با این عامل آلاینده در کشورهای صنعتی سبب شده تا مرگ و میر ناشی از سلیکوزیس کاهش چشمگیر داشته

۱-نویسنده پاسخگو، متخصص طب کار و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی (email: fdgir@yahoo.com)

۲-متخصص بیماریهای ریه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

سابقه تنگی نفس فعالیتی، سرفه‌های خشک، کاهش وزن و کاهش اشتها را داشتند بصورت جامع تر بررسی شدند. در طی ۵ سال گذشته ۴۸ نفر بصورت متناوب مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر معاینات بالینی و بررسی کامل شرح حال شغلی، در تمامی بیماران تستهای عملکردی ریه، رادیوگرافی قفسه سینه و در بعضی از موارد HRCT ریه و پلیتیسموگرافی نیز بعمل آمد. سپس گرافیهای قفسه سینه با استانداردهای ILO در خصوص طبقه بندی پنوموکونیوزیس مورد مقایسه و تفسیر قرار گرفتند. شرح حال شغلی شامل نوع و ماهیت تماس، مدت تماس و بررسی مشاغل بیماران قبل از شروع به کار در کارگاههای سیلیس کوبی بود. سابقه ابتلاء به سل در تمامی بیماران اخذ شد. تست PPD و اسمیر خلط در سه نوبت برای تمام بیماران به منظور وجود پاسیل کخ انجام گرفت.

در مواردی که قابلیت تحمل پلیتیسموگرافی وجود داشت، بیماران از نظر اندازه گیری ظرفیت توتال ریه (TLC)، مقاومت راههای هوایی، حجم زخیره ریوی (RV) مورد بررسی قرار گرفتند. تستهای عملکردی ریه بر اساس استانداردهای انجمان توراکس آمریکا (ATS) انجام گرفت.

گرافیهای قفسه سینه در مواردی که گرافیهای قبلی در دسترس بود از نظر پیشرفت ضایعات با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. گرافیهای قفسه سینه از نظر وجود اپاسیته‌های کوچک و گستردگی آن (کمتر از ۱۰mm) اپاسیته‌های بزرگ (بیش از ۱۰mm)، افزایش ضخامت پلور، کلسفیکاسیون پلور و سایر شواهد رادیوگرافی که در استانداردهای ILO وجود دارند از جمله آمفیزم، کورپولمونل، سل ریوی، پنوموتراکس، بول و سایر ضایعات ریوی بررسی شدند و نتایج رادیو گرافی بر اساس استانداردهای ILO استخراج گردید.

یافته‌ها

تعداد بیمارانی که دارای شواهد بالینی و پاراکلینیکی لازم جهت تشخیص قطعی سیلیکوزیس بودند ۱۷ نفر را شامل می‌شد که تمام آنان مرد بودند. بیماران در شرح حال شغلی خود عنوان نمودند که محیط کاری آنان در کارگاههای محل اشتغال شدیداً غبارآلوده بوده، به طوریکه از امکانات مناسب مهندسی جهت

سیلیکوزیس وابسته به میانگین تماس استنشاقی با سیلیکا است بطوریکه اگر تماس تجمعی با سیلیکا کمتر از 0.9 mg/m^3 در طی یک سال باشد، سیلیکوزیس اتفاق نمی‌افتد (۸). سیلیکوزیس به سه حالت بالینی به صورت حاد، تشدید یافته و مزمن تظاهر می‌کند (۱۸). سیلیکوزیس مزمن پس از حداقل ۱۰ سال، سیلیکوزیس تشدید یافته ۵ تا ۱۰ یا ۱۵ سال بعد از چند هفته تا ۵ سال بعد از تماس اتفاق می‌افتد. غلظت تماس یک فاکتور تعیین کننده در ایجاد سیلیکوزیس است (۱۶). در نوع حاد بیماری، آسیب سریع در آلتوولها اتفاق می‌افتد (۱۰). ا نوع حاد و تشدید یافته بیماری، سریعاً پیشروند بوده، معمولاً بهمراه تماس بسیار شدید با سیلیکا مشاهده می‌شوند (۱). ا نوع کشنده بیماری در این حالات بدليل نارسایی تنفسی است و مرگ چند سال بعد از تماس اتفاق می‌افتد (۲). با پیشرفت بیماری ممکن است علائمی از قبیل کوتاه شدن تنفس پس از فعالیت فیزیکی، سرفه شدید، خستگی، کاهش اشتها، درد سینه و تب اتفاق بیافتد (۱۴).

سیلیکوزیس حاد و تشدید یافته از بیماریهای نادر در سطه دنیا هستند که نوع حاد کمترین شیوع را دارد (۲، ۲۶، ۱۷، ۱۳). تشخیص سیلیکوزیس بر اساس معاینات پزشکی، شرح حال کامل شغلی، رادیوگرافی قفسه سینه و تستهای عملکردی ریه صورت می‌پذیرد (۲۶). بیوپسی ریه جهت تشخیص بیماری ضرورتی ندارد (۲۲). لذا تشخیص سیلیکوزیس معمولاً بدون تأیید هیستوپاتولوژی انجام می‌شود (۲۰، ۲۵). انجام بیوپسی صرفاً در مواردی که شک به یک بیماری قابل علاج وجود داشته باشد، انجام می‌شود (۲۶). تماس با سیلیکا ممکن است با بیماریهای متعددی همراه باشد ولیکن فقط چند مورد از سیلیکوزیس حاد و تشدید یافته در منابع علمی مورد بحث قرار گرفته است (۱۷، ۱۶، ۲، ۴). تماس تجمعی با گرد و غبار قابل استنشاق مهمترین فاکتور علائم تنفسی است (۲۴).

روش بررسی

افراد مورد مطالعه خانوارهایی بودند که به صورت گروهی سابقه فعالیت شغلی در کارگاههای سیلیس کوبی دریکی از استانهای مرکزی کشور را داشتند. افرادی که دارای هرگونه شکایت تنفسی خصوصاً



(٪۴۷) در مقیاس C، ۵ نفر (٪۳۰) در مقیاس B و یک نفر در مقیاس A قرار گرفتند. در ۱۲ مورد (٪۷۰) افزایش ضخامت پلور وجود داشت که در ۱۱ مورد دو طرفه و یک مورد بصورت یکطرفه مشاهده گردید. در ۳ مورد (٪۱۸) افزایش ضخامت پلور دیافراگماتیک در سمت چپ مشاهده گردید. در ۱۰ نفر (٪۵۹) افزایش ضخامت پلور در زوایای جنبی دیافراگم مشاهده شد که ۹ مورد (٪۵۲) آن بصورت درگیری هر دو زوایای جنبی و یک مورد (٪۶) در سمت راست بود. کلیوفیکاسیون دیواره پلور بصورت دو طرفه در یک مورد (٪۶) مورد شناسایی قرار گرفت. سایر یافته های رادیولوژی بر اساس معیارهای ILO در طبقه بندی پنوموکونیوزیس شامل بهم پیوستن اپاسیته کوچک (٪۸۸)، بول (٪۷۰)، ناهنجاری در شکل و یا اندازه قلب (٪۲۹)، افیوژن (٪۶)، آمفیزم مشخص (٪۵۹)، بزرگ شدن عدد لنفاوی ناف ریه و یا مدیاستینوم (٪۲۴)، ریه لانه زنبوری (HONEY COMB LUNG) در (٪۳۵) خطوط Kerely در (٪۲۴)، پنوموتوراکس در (٪۴۱) و پنوموکونیوزیس روماتوئید در (٪۱۸) وجود داشت.

بحث

شناسایی زودرس طغیان بیماریها، سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی را قادر می سازد تا علاوه بر کنترل بیماریها، شاخصهایی جهت پیشگیری از بروز موارد مشابه ایجاد نماید (۱۲). اگرچه اولین موارد بیماران این مطالعه در سال ۱۳۷۹ شناسایی شدند ولیکن به دلیل اینکه افراد مبتلا تحت پوشش قانون کار قرار نداشتند، پس از خروج از کارگاههای سلیسیس کوبی، شناسایی موارد مشابه را با مشکل مواجه می ساخت. اکثر موارد سلیکوزیس که منجر به مرگ افراد مبتلا می شنو در سینی بالاتر از ۶۵ سال قرار دارند و مرگ این افراد سالها بعد از قطع تماس با گرد و غبار سلیلیکا اتفاق می افتد. بروز موارد جدید نشان دهنده تماس شدید با این ترکیبات می باشد (۳). یافته های مطالعه نشان می دهد که از ۱۷ بیمار مبتلا هیچکدام سابقه تماس بیش از ۵ سال را نداشته اند و از طرفی ۱۵ نفر از بیماران (٪۸۸) در زمرة کارگران جوان کتر از ۴۰ سال طبقه بندی می شوند لذا می توان استنباط نمود که در کارگاههای کوچک از جمله کارگاههای سلیسیس کوبی، نظارت بر فرآیندهای بهداشت کار با محدودیت مواجه است.

کنترل تماس برخوردار نبودند. سیستم تهویه وجود نداشت، از تجهیزات محافظت فردی مناسب در برابر آلاینده های تنفسی محل کار برخوردار نبودند. هیچکدام از افراد بیمار سابقه استعمال دخانیات نداشتند. مشاغل قبلی آنان عمدتاً کشاورزی بوده، مدت زمان کار روزانه آنان در کارگاههای سلیسیس کوب ۱۲ تا ۱۴ ساعت اعلام گردید. مدت زمان اشتغال آنان در این کارگاهها در محدوده ۱ تا ۵ سال بود. افراد مبتلا در محدوده سنی ۲۰ تا ۷۶ سال قرار داشتند. سن بیماران در ۱۵ نفر (٪۸۸) موارد کمتر از ۴۰ سال، میانگین و میانه سنی تمام بیماران ۳۲ و ۲۹ سال بود. در ۱۶ نفر (٪۹۴) اولین علامت تنگی نفس در حالت فعالیت بوده، ۱۰ بیمار (٪۵۹) به سمت تنگی نفس در حالت استراحت پیشرفت کرده اند. خشونت صدای ریوی در ۱۵ نفر (٪۸۸) و کاهش اتساع قفسه سینه در ۱۴ بیمار (٪۸۲) اتفاق افتاد. ۹ نفر (٪۶۹) دچار سرفه های خشک طولانی شدند. کاهش وزن در (٪۵۴)، ارتوپنه (٪۶۱)، دیسفارژی در (٪۳۹)، فیبرومیالژیا در (٪۳۰) موارد اتفاق افتاد. ۲ نفر از بیماران به سل ریوی مبتلا شدند. در ۹ نفر (٪۵۲) به دلیل پیشرفت بیماری سندروم دیسترس تنفسی بالغین (ARDS) ایجاد شده و به دلیل نارسایی تنفسی متعاقب آن به مرگ منجر شد. در یک بیمار پس از فوت اتوپسی انجام شد که شواهد پاتولوژیک دال بر سلیکیوزیس شدید در مشاهده مستقیم ریه و همچنین پاتولوژی نمونه اتوپسی ریه مورد تایید قرار گفت.

بر اساس آخرین ارزیابی در ۱۱ نفر (٪۶۵) از بیماران FVC کمتر از ۵۰٪ قابل انتظار بود. در ۱۰ بینار (٪۵۹) کمتر از ۵۰٪ قابل انتظار استخراج گردید. نسبت FEV1 به FVC در ۲ بیمار (٪۱۲) کمتر از ۸۰٪ مشاهده شد. از ۱۲ بیماری که قابلیت تحمل انجام مانورهای مربوط به پلتیسموگرافی را داشتند، TLC در ۹ مورد (٪۵۲) کاهش بیش از ۵۰٪ را نشان داد. در ۳ بیمار (٪۱۸) RV افزایش یافته بود.

در تمام بیماران (٪۱۰۰) یافته های رادیوگرافی دال بر اپاسیته های کوچک تر از ۱۰ میلی متر مشاهده شد. گسترش اپاسیته های کوچک در ۱۲ بیمار (٪۷۰) در گروه ۳/۳ در ۲ بیمار (٪۱۲) در گروه ۳/۲ و در یک بیمار (٪۶) در گروه ۲/۲ تشخیص داده شد. بر اساس آخرین رادیوگرافی قفسه سینه هر بیمار، در ۱۴ مورد (٪۸۲) اپاسیته های بزرگ مشاهده شد که ۸ نفر

نتیجه گیری

- منابع علمی معتبر تاکید دارند که سیلیکوزیس حاد نباید در هیچ کشوری اتفاق یافتد (۱۰)، لذا نتایج مطالعه تاکید می نماید که سازمانهای دولتی و خصوصی متولی سلامت کار در جهت ساماندهی کارگاههای در معرض خطر، پیشگیری از بروز موارد مشابه و استاندارد سازی محیط کار تامل جدی تر داشته باشند. تظاهرات رادیولوژیک در بین کارگران در معرض تماس شدید با سیلیکا افزایش می یابد (۲۳)، (۱۶، ۱۸). شدت اختلالات رادیولوژیکی در قفسه سینه و کاهش شدید عملکرد ریه در تستهای انجام شده بندرت در منابع علمی قابل دسترسی است. از نظر علمی مشخص شده است که سیلیکوزیس شدید سبب اختلالات معنی دار در عملکرد ریه می شود (۹). نتایج ارزیابی عملکرد ریوی بیماران مورد مطالعه با این نظریه مطابقت دارد.
- در نهایت می توان گفت با توجه به مرگ ۵۲٪ افراد این مطالعه و شدت تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی، کنترل آلاینده های محیطی در این قبیل کارگاهها نیازمند اقدامات پیشگیرانه اورژانس در کشور می باشد.

منابع

- American Thoracic Society. Adverse effects of crystalline silica exposure Am J Respir Crit Med 1997; 155:761-5
- Ralanaan MR, Banks DE. Silicosis in Rom WN, ed Environmental Occupational Medicine 3rd ed: Lippincott Raven, 1998:440-441
- Centers for Disease Control and prevention, Silicosis deaths young adults. United States, 1968-1994. JAMA, Jul 1998;280:13-14
- Cohen C, Firman E, Ganor, EA, et al. Accelerated silicosis with mixed-dust pneumoconiosis in a hard-metal grinder Journal of occupational and Environmental medicine, 1999, 41:480-485
- Gam H, Friedtzky A, Davis GS, Hemenway DR, Gasmad, T-Lymphocyte activation in the enlarged thoracic lymph nodes of rats with silicosis, Am J Respir Cell Mol Biol 1997;16:309-16(Medline)
- Graham WGB. Silicosis. Clin Chest Med 1992;13:253-267(Medline)
- Harber P, Chenker MB, Blames JR. Occupational and environmental respiratory diseases. St. Louis : Mosby-year book Inc 1996
- Hnizoe E, Sluis-Cremer G. Risk of silicosis in a cohort of white south African gold miners. Am J Ind Med 1993;24:447-57