



## مروزی بر روشهای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، گذار از روشهای اینویو و به روشهای نوین اینویترو

شهرناز باکند<sup>۱</sup>، احمد عامری<sup>۲</sup>، علی اصغر فرشاد<sup>۳</sup>

### چکیده

تماس با مواد آلاینده‌های شیمیایی یکی از عوامل مهم در بی خطر افتادن سلامتی افراد می‌باشد. علی‌رغم پیشرفت گستردگی در زمینه ارزیابی خطر مواد شیمیایی، اطلاعات سم شناسی، خصوصاً در زمینه مواد شیمیایی صنعتی بسیار محدود می‌باشد. امروزه بیش از ۸۰۰۰۰ ماده شیمیایی با مصارف تجاری و تعداد بسیار زیادی ترکیبات شیمیایی وجود دارد. ارزیابی خطرات سمی این مواد با استفاده از مطالعات حیوانی بدلاً لیل مختلف علمی، اقتصادی و اخلاقی مقدور نمی‌باشد. بنابراین، با افزایش روزافزون مواد شیمیایی، ترکیبات و فرآورده‌های جدید ضرورت استفاده از روشهای نوین در سم شناسی که بتواند جایگزین مطالعات حیوانی شود ضرورت پیشتری یافته است. تحقیقات اخیر نشان داده است که روشهای نوین سم شناسی از جمله روشهای اینویترو دارای قابلیت زیادی در اندازه‌گیری و ارزیابی سمیت مواد شیمیایی بوده و قادر هستند اطلاعات وسیعی را در مدت زمان کوتاه‌تری فراهم نمایند. در این مطالعه، مروزی بر روشهای متداول در ارزیابی سمیت مواد شیمیایی انجام شده و قابلیت روشهای سم شناسی اینویترو در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با وجودیکه روشهای سم شناسی اینویترو نمیتوانند دقیقاً نمایانگر پیچیدگی موجود در یک ارگانیسم زنده باشند، این روشهای همراه داشن مربوط به ساختار مولکولی و سمیت مواد (QSARs) و توکسیکوکینتیک مواد شیمیایی (PBTK) قابلیت این را دارند که بطور گستردگی در ارزیابی خطر تماس با مواد شیمیایی بکار گرفته شوند.

**کلیدواژه‌ها :** آلاینده‌های شیمیایی، ارزیابی خطر، سم شناسی، اینویترو، اینویو

مورد مواد شیمیایی صنعتی، دسترسی به این اطلاعات بسیار محدود می‌باشد (۴، ۵، ۶). روشهای قدیمی و متداول اندازه‌گیری سمیت مواد شیمیایی مبتنی بر استفاده از مطالعات حیوانی می‌باشد. علاوه بر دلایل اخلاقی، استفاده بیش از حد از اطلاعات حیوانی در سم شناسی مورد انتقاد مجامع علمی قرار گرفته است (۷، ۸). امروزه بیش از ۸۰،۰۰۰ ماده شیمیایی با مصارف تجاری و تعداد بسیار زیادی ترکیبات شیمیایی وجود دارد (۹) بطوریکه ارزیابی خطرات سمی این مواد با استفاده از مطالعات حیوانی مقدور نمی‌باشد. بنابراین، با افزایش روزافزون مواد شیمیایی، ترکیبات و فرآورده‌های جدید ضرورت استفاده از روشهای نوین در سم شناسی که بتواند جایگزین مطالعات حیوانی شود ضرورت بیشتری یافته است. امروزه روشهای نوین سم شناسی از جمله روشهای اینویترو (*In vitro*) قادر

### مقدمه

گرچه رشد روزافزون درسترنز مواد و فرآورده‌های شیمیایی مانند مواد دارویی، حشره‌کش‌ها و محصولات خانگی کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشیده است، تماس با تعداد بیشمار مواد شیمیایی و استرنز سلامت انسان و محیط را به مخاطره‌انداخته است. تماس با مواد شیمیایی در محیط‌های کار و محیط‌های آزاد یکی از عوامل مهم در بی خطر افتادن سلامتی افراد بوده و می‌تواند طیف وسیعی از مشکلات تنفسی، ناراحتی‌های پوستی و بیماری‌های سیستمیک را ایجاد نماید (۱، ۲، ۳). در حالیکه ارزیابی سمیت مواد شیمیایی مستلزم داشتن اطلاعات سم شناسی می‌باشد، در بسیاری از موارد، خصوصاً در

۱- (نویسنده مسئول)، استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران (email: bakand183@yahoo.com)

۲- عضویات علمی گروه بهداشت حرفة‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳- دانشیار گروه بهداشت حرفة‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

استفاده می شود (۱۲). سم شناسی دانشی است که پیوسته در حال تحول بوده، بطوریکه در سم شناسی مدرن پاسخهای سلولی و مولکولی به عنوان نشانگرهای اولیه در تماس با مواد شیمیایی خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. امروزه روش‌های سم شناسی اینویترو، با استفاده از تکنیکهای کشت سلول به همراه دانش مربوط به ساختار مولکولی و سمیت مواد و روش‌های توکسیکوکینتیک در سم شناسی مدرن ارتقا یافته و بکار گرفته می‌شوند. پیشرفت‌های علم سم شناسی ناشی از گسترش دانش و ارتقاء تکنیکهای آزمایشگاهی در زمینه علوم مختلف مانند بیولوژی، شیمی، ریاضی و فیزیک می‌باشد. سم شناسی علمی با دامنه‌های بسیار وسیع از نظر دیسپلین، کاربردها و روشها می‌باشد. از نقطه نظر متادولوژیکی سم شناسی از مطالعات حیوانی یا اینویتو تاروش‌های نوین اینویترو متفاوت می‌باشد.

**مطالعات حیوانی یا روش‌های اینویتو (In vivo)** روش‌های قدیمی سم شناسی مبتنی بر مطالعه اثرات مواد سمی بر روی حیوانات آزمایشگاهی بوده و بطور کلی بر این فرض استوار است که یک ماده شیمیایی اگر قادر به ایجاد اثرات سمی بر روی حیوانات آزمایشگاهی باشد می‌تواند همان اثرات یا اثرات مشابهی را روی انسان نیز ایجاد نماید. بنابراین می‌توان اطلاعات بدست آمده روی حیوانات را با روش‌های مختلف برای انسان برون یابی نموده و تعیین داد. اینگونه مطالعات برای اولین بار در سال ۱۹۲۷ توسط فردی به نام ترووان (Trewan) آغاز شد. وی برای اولین بار تست LD<sub>50</sub> (Lethal Dose ۵۰%) را معرفی نمود (۱۳).

دوز کشنده یا LD<sub>50</sub> عبارتست از غلظتی از یک ماده شیمیایی است که قادر است %۵۰ از حیوانات در معرض تماس را بکشد. از آنجاکه این تست می‌تواند اطلاعات مفیدی را از سمیت یک ماده بدست دهد این آزمایش معمولاً در مورد مواد شیمیایی جدید انجام می‌گیرد. این تست شامل تجویز دوزهای متفاوت و فزاینده یک ماده شیمیایی به حیوانات آزمایشگاهی بوده و در نهایت دوزی که قادر است %۵۰ از حیوانات مورد مطالعه را بکشد تعیین می‌گردد (۱۴). در گزارش نمودن LD<sub>50</sub> معمولاً باید راه تماس (خوراکی یا پوستی) حیوان مورد مطالعه و واحد اندازه‌گیری دوز (معمولًا mg/kg وزن بدن) مشخص گردد.

هستند اطلاعات وسیعی را در زمان کوتاهتری فراهم نمایند. با این وجود در تدوین دستورالعملهای استاندارد هنوز هم در جایگزین نمودن این روشها با احتیاط عمل می‌شود. در این مطالعه، مروری بر روش‌های متداول در ارزیابی سمیت مواد شیمیایی صورت گرفته و قابلیتهای روش‌های سم شناسی اینویترو در ارزیابی سمیت مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.

### روش بروسی

با وجودیکه اطلاعات بدست آمده از مطالعات انسانی در ارزیابی اثرات سمی مواد آلاینده‌های شیمیایی بسیار ارزشمند می‌باشد، اطلاعات انسانی همواره موجود و در دسترس نمی‌باشد. به علاوه، تجربیات ناخوشایند گذشته انسان مانند تماس با مواد دارویی چون تالیدومید و یا مواد صنعتی و آلاینده‌های نظری آبزیست، سرب و بی فنیل‌های پلی کلرینه (PCBs) ثابت نموده است که اثرات مواد شیمیایی و فرآورده‌های جدید باید به موقع و پیش از بروز عوارض نامطلوب بر انسان مشخص گردد (۱۰).

بنابراین، به عنوان یک استراتژی مهم در پیشگیری، ایجاد و ارتقاء روش‌های نوین در سم شناسی که بتوانند اطلاعات ضروری را در شناسایی خطرات مواد شیمیایی فراهم نموده و از نظر زمان و هزینه نیز مقرر بصره باشند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. هیچ روشی به تنهایی نمی‌تواند تأمین کننده اطلاعات کامل سم شناسی در زمینه شناسایی مواد شیمیایی و ارزیابی اثرات آنها بر روی انسان باشد (۱۱). بطور کلی، این اطلاعات با استفاده از روش‌های مختلف نظیر مطالعات سم شناسی، اپیدمیولوژیکی، ارتباط ساختار مولکولی و سمیت مواد Quantitative structure activity relationships (QSARs؛ toxicokinetics (PBTK؛ Physiologically based می‌باشد.

از سالیان گذشته مطالعات سم شناسی نقش مهمی را در فراهم نمودن اطلاعات سمیت مواد شیمیایی داشته است. سم شناسی Toxicology (علم شناسایی مواد سمی، یا بطور دقیقتر، مطالعه اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر روی سیستمهای بیولوژیکی می‌باشد. امروزه در سم شناسی از ارزیابی ریسک Assessment (Risk) به عنوان یک روش سیستماتیک و علمی برای شناسایی و اندازه‌گیری پتانسیل خطر مواد شیمیایی



فاکتورهای عدم اطمینان همراه می‌باشد که ناشی از تفاوت‌های بیولوژیکی میان انسان و حیوان می‌باشد (۷). علاوه بر این، اعتبار برخون یا بی ازدوز یا غلظت‌های بالا به غلظت‌های واقعی و پایین تماش، خصوصاً در مواردیکه این برخون یا بی توسط اطلاعات مربوط به مکانیسم سمیت حمایت نشده‌اند مورد سؤال واقع می‌شوند (۱۶). گرچه شدت یک اثر سمی معمولاً متناسب است با میزان تماش، اختلافات بیولوژیکی بین دوزهای بالا و پایین باید مورد توجه قرار گیرند. از گذشته سه شناسان سعی کردند که با بکارگیری فاکتورهای عدم اطمینان (factors) (Uncertainty factors) در تدوین استانداردهای مواد شیمیایی تا حدودی بر این مشکلات فایق آیند (۱۲، ۱۶).

**روشهای سم شناسی اینویترو (In vitro)** از اواسط دهه ۱۹۸۰ روشهای سم شناسی حیوانی بتدریج جای خود را به روشهای نوین سم شناسی از جمله روشهای اینویترو داد (۱۷). در این روشهای استفاده از بکارگیری روشهای بیوتکنولوژی و استفاده از کشت سلول، بافت یا ارگان اثرات سمی مواد شیمیایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بطور کلی در تکنیک کشت سلول شرایط طوری فراهم می‌شود که سلول یا بافت بتواند خارج از بدن زنده مانده، رشد نموده و عملکرد طبیعی خود را نیز حفظ نماید. این شرایط آزمایشگاهی اوایل در شیشه یا لوله آزمایش و اخیراً در پلاستیک یا فلاسکهای کشت سلول ایجاد می‌گردد. به کاربرد روشهای کشت سلول در مطالعات سم شناسی روشهای اینویترو گفته می‌شود. به موازات گسترش روشهای کشت سلول‌طی دو دهه گذشته روشهای سم شناسی اینویترو نیز گسترش و کاربرد روزافزون پیدا کرده است (۱۱، ۱۸). گذشته از پیشرفت‌های علمی، عوامل دیگری نظیر جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات بمنظور حمایت از آنها، افزایش روز

به همین ترتیب، به منظور شناسایی اثرات سمی آلاینده‌های هوا، باید تستهای سمیت از راه استنشاقی روی حیوانات صورت گیرد. بدین منظور حیوانات مورد آزمایش در تماس با غلظت‌های متفاوت ماده شیمیایی قرار داده شده و پس از استنشاق هوای آلوهه، غلظتی که موجب مرگ و میر ۵۰٪ از آنها می‌شود را تحت عنوان غلظت کشنده یا  $LC_{50}$  (Lethal Dose ۵۰٪) مشخص می‌نمایند. اطلاعات بدست آمده از اینگونه مطالعات معمولاً برای طبقه‌بندی، برچسب‌گذاری و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی بکار برده می‌شود. اخیراً، یک سیستم جهانی هماهنگ (GHS)، بر اساس سمیت حاد مواد شیمیایی، برای طبقه‌بندی مواد شیمیایی ارائه شده است (۱۵). در این سیستم، بر حسب مقادیر  $LC_{50}$  یا  $LD_{50}$  معیارهایی برای طبقه‌بندی مواد شیمیایی در پنج گروه مختلف تعیین گردیده است (جدول ۱). به کارگیری سیستم طبقه‌بندی GHS موجب ارتقاء سطح سلامت انسان و محیط خواهد شد.

در سالهای اخیر مطالعات حیوانی، خصوصاً استفاده از تستهایی نظری  $LD_{50}$ ، بدلاً لیل مختلف علمی، اخلاقی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و جوابگوی تعداد بیشمار مواد و ترکیبات شیمیایی نمی‌باشد. به همین دلیل سازمان ارتقاء اقتصاد و تعاون (OECD) ۳ روش جدید را برای جایگزین کردن روش قدیمی سمیت حاد از راه خوراکی [۴۰۱] و به منظور کاهش تعداد حیوانات برای تست یک ماده شیمیایی ارائه نموده است (۲۰۰۱a). این روشهای شامل روش دوز ثابت [۴۲۰]، روش OECD، این روشهای شامل روش دوز ثابت [۴۲۲] و روش بالا و پائین [۴۲۵] می‌باشد.

استفاده بیش از حد از اطلاعات حیوانی در مطالعات سم شناسی توسط جوامع علمی مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش بینی عملکرد بیولوژیکی ماده سمی در بدن انسان با استناد به اطلاعات حیوانی همواره با یک سری

طبقه‌بندی					نحوه تماش	
۵	۴	۳	۲	۱	خوراکی mg/kg	پوستی mg/kg
۵۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰	۵	گازها (ppm)	بخارات (mg/l)
N/A	۴۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۰/۵	۰/۰۵
N/A	۵۰۰۰	۲۵۰۰	۵۰۰	۱۰۰	(mg/l)	(mg/l)
N/A	۲۰	۱۰	۲/۰	۰/۵		
N/A	۵	۱/۰	۰/۵	۰/۰۵	گردوبغار/ میست	Not Applicable = N/A

جدول ۱- سیستم GHS برای طبقه‌بندی سمیت حاد مواد شیمیایی

گوناگون در سطوح مختلف مولکولی، سلولی، بافت و ارگان شده و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. سمیت سلولی عبارت از اثرات سوء ناشی از یک ماده شیمیایی در ساختار یا فرآیندهای لازم برای ابقاء، رشد و عملکرد سلولی می‌باشد (۲۱). آزمایشات مختلفی برای ارزیابی پتانسیل سمیت مواد شیمیایی با استفاده از روش‌های اینویترو بوجود آمده است که با استفاده از هر یک می‌توان شاخصهای مختلفی را اندازه‌گیری نمود (جدول ۲، ۸، ۲۲).

در سالهای اخیر، تحقیقات در زمینه مرگ برنامه‌ریزی شده (Apoptosis) بطور شگرفی دانش انسان را در زمینه مرگ سلولی متحول نموده که نهایتاً منجر به ارتقاء شاخصهای سمت شناسی مبتنی بر مکانیسم سمیت گردیده است. بسیاری از تغییرات ساختاری و بیولوژیکی که ممکن است در سطح غشاء سلولی، پروتئین‌آزهای بخصوص DNA اتفاق بیفتد می‌تواند به عنوان شاخصهای بیولوژیکی برای اندازه‌گیری آپوپتوزیس مورد استفاده قرار گیرد (۲۳، ۲۴).

**کاربرد روش‌های سمت شناسی اینویترو**  
در ابتداروشاهی اینویترو برای مطالعه مکانیسم عمل مواد شیمیایی در سطح سلولی و مولکولی بوجود آمدند (۲۵). به مرور، این روش‌ها در سایر فیلدهای نظری بیولوژی کانسر، کشف داروها و سمت شناسی نیز بکار گرفته شدند. در سمت شناسی اولین بار برای شناسایی خواص جهش زایی مواد شیمیایی از روش‌های اینویترو استفاده شد (۲۶). در حال حاضر روش‌های اینویترو شامل طیف وسیعی بوده که می‌تواند برای مطالعه سمیت حد موضعی و سیستمیک مواد بکار رود. سمیت سلولی، تولید مثل، جهش زایی، تست تحریک پذیری، ایمونولوژی و سمت ارگان هدف، اصلی‌ترین قلمروهای سمت شناسی اینویترو می‌باشد (۲۷).

**کاربرد روش‌های اینویترو با یک سری محدودیتها و مشکلات نیز توان می‌باشد.** یکی از محدودیتها این است که سلولهای کشت داده شده سیستمهای زنده بسیار ساده‌ای هستند که نمی‌توانند بطور کامل پیچیدگی موجود در یک ارگانیسم زنده را نشان دهند. بدلیل فقدان مسیر بیوترانسفورماسیون یک سیستم اینویترو نمی‌تواند بطور دقیق بیوپتینامیک موجود در بدن انسان را تقلید نماید. به هر حال، به کارگیری ابزارهای پیش‌بینی

افزون استفاده از مواد شیمیایی و لزوم ارزیابی خطرات این مواد از عوامل مؤثر در گسترش روش‌های اینویترو بوده است.

در سال ۱۹۵۹ دو دانشمند انگلیسی به نامهای راسل و برج (Russel & Bruch) اصولی را تحت عنوان ۳RS مطرح نمودند که پایه‌ای برای تجدید نظر در بکارگیری حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات و تحقیقات آزمایشگاهی بود (۱۹). این اصول عبارتند از کاهش تعداد حیوانات در تحقیقات آزمایشگاهی (Reduction)، تصفیه (Refinement) و تجدید نظر دستورالعملها به منظور کاهش آزار و اذیت حیوانات و جایگزینی (Replacement) مطالعات حیوانی با سایر روشها از جمله روش‌های اینویترو می‌باشد. در ابتدا اصول معرفی شده توسط این دو دانشمند مورد توجه قرار نگرفت ولی با گسترش تشكلات حمایت از حیوانات در اواسط دهه ۱۹۷۰ استفاده از مطالعات حیوانی بدلاً لیل اخلاقی مورد انتقاد قرار گرفت و اهمیت توجه به اصول ۳RS بیش از پیش مشخص گردید.

بطور کلی گسترش روش‌های اینویترو تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده است که بدون شک حرکتهای اجتماعی به منظور حمایت از حیوانات یکی از عوامل مؤثر در این زمینه بوده است. عامل دیگر افزایش روزافزون تعداد مواد شیمیایی و فرآورده‌های جدید و لزوم ارزیابی ریسک این مواد می‌باشد. سالیانه هزاران ماده شیمیایی مختلف مانند مواد آرایشی، دارویی، حشره‌کشها، مواد مصرفی وارد بازار مصرف می‌شوند. با در نظر گرفتن حدود ۸۰,۰۰۰ ماده شیمیایی تجاری (۹) و همچنین تعداد بسیار زیاد مواد شیمیایی ترکیبی و تماس با آلاینده‌های توان، ارزیابی سمت این تعداد با استفاده از مطالعات حیوانی مقدور نبوده و مستلزم آزمایشات بسیار پرهیزینه، زمان برو در بسیاری موارد غیر اخلاقی روی حیوانات آزمایشگاهی می‌باشد. بسیاری از مواد شیمیایی تنها بدلیل هزینه‌ی بسیار بالایی که مطالعات حیوانی در بر دارد هیچ‌گاه مورد آزمایش قرار نگرفته اند (۲۰). ضرورت تعیین پتانسیل اثرات سمعی این تعداد بیشمار مواد نیاز به ارتقای روش‌های نوین سمت شناسی را بیش از پیش مشخص می‌نماید.

**آزمایشات سمت شناسی اینویترو**  
تماس با مواد شیمیایی می‌تواند موجب آسیبهای



- شیمیایی بدست دهد.
- نسبتاً ساده‌تر بوده و در مدت زمان کمتری انجام می‌گیرند.
- از نظر اقتصادی بیشتر مقرن به صرفه هستند.
- برای مطالعه مکانیسم‌های سم شناسی مناسب می‌باشند.
- برای مطالعه سمیت توان مواد شیمیایی (toxicity) دارای قابلیت بسیار زیادی می‌باشند.

با توجه به قابلیتهای فوق روش‌های سم شناسی اینویترو کاربردهای بسیار گسترده‌ای داشته و می‌توانند در غربالگری مواد (Screening) درجه بندی سمیت مواد شیمیایی (Toxicity ranking) و بطور کلی در ارزیابی ریسک (Risk assessment) مواد شیمیایی و فرآورده‌های مختلف بکار گرفته شوند. این روش‌ها قابلیت

کنندگان روشهای توکسیکوکینتیک با اتكا به دانش Distribution, Metabolism, and Excretion) ADME (Absorption, متابولیسم و دفع می‌تواند به بردن یابی نتایج اینویترو کمک نماید (۸، ۲۵). استفاده از روش‌های QSARs با توجه به ساختار مولکولی مواد شیمیایی نیز گاهی می‌تواند اطلاعات مفیدی را در ارزیابی پتانسیل سمیت مواد بدست دهد.

روشهای سم شناسی اینویترو در مقایسه با روش‌های قدیمی مطالعات حیوانی دارای قابلیتهای زیر می‌باشند (۸):

- در این روش‌ها در صورت بکارگیری سلولها و بافت‌های انسانی نیازی به بردن یابی از حیوان به انسان می‌تواند اطلاعات واقعی تری برای ارزیابی خطر مواد

MTT, MTS, XTT, Tetrazolium salt assays; ATP, Adenosine Triphosphate; LDH, Lactate Dehydrogenase; NADPH, Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.

شاخص بیولوژیک	روش شناسایی
مرفوولوژی سلول	شكل و اندازه سلول تماس سلولها تعداد هسته، اندازه، شکل و محتويات آن واکولاپسیون هسته و سیتوپلاسم
حيات سلول	برون داری رنگ تربیض آبی آبشام دی استیل فلورسین شمارش سلول راندمان کشت مجدد
متabolیسم سلول	یکارچگی میتوکندری (آزمایشات نمک تترازولیوم مانند MTT, MTS , XTT فعالیت لیزوژوم و دستگاه گلزاری (آبشام رنگ قرمز خنثی) کاهش فعال کننده ها (مانند میزان ATP)
نشست از غشاء سلول	از دست رفتن آنزیمهای (مانند LDH)، یونها یا فعال کننده ها (مانند $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{K}^+$ , NADPH) نشست مارکرهای نشان گذاری شده (مانند کروم <sup>51</sup> یا فلورسین)
تکثیر سلول	شمارش سلول میزان پروتئین کل (مانند متیلن آبی، کومازی آبی و کناسیک آبی) میزان DNA (مانند Hoechst 33342) تشکیل کلونی
چسبیدگی سلول	چسبیدگی به سطح کشت جدایی از سطح کشت چسبیدگی سلول با سلول
الاحاق رادیوایزوتوپها	الاحاق تیمیدین به DNA الاحاق بوریدین به DNA الاحاق آمینواسیدها به پروتئین ها

جدول ۲- شاخصهای بیولوژیکی متدائل اندازه گیری با استفاده از روش‌های اینویترو

روشهای نوین سمشناسی از جمله روش‌های اینویترو قادر استند اطلاعات وسیعی را در مدت زمان کوتاهتری فراهم نمایند. با وجودیکه روش‌های سمشناسی اینویترو نمیتوانند دقیقاً نمایانگر پیچیدگی موجود در یک ارگانیسم زنده باشند، این روشها به همراه دانش مربوط به ساختار مولکولی و سمیت مواد (QSARs) و توکسیکوکینتیک مواد شیمیایی (PBTK) قابلیت این را دارند که بطورگستردۀ ای در ارزیابی خطر تماس با مواد شیمیایی بکار گرفته شوند. همچنین بکارگیری روش‌های توکسیکوکینتیک می‌تواند یک پایه علمی برای بردن یافی غلظتها اینویترو با قابلیت ایجاد سمیت سلولی به دوزهای معادل در شرایط اینویتو را فراهم آورد.

### منابع

1. Klaassen, C.D., editor. Casarett and Doull's Toxicology: the Basic Science of Poisons, sixth edition. Mc Graw-Hill, New York. 2001.
2. Greenberg, M.I., Hamilton, R.J., Phillips, S.D., McCluskey, G.J., editors. Occupational, Industrial, and Environmental Toxicology, 2ed. Mosby, Inc, Philadelphia, Pennsylvania. 2003.
3. Winder, C., Stacey, N.H., editors. Occupational Toxicology, 2 ed. CRC Press, Boca Raton. 2004.
4. NTP. Toxicology Testing Strategies to Determine Needs and Priorities. National Toxicology Program, National Research Council, Washington. 1984.
5. Agrawal, M.R., Winder, C. The frequency and occurrence of LD50 values for materials in the workplace. Journal of Applied Toxicology, 1996.
6. EPA, Chemical Hazard Availability Study. US Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics, Washington DC. 1998.
7. Blaauwboer, B.J., The applicability of in vitro-derived data in hazard identification and characterisation of chemicals. Environmental Toxicology and Pharmacology 11: 213-225, 2002.
8. Bakand, S., Winder, C., Khalil, C. and Hayes, A., Toxicity assessment of industrial chemicals and airborne contaminants; transition from in vivo to in vitro test methods: A Review. Inhalation Toxicology, 17: 13, 775-787, 2005.
9. NTP, The National Toxicology Program Annual Plan Fiscal Year 2001. US Department of Health and Human Services, Public Health Service, NIH publication No. 02-5092, Washington. 2001.

کاربرد در زمینه تست مواد مختلف نظیر مواد صنعتی (Pharmaceuticals), دارویی (Industrial chemicals)، مصرفی (Consumer products)، آرایشی (Cosmetics)، آلاینده‌های محیط کار (Workplace contaminants)، مخلوط‌آلاینده‌ها (Chemical mixtures) و آلاینده‌های محیطی (Environmental contaminants) را دارد می‌باشد(۲۲،۸). علاوه بر این در سمشناسی محیط و حرفه‌ای می‌توان از بیو مارکرهای به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری، از طریق پایش بیولوژیکی مسیر میان تماس و ایجاد اثر استفاده نمود.

با وجودیکه تاکنون اطلاعات وسیعی از مطالعات حیوانی در مورد سمیت مواد شیمیایی حاصل شده است، اکثر این اطلاعات مربوط به تماس از راههای خوراکی یا پوستی بوده و اطلاعات مربوط به تماس از طریق استنشاقی بسیار اندک می‌باشد (۵). دلیل اصلی این محدودیت این است که بطورگلی مطالعات استنشاقی از نظر تکنیکی به مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌باشد. علی‌رغم این مشکلات، تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که روش‌های سمشناسی اینویترو می‌توانند نقش بسیار مهمی در ارزیابی سمیت مواد شیمیایی هوابرد و آلاینده‌های هوا داشته باشند (۳۵-۲۹). به منظور شناسایی قابلیت روش‌های اینویترو در این زمینه، روش‌های ارتقا یافته برای ارزیابی سمیت آلاینده‌های هوا مورد بررسی قرار گرفته است. (۸،۲۲)

### نتیجه گیری

تماس با تعداد فزاینده مواد و آلاینده‌های شیمیایی در محیط‌های کار و محیط‌های آزاد یکی از عوامل مهم در به خطر افتادن سلامتی افراد بوده و می‌تواند طیف وسیعی از مشکلات تنفسی، ناراحتیهای پوستی و بیماریهای سیستمیک را ایجاد نماید. در حالیکه ارزیابی سمیت مواد شیمیایی مستلزم داشتن اطلاعات سمشناسی می‌باشد، در بسیاری از موارد، خصوصاً در مورد مواد شیمیایی صنعتی، دسترسی به این اطلاعات بسیار محدود می‌باشد (۶،۴). علاوه بر این، امروزه گذشته از دلایل اخلاقی و اقتصادی استفاده بیش از حد از اطلاعات حیوانی در سمشناسی مورد انتقاد مجامع علمی قرار گرفته است. ضرورت تعیین پتانسیل اثرات سمی تعداد بیشمار مواد شیمیایی نیاز به ارتقای روش‌های نوین سمشناسی را پیش از پیش مشخص می‌نماید.



23. Zucco, F., De Angelis, I., Testai, E., Stammati, A., Toxicology investigations with cell culture systems: 20 years after. *Toxicology In Vitro* 18: 153-163. 2004.
24. Wilson, A.P., Cytotoxicity and viability assays. In: *Animal Cell Culture*, third edition. Masters, J.R.W., editor. Oxford University Press, NY, pp 175-219. 2000.
25. Frazier, J.M. *In Vitro Toxicity Testing Applications to Safety Evaluation*. Marcel Dekker, Inc, New York. 1992.
26. Ames, B.N., Durston, W.E., Yamasaki, E., Lee, F.D. Carcinogens are mutagens. Simple test system combining liver homogenates for activation and bacteria for detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 70: 2281-2285. 1973.
27. Ames, B.N., McCann, J., Yamasaki, E. Methods for detecting carcinogens and mutagens with the *Salmonella/mammalian-microsome mutagenicity test*. *Mutation Research* 31: 347-363. 1975.
28. O'Hare, S., Atterwill, C.K. 1995. *Methods in Molecular Biology: In vitro Toxicity Testing Protocols*. Humana Press, New Jersey.
29. Bakand, S., Hayes, A.J., Winder, C., Khalil, C. Markovic, B. In vitro cytotoxicity testing of airborne formaldehyde collected in serum free culture media. *Toxi Indus Health*, 21: 7-8, 147-154. 2005.
30. Bakand, S. Winder, C., Khalil, C. and Hayes, A. A novel in vitro exposure technique for toxicity assessment of volatile organic compounds. *Journal of Environmental Monitoring*, 8: 1, 100-105. 2006.
31. Bakand, S., Winder, C. Khalil, C. and Hayes, A. An experimental in vitro model for dynamic direct exposure of human cells to airborne contaminants. *Toxicology Letters*, 165: 1, 1-10. 2006.
32. Bakand, S., Hayes, A. and Winder, C. Comparative in vitro cytotoxicity assessment in human alveolar epithelial cells. *Toxicology In Vitro*, 21: 7, 1341-1347, 2007.
33. Bakand, S., Hayes, A. and Winder, C. An integrated in vitro approach for toxicity testing of airborne contaminants. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A*, 70:1604-1612, 2007.
34. Bakand, S., Hayes, A. and Winder, C. A new approach for testing airborne pollutants. *Environmental Health Perspectives*. 115: 3, A149-151. 2007.
35. Aufderheide, M., Knebel, J.W., Ritter, D. Novel approaches for studying pulmonary toxicity in vitro. *Toxicology Letters* 140-141: 205-211, 2003
22. Hayes, A., Bakand, S. and Winder, C.. Novel in vitro exposure techniques for toxicity testing and biomonitoring of airborne contaminants. In: *Drug Testing In Vitro-Breakthroughs and Trends in Cell Culture Technology*, Marx, U. and Sandig, V. (Eds). Wiley-VCH, Berlin, Part 1: Emerging in vitro culture technologies, Chapter 4, 103-124. 2007.
10. Greenberg, M. I. and Phillips, S. D., A brief history of Occupational, Industrial and Environmental Toxicology. In: *Occupational, Industrial and Environmental Toxicology*. 2ed. Greenberg, M. I., Hamilton, R. J. and Phillips, S. D. (Eds).. Philadelphia, Pennsylvania, Mosby, Inc. 2003. pp. 2-5
11. Barile, F.A. *Introduction to in vitro Cytotoxicity, Mechanisms and Methods*. CRC Press, Boca Raton. 1994.
12. Faustman, E.M., Omenn, G.S. Risk Assessment. In: Casarett and Doull's Toxicology: the Basic Science of Poisons, sixth edition. Klaassen, C.D., editor. McGraw-Hill, New York, pp 83-104.
13. Trevan, J.W. Error of determination of toxicity. *Proceedings of the Royal Society of London, Series B* 101: 483-514. 1927.
14. OECD. *Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing*. Organisation for Economic and Cooperative Development, Paris. 2001.
15. UN, Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS). New York, United Nations. 2003.
16. Eisenbrand, G., Pool-Zobel, B. P., Baker, V., Balls, M., Blaauwboer, B. J., Boobis, A., Carere, A., Kekekordes, S., Lhuquenot, J. C., Pieters, R. and Kleiner, J., 2002. Methods of in vitro toxicology. *Food Chem. Toxicol.*, 40:2-3, 193-236. 2003.
17. Silbergeld, E. K. Toxicology. In: *Encyclopaedia of occupational health and safety*. Fourth edition. Stellman, J. M. (Ed). Geneva, International labour office. 1998. pp. 33.1-33.74.
18. Gad, S. C. *In Vitro Toxicology*. New York, Taylor and Francis. 2000.
19. Russell, V. M. S. and Burch, R. L. *The Principles of Humane Experimental Techniques*. Methuen & Co. Ltd, London. 1959.
20. Marchant, G. E., Genetics and the future of environmental policy. In: *Environmentalism and the Technologies of Tomorrow, Shaping the Next Industrial Revolution*. Olson, R. and Rejeski, D. (Eds). Island Press, Washington, pp. 61-70. 2005.
21. Ekwall, B. Screening of toxic compounds in mammalian cell cultures. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 407:1, 64-77. 1983.