



اثر بربرین هیدروکلرايد بر اختلالات عملکرد حرکتی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مهناز مصری پورعلویجه^{*}، حمید کلالیان مقدم^۱، غلامحسن واعظی^۲

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- دانشجوی دکترای فیزیولوژی. ۲- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- استادیار. ۳- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- استادیار.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۴/۱۱

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات حرکتی گردیده و بربرین هیدروکلرايد، آلکالوئیدی با آثار متعدد خد دیابتی و آنتی‌اکسیدان می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بربرین هیدروکلرايد بر اختلالات حرکتی ناشی از دیابت در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین طراحی شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ۴۰ سرموش صحرایی نر نژاد ویستار انتخاب و بهطور تصادفی به پنج گروه مساوی: شاهد، شاهد تیمارشده با بربرین هیدروکلرايد (۱۰۰ mg/kg)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین هیدروکلرايد (۱۰۰ mg/kg و ۵۰ mg/kg) تقسیم شدند. دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین با دوز ۵۵ میلی‌گرم/کیلوگرم بهصورت درون صفاقی القاء گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین هیدروکلرايد با دوز ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم/روز بهمدت شش هفته بهصورت خوراکی انجام شد. اندماج گیری قندخون نیز در هفته‌های ۱، ۳، ۵ و ۷ از طریق سیاهگ دمی به عمل آمد و در پایان هفته ششم و هفتم، گروه‌ها با آزمون‌های رفتاری، سطح شیبدار، بارفیکس و ماز لامورد ارزیابی فرارگرفتند.

نتایج: گروه دیابتی تیمارشده با بربرین هیدروکلرايد (۱۰۰ mg/kg و ۵۰ mg/kg) بهبود قابل توجهی را در مقایسه با گروه دیابتی در آزمون‌های سطح شیبدار، بارفیکس و ماز لامورد ارزیابی فرارگرفتند.

نتیجه‌گیری: تجویز بربرین هیدروکلرايد بهمدت شش هفته منجر به بهبود اختلالات حرکتی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می‌شود.

واژه‌های کلیدی: دیابت ملیتوس، بربرین هیدروکلرايد، عملکرد حرکتی، ماز، سطح شیبدار، بارفیکس.

Original Article

Knowledge & Health 2014;8(4):181-186

The Effect of Berberine Hydrochloride on Motor Function Impairment in Streptozotocin- Induced Diabetic Rats

Mahnaz Mesripour Alavijeh^{1*}, Hamid Kalalian Moghaddam², Gholamhasan Vaezi³

1- Ph.D. Student, Basic Science Faculty, Islamic Azad University, Damghan, Iran. 2- Department of Physiology, Faculty of Medicine, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran. 3- Assistant Professor, Basic Science Faculty, Islamic Azad University, Damghan, Iran..

Abstract:

Introduction: Diabetes induce motor function impairment. Berberine is an isoquinoline alkaloid that has multiple pharmacological effects including anti-diabetic and antioxidant activity.

Methods: 40 male wistar rats were randomly selected and allocated to 5 equal groups: Control, Control berberine-treated (100 mg/kg), diabetic, and berberine- treated diabetic (50, 100 mg/kg). Diabetes was induced by STZ administration at the dose of 55 mg/kg through i.p. route. Berberine hydrochloride was administered p.o. at doses of 50 and 100 mg/kg/day 1 week after STZ injection for a period of 6 weeks. Blood samples were taken from the tail vein in 1, 3, 5, and 7 weeks after STZ injection to measure blood glucose levels. Behavioral tests including y maze task, inclend plane and barfix were performed at the end of 6th and 7th weeks.

Results: diabetic Berberine-treated groups (50, 100 mg/kg/day) has significant improvement rather than diabetic group in inclend plane test and y maze task.

Conclusion: Berberine hydrochloride administration for 6 weeks improves motor function impairment in streptozotocin- induced diabetic rats.

Keywords: Diabetes mellitus, Berberine hydrochloride, Motor function, Y maze, Inclend plane, Barfix.

Conflict of Interest: No

Received: 19 January 2013

Accepted: 2 July 2013

*Corresponding author: M. Mesripour Alavijeh, Email: shahrood_alavi@yahoo.com

مقدمه

بیماری دیابت، مجموعه‌ای از اختلالات پیچیده در متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌ها می‌باشد که بر اثر کمبود یا کاهش نسبی انسولین و یا کاهش حساسیت بافت‌ها نسبت به انسولین ایجاد می‌شود (۱). دیابت عوارض متابولیکی حادی نظیر کتواسیدوز، اغمای هیپراسمولار و یا عوارض مزمن نامطلوب نظیر: نوروپاتی (۲)، نفروپاتی (۳)، رتینوپاتی (۴)، ضایعات بوستی و نیز اختلالات متعددی در سیستم قلب و گردش خون ایجاد می‌نماید (۵).

تحقیقات قبلی نشان داده که افزایش قند خون از چند مسیر جداگانه استرس اکسیدانتیو را القای نماید، از جمله می‌توان به عدم تعادل اکسیداسیون و احیاء، افزایش فعالیت آلدوزردوکتاز (۶)، افزایش محصولات نهایی گلیکوزیلاسیون (۳)، تغییر در فعالیت پروتئین کیناز C، اختلال در تعادل پروستاتنوزیدها (۷ و ۸) و افزایش تولید سوپراکسیدهای میتوکندریالی را نام برد (۹). عوامل ایجادکننده استرس اکسیدانتیو باعث عدم توازن محصولات رادیکالی آزاد و مکانیسم‌های دفاعی آنتی‌اکسیدان گردیده و آسیب‌های بافتی بالقوه‌ای را در بافت‌های مختلف ایجاد می‌نمایند (۱۰).

نوروپاتی یکی از مهمترین مشکلات بالینی و یکی از علل مرگ‌ومیر بیماران دیابتی است. براساس یافته‌های تحقیقاتی جدید، ظهور دیابت با تغییرات ساختمانی و عملکردی در فیبرهای عصبی همراه بوده (۱۱) و از دست دادن قدرت عضلانی در بیماران دیابتی به‌دلیل از دست دادن آکسون‌ها و نقص شبکه عصبی ناشی از دیابت است (۱۲). تاکنون تحقیقات زیادی در ارتباط با دیابت و نوروپاتی محیطی به انجام رسیده، اما در مورد آثار دیابت بر سیستم اعصاب مرکزی، به‌ویژه تغییرات رفتاری ناشی از آن، شامل اختلالات حرکتی اطلاعات محدودی در دسترس می‌باشد (۱۲ و ۱۳). عدم کنترل قندخون و هیپوانسولینی در دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین سبب تضعیف قابل ملاحظه‌ای در پاسخ حرکتی اندام حرکتی جلویی در منطقه حرکتی کورتکس مغزی موش صحرایی دیابتی می‌شود (۱۴). در بیمارانی با دیابت کنترل نشده، فیبرهای عضلانی نمی‌توانند قندخون را دریافت کنند و این گرسنگی منجره استفاده از منابع سوخت‌وسازی دیگر به‌ویژه پروتئین‌های درون‌زاد شده که سبب آتروفی عضلانی می‌شود (۱۵).

بربرین هیدروکلراید آلکالوئیدی گیاهی با تاریخ درمانی بسیار طولانی است که در طب سنتی چین و هند و ایران کاربرد داشته است. این آلکالوئید در ریشه، ریزوم، ساقه و پوست بسیاری از گیاهان خانواده Berberis vulgaris و Coptis chinesis وجود دارد (۱۶). این ترکیب دارای آثار ضدمیکروبی و ضدپرتوزوایی و ضداسهالی و ضدسرطانی و کاهنده چربی و فشارخون و ضدالتهابی و ضددیابتی

است. بربرین آثار متعددی را بر متابولیسم کربوهیدرات و چربی‌ها اعمال می‌نماید، از جمله بیان mRNA گیرنده انسولین را از طریق پروتئین کیناز C به عنوان یک پرموتور در کشت‌های سلولی کبد انسان و ماهیچه اسکلتی افزایش می‌دهد (۱۷). همچنین از تخریب سلول‌های پانکراس به‌ویژه سلول‌های β در مقابل استرس اکسیدانتیو در موش‌های صحرایی دیابتی جلوگیری نموده (۱۸)، اثری مهاری بر لیپوکسیژنان (۱۹) و گزاتین اکسیداز (۲۰) اعمال می‌نماید. این آنزیم‌ها، دو منبع مهم تولید گونه‌های اکسیژن فعال (Reactive oxygen species) بوده و این توانایی، بیانگر خاصیت آنتی‌اکسیدانی بربرین هیدروکلراید می‌باشد. با توجه به شواهد متعدد که نشان دهنده نقش مؤثر بربرین هیدروکلراید در کاهش عوارض هیپرگلیسمی و تنظیم اختلالات اکسیدانتیو می‌باشد، به‌نظر می‌رسد، بربرین هیدروکلراید در دوز فارماکولوژیک به‌طور دارآمدت می‌تواند اختلالات حرکتی ناشی از القای دیابت را بهبود بخشد که این فرضیه در این مطالعه مورد آزمون قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

جهت انجام این مطالعه تجربی از ۴۰ سر موش صحرایی نر، نژاد ویستار با وزن متوسط ۲۴۰ ± ۴۰ گرم خریداری شده از مؤسسه پاستور کرج استفاده شد. نمونه‌ها به‌منظور انطباق با محیط، از یک هفته قبل از شروع آزمایش، در محیط آزمایشگاه با دمای ۲۲ ± ۲ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و به‌طور آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند. قابل ذکر است که نکات اخلاقی در تمام مدت کار رعایت گردید. موش‌های صحرایی آزمایشگاهی در تمام مدت کار رعایت گردید. موش‌های صحرایی به‌طور تصادفی به پنج گروه ۸ تایی تقسیم شدند: گروه شاهد، شاهد تیمار شده با بربرین هیدروکلراید (۱۰۰ mg/kg)، دیابتی، دیابتی تیمار شده با بربرین هیدروکلراید (با دوز ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم). داروهای به کار رفته در این آزمایش نیز شامل: بربرین هیدروکلراید و استرپتوزوتوسین بودند، که همگی از شرکت سیگما خریداری شدند.

القای دیابت با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (ip) mg/kg. حل شده در بافر سیترات (۰/۰۵M با pH=۴/۵) انجام شد. سنجش قند خون، یک هفته بعد از تزریق (STZ) و با استفاده از خون سیاهرگ دمی، به کمک دستگاه کلوجکارد ۰۱ USA انجام و موش‌های صحرایی دارای قندخون بالاتر (۳۰۰ میلی‌گرم/دسی‌لیتر دیابتی در نظر گرفته شدند. گروه‌های درمانی به مدت ۶ هفته، داروی بربرین هیدروکلراید را با دوز ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم/کیلوگرم به صورت گاواز دریافت و گروه شاهد تیمار شده، بربرین هیدروکلراید را به صورت گاواز با دوز ۱۰۰mg/kg دریافت نمودند. وزن و قند گروه‌ها هر دو هفته یک بار اندازه‌گیری شد. از آنجاکه آثار اختلالات حرکتی ناشی از دیابت بعد از گذشت شش هفته از دیابتی شدن مشهود می‌شود، لذا آزمون مازه، در

معناداری کاهش می‌یابد ($P < 0.001$) همچنین از هفته پنجم به بعد وزن بدن گروه‌های دیابتی تیمار شده با بربرین هیدروکلراید (۱۰۰ و ۵۰ mg/kg) به طور وابسته به دوز، نسبت به گروه دیابتی افزایش معناداری را نشان داد. از هفته پنجم به بعد، گروه شاهد تیمار با دارو (دوز ۱۰۰ mg/kg) نیز کاهش معناداری ($P < 0.001$) را نسبت به گروه شاهد نشان داد (جدول ۱).

از زیبایی میزان قند خون گروه‌ها نیز هر دو هفته یک بار نشان داد که قند خون هفته اول حیوانات دیابتی تیمار شده با بربرین (۱۰۰ و ۵۰ mg/kg) تفاوت معناداری با قند خون حیوانات دیابتی نداشته اما بعد از هفته پنجم به بعد قند خون حیوانات دیابتی تیمار شده با بربرین به طور وابسته به دوز (۱۰۰ و ۵۰ mg/kg) نسبت به گروه دیابتی کاهش معناداری را نشان می‌دهند (جدول ۱).

مقایسه میانگین تعداد حرکت موش‌های صحرایی در تمامی بازویی ماز y در نمودار ۱ نشان داده شده است. در هفته هفتم، گروه دیابتی تیمار شده با دوز ۵۰ و ۱۰۰ mg/kg افزایش معناداری را نسبت به گروه دیابتی در تعداد حرکات نشان داده‌اند.

مقایسه تعداد ایستاندن موش‌های صحرایی در تمامی بازویی ماز y در هفته ششم و هفتم در نمودار ۲ نشان داده شده است. در هفته هفتم گروه‌های دیابتی تیمار شده با دوز ۱۰۰ و ۵۰ میلی‌گرم/کیلوگرم دارو، افزایش معناداری را نسبت به گروه دیابتی نشان داده‌اند ($P < 0.05$).

مقایسه میزان فعالیت حرکتی بازویها و دستان در هفته هفتم مشخص نمود که گروه‌های دیابتی تیمار شده با دوز ۵۰ و دوز ۱۰۰ mg/kg افزایش معناداری را نسبت به گروه دیابتی در مدت زمان مقاومت در برابر افتادن در بارفیکس نشان می‌دهند (نمودار ۳).

مقایسه میزان عملکرد حرکتی در آزمون سطح شیبدار در هفته هفتم نیز مشخص نمود که گروه‌های دیابتی تیمار شده با دوز ۱۰۰ mg/kg و دوز ۵۰ mg/kg افزایش معناداری را نسبت به گروه دیابتی در میانگین زاویه مقاومت در برابر افتادن در سطح شیبدار نشان دادند (نمودار ۴).

پایان هفته ششم پس از تزریق استرپتوزوتوسین، انجام گردید. طول و عرض و ارتفاع هر بازوی ماز y، به ترتیب ۵۰ در ۱۵ سانتی‌متر بود. ابتدا اجازه داده می‌شد تا حیوان برای مدت ۵ دقیقه در بین سه بازو رفت و آمد کند. در تمام این مدت حرکت جانور، فیلمبرداری می‌شد. پس از فیلمبرداری تعداد دفعات حرکت و تعداد دفعات ایستاندن روی دو پای عقب در تمامی بازوها، محاسبه می‌شد (۲۱).

جهت ارزیابی میزان فعالیت حرکتی از سطح شیبدار (Inclined plane) استفاده گردید. در این آزمون، ابتدا سطح شیبدار را موازی با سطح زمین قرار داده (صغر درجه)، پس از قرار دادن حیوان بر روی سطح شیبدار هر ۵ ثانیه یک بار زاویه شیب را درجه افزایش داده و آخرين درجه‌ای که موش صحرایی می‌توانست خود را در برابر افتادن نگه دارد، به عنوان بیشینه فعالیت حرکتی درج گردیده، سپس جهت محاسبه نیروی مقاومتی که حیوان در برابر افتادن اعمال می‌کند، از رابطه $F = mg \sin \alpha$ استفاده گردید.

جهت آزمون سنجش میزان فعالیت حرکتی بازوها و دستان، مدت زمان گرفتن میله بارفیکس (Barfix) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، میله‌ای به قطر ۵/۰ سانتی‌متر را در مکعبی به ابعاد ۲۰ در ۴۰ سانتی‌متر در ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر سطح زمین قرار داده شد. مدت زمانی که موش در میله بارفیکس در برابر افتادن مقاومت می‌کرد توسط دوربین فیلمبرداری و سپس یادداشت گردید شایان ذکر است، مدت زمانی که حیوان با دو دست و بدون استفاده از پا و یا دم، خود را آویزان نگه می‌داشت، به عنوان میزان فعالیت حرکتی بازوها و دستان، در نظر گرفته شد.

مقایسه میانگین نمرات گروه‌ها با کمک برنامه Prism و آزمون آنالیز واریانس انجام شد. گروه‌های درمانی با بربرین یک بار نسبت به گروه شاهد و بار دیگر نسبت به گروه دیابتی مورد مقایسه قرار گرفتند. در تمام آزمون‌ها $P < 0.05$ به عنوان سطح معنادار در نظر گرفته شد.


نتایج

اندازه‌گیری وزن گروه‌ها هر دو هفته یکبار مشخص نمود که از هفته سوم به بعد وزن نمونه‌ها در گروه دیابتی نسبت به شاهد به طور


جدول ۱- مقایسه (میانگین \pm انحراف معیار) وزن و قند بین گروه‌های مختلف در طول دوره مطالعه

گروه	گلوکز خون (میلی‌گرم بردی‌لیتر)	وزن بدن (گرم)	وزن بدن هفته هفتم	وزن بدن هفته پنجم	وزن بدن هفته سوم	وزن بدن هفته اول	وزن بدن هفته هفتم	وزن بدن هفته پنجم	وزن بدن هفته سوم	وزن بدن هفته اول
شاهد			۳۳۴/۴ \pm ۳۲/۷ [°]	۳۱۰/۹ \pm ۳۵/۰ [°]	۲۶۲/۲ \pm ۲۲/۹ [°]	۲۴۲/۳ \pm ۲۲/۶ [°]	۹۷/۵ \pm ۷/۴ [°]	۹۸/۶ \pm ۹/۲ [°]	۹۷ \pm ۷/۶ [°]	۱۰۲/۴ \pm ۱۱/۷ [°]
شاهد+دارو (۱۰۰ mg/kg)			۲۶۵/۴ \pm ۲۲/۲ [°]	۲۵۴/۳ \pm ۲۳/۵ [°]	۲۴۵/۰ \pm ۱۹/۵ [°]	۲۳۳/۰ \pm ۱۶/۰ [°]	۷۳/۵ \pm ۴/۰ [°]	۷۷/۰ \pm ۶/۴ [°]	۸۳ \pm ۶/۶ [°]	۸۴/۷ \pm ۶/۰ [°]
دیابتی			۱۵۲/۰ \pm ۱۹/۲ [°]	۱۷۷/۸ \pm ۲۹/۷ [°]	۲۰/۱ \pm ۴/۲ \pm ۲۷/۰ [°]	۲۳۲/۰ \pm ۱۷/۷ [°]	۵۶۷/۳ \pm ۶۳/۸ [°]	۵۴۶/۸ \pm ۵۳/۷ [°]	۵۱۱/۴ \pm ۶۵/۶ [°]	۴۷۴/۳ \pm ۷۵/۸ [°]
دیابتی+دارو (۵۰ mg/kg)			۱۹۷/۶ \pm ۲۱/۷ [°]	۲۱۱/۳ \pm ۲۰/۷ [°]	۲۲۵/۴ \pm ۱۷/۳ [°]	۲۴۶/۴ \pm ۱۶/۷ [°]	۴۳۰/۸ \pm ۹۵/۴ [°]	۴۳۹/۸ \pm ۹۶/۷ [°]	۴۶۶/۱ \pm ۹۸/۵ [°]	۴۷۵/۹ \pm ۱۱۱/۹ [°]
دیابتی+دارو (۱۰۰ mg/kg)			۲۱۷/۱ \pm ۲۷/۱ [°]	۲۲۲/۸ \pm ۲۶/۴ [°]	۲۳۳/۸ \pm ۲۴/۶ [°]	۲۵۰/۰ \pm ۲۲/۸ [°]	۳۹۵/۰ \pm ۸۰/۵ [°]	۴۰۱/۹ \pm ۸۶/۷ [°]	۴۲۸/۹ \pm ۱۰/۶ ^۵ [°]	۴۷۰/۴ \pm ۱۲۱/۲ [°]


*شاندهنده اختلاف معنادار میانگین وزن و قند با گروه شاهد، ^۰شاندهنده اختلاف معنادار میانگین وزن و قند با گروه دیابتی




نحوه ۴ - مقایسه زاویه مقاومت در برابر افتادن در سطح شیب‌دار در هفته هفتم در گروه‌های تحت مطالعه




نحوه ۵ - مقایسه نیروی مقاومت در برابر افتادن در سطح شیب‌دار در هفته هفتم در گروه‌های تحت مطالعه



نحوه ۱ - مقایسه تعداد حرکت در همه بازوهای ماز y در هفته ششم و هفتم در گروه‌های تحت مطالعه



نحوه ۲ - مقایسه تعداد ایستادن در همه بازوهای ماز y در هفته ششم و هفتم در گروه‌های مختلف تحت مطالعه



نحوه ۳ - مقایسه مدت زمان مقاومت در برابر افتادن در سطح شیب‌دار در هفته هفتم در گروه‌های تحت مطالعه

مقایسه نیروی مقاومت در برابر افتادن در سطح شیب‌دار در هفته هفتم نیز مشخص نمود که گروه‌های دیابتی تیمار شده با دوز ۱۰۰ و ۵۰ میلی گرم / کیلوگرم افزایش معناداری را نسبت به گروه دیابتی (نحوه ۵) نشان دادند ($P<0.001$).

بحث
در این مطالعه نشان داده شد که تجویز خوراکی بربرین هیدروکلراید در موش‌های صحرابی دیابتی، به مدت شش هفته علاوه بر کاهش قندخون، به طور معناداری سبب افزایش عملکرد حرکتی حیوان گردید. در واقع افزایش تعداد حرکات و نیز ایستادن در تمامی بازوها، افزایش زاویه مقاومت در برابر افتادن از سطح شیب‌دار، نشان‌دهنده تأثیر بربرین هیدروکلراید در پیشگیری از ایجاد اختلالات عملکرد حرکتی، توانایی و افزایش قدرت عضلانی در گروه‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می‌باشد.

آندرسون و همکاران نشان دادند متعاقب تحلیل آکسونی و اختلال عملکرد نورون‌ها در بیماران دیابتی، عملکرد حرکتی کاهش می‌یابد (۱۲). همچنین نظر به توانایی آنتی‌اکسیدان و خواص ضدالتهابی بربرین هیدروکلراید، به نظر می‌رسد که این دارو با مهار سیکوواکسیزناز ۲ و کاهش پروستاگلاندین E2، قادر است نقش ترمیمی در سیستم عصبی ایفا نموده (۲۱ و ۲۲) و در بهبود اختلالات حرکتی ناشی از دیابت مؤثر واقع شود. همچنین برخی از محققین نشان داده‌اند که بربرین هیدروکلراید منجر به افزایش ایترولوکین β و نیتریک اسید

اکسیداتیو و کاهش سیستم‌های دفاع آنتی‌اکسیدان در بیماران دیابتی و تأثیر بربرین با توجه به نقش آنتی‌اکسیدانی آن تأکید می‌نماید (۳۹). همچنین محققین نشان داده‌اند که بربرین هیدروکلراید قادر است، از تخریب سلول‌های پانکراس بهویژه سلول‌های β در مقابل استرس اکسیداتیو در رتهای دیابتی نیز جلوگیری نماید (۱۸) و با این مکانیسم موجب افزایش ترشح انسولین در حیوانات دیابتی شود. شایان ذکر است بربرین هیدروکلراید اثری مهاری بر لیپو-اکسیژناز (۱۹) و گزانتین اکسیداز (۲۰) اعمال می‌نماید. این آنزیم‌ها، منابع مهم ایجادکننده ROS بوده و این توانایی بیانگر خاصیت آنتی‌اکسیدان بربرین هیدروکلراید می‌باشد که بخشی از آثار محافظت نورونی این دارو در بهبود اختلالات حرکتی، را به این مکانیسم نسبت می‌دهند.

باتوجه به خواص ذکر شده در پژوهش‌های قبل و نتایج بدست آمده در این مطالعه، بهنظر می‌رسد که این دارو به سبب خصوصیات فارماکولوژیک خود با نقش کاهش دهنده استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت سیتم آنتی‌اکسیدان که در پژوهش‌های قبلی نشان داده شده است از یک سو و کاهش قند خون حیوانات دیابتی از سوی دیگر قادر است نقش مؤثری در بهبود نوروپاتی‌های ناشی از دیابت ایفا نماید که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. همچنین باتوجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی نسبت به داروها با منشاء گیاهی و انجام کارآزمایی‌های بالینی و تأیید آثار احتمالی آن در نمونه‌های انسانی امید می‌رود که بتوان از این دارو به عنوان یک داروی مکمل در بهبود اختلالات حرکتی بیماران دیابتی استفاده کرد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله بر خود وظیفه می‌دانند که از خدمات سرکار خانم نوروزی مسئول محترم آزمایشگاه دانشکده بهداشت شاهروд، سرکار خانم داوردوست و سرکار خانم فضلی کارشناسان محترم آزمایشگاه دانشکده بهداشت شاهروド تشکر و قدردانی نمایند.

References

1. Guyton AC, Hall JE, Medical physiology, Elsevier Sandes. 11th ed. 2006.p.1001-1008.
2. Pop-Busui R, Sima A, Stevens M. Diabetic neuropathy and oxidative stress. *Diabetes Metab Res Rev* 2006;22:257-273.
3. Jakus V, Rietbrock N. Advanced glycation end-products and the progress of diabetic vascular complications. *Physiol Res* 2004; 53:131-42.
4. Jawa A, Kcomt J, Fonseca VA. Diabetic neuropathy and retinopathy. *Med Clin Nort America* 2004;88(4):1001-36.
5. Wandell PE. Quality of life of patients with diabetes mellitus. An overview of research in primary health care in the Nordic countries. *Scand J Prim Health Care* 2005;23(2):68-74.
6. Yagihashi S, Yamagishi SI, Wada Ri R, Baba M, Hohman TC, Yabe-Nishimura C, Kokai Y. Neuropathy in diabetic mice over expressing human aldose reductase and effects of aldose reductase inhibitor. *Brain* 2001;124:2448-2458.

ستنتاز القایی (Inducible nitric oxide synthase) گردیده، قادر است فعالیت فاگوسیتوزی ماکروفائز را افزایش دهد. بهنظر می‌رسد اینترولوکین β موجب القاء میکروگلیاهای ماکروفائزی و آستروسویت‌ها شده، تولید و ترشح فاکتور رشد شبه انسولینی ماکروفائزها را تحریک نموده منجر به بازسازی میلین و ترمیم بافت مغز می‌شود. همچنین فقدان نیتریک اکساید سنتنتاز القایی منتج به تخریب نورونی و فعالیت کاسپاز ۳ می‌شود. لذا بهنظر می‌رسد، بربرین قادر است پاتوژن‌زدیابت را از طریق افزایش بیان نیتریک اکساید سنتنتاز القایی نیز بهبود بخشد (۲۳).

بربرین هیدروکلراید اثر مهاری بر آنزیم استیل کولین استراز و منو-آمینو-اکسیداز داشته (۲۴-۲۶)، سطح نوراپی‌نفرین، سروتونین، دوپامین مغز را بهویژه در هیپوکمپ و قشر فرونتال افزایش می‌دهد (۲۷ و ۲۸). دیر و همکارانش نیز نشان دادند که بربرین هیدروکلراید، نقش معکوس و آنتاگونیستی برگیرنده آلفا ۲ آدرنرژیک در غشاء سلول پس‌سیناپسی ایفا نموده، سبب افزایش نوروتربنیمترازی آدرنرژیکی می‌شود (۲۹). لذا نقش بربرین هیدروکلراید در پیشگیری از آثار مخرب ناشی از دیابت را می‌توان تاحدودی به تعديل عملکرد نوروتربنیمتراها نسبت داد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که در گروه شاهد تیمارشده، مصرف طولانی مدت دارو اثر تعديل کننده‌ای بر وزن گذاشته و مانع از افزایش وزن شدید و چاقی نمونه‌ها می‌گردد.

درمجموع پژوهش‌های قبلی درباره اختلال در عملکرد حرکتی بیماران دیابتی نشان داده که ارتباط معناداری، بین هیپرگلیسمی و این اختلالات وجود دارد (۱۲، ۳۰ و ۳۱) که با پژوهش ما در این زمینه تطابق دارد. امریک و همکاران نیز نشان دادند که عدم کنترل قندخون و هیپو-انسولینی در مدل دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین سبب کاهش توانایی حرکتی اندام حرکتی جلویی در منطقه حرکتی کورتکس مغزی موش صحرایی دیابتی می‌شود (۱۴).

شایان ذکر است که در بیماران با دیابت کنترل نشده، فیرهای عضلانی نمی‌توانند قندخون را دریافت کنند و این گرسنگی منجر به استفاده از منابع سوخت‌وسازی دیگر بهویژه پروتئین‌های درون‌زاد گردیده، آتروفی عضلانی ایجاد می‌نماید (۱۵). همچنین در مدل‌های سلولی شامل: سلول‌های ماهیچه‌ای رده (L6) و (C2C12) و سلول‌های آدیپوسیت رده (3T3-L1) (۳۶-۳۲) نشان داده شد که بربرین قادر است در حضور انسولین، مصرف و جذب گلوكز را افزایش دهد و درواقع محرك قوي برای مصرف گلوكز می‌باشد. گروه‌های متعددی نیز در حال بررسی اثر بربرین بر انتقال دهنده‌های گلوكز هستند. دو گروه گزارش داده‌اند بربرین قادر به تحریک بیان گیرنده‌های گلوكزی GLUT4 می‌باشد (۳۷ و ۳۸) لذا شاید بتوان بخشی از آثار بربرین هیدروکلراید در پیشگیری از اختلالات مرتبط با عملکرد حرکتی در دیابت را به نقش این دارو در کاهش قند در نمونه‌های دیابتی نسبت داد. علاوه بر این آزمایش‌های متعددی بر نقش مخرب استرس

7. Pop-Busui R, Marinescu V, Van Huyzen C, Li F, Sullivan K, Greene DA, Larkin D, Stevens MJ. Dissection of metabolic, vascular and nerve conduction interrelationships in experimental diabetic neuropathy by cyclooxygenase inhibition and acetyl-L-carnitine administration. *Diabetes* 2002;51:2619-2628.
8. Kellogg A, Pop-Busui R. Peripheral nerve dysfunction in experimental diabetes is mediated by cyclooxygenase-2 and oxidative stress. *Antioxid Redox Signal* 2005;17:1521-1529.
9. Nishikawa T, Edelstein D, Du XL, Yamagishi S, Matsumura T, Kaneda Y, et al. Normalizing mitochondrial superoxide production blocks three pathways of hyperglycaemic damage. *Nature* 2000; 404:787-790.
10. Liu Q, Chen L, Hu L, Guo Y, Shen X. Small molecules from natural sources, targeting signaling pathways in diabetes. *Biochimica et Biophysica Acta* 2010;1799:854-865.
11. Galer BS, Gianas A, Jensen MP. Painful diabetic polyneuropathy: epidemiology, pain description, and quality of life. *Diabetes Res Clin Pract* 2000;47:123-128.
12. Andersen H, Stalberg E, Gjerstad MD, Jakobsen J. Association of muscle strength and electrophysiological measures of reinnervation in diabetic neuropathy. *Muscle Nerve* 1998;21:1647-1654.
13. Biessels GJ, Smale S, Duis SE, Kamal A, Gispen WH. The effect of gamma-linolenic acid-alpha-lipoic acid on functional deficits in the peripheral and central nervous system of streptozotocin-diabetic rats. *J Neurol Sci* 2001;182:99-106.
14. Emerick AJ, Richards MP, Kartje GL, Neafsey EJ, Stubbs Jr. EB. Experimental diabetes attenuates cerebral cortical-evoked forelimb motor responses. *Diabetes* 2005;54:2764-2771.
15. Goodman MH. The pancreas and regulation of metabolism. In Mountcastle VB (ed): *Medical Physiology*, ed 14. St. Louis, MO, The CV Mosby Co, 1980; pp 1638-1673
16. Vuddanda PR, Chakraborty S, Singh S. Berberine: a potential phytochemical with multispectrum therapeutic activities. *Drugs* 2010;10:1297-1307.
17. Kong WJ, Zhang H, Song DQ, Xue R, Zhao W, Wei J, et al. Berberine reduce insulin resistance through protein kinase C-dependent up regulation of insulin receptor expression. *Metabolism* 2009;58:109-19.
18. Zhou J, Zhou S, Tang J, Zhang K, Guang L, Huang Y, et al. Protective effect of berberine on beta cells in streptozotocin- and high-carbohydrate/ high-fat diet-induced diabetic rats. *European Journal of Pharmacology* 606 2009;262-268.
19. Sharma B, Salunke R, Balomajumder C, Daniel S, Roy P. Anti-diabetic potential of alkaloid rich fraction from *Capparis decidua* on diabetic mice. *Journal of Ethnopharmacology* 2009;127:457-462.
20. Wang HD, Lu DX, Qi RB. Therapeutic strategies targeting the LPS signaling and cytokines. *Pathophysiology* 2009;16:291-296.
21. Yoo KY, Hwang IK, Kim JD, Kang IJ, Park J, Yi JS, et al. Antiinflammatory effect of the ethanol extract of *Berberis koreana* in a gerbil model of cerebral ischemia/reperfusion. *Phytther Res* 2008;22:1527-1532.
22. Qu R. *Herbology*. 1st ed. Shanghai: Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Press, 2006.
23. Zhu F, Qian C. Berberine chloride can ameliorate the spatial memory impairment and increase the expression of interleukin-1beta and inducible nitric oxide synthase in the rat model of Alzheimer's disease. *BMC Neurosci* 2006;7:78.
24. Kuznetsova LP, Nikol'skai EB, Sochilina EE, Faddeeva MD. inhibition of human blood acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase by some alkaloids. *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology* 2002;38(1):35-39.
25. Kong LD, Cheng CH, Tan RX. Monoamine oxidase inhibitors from rhizoma of *Coptis chinensis*. *Planta Med* 2001;67:74-76.
26. Kuznetsova LP, Sochilina EE, Faddeeva MD, Iagodina OV. Effect of some isoquinoline alkaloids on enzymatic activity of acetylcholinesterase and monoamine oxidase. *Ukr Biokhim Zh* 2005;77:147-153.
27. Peng WH, Lo KL, Lee YH, Hung TH, Lin YC. Berberine produces antidepressant-like effects in the forced swim test and in the tail suspension test in mice. *Life Sci* 2007;81:933-938.
28. Peng WH, Wu CR, Chen CS, Chen CF, Leu ZC, Hsieh MT. Anxiolytic effect of berberine on exploratory activity of the mouse in two experimental anxiety models: interaction with drugs acting at 5-HT receptors. *Life Sci* 2004;75:2451-2462.
29. Dhir A, Kulkarni SK. Effect of addition of yohimbine (alpha-2-receptor antagonist) to the antidepressant activity of fluoxetine or venlafaxine in the mouse forced swim test. *Pharmacology* 2007; 80:239-243.
30. Andersen H, Nielsen S, Mogensen CE, Jakobsen J. Muscle strength in type 2 diabetes. *Diabetes* 2004;53:1543-1548.
31. Lesniewski LA, Miller TA, Armstrong RB. Mechanisms of force loss in diabetic mouse skeletal muscle. *Muscle Nerve* 2003;28: 493-500.
32. Zhou L, Yang Y, Wang X, Liu S, Shang W, Yuan G, et al. Berberine stimulates glucose transport through a mechanism distinct from insulin. *Metabolism* 2007;56:405-412.
33. Wang SH, Wang WJ, Wang XF, Chen W. Effect of astragalus polysaccharides and berberine on carbohydrate metabolism and cell differentiation in 3T3-L1 adipocytes. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi* 2004;24:926-928.
34. Kim SH, Shin EJ, Kim ED, Bayaraa T, Frost SC, Hyun CK, et al. Berberine activates GLUT1-mediated glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes. *Biol Pharm Bull* 2007;30:2120-2125.
35. Cheng Z, Pang T, Gu M, Gao AH, Xie CM, Li JY, Nan FJ, Li J. Berberine-stimulated glucose uptake in L6 myotubes involves both AMPK and p38 MAPK. *Biochim Biophys Acta* 2006;1760:1682-1689.
36. Zhou LB, Chen MD, Wang X, Song HD, Yang Y, Tang JF, et al. Effect of berberine on the differentiation of adipocyte. *Zhonghua Yi Xue Za Zhi* 2003;83:338-340228.
37. Ko BS, Choi SB, Park SK, Jang JS, Kim YE, Park S, et al. Insulin sensitizing and insulinotropic action of berberine from *Cortidis rhizoma*. *Biol Pharm Bull* 2005;28:1431-1437.
38. Lee YS, Kim WS, Kim KH, Yoon MJ, Cho HJ, Shen Y, et al. Berberine, a natural plant product, activates AMP-activated protein kinase with beneficial metabolic effects in diabetic and insulin-resistant states. *Diabetes* 2006;55:2256-2264.
39. Kucukatay V, Agar A, Gumuslu S, Yargicoglu P. Effect of sulfur dioxide on active and passive avoidance in experimental diabetes mellitus: relation to oxidant stress and antioxidant enzymes. *Int J Neurosci* 2007;117(8):1091-107.