



سنتز یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن

سعیده گل کار^۱، کمال الدین قرنجیک^{۲*}، مختار آرامی^۱

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۷۸۴-۴۴۱۳

۲- استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آبی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۳- دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۷۸۴-۴۴۱۳

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۲/۲۸ در دسترس به صورت الکترونیکی از:

چکیده

در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از ۴-آمینو-N-پروپیل-۱،۸-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا ۴-آمینو-N-پروپیل-۱،۸-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با N,N-دی متیل دودسیل آمین واکنش داده شد تا یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید با گروه رنگساز نفتالیمیدی به دست آمد. ماده رنگزای سنتز شده به روش تبلور مجدد و کروماتوگرافی لایه نازک خالص سازی شده و از طریق تحلیل دستگاهی ¹HNMR، FTIR، ¹³CNMR و تحلیل عنصری مورد تأیید قرار گرفت. ضمناً خواص اسپکتروفوتومتری ماده رنگزای سنتز شده تعیین و ویژگی های ضد میکروبی آن به روش کمی اندازه گیری میزان حداقل غلظت بازداری (MIC) ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهند که ماده رنگزای سنتز شده در حالت محلول در مقابل هر دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی خاصیت ضد میکروبی دارد.

واژه های کلیدی: مواد رنگزای کاتیونیک، نفتالیمید، سنتز، ترکیبات ضد میکروبی، رنگساز

Synthesis of a Novel Naphthalimide Based Cationic Dye and Its Antimicrobial Properties

S. Golkar¹, K. Gharanjig^{*2}, M. Arami¹


¹ Amirkabir University of Technology, Faculty of Textile Engineering, P.O. Box.15875-4413, Tehran, Iran

² Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box.16765-654, Tehran, Iran

Abstract

In this paper, synthesis and antimicrobial properties of a cationic dye were investigated. 4-Amino-N-propyl-1,8-naphthalimide was reacted with chloroacetylchloride followed by N,N-dimethyldodecylamine and a cationic dye was obtained. The product was purified by recrystallization and TLC methods. The chemical structure of the product was characterized by using FTIR, ¹HNMR, ¹³CNMR and elemental analysis. Also, the spectrophotometric data of the synthesized dye was studied. The antimicrobial property of the dye was evaluated by using a minimum inhibitory concentration method (MIC). The product showed considerable antimicrobial effectiveness against either Gram-negative or Gram-positive bacteria in solution. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 37-42. © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Cationic dyes, Naphthalimide, Synthesis, Antimicrobial compound, Chromophore.



شکل ۱: شکل کلی مواد رنگزا برای ادغام فرآیندهای رنگرزی و تکمیل.

مواد رنگزای نفتالیمیدی یک گروه مهمی از مواد رنگزا را تشکیل می‌دهند و کاربردهای متنوعی دارند. آنها دارای شدت و قدرت رنگی زیادی هستند و در خشندگی بالایی دارند. به همین منظور مقالات متعددی در زمینه استفاده از ترکیبات نفتالیمیدی در ساخت مواد رنگزای نساجی منتشر شده است [۹، ۱۰]. مواد رنگزای نفتالیمیدی به واسطه داشتن خاصیت فلورسنتمی دارای کاربردهای فراوانی نیز در علوم پزشکی و بیوشیمی هستند. آنها معمولاً در تشخیص بیماری‌ها اهمیت زیادی دارند. با توجه به کاربرد مواد رنگزای نفتالیمیدی بر روی الیاف نساجی و ویژگی‌های بارز آنها سبب شده است که در این تحقیق یک ماده رنگزای جدیدی بر پایه نفتالیمید معرفی گردد و خاصیت ضد میکروبی آن در محلول ارزیابی شده است. در این راستا ابتدا یک ماده رنگزای نفتالیمیدی از آسنفتین سنتز شده و با یک ترکیب الکل آمینوی نوع سوم واکنش داده شد تا ماده رنگزای مورد نظر به دست آید. سپس خاصیت ضد میکروبی ماده رنگزای سنتز شده در محلول مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲-بخش تجربی

۲-۱- مواد شیمیایی و وسایل

ماده اولیه برای سنتز ماده رنگزای ضد میکروب آسنفتین است که با درجه خلوص ۹۷٪ از شرکت الدریج تهیه شد. این ماده به روش تبلور مجدد از حلال استیک اسید خالص‌سازی و برای سنتز مواد واسطه مورد نیاز به کار رفت. N,N-دی‌متیل دودسیل آمین (الدریج)، کلرو استیل کلرید (فلوکا) و دیگر مواد مورد استفاده از شرکت مرک تهیه شد و بدون خالص‌سازی به کار رفتند.

برای اندازه‌گیری نقطه ذوب مواد سنتز شده از DSC: TA 2010 Instruments و برای تعیین ویژگی‌های رنگی ماده رنگزا از UV-vis absorption spectra: Cecil 9200 double beam استفاده شده است. ضمناً به منظور شناسایی مواد سنتز شده در این مقاله از طیف مادون قرمز ۴۷۰/۶۷۰/۸۷۰ nm و FTIR: Nicolet 470/670/870 MHz رزونانس مغناطیسی ^1H and ^{13}C NMR: Bruker Avance 300 MHz استفاده شد.

۱- مقدمه

امروزه یکی از زمینه‌های فعال تحقیقاتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است. ادغام نمودن دو یا چند فرآیند تکمیلی و انجام آنها در یک مرحله، به میزان قابل ملاحظه‌ای مصرف انرژی را پایین آورده و پس از ایجاد شده را نیز کاهش می‌دهد. دستیابی به این هدف، مستلزم طراحی و سنتز مواد شیمیایی جدید است. در یک فرآیند تکمرحله‌ای، مواد و روش به کار گرفته شده باید طوری انتخاب شوند تا اثرات نامطلوب روی یکدیگر نداشته و ضمناً ویژگی مسورد انتظار را نیز فراهم نمایند. از میان فرآیندهای تکمیلی منسوجات، رنگرزی مرحله‌ای است که در آن می‌توان تغییراتی ایجاد نمود تا برخی از فرآیندها با یکدیگر ادغام شوند. رنگرزی یک حمامه کالاهای دوجزئی و یا یکی نمودن فرآیند رنگرزی و تکمیل‌هایی مثل ضدآب، ضد مواد شیمیایی، ضد الکتریسیته ساکن و ضد میکروب از آن جمله‌اند [۱].


مواد رنگزا ترکیباتی هستند که ساختار الکترونی‌شان قادر به جذب تشعشعات الکترومغناطیسی در محدوده مرئی است [۲]. این مواد رنگزا می‌توانند حاوی گروه‌هایی باشند که خواصی علاوه بر ویژگی رنگی به ماده رنگزای مورد نظر بدeneند (شکل ۱). برای مثال می‌توان به مواد رنگزا گروه‌هایی متصل کرد که علاوه بر ایجاد رنگ بر روی پارچه ویژگی‌هایی از قبیل دفع آب، مقاومت در مقابل آتش، ضد میکروب، ضد اشعه مواراءبنفس و ضد مواد شیمیایی را به وجود آورند [۱].

در زمینه تولید این دسته از مواد رنگزا پژوهش‌های متنوعی انجام شده است. برخی از محققین با استفاده از مواد رنگزای حاوی گروه‌های آمونیوم خاصیت ضد میکروبی پایداری را در الیاف نایلون ایجاد کرده‌اند [۳، ۴]. پس از عملی شدن تفکر استفاده از گروه‌های شیمیایی فعال بر روی مولکول‌های مواد رنگزای اسیدی به عنوان پل‌هایی برای متصل کردن عوامل ضد میکروبی به پارچه‌های مصنوعی نایلونی، محققین دیگری اقدام به سنتز رنگزاهایی با خاصیت ضد میکروبی نمودند [۱]. اخیراً پیشرفت‌هایی در قراردادن عوامل ضد میکروبی N-هالامینی (ترکیبات آلی حاوی کلر متصل به نیتروژن) و نمک‌های آمونیوم به پارچه‌های اکریلیکی انجام شده است، اما متأسفانه در هر دو این روش‌ها محدودیت‌هایی در رنگرزی الیاف اکریلیک ایجاد می‌شود. با اتصال عامل ضد میکروب نمک آمونیوم توسط یک پل الکل آمینو به گروه رنگساز آنتراکینونی، گروه دیگری از مواد رنگزای ضد میکروبی به دست آمدند [۵، ۶]. در این گروه می‌توان با تغییر پل اتصال دهنده بین گروه رنگساز و نمک آمونیوم پایداری مواد رنگزا را در برابر هیدرولیز و حرارت بهبود داد [۷]. گروه دیگری از مواد رنگزای ضد میکروبی از طریق اتصال نمک‌های آمونیوم به پایه‌های گروه رنگساز آزو به دست آمدند [۸].

آبی با غلظت‌های متفاوتی از رنگزا اضافه شد. بعد از ۲۴ ساعت، ۱۰۰ میکرولیتر از محلول حاصل تا حجم ۱۰۰ میلی لیتر رقیق گردید. مجدداً ۱۰۰ میکرولیتر از محلول رقیق شده به پلیت‌های نوتریت آگار افزوده و در ۳۷ °C به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شد. همین کار برای آب مقطر بدون رنگزا به عنوان شاهد نیز انجام گردید [۱۷].

۳- نتایج و بحث

نفتالیمیدها ترکیباتی هستند که در اثر انجام یکسری واکنش‌های شیمیایی پشت سر هم از قبیل نیترودار کردن، اکسایش، احیاء ایمیدار کردن، آسیل‌دار کردن، هالوژن‌دار کردن و متراکم کردن از آسنفتین به دست می‌آیند. این ترکیبات کاربردهای مختلف و متنوعی دارند، به طوری که آنها به عنوان مواد رنگزا در رنگ کردن کالاهای نساجی، چرم و کاغذ، عوامل درخشان‌کننده فلورسنتی در شوینده‌ها، کالاهای نساجی و کاغذ، علاوه فلورسنت در دارو و بیولوژی، مواد رنگزا در کریستال‌های مایع، مواد رنگزا در فناوری لیزر، مواد رنگزای فلورسنت و مواد حساس الکتریکی - نوری به کار می‌روند [۱۱-۱۳]. مواد رنگزای نفتالیمیدی دارای قدرت رنگی زیاد و درخشندگی عالی هستند [۱۴]. بنابراین، آنها می‌توانند به عنوان یک گروه رنگساز در یکی کردن برخی از فرآیندهای نساجی بخصوص رنگرزی و تکمیل ضد میکروب بکار روند. در این راستا آسنفتین با اسید نیتریک در اسید استیک نیترودار و سپس اکسید شد تا ۴-نیترو-۸-اپتیک-۱-نیدرید نفتالیک به دست آمد. این ماده در محیط الکلی با پروپیل آمین متراکم گردید و گروه رنگساز نفتالیمیدی حاصل شد. در مرحله بعد گروه نیتروی حلقه نفتالیمیدی از طریق واکنش احیاء که توسط کلرید قلع در اسید کلریدریک انجام شد به گروه آمینو تبدیل و ماده رنگزای ۴-آمینو- N پروپیل-۸-۱-نفتالیمید به دست آمد. طیف FTIR ماده سنتر شده حضور H-N کششی آمین نوع اول را در ۳۴۳۸ و ۳۳۵۵ cm⁻¹ و حذف گروه نیترو را در نواحی ۱۳۵۰- ۱۵۳۰ cm⁻¹ نشان می‌دهد. طیف ¹H NMR نیز پروتون‌های H-N گروه آمینی نوع اول را در ناحیه ۷,۳۶ ppm به صورت یک تک پیک نشان می‌دهد. ضمناً نتایج آسالیز عنصری نشان داد که درصد کربن، نیتروژن و هیدروژن یافت شده و محاسبه شده در ماده رنگزا تطابق خوبی با یکدیگر دارند. برای این که بتوان یک گروه نمک آمونیوم چهار ظرفیتی را بر روی حلقه نفتالیمیدی ایجاد کرد، می‌بایست ۴-آمینو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید را با کلرو استیل کلرید واکنش داد (معادله ۱).



۲-۲- روش کار

سنتر ۴-آمینو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید: برای سنتر ۴-آمینو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید از آسنفتین به ترتیب یک سری واکنش‌های شیمیایی استاندارد از قبیل نیترودار کردن، اکسایش، آمین‌دار کردن و احیاء انجام گرفت [۱۱]. ویژگی‌های ترکیب نهایی ۴-آمینو-N-

پروپیل-۸-۱-نفتالیمید به شرح زیر بود:

¹HNMR(CDCl₃): ۰,۹۹-۱,۰۲ (3H, CH₃), ۱,۷۳-۱,۷۹ (2H, CH₂CH₃), ۴,۱-۴,۱۴ (2H, NCH₂), ۴,۹۴ (2H, NH₂), ۶,۸۸-۶,۹ (1H, 3-H), ۷,۶۴-۷,۶۷ (1H, 6-H), ۸,۱-۸,۱۱ (1H, 2-H), -۸,۴۳ ۸,۴۱ (1H, 5-H), ۸,۶۰-۸,۶۱ (1H, 7-H); FTIR (KBr): v ۳۳۵۶, ۳۴۳۵ cm⁻¹ (N-H str. Primary amine), ۱۶۷۵, ۱۶۳۷ cm⁻¹ (C=O str. Carbonyl); Anal. Cal. for CHN: C, % ۷۰,۸۷; H, % ۵,۵۱; N, % ۱۱,۰۲; Found: C, % ۷۰,۶۵; H, % ۵,۶; N, % ۱۱. m.p=۲۵۸,۴۶ °C.

سنتر ۴-کلرو استامیدو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید: محلولی از ۰,۷۲ گرم (۰,۰۲۵ میلی‌مول) ۴-آمینو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید در ۶ میلی‌لیتر N,N-دی متیل استامید در دمای صفر درجه سانتی گراد با استفاده از حمام آب و یخ تهیه شد. به این محلول محلولی از ۱,۵ میلی‌لیتر کلرو استیل کلرید در ۳۰ میلی‌لیتر کلروفرم اضافه شد. محلول واکنش به مدت یک ساعت با همزدن مداوم در دمای اتان نگه داشته شده و سپس به ۱۵۰ میلی‌لیتر دی‌اتیل‌اتر اضافه گردید. رسوب تشکیل شده صاف و خشک گردید. محصول دوبار با استیک اسید به روش تبلور مجدد خالص‌سازی شد. بدین ترتیب ۴-کلرو استامیدو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید جامد سفید رنگ، برآق و پفکی شکل با بازده ۷۵٪ و نقطه ذوب ۲۴۱ °C به دست آمد.

سنتر ماده رنگزای ۴-(N,N-دی متیل دودسیل) استامیدو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید کلرید: محلولی از ۰,۳۳ گرم (یک میلی‌مول) ۴-کلرو استامیدو-N-پروپیل-۸-۱-نفتالیمید در ۴ میلی‌لیتر دی متیل استامید تهیه شده و به آن ۱,۶ میلی‌لیتر (۶ میلی‌مول) N,N-دی متیل دودسیل آمین اضافه شد. واکنش به مدت ۳ ساعت در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد ادامه یافت تا TLC نشان داد که ماده اولیه به طور کامل از محلول واکنش حذف شده است (هگزان نرمال و اتیل استات ۴:۱). پس از پایان واکنش، آمین اضافی با دکانتور جدا شده و بقیه محلول از طریق تقطیر در خلاء (۱۱۰ درجه سانتی گراد) تغليظ شد. محصول به ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر اضافه شد تا رسوبی از محصول تشکیل شود. این رسوب صاف شده و در دمای محیط خشک گردید.

سنچش خاصیت ضد میکروبی ماده رنگزای سنتر شده در حالت محلول به روش کمی: ۱ میلی‌لیتر از سوسپانسیون آبی حاوی ^۷۱۰ اشريشيا كولي يا استافيلاكوكس طلابي به ۹ میلی‌لیتر محلول

1- Colony form units per milliliter

$(C_7)_{11}H_{18}, 4$, $2C_6N(CH_3)_2$, $62, 9$, $10C_6CH_2$, $52, 4$, $(NCH_2)_3$, $31, 6$, $(C=O)_{13}O$, $127, 2$, $(C_9)_{125, 5}$, $(C_{10})_{128, 7}$, $(C_8)_{121, 4}$, $(C=O)_{140, 9}$, $(NCHO)_{163, 5}$, $(C=O)_{140, 9}$.


بررسی ویژگی‌های اسپکتروفوتومتری نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده در آب دارای ماكزیمم جذب 372 nm است و دارای رنگ زرد می‌باشد. با مقایسه طول موج ماكزیمم جذب ماده رنگزای $4\text{-آمینو-}N\text{-پروپیل-}1\text{-نفتالیمید}$ که 435 nm است یک جابجایی هیپوسکرومیک در حدود 60 nm مشاهده می‌شود. این اثر را می‌توان به کاهش خاصیت الکترون‌دهندگی گروه آمینو در مکان 4 و افزایش وزن مولکولی محصول به خاطر حضور گروه الکیل آمینو نسبت داد [۱۵].

ضریب جذب مولار ماده رنگزای سنتز شده در طول موج ماكزیمم جذب برابر $10,127 \text{ L mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$ بود که در مقایسه با ضریب جذب مولار $4\text{-آمینو-}N\text{-پروپیل-}1\text{-نفتالیمید}$ که در حدود 38500 است کاهش نسبتاً شدیدی نشان می‌دهد. البته حضور گروه الکیل آمینو چهار ظرفیتی در مولکول مواد رنگرا سبب کاهش قدرت رنگی می‌گردد و این موضوع در مورد ترکیبات آتراکینونی نیز رخ می‌دهد [۴].

بدین ترتیب $4\text{-کلرو استامیدو-}N\text{-پروپیل-}1\text{-نفتالیمید}$ با نقطه ذوب 242°C به دست آمد. طیف FTIR ماده سنتز شده نیز $N\text{-H}$ کششی آمین نوع دوم را در 3260 cm^{-1} , $C=O$ کششی گروه آمید در 1624 cm^{-1} و $C\text{-Cl}$ کششی را نیز در 783 cm^{-1} نشان می‌دهد. $^1\text{HNMR}$ نیز حضور گروه‌های CH_2 استامید و $N\text{-H}$ را به ترتیب در نواحی $4, 0\text{ ppm}$ و $4, 55\text{ ppm}$ تأیید می‌کند (جدول ۱). نتایج تحلیل عنصری این ترکیب (یافت شده: کربن $8, 73, 8, 08$ ٪، هیدروژن $9, 15, 9, 05$ ٪ و نیتروژن $8, 21, 8, 26$ ٪) با درصد عناصر موجود در ساختار شیمیایی مولکول ماده سنتز شده تطابق خوبی دارد (محاسبه شده: کربن $8, 73, 2$ ٪، هیدروژن $9, 05$ ٪ و نیتروژن $8, 26$ ٪).

در مرحله نهایی $N,N\text{-دی متیل دودسیل آمین با 4-کلرو استامیدو-}N\text{-پروپیل-}1\text{-نفتالیمید واکنش داده شد تا 4-دی متیل دودسیل)$ استامیدو- $N\text{-پروپیل-}1\text{-نفتالیمید کلرید$ با نقطه ذوب $193, 2^\circ\text{C}$ به دست آید (معادله ۲).

نتایج حاصل از طیف‌های $^1\text{HNMR}$ و تحلیل عنصری نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده با ساختار شیمیایی اش تطابق خوبی دارد (جدول ۲). ضمناً $^{13}\text{CNMR}$ حضور 31 ppm کربن را در نواحی $28, 6$, $25, 9$, $24, 3$, $11, 7$, $(NCH_2)_3$, CH_2 می‌نماید.



جدول ۱: طیف $^1\text{HNMR}$ و FTIR مواد رنگزای ۱ و ۲.

FTIR	$^1\text{HNMR}$	مواد رنگزای
3260 cm^{-1} (کششی N-H), 1699 cm^{-1} , 1624 cm^{-1} (کششی کربونیل) 1655 cm^{-1} (کششی آمید) 783 cm^{-1} (کششی C-Cl)	$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$: $\delta =, 93$ (3H, CH ₃), $1, 66$ (2H, CH ₂), $4, 1$ (1H, N-CH ₂), $4, 55$ (2H, CH ₂), $7, 9$ - $8, 66$ (5H, naphthalimid ring), $10, 7$ (1H, N-H).	۱
3377 cm^{-1} (کششی N-H), 1699 cm^{-1} , 1632 cm^{-1} (کششی کربونیل) 1655 cm^{-1} (کششی آمید)	$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$: $\delta =, 8$ (3H, CH ₃), $=, 9$ (3H, CH ₃), $1, 12$ - $1, 25$ (2H, CH ₂), $1, 0$ H CH ₂ (1H, N-CH ₂), $1, 6$ (2H, CH ₂), $2, 54$ (6H, N CH ₃), $3, 57$ (1H, N-H), $3, 97$ (2H, CH ₂), $4, 69$ (2H, CH ₂), $7, 77$ (1H, 6-H), $8, 23$ (1H, 5-H), $8, 39$ - $8, 44$ (2H, 2-H, 3-H), $8, 95$ (1H, 7-H)	۲

جدول ۲: نتایج تحلیل عنصری ترکیب ۴ - N,N-دی متیل دودسیل) استامیدو-N-پروپیل-۸,۱-نفتالیمید کلرید.

عنصر	محاسبه شده (%)	یافت شده (%)
C	۷۳,۲	۷۳,۱۸
N	۸,۲۶	۸,۲۶
H	۹,۰۵	۹,۰۱

زنگیرهای الکیل با تعداد اتم کربن کمتر از ۱۰ اثر بخشی کمی داشته و با تعداد بیش از ۱۴ اتم کربن نیز بدلیل کم محلول بودن در محیط آبی، خاصیت ضدمیکروبی کمتری نشان می‌دهند [۷].

۴- نتیجه‌گیری

به منظور تلفیق رنگزی و تکمیل ضدمیکروبی، یک ماده رنگزای کاتیونیک ضدمیکروب از طریق اتصال N,N-دی متیل دودسیل آمین با یک پل استامیدی به ماده رنگزای ۴-آمینو-N-پروپیل-۸,۱-نفتالیمید سنتز گردید. ماده رنگزای پایه از آسنفتین و با انجام واکنش‌های نیترودار کردن، اکسایش، آمیندار کردن و احیاء به دست آمد. پس از خالص‌سازی، گروه آمینوی موقعیت ۴ مولکول رنگزا با استفاده از کلرو اسチل کلرید به گروه فعال شیمیایی ۴-کلرو استامیدو تبدیل شد. در مرحله بعد ماده واسطه با آمین نوع چهارم مورد نظر تبدیل شد. در نتیجه از روش‌های تحلیل دستگاهی تأیید شد. خاصیت ضدمیکروبی رنگزای ضد میکروب سنتز شده به روش کمی ارزیابی گردید. روش کمی مبتنی بر اندازه‌گیری حداقل غلظت مورد نیازی از رنگزا (MIC) است که موجب بازداری رشد میکروارگانیسم‌ها می‌گردد. نتایج نشان می‌دهند که ماده رنگزای سنتز شده در مقابل هر دو نوع باکتری گرم مشبت و گرم منفی خاصیت ضد میکروبی دارد. از آنجا که مکانیسم عمل ضد میکروبی گروه‌های آمونیوم، تخریب و ایجاد اختلال در غشاء سیتوپلاسمی میکروارگانیسم‌ها است و با توجه به اختلاف دو نوع باکتری در ترکیب و ساختار این بخش از سلول، همان‌طور که انتظار می‌رفت، باکتری گرم منفی مقاومت بیشتری را در مقابل عامل ضد میکروب از خود نشان می‌دهد.

عرض نوار در نصف ارتفاع نوار جذبی است و معیاری برای سنجش درخشنده‌گی مواد رنگزا می‌باشد. مواد رنگزا با مقادیر $\Delta v_{1/2}$ کم فامهای درخشنای دارند در حالی که $\Delta v_{1/2}$ بالا درخشنده‌گی کاهش می‌یابد. مقادیر $\Delta v_{1/2}$ برای مواد رنگزای آزو بنزن و آزو نفتالیمید در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ نانومتر قرار دارد [۹, ۱۶]. با مقایسه $\Delta v_{1/2}$ ماده رنگزای نفتالیمیدی سنتز شده با مواد رنگزای آزو نتیجه می‌شود که ماده رنگزای سنتز شده دارای درخشنده‌گی رنگ بیشتری نسبت به ترکیبات آزو است.

۳- نتایج آزمون ضد میکروبی

نتیجه حاصل از آزمون ضد میکروبی نشان می‌دهد که حداقل غلظت مورد نیاز محلول ماده رنگزا برای جلوگیری از رشد باکتری (MIC)، برای باکتری استافیلاکوکوس طلایی 20 ppm و در مورد باکتری گرم منفی اشريشيا کولي 30 ppm است. مقایر حداقل غلظت بازدارندگی ماده رنگزای سنتز شده و مقایسه آن با مواد رنگزای آنتراکینونی و آزو ضد میکروبی مشخص می‌کند که ترکیب سنتز شده دارای خاصیت ضد میکروبی تقریباً معادلی با دیگر مواد رنگزا است [۱, ۷]. لازم به ذکر است که مقدار حداقل غلظت بازدارندگی برای مواد رنگزای آنتراکینونی برای هر دو باکتری استافیلاکوکوس طلایی و اشريشيا کولي معادل 20 ppm گزارش شده است [۱, ۴]. آنچه مسلم است این که مقدار حداقل غلظت بازدارندگی یک ماده رنگزا هر چقدر کمتر باشد بیشتر مانع رشد باکتریها خواهد شد. به هر حال می‌توان با تغییر طول زنجیر الکیل، مقدار حداقل غلظت بازدارندگی را تغییر داد و به یک بهینه مناسبی از مقدار مصرف مواد رنگزا و ویژگی‌های رفتاری آن دست یافت. زنجیرهای الکیل با تعداد ۱۲ اتم کربن، نسبت به زنجیرهای کوتاه‌تر و بلندتر خصوصیات بهتری را تأمین می‌نمایند.

-مراجع-

1. M. Ma, G. Sun, Antimicrobial cationic dyes. *Dyes Pigments.* 58(2003), 27-35.
2. H. Zollinger, Color chemistry, VCH Pub., Zurich, Switzerland, (2003), 165,195.
3. Y. Kim, G. Sun, Dye molecules as bridges for functional modifications of nylon. *Textile Res. J.* 70(2000), 728-733.
4. Y. Kim, G. Sun, Durable antimicrobial finishing of nylon fabrics with acid dyes and a quaternary ammonium salt. *Textile Res. J.* 71(2001), 318-323.
5. M. Ma, G. Sun, Antimicrobial cationic dyes. part 2: thermal and hydrolytic stability. *Dyes Pigments.* 63(2004), 49-57.
6. M. Ma, G. Sun, Antimicrobial cationic dyes. part 3: simultaneous dyeing and antimicrobial finishing of acrylic fabrics. *Dyes Pigments.* 66(2005), 41-33.
7. J. Liu, G. Sun, The synthesis of novel cationic anthraquinone dyes with high potent antimicrobial activity. *Dyes Pigments.* 7(2008), 386-360.
8. S. Liu, J. Ma, D. Zhao, Synthesis and characterization of cationic monoazo dyes incorporating quaternary ammonium salts. *Dyes Pigments.* 75(2007), 255-262.
9. K. Gharanjig, M. Arami, N. M. Mahmoudi, S. Rouhani, H. Bahrami, Synthesis, spectral properties and application of monoazo disperse dyes derived from N- ester-1,8-naphthalimide to polyester. *Dyes Pigments.* 76(2008),648-689.
- 10.A. Khosravi, S. Moradian, K. Gharanjig, Synthesis and characterization of some monoazo disperse dyestuffs based on naphthalimide derivatives for dyeing of polyester fabrics. *J. Chin. Chem. Soc.*, 52(2005), 1-8.
- 11.M. S. Alexio, V. Tychopoulos, S. Ghorbanian, J. Tyman, The UV-Visible absorption and fluorescence of some substituted 1,8-naphthalimides and naphthalic anhydrides. *J. Chem. Soc. Perkin Trans.* 2(1990), 837-842.
- 12.P. Bosch, F. Catalina, T. Corrales, C. Peinado, Fluorescent probes for sensing processes in polymers. *Chem. Eur. J.* 11(2005), 4314-4325.
- 13.L. Duan, Y. Xu, X. Qian, Y. Zhang, Y. Liu, Novel naphthalimide derivatives with near-infrared emission: synthesis via photochemical cycloaromatization, fluorescence in solvents and living cell. *Tetrahedron Lett.* 50(2009), 22-28.
- 14.A. Khosravi, S. Moradian, K. Gharanjig, Synthesis and spectroscopic studies of some naphthalimide based disperse azo dyestuffs for the dyeing of polyester fibres. *Dyes Pigments.* 69(2008), 79-92.
- 15.J. Griffiths, Color and constitution of organic molecules, Academic press Pub., (1976).
- 16.K. Singh, S. Singh, J. A. Taylor, Monoazo disperse dyes. Part 2; Colour-constitution relationships of some novel blue disperse dyes. *Color. Technol.* 119(2006), 158-163.