

فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر میزان نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹)

محبوبه کیانی^۱، احمد عابدی^۲، سالار فرامرزی^۲

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، متخصصان در زمینه اختلال وسوسی فکری-عملی به دنبال سنجش، اعتبار و کارایی مداخلات دارویی بوده‌اند. پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر بیمارانی بود که نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری داشته‌اند. این فراتحلیل بر اساس تحقیقات ده سال اخیر در ایران انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش، با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثرگذاری دارو درمانی را بر کاهش نشانه‌های وسوسی فکری-عملی مورد بررسی قرار داده است. به منظور انجام این تحقیق، بیست پژوهشی که در ده سال اخیر در ایران صورت گرفته، این مقایسه بین میانگین‌های گروه‌های آزمایش و شاهد بوده است، انتخاب و روش فراتحلیل بر روی آن‌ها انجام گرفت. ابزار پژوهش، عبارت از چک‌لیست فراتحلیل بود.

یافته‌ها: میزان اندازه اثر مداخلات دارو درمانی بر کاهش نشانه‌های وسوسی فکری-عملی $d = 1/11$ بود ($P \leq 0.001$).

نتیجه‌گیری: میزان اندازه اثر دارو درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری مطابق جدول تفسیر اندازه اثر Cohen در حد بالا بود.

واژه‌های کلیدی: فراتحلیل، اختلال وسوسی-اجباری، مداخلات دارویی، اندازه اثر، Cohen.

نوع مقاله: مروری

دریافت مقاله: ۹۰/۶/۲۶

پذیرش مقاله: ۹۱/۱/۱۴

مقدمه

بالینی این بیماری، شیوه‌های متعدد درمانی اعم از مداخلات روان‌شناسی و دارو درمانی و ترکیب آن‌ها ارایه شده است (۲). نظریه‌های علت شناختی متعددی ارایه شده، که مهم‌ترین نظریه نقش سروتونین در بروز این بیماری است که بر اساس تحقیقات دارویی مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های وراثتی موجود درباره اختلال وسوسی-اجباری با این فرضیه همخوانی دارد، که اختلال مذکور مؤلفه وراثتی قابل توجهی

اختلال وسوسی فکری و عملی در زمرة شایع‌ترین اختلالات اضطرابی است. این اختلال طبق فرم تجدید نظر شده چهارمین چاپ راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM-IV-TR) وجود فکر وسوسی یا عمل وسوسی است؛ به طوری که دارای شدت کافی برای ایجاد ناراحتی قابل ملاحظه در شخص می‌باشد (۱). به دلیل متنوع بودن نیمرخ

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Email: mahboobehkiany@yahoo.com

۲- استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

تحقیقات می‌توان به پژوهش‌های آرمان (۷)، ترکزبان (۸)، دادر (۹)، پورافکاری و همکاران (۱۰)، میرسپاسی و سالیانی (۱۱)، قریشی و فرنام (۱۲)، حمیدی و همکاران (۱۳)، سلطانی‌فر و همکاران (۱۴)، فرنام، شعبانی (۱۵) اثربخشی مداخلات پزشکی و دارو درمانی را در کنترل و کاهش عالیم این اختلال به نسبت مناسب گزارش نموده‌اند.

با توجه به ناهمخوانی که در نتایج تحقیقات مربوط به اثربخشی دارو درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس-اجباری وجود دارد، به نظر می‌رسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تأثیر دارو درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس اجباری کمک خواهد کرد. به عبارتی روشن‌تر، با انجام روش فراتحلیل دیدگاه کلی‌تری نسبت به کارایی الگوهای درمانی (اثربخشی دارو درمانی) بر کاهش نشانه‌های OCD (Obsessive compulsive disorder) در کشور به دست آورده. با توجه به آن که اختلال وسواس اجباری در تمام اقشار جامعه باعث کاهش کارایی فعالیت‌های روزانه و اختلال در جریان عادی زندگی می‌گردد، ضرورت انجام این تحقیق روشن‌تر می‌شود. به خصوص با توجه به این که بخش قابل توجهی از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های روان‌شناختی و مشاوره افراد مبتلا به وسواس می‌باشند و همچنین هزینه‌های درمانی که برای این افراد در بر دارد، ضرورت انجام این تحقیق بیش از پیش روشن می‌گردد. از این رو با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهش فراتحلیل میزان اثرگذاری الگوی مداخلات روان‌شناختی و دارو درمانی را در کاهش عالیم اختلال وسواس اجباری مورد بررسی قرار دهد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق با توجه به هدف پژوهش از روش "فراتحلیل" استفاده شده است. فراتحلیل شیوه‌ای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعدد برای دست‌یابی به برآوردهای بهتر درباره واقعیت است که شامل مراحل زیر می‌شود: (الف) یک جستجوی فرآگیر برای تمامی مدارک موجود، (ب) به

دارد. به دلیل متنوع بودن نیم‌رخ بالینی این بیماری، شیوه‌های متعدد درمانی اعم از مداخلات روان‌شناختی و دارو درمانی و ترکیب آن‌ها ارایه شده است (۳).

مرور فراتحلیل‌ها نشان داده‌اند که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ و شناخت درمانی، درمان‌های مؤثری برای اختلال وسواس اجباری هستند. برای مثال Abramowitz (۵) میانگین اندازه اثر این روش‌ها را بر حسب میانگین تفاوت‌های تراز شده از $1/19$ و $d = 1/5$ به دست آورده‌اند. Mendes، Kwanza-Gomez، Meka-Sanchez Eddie، Westen و Bradley به مقادیر $1/75$ و $1/26$ و $1/53$ و $1/54$ و $1/39$ به مقادیر $d = 1/5$ و $d = 1/53$ دست یافته‌اند (۴).

چنان‌چه نتایج فراتحلیل‌های مختلف نظیر Abramowitz (۵) و فرنام و همکاران اثربخشی این روش درمانی را نشان داده‌اند (۶).

از طرف دیگر در خصوص اثربخشی روش‌های درمان رفتاری از جمله روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ پژوهش‌های Eddy و Fisher و Wells و Abramowitz (۴) بیان‌گر باقی ماندن بعضی از عالیم و رها کردن درمان توسط بخش به نسبت قابل توجهی از درمان جویان می‌باشد. آن‌چه جبران این عدم کفایت را خواهد کرد، رویکردهای جایگزین و یا مکمل می‌باشد. در این خصوص رویکردهای زیستی به عنوان یک انتخاب در نقطه مقابل رویکردهای روان‌شناختی مطرح می‌شود. درمان دارویی یکی از روش‌های درمان در رویکرد زیستی است، مرور فراتحلیل‌ها استفاده از ضد افسردگی‌ها در درمان وسواسی- اجباری حمایت می‌کند. فراتحلیل انجام شده درباره درمان اختلال وسواس فکری و عملی میزان بهبود بیماران را در مقایسه با دارونما در مورد کلومی‌پرامین 61 درصد و در مورد داروهای مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین (SSRI) یا Selective serotonin reuptake inhibitors 22 تا 28 درصد گزارش نموده‌اند (۶). در ایران پژوهش‌های زیادی در خصوص درمان دارویی وسواس انجام شده است، از جمله این

انجام شده، از لحاظ روش‌شناسی شرایط لازم را داشته بودند. منابع جستجو در پژوهش حاضر عبارت بودند از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها، بانک منابع اطلاعاتی جهاد دانشگاهی، مرکز اسناد ایران (واژه جستجو وسوس) بود. فقط منابع فارسی و تحقیقاتی که در ایران، انجام شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ملاک‌های "درون گنجی" برای فراتحلیل عبارت بودند از: ۱- داشتن شرایط لازم از نظر روش‌شناسی (فرضیه‌سازی)، روش تحقیق، جامعه، حجم نمونه، و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری، فرضیه‌های آماری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری، ۲- موضوع پژوهش مداخلات دارویی اختلال وسوسی اجباری باشد، ۳- بررسی در قالب یک پژوهش گروهی صورت گرفته باشد (موردنی و منفرد نباشد)، ۴- تحقیقات به صورت آزمایشی و نیمه‌آزمایشی انجام شده باشند. ملاک‌های خروج، پژوهش‌هایی بودند که شرایط روش‌شناسی را نداشتند و یا به صورت موردنی، مروری، همبستگی و توصیفی انجام شده‌اند.

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش چک‌لیست تحلیل محتوا (از لحاظ روش‌شناسی) بود. از این چک‌لیست برای انتخاب پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و مقاله‌های پژوهشی دارای ملاک‌های "درون گنجی" و استخراج اطلاعات لازم برای انجام فراتحلیل استفاده شد. این بررسی برای ۳۰ منبع مورد استفاده در فراتحلیل استفاده شد. این مقاله که ملاک‌های درون گنجی در داشتند، انتخاب شده است. چک‌لیست مذکور شامل مؤلفه‌های زیر بود: "عنوان پژوهش‌های انجام شده درباره اختلال وسوس- اجباری" "مشخصات کامل مجریان، سال" و " محل" اجرای سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، ابزارها "روایی" و "اعتبار" ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری، حجم نمونه و سطح معنی‌داری آزمون‌ها به کار گرفته شده در پژوهش، شیوه محاسباتی فراتحلیل، بر اساس

کارگیری معیارهای، روشن برای تعیین پژوهش‌های قابل شمول، ج) تعیین یک اندازه اثر برای هر تحقیق، د) یکی کردن اندازه‌های اثر پژوهش‌ها تا رسیدن به یک برآورد کلی از شیوع، رابطه یا تأثیر یک رفتار (۱۶). در فراتحلیل اندازه اثر نشان دهنده میزان یا درجه حضور یک پدیده در جامعه است. با در دست داشتن آماره‌هایی مانند t , F , x می‌توان شاخص اندازه اثر مربوط به d را برآورد کرد. بر اساس نظر Cohen، برای شاخص d اندازه‌های اثر $1/10$, $0/3$, $0/5$ به ترتیب کوچک، متوسط و بزرگ قلمداد می‌شود.

به طور کلی دو رویکرد برای ترکیب و تحلیل نتایج در فراتحلیل وجود دارد: یکی مدل اثرهای ثابت و دیگری مدل اثرهای تصادفی. شایان ذکر است که انتخاب مدل به میزان قابل توجهی به نوع استنباط‌هایی که پژوهشگر می‌خواهد انجام دهد، بستگی دارد. مدل اثرهای ثابت تنها برای استنباط‌های شرطی نامعلوم مناسب است، یعنی استنباط‌هایی که تنها می‌خواهند مطالعات موجود در فراتحلیل را وسعت دهند؛ در حالی که مدل اثرهای تصادفی خواستار تسهیل استنباط‌های غیر شرطی، یعنی استنباط‌هایی که ورای فراتحلیل تعمیم داده شده‌اند. برای داده‌های جهان واقعی در علوم انسانی، پژوهشگران می‌خواهند استنباط‌های غیر شرطی انجام دهند و بنابراین، مدل‌های اثر تصادفی اغلب مناسب‌تر هستند. بنابراین در این پژوهش از مدل اثرهای تصادفی استفاده شد. پیش‌فرض این مدل آن است که این مطالعات یک نمونه تصادفی است که از جامعه همه مطالعات ممکن انتخاب شده است. اندازه اثر؛ بیان‌گر تفاوت استاندارد شده بین میانگین‌های گروه‌های آزمایش و شاهد است و برای محاسبه آن باید نسبت تفاوت میانگین نمرات گروه آزمایش و شاهد بر واریانس ادغام شده کل نمرات به دست آورد. جامعه آماری "پژوهش، پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحقیقات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی بودند که در طی ده سال گذشته (۱۳۸۹-۱۳۷۹) در زمینه مداخلات دارویی بر نشانه‌های OCD در ایران

فرمول ۲. محاسبه واریانس ادغام شده:

$$Sp^2 = SE^2 (NE-1) + SC^2 (NC-1) / (NE+NC-2)$$

یافته‌ها

در این بخش بر اساس داده‌های ارایه شده در گزارش هر یک از پژوهش‌های مورد نظر، به محاسبه اندازه اثر اعمال الگوی درمانی دارویی می‌پردازد. به همین منظور اندازه اثر طبق مراحل فراتحلیل Howitt و Cramer محاسبه شد. با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران، میزان تأثیر درمان‌های دارویی بر کاهش نشانه‌های اختلال وسواس-اجباری مورد بررسی قرار گرفت. جدول ۲ میانگین اندازه اثر مطالعات دارویی را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جداول تأثیر متغیر مستقل (مداخلات دارویی) بر متغیر وابسته (کاهش علایم وسواس- اجباری) برابر با ۱/۱۱ است که بر اساس جداول تفسیر اندازه اثر Cohen، بالاتر از متوسط ارزیابی می‌شود.


مراحل فراتحلیل Cohen انجام شده است (۱۶). برای بررسی همگونی مطالعات از نمودار فونل استفاده شد. نمودار فونل مربوط به مطالعات به کار رفته در فراتحلیل در شکل ۱ آمده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، نقاط این نمودار به طور تقریبی به صورت متقارن پراکنده شده‌اند و غیر از دو نقطه پرت بقیه نقاط در داخل یک شکل دودکش مانند قرار می‌گیرند، بنابراین نمودار فونل بر عدم وجود تورش انتشار دلالت دارد (۱۷).

به همین منظور ابتدا باید آن چه اندازه اثر نامیده می‌شود، را در هر یک از پژوهش‌ها به صورت جداگانه محاسبه کرد.

فرمول ۱. محاسبه اندازه اثر بر اساس d

$$Es = \bar{X}_E - \bar{X}_C / Sp$$

واریانس ادغام شده نیز با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:



شکل ۱. نمودار فونل مربوط به مداخلات دارویی

جدول ۱. چکلیست فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر میزان نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹)

ردیف	عنوان تحقیق	منبع	پژوهشگر	الگوی درمانی	سال اجرا	حجم نمونه	ابزار	اندازه اثر d Cohen	میزان آماره معناداری سطح
۱	مقایسه اثرات درمانی نالترکسون و فلوگرتین بر اختلال وسوسی-اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	دارو درمانی عباس با محمود زاده نالترکسون	دارو درمانی عباس با محمود زاده	۱۳۸۶	۳۰	مقیاس یل برآون	۰/۰۵	/۴۵/۰۱
۲	مقایسه اثرات درمانی نالترکسون و فلوگرتین بر اختلال وسوسی-اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	دارو درمانی عباس با فلوگرتین	دارو درمانی عباس با فلوگرتین	۱۳۸۶	۳۰	مقیاس یل برآون	۰/۰۵	/۴۵/۰۱
۳	مقایسه اثربخشی دارو درمانی و درمان توأم دارویی و غیره دارویی بر وسوسی کودکان و نوجوانان مراجعته کننده به کلینیک روان پژوهشکی	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	دارو درمانی سرور ارمن با غیر دارویی	دارو درمانی سرور ارمن با غیر دارویی	۱۳۸۱	۲۵	پرسشنامه ماذلی مقیاس یل برآون	۰/۰۰۱	گزارش نشده
۴	مقایسه اثربخشی درمان های رفتار درمانی شناختی و فلوگرتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسوسی اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	علیرضا فرنام	دارو درمانی سید اکبر بیان زاده	۱۳۸۸	۴۲	پرسشنامه ماذلی	۰/۰۰۱	گزارش نشده
۵	بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، مذهبی فرهنگی در بهبود OCD مبتلایان	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	سید اکبر بیان زاده	دارو درمانی سید اکبر بیان زاده	۱۳۸۳	۱۵	مقیاس یل برآون	۰/۰۰۱	۷۳/۶۱
۶	مقایسه اثربخشی درمان های مواجه سازی- جلوگیری از پاسخ و فلوگرتین در بهبود اختلال وسوسی اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	مهدی ایمانی	دارو درمانی با فلوگرتین	۱۳۸۶	۴۵	پرسشنامه ماذلی	۰/۰۰۱	۸/۹۱
۷	بررسی اثر تقویت دارویی با الانزایین در اختلال وسوسی جبری مقاوم به درمان	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	مینا شعبانی	درمان دارویی با الانزایین	۱۳۸۸	۴۲	معیارهای تشخیصی براساس DSM-IV	۰/۰۰۱	گزارش نشده
۸	بررسی پاسخ درمانی انواع مختلف اختلال وسوسی- جبری به فلوگرتین	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	سید محمدعلی قریشی زاده	دارو درمانی با فلوگرتین	۱۳۸۴	۱۰۰	- وسوسی - جبری یل برآون	۰/۰۰۱	گزارش نشده
۹	بررسی کارامدی نسبی تکنیک های شناختی- رفتاری دارویی و ترکیب آنها در درمان OCD	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	حسن جانی تو زنده	شناختی- رفتاری با دارو	۱۳۸۳	۱۳	برشتمانه ماذلی مقیاس یل برآون	۰/۰۵	۲۰۳/۳۰
۱۰	بررسی تأثیر درمان دارویی بر تغییر تشخیص اختلال شخصیت در بیماران وسوسی- جبری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	محبوبه دادرف	دارو درمانی	۱۳۸۱	۳۰	مقیاس یل برآون	۰/۰۵ ۰/۰۱	گزارش نشده

ادامه جدول ۱. چکلیست فراتحلیل اثربخشی دارو درمانی بر میزان نشانه‌های اختلال و سوساسی-اجباری: (ایران ۱۳۸۹-۱۳۷۹)

ردیف	عنوان تحقیق	منبع	پژوهشگر	الگوی درمانی	سال	حجم نمونه	ابزار	اندازه اثر d Cohen	میزان آماره معناداری	سطح میزان
۱۱	بررسی تأثیر نالترکسون بر کاهش علایم اختلال وسوسas-اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	آرام حمیدی	دارو درمانی	۱۳۸۵	۱۶	مقیاس بیل برآون	.۰/۶۳	.۰/۰۰۱	
۱۲	بررسی مقایسه‌ای اثربخشی فلوگستین و کلومی پیرامین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	رضا ترک زبان	دارو درمانی با فلوگزتین	۱۳۸۱	۳۰	مقیاس بیل برآون پرسشنامه مادزی	۲/ ۳۳	۸/۳	۰/۰۰۱
۱۳	بررسی مقایسه‌ای اثربخشی فلوگستین و کلومی پیرامین در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	رضا ترک زبان	دارو درمانی با کلومی پیرامین	۱۳۸۱	۳۰	مقیاس وسوسas-جبری بیل برآون پرسشنامه مادزی	۱/۰۸	۸/۳	۰/۰۰۱
۱۴	مقایسه‌ای کارایی فلوگستین و کلومی پیرامین در درمان اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	نصرت الله پور افکاری	دارو درمانی با فلوگزتین	۱۳۸۲	۱۱۰	مقیاس بیل برآون	.۰/۸۲	.۲/۶۲	.۰/۰۱
۱۵	مقایسه‌ای کارایی فلوگستین و کلومی پیرامین در درمان اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	نصرت الله پورافکاری	دارو درمانی با کلومی پیرامین	۱۳۸۲	۱۱۰	مقیاس بیل برآون	.۱/۰۸	.۲/۶۲	.۰/۰۱
۱۶	مقایسه‌ای کارایی فلوگستین و کلومی پیرامین در کودکان و نوجوانان اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	عاطفه سلطانی فر	دارو درمانی با فلوگزتین	۱۳۸۲	۲۶	مقیاس بیل برآون پرسشنامه مادزی	.۰/۸۲	= ۵۳/۵ U	.۰/۰۵۶
۱۷	مقایسه‌ای کارایی فلوگستین و کلومی پیرامین در کودکان و نوجوانان اختلال وسوسas اجباری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	عاطفه سلطانی فر	دارو درمانی با کلومی پیرامین	۱۳۸۲	۲۶	مقیاس بیل برآون پرسشنامه مادزی	.۰/۴۵	= ۵۳/۵ U	.۰/۰۵۶
۱۸	مقایسه کارایی ترکیب فلوگزتین-هالیپریدول با فلوگزتین دارونما در بیماران اختلال وسوسas جبری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	غلامرضا میرسپاسی	دارو درمانی با فلوگزتین	۱۳۸۲	۲۴	مقیاس بیل برآون	.۰/۴۵	گزارش نشده	.۰/۰۵
۱۹	مقایسه کارایی ترکیب فلوگزتین-هالیپریدول با فلوگزتین دارونما در بیماران اختلال وسوسas جبری	بایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی	غلام رضا میرسپاسی	دارو درمانی با فلوگزتین-دارونما	۱۳۸۲	۲۴	مقیاس وسوسas-جبری بیل برآون	.۰/۶۸	گزارش نشده	.۰/۰۵
۲۰	مقایسه اثربخشی روش‌های رفتاری، رفتاری شناختی، رفتاری فراشناختی و دارویی بر عالیم فراسناختی و دارویی بر عالیم وسوسas و باورهای فراشناخت بیماران اختلال وسوسas	دانشگاه اصفهان	ناهید اکرمی	دارو درمانی	۱۳۸۹	۵۲	پرسشنامه مادزی	.۰/۷۰		.۰/۰۵

جدول ۲. نتایج فراتحلیل اثربخشی مداخلات دارویی بر کاهش عالیم OCD

پژوهش	اندازه اثر	Cohen d	سطح معنی‌داری مطالعات	تبديل سطح معنی‌داری به z	تبديل z معنی‌داری ترکیبی
۱	.۰/۶۵	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۲	.۰/۶۵	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۳	.۱/۵۴	.۰/۰۱	۳/۰۹۰		
۴	.۱/۳۹	.۰/۰۰۱	۳/۷۱۹		
۵	.۳/۱	.۰/۰۰۱	۳/۷۱۹		
۶	.۰/۶۳	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۷	.۱/۰۴	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۸	.۰/۶۳	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۹	.۳/۵۶	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۱۰	.۲/۶۸	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۱۱	.۰/۶۳	.۰/۰۰۱	۳/۷۱۹		
۱۲	.۲/۳۳	.۰/۰۰۱	۳/۷۱۹		
۱۳	.۱/۰۸	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۱۴	.۰/۸۲	.۰/۰۱	۲/۳۲۶		
۱۵	.۱/۰۸	.۰/۰۱	۲/۳۲۶		
۱۶	.۰/۸۲	.۰/۰۵۶	.۰/۱۵۱		
۱۷	.۰/۴۵	.۰/۰۵	.۰/۱۵۱		
۱۸	.۰/۴۵	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۱۹	.۰/۶۸	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۲۰	.۰/۶۸	.۰/۰۵	۱/۶۴۵		
۲۱	.۱/۰۴	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۲۲	.۰/۷۰	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
۲۳	.۰/۷۰	.۰/۰۰۱	۳/۰۹۰		
میانگین اندازه اثر	.۱/۱۱				.۰/۰۰۱

یافته‌های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که مداخلات پزشکی و دارو درمانی بر نشانه‌های اختلال وسوسی-اجباری در ایران تأثیر به نسبت بالایی مطابق جدول Cohen (۱/۱۱) دارد. این پژوهشگران اثربخشی مداخلات پزشکی و دارو درمانی را در کنترل و کاهش عالیم این اختلال به نسبت بالا گزارش نموده‌اند. نتایج این پژوهش نیز با فراتحلیل‌های Abramowitz و همکاران (۱۸)، van Balkom و همکاران (۱۹) Eddy و همکاران (۴) همسو بود.

از جمله ویژگی‌های بارز فراتحلیل این است که امکان مقایسه کارایی الگوهای درمانی مختلف را در بافت‌های فرهنگی مختلف فراهم می‌کند. بر اساس یافته این فراتحلیل

بحث و نتیجه‌گیری

اصطلاح فراتحلیل به روش آماری اشاره دارد که در آن اندازه‌های اثر ترکیب می‌شوند تا یک فرضیه پژوهشی خاص آزمون شود. بدین ترتیب می‌توان تعدادی از مطالعات را با استفاده از متغیرهای یکسان انجام داد و نتایج را در درون یک پژوهش واحد ترکیب کرد. چنین یافته‌هایی در جوامعی چون جامعه ما که گوناگونی بیشتری را دارد، مهم‌تر است، چرا که این گوناگونی، تفاوت‌های بیشتری را به همراه دارد. به ناچار باید اطلاعات متعددی را از نمونه‌های مختلف این جامعه، در دست داشت تا با یکپارچه کردن این اطلاعات، شباهت‌ها را به دست آورد و با تفاوت‌ها به طرز مناسبی برخورد کرد.

محدودیت‌های انجام چنین فراتحلیل‌هایی، دسترسی به منابع و پژوهش‌هایی است که در یک حیطه مشخص انجام و منتشر شده‌اند. از این رو مناسب است تا از تکرار موضوعات مختلف استقبال شود تا نمونه‌های بیشتر از جامعه مورد نظر بررسی شوند. همچنین به ندرت پیش می‌آید که یک یک مطالعاتی که در فراتحلیل وارد و تلفیق می‌شوند، همه شاخص‌های لازم برای تحلیل‌ها را گزارش کرده باشند و این جزء محدودیت‌های اساسی در انجام فراتحلیل می‌باشد. امید می‌رود که با تأکید‌ها مبنی بر لزوم گزارش کامل آماره‌های پاره‌ای، گزارش به نسبت دقیق سطح معنی‌داری و نیز برآورد اندازه اثر و همچنین با رواج روز افزون رویکرد فراتحلیلی، حساسیت در چاپ کامل و دقیق یافته‌ها افزایش یابد.

سپاسگزاری

از کلیه همکاران فعال در مراکز اطلاع‌رسانی و کارمندان بخش کتابخانه‌ها کمال تشکر و قدردانی را دارد.

درمان‌گران می‌توانند الگوهای درمانی مناسبی را انتخاب کنند تا نتیجه بهتر و قابل اطمینان‌تری را به دست آورند. در مجموع در تبیین یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت که با توجه به این که نگرش افراد نسبت به درمان دارویی اختلال وسوسات-اجباری منفی است و از طرفی درمان این اختلال در نظریه‌های جدید به صورت ترکیبی (درمان دارویی + مداخلات روان‌شناختی) توصیه شده است، می‌توان هم از درمان دارویی و در کنار آن از مداخلات روان‌شناختی استفاده نمود. از امتیازات این روش بررسی شکاف‌های موجود بین پیشینه موضوعات پژوهشی و مشخص شدن آن که زمینه پژوهش‌های بعدی بهتر است چه چیزی باشد. در نهایت باید در نظر داشت که لازمه انجام فراتحلیل‌های بیشتر در زمینه‌های درمانی مختلف ضروری است. در مجموع نتایج این فراتحلیل نشان داد که درمان دارویی بر کاهش نشانه‌های وسوسات مؤثر بوده است. به عبارت روشن‌تر اندازه اثر مداخلات دارویی بر کاهش نشانه‌های وسوسات مطابق جدول تفسیر Cohen بالا ارزیابی گردید. از

References

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2000.
2. Fisher PL, Wells A. Experimental modification of beliefs in obsessive-compulsive disorder: a test of the metacognitive model. Behav Res Ther 2005; 43(6): 821-9.
3. Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
4. Eddy KT, Dutra L, Bradley R, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy and pharmacotherapy for obsessive-compulsive disorder. Clin Psychol Rev 2004; 24(8): 1011-30.
5. Abramowitz JS. Variants of exposure and response prevention in the treatment of obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. Behavior Therapy 1996; 27(4): 583-600.
6. Farnam A . Imani M, Aliloo MM, Bakhshipoor A,. The comparison of effectiveness exposure-response prevention and fluoxetine in recovery obsessive-compulsive patients. Research on Psychological Health 2008; 1(4): 41-9.
7. Arman S. Comparison effectiveness drug therapy and combin drug and non drug therapy in children and adolescents with obsessive-compulsive referred to psychiatric clinic. Scientific information database. Journal of Isfahan Medical School 2002; 20(67): 40-5.
8. Torkzaban R. Comparison effectiveness of fluoxetine and colompiramin in treatment children and adolescents obsessive-compulsive disorder. Hakim Journal 2002; 5(1): 37-43.
9. Dadfar M. Effects of medication in the chang diagnosis personality disorder of obsessive-compulsive disorder. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2002; 8(29): 76-87.
10. Porafkari N, Nabdel E, Dadashzade J. Comparison effectiveness of fluoxetine and colomepiramin in treatment obsessive-compulsive disorder. Urima Medical Journal 2003; 14(4): 9-15.
11. Mirsepasi GhR, Saliani A. Comparison of efficacy of fluoxetine-haloperidol vs. fluoxetine-placebo in obsessive-compulsive patients. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2003; 8(4): 4-10.

12. Ghoreishi M, Farnam A. The response therapy different types with fluoxetin. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2005; 27(2): 59-62.
13. Hamidi A, Dadfar M, Jahangiry B, Nasr Esfahani M, Dadfar F. The study of the effect of naltrexone on reduction of severity of obsessive-compulsive disorder (OCD). Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2006; 11(2): 78-85.
14. Soltanifar A, Abdollahian E, Nasiraei A. The comparison between fluoxetine and clomipramine in children and adolescents with obsessive - compulsive disorder. Journal of Mashhad Medical School 2007; 97(50): 315-20.
15. Shabani M, Ghoreishi A, Mosavinasab N. Olanzapine augmentation therapy in patients with the obsessive-compulsive disorder resistant to treatment. ZUMS Journal 2009; 17(66): 21-8.
16. Howitt D, Cramer D. Introduction to statistics in psychology. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall; 2004.
17. Duval S, Tweedie R. Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics 2000; 56(2): 455-63.
18. van Balkom AJ, de HE, van OP, Spinhoven P, Hoogduin KA, van DR. Cognitive and behavioral therapies alone versus in combination with fluvoxamine in the treatment of obsessive compulsive disorder. J Nerv Ment Dis 1998; 186(8): 492-9.
19. Abramowitz JS. Effectiveness of psychological and pharmacological treatments for obsessive-compulsive disorder: a quantitative review. J Consult Clin Psychol 1997; 65(1): 44-52.

A meta-analysis on the effectiveness of drug therapy in improving obsessive-compulsive disorder symptoms

Mahboobeh Kiani¹, Ahmad Abedi², Salar Faramarzi²

Abstract

Aim and Background: In recent years, experts in the field of obsessive-compulsive disorder have been trying to measure the validity and efficiency of pharmaceutical interventions. The meta-analysis evaluated the effectiveness of medication on symptoms of patients with obsessive-compulsive disorder.

Methods and Materials: This meta-analysis was conducted on studies during the past decade in Iran. Therefore, 20 studies which have been conducted with approved and accurate methodology during the past 10 years were selected and divided into control and experimental groups. They were then investigated based on the meta-analysis method. The research tool was the meta-analysis checklist.

Findings: The effect size of pharmaceutical treatment on reducing obsessive-compulsive symptoms was $d = 1.11$ ($P \leq 0.001$).

Conclusions: According to Cohen's power table for effect size, the effect size of pharmaceutical treatment on reducing symptoms of obsessive-compulsive disorder was high.

Keywords: Meta-Analysis, Obsessive-Compulsive Disorder, Pharmaceutical Intervention, Effect Size, Cohen.

Type of article: Original

Received: 17.09.2011

Accepted: 02.04.2012

1. Master of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Email: mahboobekhani@yahoo.com

2. Assistant Professor, School of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.