

## مقایسه دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی برای گوسفند در مرتع نیمه‌استپی استان فارس

سید محمد رضا حبیبیان<sup>۱\*</sup>، حسین ارزانی<sup>۲</sup>، سید اکبر جوادی<sup>۳</sup> و سید حمید حبیبیان<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۱/۴ – تاریخ پذیرش: ۸۹/۳/۲۴

### چکیده

آگاهی از ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی در برآورده تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است. به همین منظور در این تحقیق با استفاده از دو روش مشاهده مستقیم زمان‌سنجه (فیلمبرداری) و (لقمه‌شماری) در مرتع نیمه‌استپی استان فارس در سال ۱۳۸۸ ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی تعیین و با هم مقایسه شدند. در هر روش با به کارگیری ۳ رأس گوسفند در زمان‌های ۹ و ۱۱ صبح و ۴ بعد از ظهر در ماههای فصل چرا رکورددگیری انجام شد. داده‌های هر روش به طور جداگانه با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه دو روش از شیوه تجزیه واریانس مرکب استفاده شد. نتایج نشان داد که در دو روش مورد بررسی برای گوسفند از نظر ارزش رجحانی گونه‌ها در ماههای مختلف فصل چرا و همچنین تکرارهای فیلمبرداری و لقمه‌شماری تفاوت معنی‌داری در سطح ۱ درصد ( $p < 0.01$ ) وجود دارد.

**واژه‌های کلیدی:** ارزش رجحانی، لقمه‌شماری، مشاهده مستقیم، زمان‌سنجه، گوسفند

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، \*: نویسنده مسئول: Habibian658@yahoo.com

۲- استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

۳- استادیار دانشکده منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

۴- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان

نzedیک است. دلاوری‌پور (۲۰۰۵) به مقایسه خوشخوارکی چند گونه مهم مرتعی منطقه دربید یزد در رابطه با چرای گوسفند و بز پرداخت. نتایج نشان داد گوسفند بیش از ۹۲/۳۵ درصد زمان چرای خود را روی گونه‌های شاخص و نیز لاشبرگ متتمرکز کرده است. یکساله‌ها در جایگاه دوم و گونه غالب *Artemisia sieberi* و گونه همراه *Salsola rigida* در جایگاه سوم قرار گرفتند. علاوه بر ذاته گوسفند، تولید، درصد حضور گیاهان در ترکیب، نحوجه پراکنش و میزان دسترسی دام به گیاه هم در این زمینه مهم است و مشخص شد که درصد مصرف گونه‌های مختلف برای گوسفند و بز در یک سطح خوشخوارکی قرار دارد. تنها گونه *Launea acanthodes* برای بز و لاشبرگ آن برای گوسفند از خوشخوارکی بالاتری برخوردارند. تفاوت معنی‌داری بین چرای دام در صبح و بعد از ظهر دیده نشد. رنجبری و همکاران (۲۰۰۵) در سه منطقه از شهرستان سمیرم ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی در سه مرحله از فصل چرا با استفاده از گوسفند و بز به روش زمانی را تعیین کردند. براساس نتایج این تحقیق، بین گوسفند و بز در انتخاب گونه‌ها تفاوت آماری وجود داشت. در ابتدای فصل چرا همیستگی شدید درصد پوشش و ترجیح گونه‌ها توسط دام وجود دارد. همچنین گونه‌های همراه، مراحل مختلف چرا، نوع دام اثر بسیار معنی‌داری بر میزان ترجیح یک گونه دارد. در ابتدای فصل با توجه به حضور گونه‌های خوشنخوارک و متنوع، دام از انتخاب بیشتری برخوردار است و پس از گذشت مراحل فنولوژیک گیاه و کاهش علوفه در مرتع، تعداد انتخاب دام از علوفه کاهش می‌یابد. نکته دیگر صرف زمان بیشتر برای انتخاب یک گونه در گوسفند نسبت به بز است. تفاوت ارزش رجحانی گونه‌های مشترک در هر منطقه می‌تواند به دلیل وجود گونه‌های همراه باشد. احمدی و همکاران (۲۰۰۰) تعیین رفتار چرایی دام و ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی را برای سنتین مختلف میشانند نزدی زندی در مراتع بیابانی و استپی قم بررسی کردن و نتیجه گرفتند که با استفاده از روش‌های مشاهده مستقیم (فیلمبرداری) و وزنی (درصد بهره‌برداری)، در طول فصل چرا، در مرتع قشلاقی

## مقدمه

از بین روش‌های تعیین ارزش رجحانی، روش زمان‌سنجی (کورونومتر) و وزنی (کافه‌تریا) از قدمت زیادی برخوردار است، ولی استفاده از دو روش زمان‌سنجی (ویدیویی) و مشاهده مستقیم چرا با شمارش تعداد لقمه، تقریباً جدید بوده و لازم است بر روی گونه‌های مرتعی در مناطق مختلف انجام شود. همچنین مقایسه بین این دو روش و نتایج به دست آمده از این تحقیق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ضمن تعیین ظرفیت چرا و علوفه قابل دسترسی دام از نظر علمی و عملی می‌تواند مرتعداران، مدیران و برنامه‌ریزان را در جهت ارزیابی کیفی مرتع راهنمایی و زمینه را برای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار و مستمر از مرتع فراهم سازد. در ایران تحقیقات زیادی روی ارزش رجحانی و نیز رفتار چرایی دام در مرتع وجود ندارد. دفتر فنی مرتع (۲۰۰۰) در کتابچه کد گیاهان مرتعی، ارزش علوفه‌ای و مرتعی هر گونه را در ۳ گروه طبقه‌بندی کرده است. بدین صورت گونه‌هایی که در طبقه I قرار دارند، از نظر مرتعداری و خوشخوارکی بر سایرین برتری دارند و گونه‌های طبقه II، ارزش متوسط و بالاخره طبقه سوم III که گیاهان کم ارزش با خوشخوارکی پایین را شامل می‌شود.

اخوت (۱۹۹۹) به منظور بررسی رجحان گونه‌های شورپسند مرتع گمیشان و اینچه‌برون از دو روش وزنی (کافه‌تریایی) و ویدیویی استفاده کرد. نتایج نشان داد که در بهار، گندمیان از ارجحیت بالاتری نسبت به دیگر گونه‌ها برخوردارند. در فصل پاییز در صورت وجود گندمیان تازه سبز شده دام رغبتی به خوردن جنس‌های *Halostachys*, *Halocnemum*, *Pterosimonia*, *Salicornia* (در زمان گلدنه) از خود نشان نمی‌دهد، ولی همزمان با خشکشدن این گیاهان (بذردهی) رغبت دام نسبت به تعلیف این گونه‌ها زیادتر می‌شود. از لحاظ مدت زمان تعلیف گونه *P. brachiata* از دی‌ماه و گونه *H. strobilaceum* در بهمن ماه دارد. در ارزیابی دو روش ویدیویی و کافه‌تریا به نظر رسید که روش ویدیویی برای گوسفند بهتر از روش وزنی است. با وجود این نتایج دو روش تا اندازه‌ای به هم

*Lolium* خوشخوارکی را داشت و به دنبال آن گونه‌های *Lplium hybridum*, *Phleum pratensis*, *prenne* و *Festuca arundinacea* بیشترین خوشخوارکی را داشتند.

### مواد و روش‌ها

منطقه مورد بررسی در استان فارس بین طول‌های ۵۲ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی و عرض‌های ۲۹ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه شمالی در فاصله ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان شیراز واقع شده است. وسعت آن ۲۴۰۰ هکتار و جزو مراتع بیلاقی عشاپری محسوب می‌شود. این منطقه در محدوده رویشگاه‌های نیمه‌استپی قرار دارد و دامنه ارتفاعی آن بین ۱۶۵۰ تا ۲۳۰۰ متری از سطح دریاست. اقلیم منطقه براساس روش دومارتن تصحیح شده در محدوده مدیترانه‌ای معتدل قرار دارد. مدت بهره‌برداری از مراتع ۴ ماه از نیمة اردیبهشت لغایت نیمة شهریور، تعداد بهره‌بردار ۱۲ خانوار و تعداد دام مجاز ۱۸۰۰ رأس است. سیستم چرا روزانه و دام غالب منطقه گوسفند است. بررسی منحنی آمبروترومیک ۳۰ ساله در منطقه مورد مطالعه نیز نشان‌دهنده آن است که وضعیت رطوبت در ماه‌های آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین بالاست، به طوریکه طول فصل مرطوب ۵ ماه (نوسانات آن بین ۷۸ تا ۲۸ میلی‌متر) و فصل خشک ۷ ماه و میزان بارندگی ۳۱۵/۷ میلی‌متر و دمای متوسط ۱۸/۲ درجه سانتی‌گراد است. بررسی منحنی آمبروترومیک سال بررسی نشان‌دهنده آن است که وضعیت رطوبت در ماه‌های آبان، دی، بهمن و فروردین بالاست، به طوریکه طول فصل مرطوب ۴ ماه (نوسانات آن در آبان، دی و بهمن ماه بین ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر) و در فروردین ماه حدود ۶۳ میلی‌متر) و فصل خشک ۸ ماه و بارندگی ۱۷۵/۳ میلی‌متر و دمای متوسط ۱۸/۶ درجه سانتی‌گراد است.

در روش زمانسنجی (فیلمبرداری با دوربین)، برداشت اطلاعات در ۴ دوره چرایی از ۳ رأس گوسفند به مدت ۴ ماه (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) انجام شد. این دامها در گله علامت‌گذاری و در یک دوره زمانی ۳۰

(حوض سلطان)، گونه‌های *Tamarix passerinoides* و *Buffunia macrocarpa*, *Alhagi camelorum* گونه‌های یکساله، بیشترین شاخص رجحان را برای دام داشته‌اند. اسمیت و کوبر<sup>۱</sup> (۱۹۵۴)، با استفاده از روش‌های کافه‌تریا و کورنومتر خوشخوارکی گیاهان مرتعی شمال یوتا را برای گوزن آزمایش و این دو روش را با یکدیگر مقایسه کردند و اظهار داشتند که همبستگی اطلاعات (رتبه‌های) دو روش تقریباً طبقات خوشخوارکی مشابهی را برای گونه‌های مورد آزمایش به دست می‌دهند. بوکتر و بوروس<sup>۲</sup> (۱۹۶۲)، طی تحقیقی روش مشاهده مستقیم (روش زمانی) را با روش درصد بهره‌برداری مقایسه و نتیجه‌گیری کردند که روش‌های مذکور نتایج تقریباً یکسانی ارائه می‌دهند و اختلاف بین آنها معنی دار نیست. فراسور و همکاران<sup>۳</sup> (۱۹۷۹)، در روشی با شمارش تعداد دفعات گاز زدن توسط دام از هر گونه گیاهی، خوشخوارکی را تعیین کرد. آنها در این بررسی با قرارگرفتن در فاصله ۱-۴ متری هر دام تعداد گاز از هر گونه را ثبت کردند. البته لازم به ذکر است که از قبل فهرست گیاهان منطقه آماده شده بود و در انتهای درصد استفاده از هر گونه را با در نظر داشتن کل تعداد گاز برای هر گونه محاسبه کردند. در این روش بهتر است داده‌ها بر روی نوار کاست ضبط شود و نکته دیگر اینکه این کار باید توسط یک نفر از آغاز تا پایان انجام شود. لوسيجی و همکاران<sup>۴</sup> (۱۹۸۴)، خوشخوارکی گیاهان بومی شمال کنیا را به روش زمانی مورد مطالعه قرار دادند و به نتایج زیر دست یافتند: گندمیان یکساله همچون *Aristida sp.* بخشی از جیره غذایی گاو و گوسفند را شامل می‌شوند. *Eragrostis sp.*, *Digitaria velutina*, *Digitaria sp.* هم برای گاو و هم برای گوسفند خیلی مطلوب‌اند. هانت<sup>۵</sup> (۱۹۹۴)، ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی مرتعی را برای گوساله‌های شیری در نیوزلند ارزیابی کرد. بالاترین درجه گونه *Dactylis glomerata*

1-Smith & Cooper

2-Buckner & Burrus

3-Frasure

4-Lusigi

5-Hunt

بین گونه های مرتتعی در روش زمان سنجی برای گوسفند در دوره های مختلف فصل چرا تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ( $p < 0.05$ ) وجود دارد، به طور یکم، در دوره چرایی خرداد ماه، گونه های گندمیان *I* یکساله و پهنه برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس *I* گونه های *Achillea eriophora* و *Teucrium polium* دارای ارزش رجحانی کلاس *II* و گونه های *Dianthus crinitus*, *Bromus tomentellus*, *Astragalus rhodosemious*, *Phlomis olivieri* دارای ارزش رجحانی کلاس *III* هستند. در دوره چرایی تیر ماه، گونه های گندمیان یکساله و پهنه برگان علفی ارزش رجحانی کلاس *I*, گونه های *Achillea*, *Bromus* و *Teucrium polium*, *eriophora* دارای ارزش رجحانی کلاس *II* و گونه های *Dianthus crinitus* و *Astragalus susianus* ارزش رجحانی کلاس *III* دارند. در دوره چرایی مرداد ماه، گونه *Bromus tomentellus* ارزش رجحانی کلاس *I*, گونه های گندمیان یکساله و پهنه برگان علفی ارزش رجحانی کلاس *II* و بقیه گونه ها ارزش رجحانی کلاس *III* دارند. در دوره چرایی شهریور ماه، گونه های گندمیان یکساله و پهنه برگان علفی ارزش رجحانی کلاس *I*, گونه *Bromus tomentellus* ارزش رجحانی کلاس *II* و بقیه گونه ها ارزش رجحانی کلاس *III* دارند (جدول ۲).

نتایج تجزیه واریانس در روش زمان سنجی نشان داد که بین گونه های مختلف مورد چرا، از نظر ارزش رجحانی برای گوسفند در هر تکرار و همچنین بین تکرارهای مختلف فیلمبرداری (۹ صبح، ۱۱ صبح و ۴ عصر) تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) وجود دارد (جدول ۳).

دقیقه های در سه تکرار در روز (ساعت های ۹ صبح، ۱۱ صبح و ۴ عصر) فیلمبرداری انجام و با انتقال به کامپیوتر مدت زمان چرا از هر گونه معین و برس حسب زمان صرف شده ارزش رجحانی گونه ها، در هر ماه و در پایان فصل چرا مشخص شد. در روش مشاهده مستقیم (لقمه شماری) برداشت اطلاعات در ۴ دوره چرایی از ۳ رأس گوسفند به مدت ۴ ماه (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) در گله این دامها علامت گذاری و در یک دوره ۹ زمانی ۱۵ دقیقه های در سه تکرار در روز (ساعت های ۹ صبح، ۱۱ صبح و ۴ عصر) به طور مشاهده ای تحت تعقیب قرار گرفتند. تعداد لقمه های خورده شده توسط هر نوع دام از گونه های مختلف مرتتعی شمارش و ثبت شد. بعد از مرتب کردن داده ها در Excel ابتدا آنها از نظر فرض های تجزیه واریانس همچون نرم افزار بودن داده ها، همگنی واریانس ها و جمع بذیری کنترل شدند. سپس SPSS تجزیه واریانس با استفاده از نرم افزارهای SAS و SAS انجام شد. در صورت معنی دار بودن تفاوت ها مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. در مورد صفات درصد زمان صرف شده از گونه و درصد شدت لقمه گیری به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل شدند.

## نتایج

نتایج تجزیه واریانس در روش زمان سنجی نشان داد که بین گونه های مختلف موردن چرا، از نظر ارزش رجحانی برای گوسفند در هر دوره چرایی (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) و همچنین بین دوره های چرایی تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) وجود دارد (جدول ۱).

جدول ۱- تجزیه واریانس بین گونه ها از لحاظ مدت زمان صرف شده برای گوسفند در دوره های مختلف چرایی در روش زمان سنجی

ماه های فصل چرا						نوع دام	منابع تغییر	ارزش رجحانی گونه	گوسفند
شهریور	مرداد	تیر	خرداد	درجه آزادی	تفاوت در سطح یک درصد معنی دار است.				
**۲۶۸۳۰	**۲۳۰۹۰	**۲۵۵۶۳	**۱۵۶۶۹	۳۱	**				

جدول ۲- مقایسه میانگین گونه‌ها از لحاظ مدت زمان صرف شده برای گوسفند در دوره‌های مختلف چرایی به روش زمان‌سنجی\*

شهریور	مرداد			تیر			خرداد			گونه
	کلاس ارزش رجحانی	مدت زمان (ثانیه)	کلاس ارزش رجحانی							
-	-	III	۱۳ d	III	۲۸ cd	III	۵۰/۳ c	Dianthus crinitus		
III	۱۱۸/۷ c	III	۱۴۵/۷c	III	۴۷ cd	-	-	Astragalus susianus		
I	۴۸۶ a	II	۲۸۹ b	I	۴۹۱/۷ a	I	۳۶۲/۳ a	Annual Grasses+Forbs		
III	۸۹/۷ c	III	۲۷/۳ d	II	۹۳/۷ bc	II	۱۶۴/۳ b	Achillea eriophora		
II	۲۱۷/۷ b	I	۴۰۱ a	II	۱۵۶/۳ b	III	۴۷ c	Bromus tomentellus		
III	۶۳/۳ c	-	-	II	۱۴۲ b	II	۱۵۲/۳ b	Teucrium polium		
-	-	-	-	-	-	۶	۴۲ c	Picris strigosa		

\*: بقیه گونه‌ها تا ۳۲ گونه، مدت زمان مصرف از هر گونه جنابه زیر ۲۰ ثانیه بود، حذف شده است.

جدول ۳- تجزیه واریانس بین گونه‌ها از لحاظ مدت زمان صرف شده برای گوسفند در تکرارهای مختلف فیلمبرداری در روش زمان‌سنجی

تکرارهای فیلمبرداری		نوع دام	منابع تغییر	درجه آزادی	ساعت ۹ صبح	ساعت ۱۱ صبح	ساعت ۴ عصر
گوسفند	ارزش رجحانی گونه	**۲۱۵۲۴	**۴۲۰۹۲	**۱۸۶۶۵	۳۱	**۲۱۵۲۴	**۴۲۰۹۲

\*\*: تفاوت در سطح یک درصد معنی دار است.

نتایج نشان داد، بین گونه‌های مرتعی در روش لقمه‌شماری برای گوسفند در دوره‌های مختلف فصل چرا تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ( $p < 0.05$ ) وجود دارد، به طوریکه در دوره چرایی خرداد ماه، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های Achillea eriophora دارای ارزش رجحانی کلاس II، گونه‌های Bromus tomentellus و Phlomis olivieri دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در دوره چرایی تیر ماه، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های Bromus tomentellus و Achillea eriophora دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در دوره چرایی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی و مرداد ماه، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی و همچنین گونه Bromus tomentellus دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های Achillea eriophora دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در دوره چرایی شهریور ماه، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های Astragalus cephalanthus دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در دوره چرایی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند (جدول ۴).

بین گونه‌های مرتعی در روش زمان‌سنجی برای گوسفند در تکرارهای مختلف فیلمبرداری تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ( $p < 0.05$ ) وجود دارد به طوری که، در تکرار ساعت ۹ صبح، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I گونه‌های Achillea eriophora و Teucrium polium دارای ارزش رجحانی کلاس II و Astragalus susianus دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در تکرارهای ساعت ۱۱ صبح و ۴ عصر، گونه‌های گندمیان یکساله و پهن برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های Bromus tomentellus دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند (جدول ۴). نتایج تجزیه واریانس در روش لقمه‌شماری نشان داد که بین گونه‌های مختلف مورد چرا، از نظر ارزش رجحانی برای گوسفند در هر دوره چرایی (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) و همچنین بین دوره‌های چرایی تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) وجود دارد (جدول ۵).

تکرارهای مختلف لقمه شماری (۹ صبح، ۱۱ صبح و ۴ عصر) تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) وجود دارد (جدول ۷).

نتایج تجزیه واریانس در روش لقمه شماری نشان داد که بین گونه های مختلف مورد چرا، از نظر ارزش رجحانی برای گوسفند در هر تکرار و همچنین بین

جدول ۴- مقایسه میانگین بین گونه ها از نظر مدت زمان صرف شده برای گوسفند در تکرارهای مختلف فیلمبرداری در روش زمان سنجی\*

گونه	ساعت ۹ صبح						ساعت ۱۱ صبح	ساعت ۴ عصر
	کلاس ارزش	مدت زمان	کلاس ارزش	مدت زمان	کلاس ارزش	مدت زمان		
	رجحانی	(ثانیه)	رجحانی	(ثانیه)	رجحانی	(ثانیه)		
I	۳۲۷ a	I	۵۴۶/۷ a	I	۳۴۸ a	Annual Grass+Forb		
II	۲۴۰/۷ b	II	۲۰۴ b	II	۱۷۱/۷ b	<i>Bromus tomentellus</i>		
III	۱۱۶/۲ c	III	۹۱/۵ c	II	۷۳/۵ bc	<i>Achillea eriophora</i>		
III	۷۴/۵ cd	III	۸۰ cd	II	۷۹ bc	<i>Astragalus susianus</i>		
III	۱۱۳/۵ c	III	۸۴/۲ c	II	۷۳ bc	<i>Teucrium polium</i>		
III	۱۳/۲ d	III	۹۰/۷ c	III	۴۰ c	<i>Phlomis olivieri</i>		

\*: بقیه گونه ها تا ۳۲ گونه، مدت زمان صرف از هر گونه چنانچه زیر ۲۰ ثانیه بود، حذف شده است.

جدول ۵- تجزیه واریانس بین گونه ها از لحاظ تعداد لقمه استفاده برای گوسفند در ماه های مختلف فصل چرا در روش لقمه شماری

ماه های فصل چرا						نوع دام	منابع تغییر	درجه آزادی
شهریور	مرداد	تیر	خرداد	ارزش رجحانی گونه	گوسفند			
۲۳۰ **	۳۳۳ **	۳۲۴ **	۳۰۷ **	۳۴	**			

\*\*: تفاوت در سطح یک درصد معنی دار است.

جدول ۶- مقایسه میانگین بین گونه های مرتعی از لحاظ تعداد لقمه برای گوسفند در ماه های مختلف فصل چرا به روش لقمه شماری\*

گونه	خرداد						تیر	مرداد	شهریور
	کلاس	کلاس	کلاس	کلاس	کلاس	کلاس			
	ارزش	ارزش	ارزش	ارزش	ارزش	ارزش			
I	۲۲/۴ a	I	۲۵/۲ a	I	۲۷/۴ a	I	۳۰/۷ a	Annual Grass+Forb	
-	-	II	۷/۹ b	II	۱۴/۹ b	II	۱۴/۱ b	<i>Achillea eriophora</i>	
III	۷/۱ c	I	۲۵ a	II	۱۷ b	III	۹/۸ c	<i>Bromus tomentellus</i>	
-	-	III	۴/۶ cd	III	۹/۶ c	III	۷/۳ cd	<i>Teucrium polium</i>	
-	-	-	-	III	۷/۱ cd	III	۵/۶ de	<i>Astragalus ephalanthus</i>	
-	-	-	-	III	۶/۶ d	III	۵/۱ def	<i>Dianthus crinitus</i>	
-	-	-	-	-	-	III	۳/۳ efg	<i>Marrobiuum sp.</i>	
II	۱۱/۸ c	-	-	-	-	-	-	<i>Astragalus susianus</i>	

\*: بقیه گونه ها تا ۳۴ گونه، تعداد لقمه کمتر از ۳ حذف شده است.

جدول ۷- تجزیه واریانس بین گونه ها از نظر تعداد لقمه استفاده برای گوسفند در تکرارهای مختلف در روش لقمه شماری

نوع دام	درجه آزادی						منابع تغییر	ساعت ۹ صبح	ساعت ۱۰ صبح	ساعت ۴ عصر				
	ارزش رجحانی گونه	گوسفند	تکرارهای لقمه شماری											
			تکرارهای لقمه شماری	ساعت ۹ صبح	درجه آزادی	تکرارهای لقمه شماری								
				۳۹۶ **	۲۶۳ **	۳۴۳ **								

\*\*: تفاوت در سطح یک درصد معنی دار است.

لقمه شماری تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد (۰/۰۵) وجود دارد به طور یکم، در تکرار ساعت ۹

بین گونه های مرتعی از نظر ارزش رجحانی در روش لقمه شماری برای گوسفند در تکرارهای مختلف

گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند (جدول ۸).

**مقایسه دو روش تعیین ارزش رجحانی**  
با استفاده از روش تجزیه واریانس مرکب تفاوتی بین دو روش زمان‌سنجی و لقمه‌شماری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) به دست نیامد (جدول ۹).

صبح، گونه‌های گندمیان یکساله و پهنه برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه‌های *Achillea*, *Bromus*, *Teucrium polium*, *eriophora* دارای ارزش *Astragalus susianus* و *tomentellus* رجحانی کلاس II و بقیه گونه‌ها دارای ارزش رجحانی کلاس III هستند. در تکرارهای ساعت ۱۱ صبح و ۴ عصر، گونه‌های گندمیان یکساله و پهنه برگان علفی دارای ارزش رجحانی کلاس I، گونه *Bromus* دارای ارزش رجحانی کلاس II و بقیه *Astragalus susianus* و *tomentellus*

جدول ۸- مقایسه میانگین بین گونه‌ها از نظر تعداد لقمه استفاده شده برای گوسفند در تکرارهای لقمه شماری\*

	کلاس ارزش رجحانی	تعداد لقمه	کلاس ارزش رجحانی	تعداد لقمه	ساعت ۱۱ صبح		ساعت ۶ صبح		گونه
					ساعت ۴ عصر	ساعت ۱۱ صبح	تعداد لقمه	رجحانی	
I	۲۴/۲	a	I	۳۰/۸	a	I	۲۴/۲	a	<i>Annual Grass+Forb</i>
II	۲۰/۷	b	II	۱۳	b	II	۱۰/۴	b	<i>Bromus tomentellus</i>
III	۷/۸	c	III	۱۰/۱	c	II	۹/۸	bc	<i>Ach ilea eriophora</i>
III	۵/۸	cd	III	۵/۲	de	II	۷/۶	bc	<i>Astragalus susianus</i>
-	-	-	III	۶/۲	d	II	۷	c	<i>Teucrium polium</i>
III	۳	efg	III	۳/۸	df	III	۳/۸	d	<i>Dianthus crinitus</i>

\* بقیه گونه‌ها تا ۳۴ گونه، تعداد لقمه کمتر از ۳ حذف شده است.

جدول ۹- تجزیه واریانس بین روش زمان‌سنجی و لقمه‌شماری

روش‌ها	نحوه تفاوت در سطح یک درصد معنی‌دارنیست.	منابع تغییر درجه آزادی	میانگین مریعات
۲	ns	۴۲۴/۰	

ns: نتوایت در سطح یک درصد معنی‌دارنیست.

گونه‌های گندمیان و پهنه برگان علفی از گونه‌هایی هستند که در منطقه مورد بررسی به دلیل تحول خاص آب و هوایی سال بررسی (۲۰۰۹) از جمله خنکی هوا و وقوع بارش ۶۳ میلی متری در ۱۶ فروردین ماه باعث شد که سیمای ظاهری منطقه را به شدت تغییر دهد، به طوریکه این گونه‌ها مورد انتخاب و گزینش دام قرار گیرد. این گروه گیاهی در تمام دوره‌های چرایی ارزش رجحانی بالایی نسبت به سایر گونه‌های مرتعی دیگر حتی در حالت سبز دارد. البته لازم به توضیح است که این منطقه در فصل خشک مورد استفاده دام‌های عشاپری قرار می‌گیرد و تاریخ ورود دام به منطقه

**بحث و نتیجه‌گیری**  
به طور کلی نتایج به دست آمده از این تحقیق، نشان‌دهنده تغییرات ارزش رجحانی هر یک از گونه‌های مورد چرای گوسفند در هر دوره چرایی به تفکیک و همچنین در میان دوره‌های چرایی مختلف (ماههای فصل چرا) و در هر تکرار فیلمبرداری یا لقمه‌شماری به تفکیک و همچنین در میان تکرارهای رکورددگیری در دو روش زمان‌سنجی (فیلمبرداری) و لقمه‌شماری است. البته این تغییرات در منطقه مورد بررسی ممکن است به دلیل تنوع گونه‌ای زیاد باشد که به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:

تجزیه واریانس مرکب به ما کمک می کند که کدام روش بهتر است. بنابراین روش لقمه شماری بهدلیل نیاز به تجهیزات کم، سریع بودن و سادگی بر روشن زمان سنجی ترجیح دارد. محدودیت این روش شناسایی دقیق گونه های مرتعی، ممارست و انس گرفتن با گله دام مورد بررسی و همچنین تکرار بیشتر رکوردهای میباشد. ضمناً در مراتع قابل اجراء است که بیشتر بوتهزار باشد تا علفزار. بعد از آن روش زمان سنجی بهدلیل دقیق زیاد، سهولت کار و امکان کار بیشتر بعد از فیلمبرداری و تکرار عملیات به وسیله کامپیوتر علیرغم وقت گیری و هزینه بیشتر نسبت به روش لقمه شماری قابل توصیه است. این یافته با نتایج مارتون و همکاران (۱۹۸۷) و همچنین باکتر و همکاران (۱۹۶۲) مطابقت دارد.

با نظر به نتایج این تحقیق به طور کلی می توان گفت استفاده از روش زمان سنجی بهدلیل عینی و ملموس بودن نتایج، در خصوص تعیین ارزش رجحانی و میزان بهره برداری از گونه های گیاهی، نتایج واقعی تری نسبت به روش های دیگر ارائه می کند که این امر با نتایج صادقی (۱۹۹۲)، اخوت (۱۹۹۹) و باقری (۲۰۰۷) مطابقت دارد.

مصادف با سپری شدن مراحل فنولوژی گونه های یکساله بود و در تمام دوره های چرایی به صورت خشک مورد چرای گوسفند واقع شده است. در روش زمان سنجی در مورد گوسفند بین گونه های مختلف از نظر مدت زمان صرف شده برای چرا در دوره های مختلف چرایی تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) به دست آمد. این یافته با نتایج باگستانی (۲۰۰۳) همخوانی دارد. همانطور که در قسمت نتایج ذکر شد، بین دو روش زمان سنجی (فیلمبرداری) و لقمه شماری از لحاظ تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی هیچگونه تفاوت معنی داری در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) مشاهده نشد. نتایج فوق با نتایجی که دکاندیا و همکاران (۲۰۰۵) در بوتهزارهای مدیترانه ای کشور اسپانیا بر روی مقدار مصرف علوفه توسط بزرگواری و به رابطه رگرسیونی قوی بین میزان مصرف واقعی علوفه و میزان مصرف علوفه برآورده از روش مشاهده مستقیم دست یافتند، مطابقت دارد. باکتر (۱۹۶۲) طی تحقیقی، روش مشاهده مستقیم (روشن زمانی) را با روش درصد بهره برداری مقایسه و نتیجه گرفت که روش های مذکور نتایج یکسانی ارایه می دهند. معنی دار نشدن تفاوت بین دو روش مورد بررسی در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) در

## منابع

1. Ahmadi, A., 2009. Determination of grazing behavior and range plants performance for different ages of zandi race ewes in desert and steppe rangelands of Qom, Ph.D Thesis of range management, Islamic Azad University, branch of science and research, p. 187. (In Persian)
2. Ahmadi, A., H. Arzani & M. Jafari, 2005. Determination and Composition of Forage Quality of Five Species in Different Phenological Stage in Alborz Rangelands (IRAN). Proceeding of the XX Internatinal Grassland Congress, Dublin, Ireland, p. 292. (In Persian)
3. Arzani, H.M. Zohdi, E. Fish, G.H. Zahedi Amiri, A. Nikkhah & D. Wester, 2004. Phenological effect on forage quality of five grass species. J. of Range Management, 57(6): 624-630.
4. Baghestani Meybodi, N., 2003. Investigation of short time effects of different goat grazing intensities on some vegetation characteristics and animal performance in steppe rangelands of Yazd, Ph.D Thesis of range management, University of Tehran. (In Persian)
5. Buckner, R.C., & P. Burrus, 1962. Comparison of techniques for evaluating palatability differences among tall fescue strains. J. Crop Science, 2(1): 55-57.
6. Decandia, M., G. Pinna, A. Cabiddu & G. Moll, 2005. Intake by lactating goats browing on palatability mediterranean shrubland. XX international Grassland Congress. 540 p.
7. Delavaripour A., 2005. Comparison of palatability of some important range spicies in Darbid (Yazd) In relation to sheep and goat grazing, M.sc Thesis of range management, Islamic Azad University, branch of science and research. (In Persian)
8. Frasure, J.R., 1979. The Effect of Three Grazing Management Systems on Cattle Diets on the Welder Wildlife Refuge. MSc. Thesis . Texas Tech Univ., Lubboke, Tex.

9. Holecheck, J.L.D.R. Piper, C.H. Herbal. 1989. Range Management Principles and Practice-Hall, Inc. U.S.A.
10. Hunt, W.F. & R.J.M. Hay, 1990. A photographic technique for assessing the pasture species preference of grazing animals. Proceedings of the New Zealand Association, 51: 191-196.
11. Lusigi, W.J., E.R. Nkuruziza, & S. Masheti, 1984. Forage Preferences of livestock in the arid lands of northern Kenya J. Range Manage. 37(6): 542-548.
12. Marten. G.C., C.C. Sheaffer, & D.L. Wyse, 1987. Forage nutritive value and palatability of perennial weeds. Agronomy J., 79(6): 980-986.
13. Okhovvat, M.S., 1999. Preference value of halophyte range plants of Gorgan and Gonbad, Final report of research plan, natural resources research centre of Golestan Province. (In Persian)
14. Rangbari, A., M.R. Ardakani & M. Jowhari, 2005. Studying of Grazing behavior of sheep and goat during grazing season in Semirom rangelands, proceedings of second seminar of sheep and goats of Iran. (In Persian)

Archive of SID

## Comparison of two methods of preference value determination of plant species for sheep in semi-steppe rangelands in Fars province

S.M.R. Habibian<sup>1\*</sup>, H. Arzani<sup>2</sup>, S.A. Javadi<sup>3</sup> & S.H. Habibian<sup>4</sup>

Received: 24 January 2010, Accepted: 14 June 2010

### Abstract

Rangeland species preference is important due to their role in forage production estimation, that is, available forage of rangeland depends on plants preference. In this study two methods of determination of the preference value, direct time observation (DTO) and bite count (BC) in semi-steppe rangelands of Fars province was compared in 2009. In each of DTO and BC methods, 3 sheep were used to do grazing at 9 and 11 A.M and 4 P.M in four grazing periods. Time of consumption and number of bites for plant species were recorded, respectively. Data were analyzed by factorial experiment in CRD. Comparison of two methods was performed by Anova. The results showed that preference values obtained from DTO and BC for grazed species by sheep were significantly different ( $p<0.01$ ).

**Keywords:** Preference value, Bite count, Direct observation, Sheep.

1 -M.Sc Student of Range Management, Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU)  
\*: Corresponding author: habibian658@yahoo.com

2 - Professor, Natural Resources Faculty, University of Tehran

3- Assistant Prof., Natural Resources Faculty, Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU)

4- Assistant Prof., Islamic Azad University Arsenjan (IAUA)