

## بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های *Ferula ovina* و *Ferula gummosa* در مراتع کوهستانی

شیلاندر زنجان

فرهاد آقاجانلو<sup>۱</sup> و اردوان قربانی<sup>۲\*</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳      تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰

### چکیده

این مطالعه در مراتع شیلاندر زنجان به منظور بررسی تأثیر برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه‌های *Ferula gummosa* و گونه‌های همراه انجام شد. بدین منظور، نمونه‌برداری از دو رویشگاه با حضور و از دو رویشگاه با عدم حضور گونه‌های *Ferula* انجام شد. در هر رویشگاه تعداد سه ترانسکت ۱۵۰ متری مستقر و تعداد ۷ پلات نمونه‌برداری  $2 \times 2$  متر به فواصل ۲۰ متر از هم در طول ترانسکتها برداشت شد. نمونه خاک نیز از ابتدا، وسط و انتهای ترانسکت به صورت مرکب از عمق ۰-۳۰ سانتی‌متر (عمق ریشه‌دانی) برداشت شد و در آزمایشگاه خاک‌شناسی مورد تجزیه قرار گرفت. درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع نقاط نمونه‌برداری ثبت شد. برای بررسی تأثیر عوامل محیطی بر انتشار گونه‌های *Ferula* و گونه‌های همراه از آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA) و RDA استفاده شد. نتایج نشان داد که در تفکیک رویشگاه‌های گونه‌های *Ferula*، مقدار و سیل و ارتفاع از سطح دریا در سطح پنج درصد ( $P < 0.05$ ) در رویشگاه‌های مورد مطالعه، دارای اختلاف معنی‌دار هستند. در بررسی حضور و عدم حضور گونه‌های *Ferula* با استفاده از رگرسیون لجستیک، نتایج نشان داد که pH خاک در سطح یک درصد ( $P < 0.01$ ) و درصد مواد خنثی شونده در سطح پنج درصد ( $P < 0.05$ ) تأثیر معنی‌داری داشتند.

**واژه‌های کلیدی:** آنالیز تطبیقی متعارفی، کُما، عوامل محیطی، رگرسیون لجستیک، استان زنجان.

۱- دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی

۲- دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

\*: نویسنده مسئول: ardavanica@yahoo.com

## مقدمه

گیاهی مهم‌ترین عوامل اثرگذار می‌باشند. همچنین محسن‌نژاد اندواری و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیق خود در مراتع بیلاقی هراز بیان داشتند که نتایج حاصل از روش‌های تجزیه چندمتغیره، بیانگر وجود ارتباط معنی‌دار بین عوامل خاکی در جوامع گیاهی است و عوامل خاکی دربردارنده حدود ۳۰ درصد از تغییرات پوشش گیاهی هستند.

از آنجا که حضور هر گونه گیاهی تحت تأثیر عوامل محیطی و روابط بین گونه‌ای است و یک یا چند عامل محیطی بیشترین اثر را در حضور یک گونه گیاهی خاص دارند، اگر بتوان عوامل محیطی اثرگذار در پراکنش هر گونه گیاهی را تعیین کرد و رفتار گونه را نسبت به متغیرهای محیطی بررسی نمود، می‌توان به مدل‌های پیش‌بینی توزیع گونه‌ای دست یافت (۳۵).

کشور ایران خاستگاه اصلی و یکی از مراکز مهم گونه *Ferula* است، که علاوه بر نقش حفاظتی، استفاده‌های دارویی، صنعتی و علوفه‌ای آن دارای ساقه‌ای بس طولانی است. بهمنظور جلوگیری از نابودی و شناخت مناطق مستعد رویش این گیاه لازم است ارتباط بین عوامل محیطی با این گیاه مورد بررسی قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش جنس گُما و گونه‌های همراه آن بوده است.

## مواد و روش‌ها

مراتع بیلاقی منطقه شیلاندر در ۵۵ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع است (شکل ۱). این منطقه در بین مختصات  $۳۷^{\circ} ۴۹'$  تا  $۴۸^{\circ} ۳۶'$  عرض شمالی واقع شده و تغییرات ارتفاعی رویشگاه‌های انتخاب شده بین ۲۳۶۰ تا ۲۵۲۰ متر از سطح دریا بوده و دمای متوسط ماهانه در سردترین ماه سال کمتر از  $-7^{\circ}$  و متوسط سالانه ۸ و متوسط گرم‌ترین ماه سال حدود  $36^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد و میانگین بارندگی سالانه آن بین  $400-350$  میلی‌متر است. نزولات جوی در این منطقه اغلب به صورت برف است (۱۰).

منطقه شیلاندر، جزئی از رشته کوه‌های طارم علیا بوده و در زون ساختمانی البرز غربی و آذربایجان قرار دارد.

مراتع بخشی از منابع طبیعی و دارایی‌های هر کشور است که هم در اقتصاد ملی و هم در توازن‌های زیست محیطی، تنظیم چرخه هیدرولیکی، پالایش آلینده‌های محیطی، حفظ خاک، تلطیف آب و هوا و ایجاد روحیه و نشاط در انسان نقش دارد (۲). بررسی‌های گودال<sup>۱</sup> و پری<sup>۲</sup> (۱۹۷۹) نشان داد که خصوصیات خاک از عوامل اصلی پراکنش جوامع گیاهی به خصوص در مناطق خشک است. با توجه به تفاوت شرایط و گونه‌ها در بین گروه گونه‌های بوم شناختی یک منطقه می‌توان راهکارهای حفاظتی و مدیریتی مناسب و متفاوت را برای هر گروه مشخص نمود (۳).

همبستگی بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار در شکل‌گیری ساختار جوامع گیاهی و پراکنش آن‌ها در هر ناحیه است (۱۸). شالتوات<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۰۲) در مطالعه رویشگاه‌های گونه گیاهی *Nitraria retusa* به این نتیجه رسیدند که این گونه با مقدار شوری و رس همبستگی زیادی دارد. حشمتی (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای با عنوان بررسی اثر عوامل محیطی بر استقرار و گسترش گیاهان مرتتعی با استفاده از آنالیز چند متغیره، به این نتیجه رسید که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر جوامع گیاهی عمق آب زیرزمینی، جهت جغرافیایی و شوری خاک است. جین‌تون<sup>۴</sup> (۲۰۰۲) در چین به مطالعه روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی پرداخت و پراکنش پوشش گیاهی را وابسته به اقلیم و عواملی خاکی اعلام کرد. بارت<sup>۵</sup> و همکاران (۲۰۰۶) عمق آب زیرزمینی و بافت خاک را به عنوان عوامل کلیدی تعیین‌کننده پراکنش جوامع گیاهی در سواحل دریاچه‌های شور معرفی کردند. نتایج تحقیق مختاری اصل و همکاران (۲۰۰۸) که از روش آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA) استفاده کردند، نشانگر آن است که از بین عوامل خاکی مورد بررسی میزان یون سدیم، درصد املاح محلول و هدایت الکتریکی خاک در پراکنش و استقرار گونه‌های

<sup>1</sup> -Goodal

<sup>2</sup> -Perry


<sup>3</sup> -Shaltout

<sup>4</sup> -Jin-Tun

<sup>5</sup> -Barret

*Thymus*, *Agropyrum libanoticum*, *Acantholimon festucaceum*, *kotschyanius*, *Poa bulbosa*, *Festuca ovina*, *Hypericum scabrum* بوده و لیست فلورستیک منطقه به شرح جدول ذیل (جدول ۱) می‌باشد. منطقه مورد مطالعه به عنوان مرتع روستایی و به مدت حدود ۶ ماه در سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بهره‌برداری به صورت دامداری سنتی بوده و دام غالب عرصه گوسفند می‌باشد.

خاک منطقه جزء خاک‌های رده انتی‌سول بوده و به دلیل شرایط نامناسب آب و هوا تکامل نیافته و پروفیل خاک دارای افق‌های A(c) که جزء خاک‌های کم عمق بوده و با توجه به اقلیم و مشخصات پروفیلی در رده بندی جدید آمریکایی جزء خاک‌های Typicxerorthents می‌باشد. تیپ *Astragalus* spp- غالب گیاهی در مکان‌های انتخاب شده *Ferula* spp- *Onobrychis cornuta* بوده و علاوه بر گونه‌های *Ferula ovina* و *gummosa* گونه‌های غالب در منطقه شامل



شکل ۱- موقعیت منطقه و رویشگاه‌های مورد بررسی در سطح شهرستان و استان زنجان و کل کشور

طول ترانسکت‌ها انجام شد. با توجه به وسعت و گستردگی رویشگاه‌ها، تعداد سه ترانسکت ۱۵۰ متری که دو ترانسکت در طول شیب و یک ترانسکت عمود بر شیب در هر یک از رویشگاه‌ها به روش تصادفی مستقر شد و با تعیین حداقل سطح<sup>۱</sup> (۲×۲ مترمربع)، تعداد ۷ پلات

**روش نمونه‌برداری**  
نمونه‌برداری از اوخر اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه ۱۳۹۳ در دو رویشگاه *Ferula gummosa* در جهت شمالی و *Ferula ovina* در جهت جنوبی منطقه (شکل ۱) و دو رویشگاه مجاور که گونه‌های *Ferula* در آن عرصه‌ها وجود نداشت به عنوان شاهد صورت گرفت. نمونه‌برداری در واحدهای نمونه‌برداری به روش تصادفی- سیستماتیک در

<sup>۱</sup>- Minimal area

رویشگاه‌های موردمطالعه و تعیین عوامل محیطی مؤثر در این ارتباط از رگرسیون لجستیک دوسرطحی<sup>۱</sup> استفاده شد. کلیه محاسبات در این خصوص با استفاده از نرم‌افزار SPSS<sup>۶</sup> انجام گرفت.

### نتایج

نتایج حاصل از بررسی عوامل مختلف در منطقه مورد مطالعه نشان داد که رویشگاه‌های موردمبررسی از نظر عواملی چون pH، درصد مواد خنثی شونده (NTV)، درصد شن (SA)، درصد سیلت (SI)، درصد شیب (SL) و ارتفاع از سطح دریا (HLS) دارای اختلاف معنی‌داری نسبت به هم هستند (جدول ۲).

نمونه‌برداری به فواصل ۲۰ متر از هم در طول ترانسکت‌ها قرار داده شد. گونه‌های موجود شناسایی و درصد پوشش تاجی گونه‌ها، درصد سنگ و سنگریزه، درصد لاشبرگ و درصد خاک لخت در هر واحد نمونه‌برداری ثبت شد.

با بررسی منابع (۲۹، ۲۰ و ۱۲) نمونه‌برداری از خاک در سه نقطه ابتداء، وسط و انتهای هر ترانسکت به صورت مرکب از عمق ۰-۳۰ سانتی‌متری (عمق ریشه‌دوانی) صورت گرفت. نمونه‌های خاک به آزمایشگاه خاک‌شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان منتقل و میزان درصد مواد خنثی شونده<sup>۱</sup> (TNV) به روش نیتراسیون با سود، pH با بهره‌گیری از pH متر در گل اشباع، درصد کربن آلی (OC) به روش والکی بلک، سوری (EC) به روش عصاره گل اشباع، درصد اشباع (SP)، میزان فسفر (P) به روش رنگ‌سنجی، میزان پتاسیم (K) با استفاده از استات آمونیم، درصد شن، سیلت و رس اندازه‌گیری شد. درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع نقاط نمونه‌برداری با استفاده از شیب‌سنج و نقشه‌های توپوگرافی و دستگاه موقعیت‌یاب (GPS) تعیین شد.

### تجزیه و تحلیل آماری

بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام شد. جهت تعیین ارتباط گونه‌های گیاهی و عوامل محیطی، جدول‌های ماتریس گونه‌های گیاهی و عوامل محیطی تهیه و سپس جهت تعیین طول بازوی گرادیان، آنالیز تطبیقی ناریب (DCA)<sup>۲</sup> رج‌بندی انجام و طول گرادیان<sup>۳</sup> اندازه‌گیری شد. پس از آن با توجه به اندازه طول گرادیان، از آنالیز تطبیقی متعارفی (CCA)<sup>۴</sup> در رویشگاه *Ferula* و (RDA)<sup>۵</sup> در منطقه شاهد جهت پردازش داده‌ها استفاده شد و کلیه پردازش‌ها با استفاده از نرم‌افزار CANOCO<sup>4.5</sup> انجام شد. جهت مقایسه عوامل موردمبررسی در هریک از رویشگاه‌ها از آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد و همچنین به منظور بررسی حضور و عدم حضور گونه‌های جنس *Ferula* در

<sup>1</sup> - Total neutralizing Value

<sup>2</sup> - Detrended Correspondence Analysis

<sup>3</sup> - Length of gradient

<sup>4</sup> - Canonical Correspondence Analysis

<sup>5</sup> - Redundancy Analysis

## جدول ۱- فهرست گونه‌های گیاهی در رویشگاه‌های موردمطالعه و مشخصات هر یک از گونه‌ها

ردیف	نام علمی گیاه	اختصار	فرم روشی	دیر زیستی	ردیف	نام علمی گیاه	اختصار	فرم روشی	دیر زیستی	ردیف	نام علمی گیاه	اختصار	فرم روشی	دیر زیستی
۱	<i>Acantholimon</i>	Ac fe	P	S	۲۹	<i>Festuca ovina</i>	Fe ov	P	G	۲۰	<i>Gentiana sp</i>	Ge sp	P	F
۲	<i>Achillea setacea</i>	Ach se	P	F	۳۰	<i>Geranium tuberosum</i>	Ge tu	P	S	۳۱	<i>Hypericum scabrum</i>	Hy sc	P	G
۳	<i>Aethionema carneum</i>	Aet ca	P	S	۳۲	<i>Malabaila secacul</i>	Ma se	P	G	۳۳	<i>Marrubium Cuneatum</i>	Ma cu	P	F
۴	<i>Agropyrum libanoticum</i>	Ag li	P	G	۳۴	<i>Matthiola sp</i>	Mat sp	P	G	۳۵	<i>Minuartia meyeri</i>	Mi me	P	G
۵	<i>Agropyrum pectiniforme</i>	Ag pe	P	G	۳۶	<i>Nepeta heliotropifolia</i>	Ne he	P	S	۳۷	<i>Onobrychis cornuta</i>	On co	P	F
۶	<i>Alium sp</i>	Al sp	P	F	۳۸	<i>Phlomis oilivieri</i>	Ph ol	P	F	۳۹	<i>Pimpinella tragium</i>	Pi tr	P	S
۷	<i>Alopecurus textilis</i>	Al te	P	G	۴۰	<i>Poa bulbosa</i>	Po bu	P	S	۴۱	<i>Poa trivialis</i>	Po tr	P	G
۸	<i>Arenaria gypsophiloides</i>	Ar gy	P	G	۴۲	<i>Prangos ferulacea</i>	Pr fe	A	G	۴۳	<i>Ranunculus sp</i>	Ra sp	P	F
۹	<i>Astragalus bagensis</i>	As ba	P	F	۴۴	<i>Salvia limbata</i>	Sa li	P	F	۴۵	<i>Scariola orientalis</i>	Sc or	P	F
۱۰	<i>Astragalus citrinus</i>	As ci	P	F	۴۶	<i>Silene ampulata</i>	Si am	P	F	۴۷	<i>Silene bupleuroides</i>	Si bu	P	F
۱۱	<i>Astragalus curvirostris</i>	As cu	P	F	۴۸	<i>Stachys lavandolifolia</i>	St la	P	F	۴۹	<i>Tanacetum</i>	Ta po	P	G
۱۲	<i>Astragalus rubristriatus</i>	As ru	P	S	۵۰	<i>Thymus kotschyanus</i>	Th ko	P	S	۵۱	<i>Valeriana sisymbifolia</i>	va si	P	G
۱۳	<i>Astragalus tricholobus</i>	As tr	P	G	۵۲	<i>Veronica sp</i>	Ve sp	P	F	۵۳	<i>Vinca herbacea</i>	Vi he	P	F
۱۴	<i>Bromus tomentellus</i>	Br to	P	G	۵۴	<i>Viola sp</i>	Vi sp	P	F	۵۵	<i>Forb=F</i>	(علفی)	P	G
۱۵	<i>Bromus tectorum</i>	Br to	A	G	۵۶									
۱۶	<i>Campanula sp</i>	ca sp	P	F										
۱۷	<i>Centaurea aucheri</i>	Ce au	P	F										
۱۸	<i>Cephalaria sp</i>	Ce sp	P	F										
۱۹	<i>Cicer spiroceras</i>	Ci sp	P	F										
۲۰	<i>Clastupus vestitus</i>	Cl ve	P	F										
۲۱	<i>Cousinia.sp</i>	Co sp	P	F										
۲۲	<i>Dactylis glomerata</i>	Da gl	P	G										
۲۳	<i>Dendrosteyllera lessertii</i>	De le	P	S										
۲۴	<i>Dianthus orientalis</i>	Di or	P	G										
۲۵	<i>Eringium bilardi</i>	Er bi	P	F										
۲۶	<i>Ferula gumosa</i>	Fe gu	P	F										
۲۷	<i>Ferula ovina</i>	Fe ov	P	F										
۲۸	<i>Ferula sp</i>	Fe sp	P	F										

Grass = G (بوته)، Forb=F (علفی)، Shrub = S (چندساله)، Annuals = A (یکساله).

منطقه را توجیه کرده و بیشترین تغییرات پوشش گیاهی را به خود اختصاص داده‌اند (جدول ۳).

روابط بین عوامل محیطی و پوشش در رویشگاه با CCA نشان داد که محور اول و دوم به ترتیب با مقادیر ویژه ۰/۴۵۹ و ۰/۲۵۲ و واریانس ۱۲/۶ و ۱۹/۵ تغییرات پوشش گیاهی و فاکتورهای محیطی

## جدول ۲- مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن

عامل موردنبرگی	HLS	علامت اختصاری	میانگین مربعات	F	سطح معنی‌داری
درصد اشباح	SP		۹۱/۶۴	۳/۹۶	۰/۰۵۳
شوری (ds/m)	EC		۰/۲۷۴	۲/۹۸	۰/۰۹۷
pH	-		۰/۰۵۳	۶/۶۳	۰/۰۱۵*
درصد مواد خنثی شونده	TNV		۲/۸۰۲	۱۲/۱۸	۰/۰۰۱**
درصد کربن آلی	OC		۱/۳۱۷	۱/۶۶	۰/۲۵۱
فسفر (ppm)	P		۱/۷۹۹	۰/۲۳۱	۰/۸۷
پتاسیم (ppm)	K		۲۳۸۸۶/۵۲۸	۲/۷۶	۰/۱۱۱
درصد شن	SA		۱۳۰/۱۶۸۷	۹/۱۱۶	۰/۰۰۶ **
درصد سیلت	SI		۱۴۲/۱۵۸۶	۵/۷۷۹	۰/۰۲۱*
درصد رس	CL		۲۰/۷۷۸	۰/۷۵۱	۰/۵۵
درصد شب	SL		۳۴۹/۱۷۰	۴/۳۶	۰/۰۰۰ **
ارتفاع از سطح دریا (m)	HLS		۸۶۵۱/۲۲۲	۵/۱۷۰	۰/۰۲۸*

جدول ۳- نتایج حاصل از CCA عواملی محیطی با حضور *Ferula spp*

محورها	CCA <sub>4</sub>	CCA <sub>3</sub>	CCA <sub>2</sub>	CCA <sub>1</sub>
مقدار و پیزه	-۰/۱۵۶	-۰/۱۹۰	-۰/۲۵۲	-۰/۴۵۹
همبستگی گونه و محیط	-۰/۸۲۹	-۰/۹۱۲	-۰/۹۲۶	-۰/۹۸۳
مقدار واریانس توجیه شده به سیله هر محور	۲۹/۰	۲۴/۷	۱۹/۵	۱۲/۶
واریانس توجیه شده گونه‌ها با عوامل محیطی (تجمعی)	۸۷/۹	۷۴/۹	۵۹/۱	۳۸/۱


جدول ۴- همبستگی محورها با عوامل محیطی بر اساس پوشش تاجی گونه‌ها در روش CCA

د	د	د	د	د	د	د
-۰/۰۸	-۰/۰۶	-۰/۰۰	-۰/۹۵	SL	درصد شبیه	
-۰/۰۸	-۰/۰۶	-۰/۲۰	-۰/۹۵	AS	جهت جغرافیائی (درجه)	
-۰/۱۲	-۰/۲۸	-۰/۱۸	-۰/۸۵	TNV	درصد مواد خشی شونده	
-۰/۱۸	-۰/۰۴	-۰/۱۲	-۰/۶۷	GR	درصد سنگ و سنگریزه	
-۰/۰۶	-۰/۱۴	-۰/۴۶	-۰/۶۴	SP	درصد اشیاع	
-۰/۱۱	-۰/۲۳	-۰/۰۰	-۰/۵۵	CL	درصد رس	
-۰/۱۶	-۰/۱۸	-۰/۷۸	-۰/۲۹	P	فسفر (ppm)	
-۰/۲۱	-۰/۰۱	-۰/۷۶	-۰/۴۴	-	pH	
-۰/۳۹	-۰/۱۱	-۰/۶۹	-۰/۲۷	HLS	ارتفاع از سطح دریا (m)	
-۰/۲۷	-۰/۲۹	-۰/۶۰	-۰/۴۷	SA	درصد شن	
-۰/۱۳	-۰/۰۵	-۰/۵۸	-۰/۴۴	OC	درصد کربن آلی	
-۰/۱۳	-۰/۵۲	-۰/۱۶	-۰/۱۷	SI	درصد سیلت	
-۰/۰۵	-۰/۰۱	-۰/۵۴	-۰/۵۰	K	پتانسیم (ppm)	
-۰/۵۳	-۰/۲۹	-۰/۲۳	-۰/۲۹	EC	شوری (ds/m)	

در بررسی روابط بین عوامل محیطی و پوشش گیاهی منطقه شاهد با RDA ملاحظه شد که محورهای اول و دوم به ترتیب با مقادیر ویژه ۰/۱۳۰ و ۰/۰۵۵ و واریانس ۱۳/۰ و ۱۸/۵ تغییرات پوشش گیاهی و فاکتورهای محیطی منطقه را توجیه می‌کند (جدول ۵).

با استناد به دیاگرام رجبندی گونه‌ها و جدول همبستگی عوامل محیطی با پوشش گیاهی (شکل ۲ و جدول ۴)، ملاحظه می‌شود که گونه‌ای چون *Ferula ovina* به همراه *Geranium tuberosum*, *Phlomis olivieri*, *Vinca* و *Centaurea aucheir*, *Malabaila secacul*, *herbacea* با شبیه دامنه، همبستگی منفی و با جهت *Festuca ovina* همبستگی مثبت و گونه‌ای *Thymus kotshyanus*, *Acantholimon festucaceum*, *Campanula sp* و *Veronica sp* همبستگی مثبت و گونه‌ای *Stachys lavandulifolia* با درصد مواد خشی شونده و *Tanacetum polycephalum* درصد سنگ و سنگریزه همبستگی مثبت و گونه‌ای *Astragalus*, *Prangos ferulacea*, *Ferula gummosa* با *Clastapus vestitus*, *Aethionema carneum*, *citrinus* درصد اشیاع همبستگی منفی و پراکنش گونه‌ای *Salvia* با میزان فسفر خاک و گونه‌ای *Ferula sp* به همراه *Cicer spiroceras*, *Astragalus curvirostries*, *Arenaria* و *Alopecurus textilis*, *Gentiana sp* با میزان *Pimpinella tragium* و *Dianthus orientalis* رس همبستگی مثبت داشته و از نظر درجه اهمیت در محور اول قرار گرفتند.

پراکنش گونه *Dactylis glomerata* و گونه *Salvia* با میزان فسفر خاک و گونه‌ای *Ferula sp* به همراه *limbata*, *Cicer spiroceras*, *Astragalus curvirostries*, *Arenaria* و *Alopecurus textilis*, *Gentiana sp* با میزان *Pimpinella tragium* و *Dianthus orientalis* درصد شن همبستگی مثبت و با درصد کربن آلی و میزان پتانسیم همبستگی مثبت و با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت و با درصد کربن آلی و میزان پتانسیم همبستگی منفی، گونه‌ای *Aethionema carneum*, *Ranunculus sp* و *Valeriana sisymbriifolia* با ارتفاع از سطح دریا همبستگی مثبت و با درصد شن همبستگی منفی و گونه *Poa trivialis*, *Astragalus*, *Cephalaria sp* و *Onobrychis cornuta*, *curvirostris*, *Agropyrum* با درصد شن همبستگی منفی و گونه *Nepeta heliotropifolia* و *libanoticum* با درصد شن همبستگی مثبت نشان دادند.

شکل ۲- دیاگرام رجبندي CCA در روبيشكاه *Ferula spp.*


جدول ۵- نتایج حاصل از RDA عوامل در منطقه شاهد

RDA <sub>4</sub>	RDA <sub>3</sub>	RDA <sub>2</sub>	RDA <sub>1</sub>	محورها
۰/۰۳۱	۰/۰۵۰	۰/۰۵۵	۰/۱۳۰	مقدار پيژه
۰/۶۹۰	۰/۷۵۹	۰/۸۰۱	۰/۹۰۵	همبستگي گونه و محيط
۲۶/۶	۲۳/۶	۱۸/۵	۱۳	مقدار واريанс توجيه شده به وسیله هر محور
۸۸/۲	۷۸	۶۱/۳	۴۳/۰	واريانس توجيه شده گونه ها با عوامل محطي (به صورت تجمعی)

منفی و گونه های *Onobrychis cornuta*, *Poa bulbosa*, *Bromus tomentellus* با درصد سنگ و سنگريزه در خاک همبستگی منفی و *Agropyrum libanoticum* با ميزان سنگ و سنگريزه همبستگی مشبت، در مقابل *Poa bulbosa* و *Agropyrum pectiniforme* همبستگی مشبت نشان دادند.

در بررسی روابط بين عوامل محطي و پوشش گياهي منطقه شاهد با RDA ملاحظه شد که محورهای اول و دوم به ترتيب با مقادير ويژه ۰/۱۳۰ و ۰/۰۵۵ و واريанс ۱۳/۰ و ۱۸/۵ تغييرات پوشش گياهي و فاكتورهای محطي منطقه را توجيه می کند (جدول ۵).

با استناد به دیاگرام رجبندي و جدول درصد همبستگي گونه ها با عوامل محطي در منطق شاهد (شکل ۳ و جدول ۶)، مشاهده می شود که بيشتر عوامل محطي در محور اول با پوشش گياهي همبستگي منفي داشته، اما به گونه های *Hypericum scabrum*, *Poa trivialis*, *Thymus* و *Festuca ovina*, *Marrobiun cuneatum*, *kotshyanus* می توان اشاره کرد که بيشتر تحت تأثير درصد مواد خنثی شونده بوده و با آن همبستگي مشبت دارند. گونه هايی چون *Astragalus bagensis* و *Arenaria gipsophyloides* با درصد شيب و درصد شن در خاک همبستگي مشبت و با درصد اشباع و pH همبستگي



شکل ۳- دیاگرام رج‌بندی RDA در منطقه شاهد

جدول ۶- همبستگی محورها با عوامل محیطی بر حسب پوشش تاجی گونه‌ها در روش RDA در منطقه شاهد

عوامل محیطی	علام اختصاری	مؤلفه اول	مؤلفه دوم	مؤلفه سوم	مؤلفه چهارم
درصد شیب	SL	-0/82	-0/13	-0/27	+0/2
جهت جنوبافانی (درجه)	AS	-0/82	+0/12	+0/27	-0/02
پتانسیم (ppm)	K	-0/82	+0/15	+0/17	-0/05
درصد شن	SA	+0/74	+0/1	-0/43	+0/05
ارتفاع از سطح دریا (m)	HLS	+0/74	+0/11	+0/33	-0/12
pH	-	+0/74	-0/01	-0/06	+0/28
شوری (ds/m)	EC	+0/73	-0/16	+0/1	+0/25
درصد سیلت	SI	+0/69	-0/10	+0/36	+0/16
درصد اشباع	SP	+0/58	+0/2	+0/33	+0/28
درصد مواد خنثی شونده	TNV	+0/58	+0/25	-0/45	+0/03
فسفر (ppm)	P	+0/48	-0/09	+0/09	-0/03
درصد سنگ و سنگریزه	GR	+0/20	-0/54	-0/26	-0/39
درصد کربن آلی	OC	-0/35	+0/1	+0/12	+0/44
درصد رس	CL	+0/11	+0/21	+0/2	+0/44

با توجه به ضرایب ستون اول جدول، پیش‌بینی حضور *Ferula gummosa* و *Ferula ovina* در منطقه به صورت معادله ذیل حاصل شد.

$$P = \frac{EXP(-118.358pH - 6.405TNV + 862.971)}{1 + EXP(-118.358pH - 6.405TNV + 862.971)}$$

برای بررسی رابطه بین حضور و عدم حضور *Ferula ovina* و *Ferula gummosa* با عوامل محیطی در رویشگاه‌های مورد مطالعه، حضور و عدم حضور گونه‌های *Ferula* به عنوان متغیر وابسته انتخاب و رابطه آن از طریق روش رگرسیون لجستیک دوستحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان pH در سطح یک درصد ( $p < 0.01$ ) و مواد خنثی‌شونده در سطح پنج درصد ( $p < 0.05$ ) معنی‌دار بوده و با عنایت به میزان آماره بتا (آماره بخت‌ها) شکل تغییرات بین متغیرهای مستقل و وابسته در جهت مخالف هم است (جدول ۷).

جدول ۷ - نتایج رگرسیون لجستیک دوستحی گونه‌های *Ferula* با عوامل محیطی در منطقه موردمطالعه

مراحل تجزیه	عوامل مؤثر	ضریب بتا	اشتباه از استاندارد	آماره والد	درجه آزادی	سطح معنی‌دار	آماره بتا
اول	pH	-۲۱/۲۱	۴۶۴	۲۰/۹۱	۱	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰
Constant		۱۵۰/۴۰	۳۲/۸۰	۲۱/۰۲	۱	۰/۰۰۰	۲/۰۰۸
	pH	-۱۱۸/۳۶	۴۴/۹۱	۶/۹۵	۱	۰/۰۰۸	۰/۰۰۰
دوم	TNV	-۶/۴۱	۲/۷۳	۵/۵۱	۱	۰/۰۱۹	۰/۰۰۲
Constant		۸۶۲/۹۷	۳۲۸/۱۱	۶/۹۲	۱	۰/۰۰۹	--

است. از طرف دیگر جهات شبیه نیز بر مقدار آب در دسترس گیاه، درجه حرارت خاک و میزان نور دریافتی توسط گیاه تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، دامنه‌های جنوبی نسبت به دامنه‌های شمالی دارای رطوبت کمتری بوده و این موضوع باعث می‌شود که گونه‌های استقراری‌افتاده در دو دامنه از لحاظ بوم‌شناسی با هم متفاوت باشند. مرادی و احمدی‌پور نیز در بررسی اثر ویژگی‌های خاک و عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی در منطقه پلور، شبیه و جهت دامنه را مهم‌ترین عامل فیزیوگرافی در میزان تاج پوشش و تراکم گونه‌های گیاهی ذکر کردند (۲۵). از سوی دیگر، همراهی گونه‌هایی چون *Campanula* sp با گونه *Pimpinella* sp، *Veronica* sp، *Acantholimon festucaceum* در عرصه‌های شبیدار، *Acantholimon* sp باشد که گونه *festucaceum* با تاج پوشش بالشتکی شکل گسترشده خود، رطوبت موجود در خاک اطراف خود را حفظ کرده و از طرف دیگر به عنوان یک گونه پرستار در رشد و بقای این گونه‌ها نقش حمایتی ایفا نموده و باعث حفظ این گونه‌ها شده است (۲۶).

عوامل خاکی یکی دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر استقرار گونه‌ها در این منطقه است. بافت خاک به عنوان نمونه‌ای از عوامل خاکی استقرار گونه‌های گیاهی را در این منطقه توجیه می‌کند. در واقع بافت خاک نسبت ذرات رس، شن و سیلت در خاک است که در تغذیه و رشد و نمو گیاهان نقش مؤثری ایفا می‌کند. همبستگی برخی از گونه‌ها با درصد سنگ و سنگریزه و میزان رس خاک در حضور *Ferula* و در منطقه شاهد، بر اهمیت بافت خاک در پراکنش پوشش گیاهی منطقه تأکید دارد. بافت خاک یکی از عواملی است که علاوه بر تأثیر در جذب مواد

### بحث و نتیجه‌گیری

حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم‌های مرتعی تصادفی نیست. بلکه عوامل اقلیمی، خاکی، پستی و بلندی، انسانی و ... در گسترش آن‌ها نقش اساسی دارند. تعیین عواملی که حضور و پراکنش گیاهان مرتعی را کنترل می‌کند از جمله اهداف مهم در تحقیقات اکوسیستم‌های مرتعی است (۵).

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عوامل محیطی مختلفی در پراکنش گونه‌های گیاهی منطقه نقش داشته است. درک و شناسایی این ارتباطات در حفظ پوشش گیاهی عرصه‌های آبخیز، حفاظت از آب‌وخاک، اصلاح و احیای مرتع نقش مهمی ایفا می‌کند (۲۶).

در تفکیک رویشگاه‌های *Ferula* و *Ferula ovina* و *gummosa* مقدار و جهت شبیه، میزان مواد خنثی‌شونده، درصد اشباع و مقدار رس و سنگ و سنگریزه سطح خاک که در مؤلفه اول قرار گرفته‌اند از عوامل مؤثرتری بوده و عوامل دیگر موردمطالعه نظیر pH، فسفر و ... در جایگاه دوم از نظر ایقای نقش در انتشار گونه‌ها قرار دارند. روشن است که با زیادشدن درصد شبیه و درنتیجه زیادشدن نیروی ثقل، میزان فرسایش سطحی بیشتر شده و از سوی دیگر عمق خاک کاهش می‌یابد و درنتیجه ریشه دوانی برخی از گونه‌ها با مشکل مواجه شده و گیاهان با ریشه عمیق نمی‌توانند در این عرصه‌ها مستقر شوند. در این مطالعه نیز همبستگی منفی گونه‌هایی

چون *Phlomis olivieri*, *Ferula ovina* و *herbacea* که دارای ریشه‌های عمیق بوده و همبستگی مثبت گونه‌های نظیر *Acantholimon*, *Festuca ovina* و *Veronica* sp با میزان شبیه *festucaceum* ریشه‌های افشان و یا سطحی هستند مؤید مطلب فوق

آهک‌دوست یک عامل بازدارنده رشد است و قابلیت استفاده از عناصر ریز معدنی مانند روی و منگنز را برای گیاهان کاهش می‌دهد (۲۲).

ارتفاع از سطح دریا، عوامل دیگر مانند اقلیم و حتی عوامل مربوط به خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به این که منطقه موردمطالعه یک منطقه کوهستانی است، می‌توان گفت که عامل ارتفاع از سطح دریا به طور مستقیم با تأثیر بر عوامل محیطی دیگر مثل میزان بارندگی و درجه حرارت و به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر در تشکیل خاک بر انتشار گونه‌های گیاهی منطقه تأثیر می‌گذارد (۳۲). اما نقش فسفر خاک، بعد از ازت به عنوان مهم‌ترین عنصر غذایی در تغذیه و رشد زایشی، در پراکنش گونه *Dactylis glomerata* بیشتر از سایر عوامل و عناصر بوده است. این نتایج مشابه با نتایج شفق کلوانق و عباس وند آذر (۲۰۱۴) است که در نتایج مطالعه خویش، *Scariola* و *Poa bulbosa* بیشترین همبستگی گونه‌های *orientalis* را با میزان فسفر خاک گزارش کردند.

از طرف دیگر نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک در این مطالعه نشان داد که در منطقه موردمطالعی مهم‌ترین عامل محیطی اثرگذار در خصوص حضور و عدم حضور گونه‌های *Ferula ovina* و *Ferula gummosa* عامل pH و میزان مواد خنثی شونده در خاک است. با عنایت به جدول نتایج ملاحظه شد که آماره بخته‌های عوامل مؤثر کمتر از یک بوده و نشان‌دهنده این مطلب است که شکل تغییرات بین متغیرهای مستقل و وابسته در جهت مخالف هم است، یعنی حضور گونه‌های موردمطالعه جنس *Ferula* با میزان اسیدیته و مواد خنثی شونده خاک رابطه عکس دارد.

ریحان و امیراصلانی (۲۰۰۶) نیز در تحقیقات خود گزارش کردند که در سیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران خصوصیات خاک مانند اسیدیته و شوری نقش مهمی را در تغییرات پوشش گیاهی ایفا می‌کنند. همین‌طور زارع چاهوکی و همکاران (۲۰۰۷) در مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مرانع غرب حوض سلطان استان قم با روش رگرسیون لجستیک نشان دادند که در رویشگاه گونه *Siedlitzia rosmarinus* بر اساس مدل

غذائی، میزان نفوذپذیری و تهویه، بر میزان رطوبت قابل‌دسترس گیاهان نیز مؤثر بوده و در پراکنش گونه‌های مختلف نقش مهمی دارد. یافته‌های باروج<sup>۱</sup> (۲۰۰۵)، فریدل<sup>۲</sup> و همکاران (۱۹۹۶) بر نقش بافت خاک در پراکنش گونه‌های گیاهی تأکید داشته و این یافته را پشتیبانی می‌نماید، همین‌طور گرگین کرجی و همکاران (۲۰۰۶) نیز در بررسی ارتباط برخی گونه‌های شاخص مرتعی با خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک اعلام داشتند که حضور و درصد تاج پوشش گونه‌های گیاهی با برخی عوامل خاکی از جمله بافت خاک، درصد اشباع pH، سنگ و سنگریزه، سیلت و رس همبستگی داشته و نیز اظهار داشتند که حضور و درصد تاج پوشش گونه *Ferula haussknechtii* با بافت خاک و درصد اشباع بازی همبستگی داشته است.

گروهی از گونه‌ها نظیر *Arenaria gypsophiloides*، *Astragalus rubristeriatus* و *Alopecurus textilis* *Aethionema sp.*، *Agropyrum libanoticum* در pH خاک رابطه همبستگی مثبت و *Nepeta heliotropifolia* و *Silene buoleuroides*، ارتباط منفی بود، مهم‌ترین نقش pH خاک کنترل حلایلت عناصر غذائی در خاک است به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذائی وابستگی زیادی به pH خاک دارد. هر گیاه یک محدوده pH خاص و مناسبی را تحمل می‌کند و معمولاً با افزایش pH حلایلت عناصر غذائی کاهش پیدا می‌کند و در روند رشد گیاهان اختلال ایجاد می‌کند. نتیجه اخذشده مشابه نتایج ویرتان و همکاران (۲۰۰۶) و یبینگ (۲۰۰۸) است که در تحقیقات خود بیان می‌نمایند که ویژگی‌های شیمیایی خاک نظیر pH، EC و Ca در الگوی جوامع گیاهی نقش داشته و آن را کنترل می‌کنند. مقدار مواد خنثی شونده (آهک و ...) عامل دیگر مؤثر بر پراکنش گونه‌ها در منطقه موردمطالعه بود. آهک از املاحی است که دارای حلایلت کم در آب است و در صورتی که به صورت محلول در آید تولید یک قلیای قوی می‌کند و رشد گیاهانی را که به pH اسیدی نیاز دارند، با محدودیت مواجه می‌کند. از این‌رو آهک به جز برای گیاهان

1 - Brauch

2 - Friedel

شناخت کامل از نیازهای بوم‌شناختی گونه‌ها با استفاده از مدل‌های بدست‌آمده، می‌توان برای انجام فعالیت‌های اصلاحی در مرتع، گونه مناسب و سازگار با شرایط هر منطقه را برای انجام فعالیت‌های اصلاحی پیشنهاد نمود.

رگرسیونی حاصل، سیلت خاک و pH خاک به عنوان متغیرهای دارای بیشترین تأثیر شناخته شدند. شناخت لازم از نیازهای بوم‌شناختی گونه‌ها و توجه به عوامل مؤثر در پراکنش و انتشار گونه‌ها در مناطق برای انجام فعالیت‌های اصلاحی در مرتع ضروری است. بعد از

## References

- Ali, M. M., G. Dickinson & K. J. Murphy, 2000. Predictors of plant diversity in a hyperarid desert wadi ecosystem. *Arid Environments*, 45: 215-230.
- Austin, M.P., 2002. Spatial prediction of species distribution: an interface between ecological theory and statistical modelling. *Ecological Modelling*, 157:101-118.
- Barnes, B. V., K. S. Pregitzer & T. A. Spies, 1982. Ecological forest site classification. *Journal of Forestry*. 80:493-498.
- Barrett, G., 2006. Vegetation communities on the shores of a salt lake in semi-arid Western Australia. *Arid Environments*, 67:77-89.
- Baruch Z., 2005. Vegetation-environmental relationships and classification of the seasonal savannas in Venezuela. *Journal of flora*, 200:49-64.
- Bravo de la, P. R & J. C. Poggiale, 2005. Theoretical ecology and mathematical modelling: problems and methods. *Ecological Modelling*, Editorial, 188:1-2.
- Cannon, H.C., R.P. Peart & L. Lighton, 1998. Tree species diversity in commercially logged Bornean rainforest. *Science*, 281:1366-1368.
- Cantero, J.J., J. Liira, J.M. Cisneros, J. Gonzalez, L. Petryna, M. Zobel & C. Nunez, 2003. Species richness, alien species and plant traits in central Argentine mountain grasslands. *Journal of Vegetation Science*, 14: 129-136.
- Dehghanian, S & A.A. Sarafraz, 1998. Investigation of degradation of Khorasan-e Shomali rangelands from the perspective of economic, social and ecological. *Journal of economic agricultural and development*, 23: 143-158. (In Persian).
- Deputy planning of Zanjan province, 2006. Landuse plan of studies. Climate Studies. Governor's office of Zanjan province.
- Friedel, J. K., J. C. Munch, W. R. Fischer, 1996. Soil microbial properties and the assessment of available soil organic matter in a haplic luvisol after several years of different cultivation. *Soil Biology and Biochemistry*, 28: 479-488.
- Gorgin Karaji, M., P. Karami, M. Shokri & N. Safaeian, 2006. Investigation relationship between some important species and physical and chemical soil factors. *Pajouhesh & Sazandeghi*, 73: 126-132. (In Persian).
- Goodall, D. W & R.A. Perry, 1979. Arid-land ecosystem, published by the Syndics of the Cambridge University.
- Heshmati, G.A., 2003. Investigation on effects of environment factor on species distribution in inland salt marshes (Argentina) conenoses, 52(1):13-120.
- Janisva, M., 2005. Vegetation-environment relationship in dry calcareous grassland. *Journal of Ekologia-Bratislava*, 24(1) : 25-44.
- Jensen, M., 1990. Interpretation of environmental gradients which influence sagebrush community distribution Nevada. *Journal of Range Management*, 43: 161-166.
- Jin-Tun, Z., 2002. A study on relation of vegetation, climate and soil in Shanxi province. *Journal of Plant ecology*, 6: 23-31.
- Jongman, R.H.G., C.J.F. Break & O.F.R.Tongeren, 1987. Data Analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press, Wageningen, 299 p.
- Kohandel, A. L., F. Khalighi Sigaroudi & N. Pirouzi, 2013. Effects of environmental factors on the establishment and distribution of plant habitats in the southern part of Alborz. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 20 (3): 531-539.
- Lentz, S., 1987. Correspondence of soil properties and classification units with sagebrush communities in southeastern Oregon: I and II, *Soil Science Society of America Journal*, 51: 1263-1276.
- Mahmudi, S & M. Hakymian, 2007. Fundamental of Soil Science. Tehran University Press, 22. 700 p. (In Persian)

23. Moghaddam, M.R., 1998. Range and Range Management. Tehran University Press, 470 p. (In Persian).
24. Mohsennejad andvari, M., M. Shekari, S.H. Zali & Z. Jafariyan, 2010. Study on the relationship between soil and physiographic factors and plant community distribution. Journal of Rangeland, 4(2): 257-262.
25. Mokhtari Asl, A., M. Mesdaghi, M. Akbarlou & R. Rangavar, 2008. Effective interaction between soil characteristics and distribution of plant species in rangeland pastures Gherkhlar index of Marand in East Azarbaijan Province. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(1): 26-36.
26. Moradi, H & SH. Ahmadipour, 2006. Investigation of geomorphological and soil roles on vegetation by GIS. Journal of Geographical Research, 38(58): 17-32
27. Reeder, J. E., E. E. Schuman, J. A. Morgan, D. R. Lecain & R. H. Hart, 2001. Impact of grazing management strategies on carbon sequestration in semi-arid rangeland. USA, Proceedings of XIX International Grassland Congress, 211-217.
28. Reyhan, M. K., & F. Amiraslani, 2006. Studying the relationship Between Vegetation and Physical-Chemical Properties of Soil. Case Study: Tabas Region, Iran. Pakistan Journal of Nutrition, 5(2): 169-171.
29. Shafagh kolvanagh, J & E. Abbasvand, 2014. Effects of Soil Nitrogen, Phosphorus and Potassium on distribution of rangeland species, weeds and sustainability of species in Khalat Poshan rangelands of Tabriz County. Journal of Agricultural Science, 24(2): 73-84.
30. Shaltout K.H., M.G. Sheded, H.F. El-Kady & Y.M. Al-Sudani. 2002. Phytosociology & size structure of *Nitraria retusa* along the Egyptian Red Sea coast. Journal of Arid Environment, 53: 331-345.
31. Shokrollahi, SH., H.R. Moradi & Gh. A. Dianati Tilaki, 2012. Effects of soil properties and physiographic factors on vegetation cover. Iranian journal of Range and Desert Reseach, 19 (4): 654-688.
32. Sperry, J.S & U.G. Hacke, 2002. Desert shrub water relations with respect to soil characteristics and plant functional type. Journal of Functional Ecology, 16: 367-378.
33. Villers-Ruiz L., I. Trejo-Vazquez & J. Lipez-Blanco, 2003. Dry vegetation in relation to
34. the physical environment in the Baja California Peninsula, Mexico. Journal of Vegetation
35. Science, 14: 517-524.
36. Virtanen, R., J. Oksanen & V.Y. Razzhivin, 2006. Broad-scale vegetation- environment relationships in Eurasian high-latitude areas. Journal of Vegetation Science, 17(4): 519-528.
37. Yibing Q, 2008. Impact of habitat heterogeneity on plant community pattern in Gurbantunggut desert. Geographical science, 14(4): 447-455.
38. Zare Chahouki, M. A., M. Jafari & H. Azarnivand, 2007. Relationship between vegetation diversity and environmental factors in Poshtkouh rangelands of Yazd province. Journal of Pajouhesh & Sazandeghi, 76: 192-199. (In Persian).
39. Zare Chahouki, M. A, H. Piry Sahragard & H. Azarnivand, 2014. Habitat distribution modeling of some halophyte plant species using Logistic regression Method in Hoze Sultan rangelands Of Qum Province. Journal of Range management, 1(1): 94-113. (In Persian).