

## تحلیل ساختار اجتماعی و دانش بومی ایل محمدی سلیمانی شهرستان جیرفت

حمید رضا سعیدی گراغانی<sup>۱</sup>، حسین ارزانی<sup>\*</sup><sup>۲</sup>، مهدی قربانی<sup>۳</sup> و نسیم جهانبخش گروهی<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۰/۰۵

### چکیده

دانش بومی در تعامل و هماهنگی بومیان (روستاییان، کوچنشینان، جنگلنشینان) با محیط پیرامون آنها بوجود می‌آید. از این رو بومیان از طریق همسو و هماهنگ کردن خود با محیط به کسب دانشی نائل می‌شوند که چون خاص محیط آنان است به نام دانش بومی نامیده می‌شود. در این پژوهش سعی شده است ضمن معرفی ساختار اجتماعی عشاير محمدی سلیمانی بخش اسفندقه شهرستان جیرفت به نقش دانش بومی، شناخت و بهره‌گیری از آن در بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران پرداخته شود. روش انجام این پژوهش کیفی است، در این روش ضمن انجام مصاحبه‌های عمیق و جمع‌آوری اطلاعات، سؤالات محوری در خصوص استفاده از مراتع تعیین شد. نتایج جمع‌بندی اظهارات مصاحبه شوندگان نشان می‌دهد. بهره‌برداران مراتع با توجه به آمیزه‌های بومی می‌توانند تقسیم مکانی پراکنش دام، محل‌های تأمین آب شرب گله و مسیر حرکت گله را به خوبی پیش‌بینی و تعیین نمایند. آنها همچنین می‌توانند با چرای دام در شب، چرای تناوبی، مدت توقف دام، از تمام قسمت‌های یک محدوده عرفی به صورت یکنواخت استفاده نمایند. براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که هر یک از افراد در ایل جایگاه خاصی داشته و وظایف خاصی را انجام می‌دهد. در امر مدیریت ایل، ایشوم و گله پنج نقش بزرگ طایفه، بزرگ تیره و سرایشوم، چوپان و رفیق تعریف شده است. آنها در سکونتگاه‌هایی زیست می‌کنند که ساخت خودشان بوده و از مصالح محلی ساخته شده که از آن جمله می‌توان به کپر، کوار و سیاه‌چادر اشاره کرد. از آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که ساختار مدیریتی و دانش اکولوژیک بومی گله‌داران نقش مهمی در پایداری سرزمین ایفا می‌نماید و با توجه به قدمت زیاد شبانی در کشور زنده نمودن بخش‌های از این دانش که امروزه مصداق‌های علمی آنها مشخص شده است، می‌تواند مبنایی برای توسعه و معیشت پایدار در مراتع باشد.

**واژه‌های کلیدی:** ساختار اجتماعی، دانش بومی، عشاير، اسفندقه.

۱- دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

۲- استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران..

\*: نویسنده مسئول: harzani@ut.ac.ir

۳- استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

۴- کارشناس ارشد برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور بیرون.

کلهر بیان داشتند که دامداران عشاير بهمنظور رسیدن به تولیدی مطلوب به تفاوت الگوهای تغذیه در مراحل مختلف فیزیولوژیک نظری قبیل از جفتگیری، آبستنی و شیردهی توجه لازم را معطوف داشته و به ارزیابی و مدیریت مرتع به مثابه اصلی ترین منبع تأمین خوراک دام در نظام کوچندگی اهمیتی شایان توجه می‌دهند. در مطالعه دیگری حیدری و سعیدی گراغانی (۱۳۹۰) با معرفی دانش بومی بهره‌برداران مرتع ییلاقی دام‌وند بخش لاریجان بیان داشتند بهره‌برداران مرتع به راحتی می‌توانند تقسیم مکانی پراکنش دام، تنظیم اندازه گله یا لنگه‌ها، محل‌های تأمین آب شرب گله، مسیر حرکت گله، بهترین نقاط چراگاه و استراحت گله را به خوبی مدیریت نمایند. همچنین سیدی (۱۳۹۱) با بررسی ارزیابی دانش و آگاهی مرتعداران پیرامون عملیات فرق در حفظ و احیای مرتع شهرستان بجنورد اعتقاد دارد که علیرغم پایین بودن سطح سواد جمعیت موردمطالعه، آنان از دانش و آگاهی نسبتاً بالایی در زمینه فرق برخوردار هستند. همچنین یوسفی و عبادی (۱۳۹۱) در بررسی شیوه مدیریت سنتی گله‌داری و دامداری در مناطق نیمه‌خشک ایران، به این نتیجه رسیدند که شیوه‌های سنتی دامداری در منطقه با آداب و رسوم و عرف‌های زیاد می‌تواند یک شیوه همیاری و مشارکتی موفق در میان روستائیان در جهت مدیریت مرتع روزتا و همچنین کاهش گله‌داری به صورت منفرد توسط دامداران به مرتع و تخریب آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود و این شیوه‌های مدیریتی سنتی در سطوح محلی می‌تواند در حل مسائل اجتماعی - اقتصادی و مدیریتی برای مدیران ذیربیط و همچنین جلوگیری از تخریب پوشش‌گیاهی و در نتیجه گسترش روند بیابانی شدن در منطقه، راهگشا و مؤثر باشد.

قربانی و همکاران (۲۰۱۳) نیز در مطالعه‌ای تحت عنوان تحلیل دانش اکولوژیک بومی در مدیریت پایدار منابع طبیعی در ایران نشان دادند استراتژی‌های مدیریت مرتع در طول یکسال و تخمین وضعیت مرتع بر اساس دانش بومی گله‌داران می‌باشد. آنها همچنین بیان نمودند دانش اکولوژیک بومی گله‌داران نقش مهمی در پایداری سرزمین ایفا می‌نماید. در مطالعه دیگری کاوانا و همکاران (۱۳۹۰) با بررسی دانش بومی تغذیه دام کوچندگان ایل

## مقدمه

دانش بومی را می‌توان دانش بکارگیری منابع، متناسب با شرایط بوم‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی دانست که بومیان در جهت رفع نیازهای خود از آن بهره می‌گیرند (۱۹). همچنین دانش بومی علمی است معطوف به تجربه و متناسب با زیست‌بوم که بخشی از نیازهای انسانی از طریق آن مرتفع می‌گردد. این علم ریشه در گذشته دارد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود (۹). نظامهای دانش بومی مبنای تصمیم‌گیری‌ها در سطح محلی است زیرا ناشی از تلاش مردم محلی برای شناسایی مشکلات و یافتن راه حل‌ها به کمک نوآوری و آزمودن آنهاست (۱۴ و ۲۰). مردم محلی فن‌آوری‌های جدیدی را در سطح محلی ابداع می‌کنند و در راه اشاعه آنها از تشكلهای ارتباطی بومی بهره می‌گیرند (۳ و ۷). برای نیل به توسعه لازم است تا دانش عشاير متتحول شود و همچنین به دیدگاه‌های بدیل که از دانش عشاير نشأت گرفته است توجه شود (۱۸). دانش بومی به عنوان مبنای برای بیان نهادن علومی موفق و کارا در راه دستیابی به توسعه مدنظر قرار گرفته است. لازمه محلی بودن توسعه، توجه به چنین دانشی است که خود این امر مقدمه توجه همه‌جانبه به توسعه است، زیرا دانش بومی ناشی از تجربیات بلاواسطه در طبیعت است و طی فرایند عمل کردن حاصل می‌شود. بنابراین خصوصیت خاص اجتماعی، فیزیکی و بوم‌شناختی هر منطقه و محل در دانش بومی لحاظ می‌شود و آنرا به منطقه خاص محدود می‌کند (۱۹). فرناندز گیمنز و سوئیفت (۲۰۰۳) مهتمین راهبردهای مدیریت دام در آسیای مرکزی را حرکت یا جابجایی (کوچ) و تنوع دام در گله می‌دانند و اعتقاد به پایداری این سیستم‌ها و قابلیت آنها برای تلفیق با روش‌های مدیریت مرتع در جهان توسعه یافته دارند. پاپ زن و افشارزاده (۱۳۸۹) نیز در بررسی سازوکارهای بومی مدیریت مرتع عشاير کوچنده ایل کلهر بیان داشت که بهره‌برداران این منطقه اشراف کاملی بر مسائلی همچون تقسیم‌بندی مرتع بر حسب شیب زمین و واحد دامی، قطعه‌بندی مرتع و برخی راهکارهای بومی مدیریت مرتع نظیر کوچ و ارزیابی مرتع دارند. افشارزاده و پاپ زن (۱۳۹۰) با بررسی دانش بومی تغذیه دام کوچندگان ایل

## مواد و روش‌ها

### منطقه مورد مطالعه

دهستان اسفندقه با مساحتی بالغ بر ۳۴۷۲ کیلومتر مربع یکی از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت است. مرکز این دهستان روستای دولت‌آباد می‌باشد. مراع عشاير این منطقه در فاصله ۳۰ کیلومتری غرب شهر جیرفت قرار دارد. این مراع بین طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۵۴ دقیقه الی ۵۷ درجه و ۳۲ دقیقه و عرض ۲۷ درجه و ۱۷ دقیقه الی ۲۹ درجه و ۰۲ دقیقه واقع شده‌اند. این منطقه از شمال به دهستان ساردوئیه از شمال شرق به روستای دلفارد، از شرق به دهستان‌های هلیل، خاتون‌آباد و گنج‌آباد و از جنوب شرق به دهستان اسماعیلی و از جنوب به دهستان هور و از غرب به دهستان دشت‌تاب شهرستان بافت متصل است. اقلیم مراع ییلاقی منطقه با متوسط بارندگی ۲۹۶ میلی متر، سرد و خشک و مراع قشلاقی با میانگین بارندگی ۲۳۰ میلی‌متر، آب و هوایی گرم و خشک دارد (۱۳).

## روش انجام پژوهش

در بخش زمینه‌ای این تحقیق آمار و اطلاعات مورد نیاز از مقالات علمی و پژوهشی و کارشناسان اداره امور عشاير شهرستان جیرفت و اداره کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان جمع‌آوری شد. تحقیق در زمینه دانش بومی بهدلیل کیفی بودن موضوع، غالباً از نوع اکتشافی است. در این پژوهش مشارکتی از تکنیک‌های گروه‌های متمرکز و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. در نمونه‌گیری‌های هدفمند، اصولاً هدف انتخاب مواردیست که با توجه به موضوع تحقیق اطلاعات زیادی داشته باشند (۱۵ و ۱۶). جامعه آماری این تحقیق را عشاير کوچنده ایل محمدی سلیمانی که زیست‌بوم آنها در منطقه اسفندقه شهرستان جیرفت است تشکیل داده‌اند. در این پژوهه با نمونه‌گیری هدفمند ضمن فیش‌برداری، دسته‌بندی و مشاهده حضوری از ۴۸ نفر از خبرگان و افراد آگاه عشاير محمدی سلیمانی منطقه اسفندقه (این افراد توسط اداره امور عشاير شهرستان جیرفت و اداره کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان معرفی شدند بهصورت فردی (از ۱۸ نفر) یا گروهی (۲

۲۰۰۵) در ارزیابی الگوهای چرایی بومی بهره‌برداران مناطق شرق تانزانیا نتیجه گرفتند دامداران به‌طور سنتی تفاوت انواع خاک و گونه‌های گیاهی غالب را در مناطق تحت چرا تشخیص می‌دهند و الگوهای چرا در مراع طوری تنظیم می‌کنند که دامها در فصول سرد و بارانی در مناطق نزدیک و در فصول گرم و خشک در مناطق دورتر چرا کنند.

ایل محمدی سلیمانی یکی از بزرگترین ایلات استان کرمان بوده که در جنوب استان و در محدوده شهرستان جیرفت زندگی می‌کنند. بسیاری از آنها کوچرو هستند و دارای بیلاق و قشلاق می‌باشند. بیلاق این عشاير در مناطق سرگز، گرزنوئیه و بند ارزانی بوده و قشلاق آنها در مناطق کرجاز، چاشور، گدار تنگاری، کوه سفید و چلیتون واقع است. معروفیت این ایل در استان کرمان بیشتر بواسطه تولید و عرضه صنایع دستی منحصر به‌فرد (خصوصاً فرش گل سرخ) آنها است.

باتوجه به اینکه بخش اصلی نظام دانش هر کشور، دانش بومی آن است انجام پژوهش‌هایی در زمینه داشته‌ها و دانسته‌های جوامع محلی می‌تواند درک شرایط محلی را بهبود داده و زمینه مناسبی را برای انجام فعالیت‌های توسعه جوامع ایجاد نماید. از آنجا که دانش بومی برگرفته از زندگی افراد بومی و بخش مهمی از زندگی مردم فقیر می‌باشد، بکارگیری آن با حداقل امکانات و ابزار امکان‌پذیر است و بسیار راحت‌تر از فناوری‌های مدرن وارداتی از کشورهای توسعه یافته توسط مردم پذیرفته شده و بکار گرفته می‌شود و می‌تواند اثر بیشتری در بهبود سطح زندگی عشاير کشور داشته باشد. بدین ترتیب اتخاذ سیاست‌های مالی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای سازمان‌های غیر دولتی و جوامع مدنی و استفاده از فناوری مدرن اطلاعاتی و ارتباطی می‌تواند با تسهیل تبادل دانش بومی باعث ماندگاری و دوام آن و از طرفی سهم‌بندی مزایای بکارگیری این دانش برای حصول اهداف توسعه پایدار در جوامع مختلف شود. بنابر آنچه ذکر شد هدف از این مطالعه بررسی ساختار اجتماعی و دانش بومی ایل محمدی سلیمانی بخش اسفندقه شهرستان جیرفت بود.

مقوله‌بندی شده و داده‌های مربوط به آن در همان حیطه قرار گرفت.

### نتایج

#### طبقه‌بندی پاسخگویان بر حسب سن، سواد و سابقه گله‌داری

همانطور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود، حدود ۱۶/۷ درصد بهره‌برداران کمتر از ۳۰ سال سن، ۳۳/۳ درصد ۳۰ تا ۴۵ سال سن، ۳۱/۳ درصد بین ۴۶ تا ۶۰ سال قرار دارند و تنها ۱۸/۸ درصد بهره‌برداران منطقه در طبقه سنی بالاتر از ۶۵ سال قرار داشتند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد ۲۲/۹ درصد بهره‌برداران بی‌سواد بوده اما حدود ۷۷ درصد بهره‌برداران دارای تحصیلات در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و یا مقاطع بالاتر هستند که از این بین ۳۳/۳ درصد بهره‌برداران تحصیلات دیپلم و یا بالاتر دارند که این نتایج بیانگر سطح سواد و معلومات بالای پاسخگویان است. در زمینه ساقه بهره‌برداری نیز ۲۰/۸ درصد بهره‌برداران کمتر از ۱۵ سال سابقه، ۲۹/۲ درصد آنها بین ۱۵ تا ۳۰ سال سابقه، ۳۱/۳ درصد نیز بین ۳۱ تا ۴۵ سال سابقه بهره‌برداری و حدود ۱۸/۸ درصد آنها بیشتر از ۴۵ سال سابقه بهره‌برداری از مرتع داشتند (جدول ۱).

الی ۵ نفره) مصاحبه به عمل آمده است. مصاحبه و پرسش‌ها در این پژوهش مشارکتی تا جایی ادامه یافت که پاسخ‌های تکراری برای محقق اثبات شد و ادامه مصاحبه‌ها نکته‌ای جدیدی به یاداشت‌ها اضافه نمی‌نمود. این کیفیت در اثر تکرار پاسخ‌های مشابه از طرف مصاحبه شوندگان مختلف برای محقق محرز می‌گردد (۲). در هر کدام از این مصاحبه‌های انفرادی و گروهی، برای پرهیز از خستگی افراد، بیش از یک تا دو ساعت به طول نمی‌انجامید. یاداشت‌ها به روش تحلیل محتوا مقوله‌بندی شد و سپس نتایج آن تدوین شد. خبرگان و افراد آگاه از ۱۱ سامان عرفی (ایشوم) در منطقه موردمطالعه انتخاب شدند. این افراد همگی از ایل محمدی سلیمانی بودند. زمان اجرای پژوهش فصل بهار و مکان آن مراعط ییلاقی و قشلاقی منطقه اسفندیه شهرستان جیرفت بود. در این تحقیق ساختار اجتماعی و جنبه‌های مختلف دانش بومی عشاير از جمله حافظه اکولوژیکی بهره‌برداران، قطعه‌بندی مرتع، استراتژی‌های بومی و سازگار مدیریت مرتع، حفاظت گله و تنوع ترکیب گله، شیوه بهره‌برداری از مراع، چرا و تغذیه دام در حالت‌های مختلف فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. به این معنا که بعد از مطالعه کلی مباحث مطروحه، بحث در حیطه‌های مختلف

جدول ۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی، سواد و سابقه گله‌داری

متغیرها	طبقه‌بندی	تعداد	درصد	درصد تجمعی
سن	کمتر از ۳۰ سال	۸	۱۶/۷	۱۶/۷
	۴۵-۳۰	۱۶	۳۳/۳	۴۹/۹۹
	۶۰-۴۶	۱۵	۳۱/۲۵	۸۱/۲۴
سواد	بی‌سواد	۱۱	۲۲/۹۱	۱۰۰
	ابتدایی	۱۲	۲۵	۴۷/۹۱
	راهنمایی یا متوسطه	۹	۱۸/۷۶	۶۶/۶۷
	دیپلم یا بالاتر	۱۶	۳۲/۳۳	۱۰۰
سابقه گله‌داری	کمتر از ۱۵ سال	۱۰	۲۰/۸۳	۲۰/۸۳
	۳۰-۱۵	۱۴	۲۹/۱۶	۴۹/۹۹
	۴۵-۳۱	۱۵	۳۱/۲۵	۸۱/۲۴
	بیشتر از ۴۵ سال	۹	۱۸/۷۶	۱۰۰

سمت ریش‌سفید طایفه (بزرگ طایفه) برگزیده شود. عوامل مؤثر در انتخاب بزرگ تیره و بزرگ طایفه عبارتند از: قدرت شبکه خانوادگی، قدرت رهبری، خبرگی، قدرت اقتصادی، ارتباطات خارجی، اقوام پدری، اقوام مادری، اقوام همسر و قدرت زن.

**چوپان و رفیق چوپان:** هر ایشوم غیر از سر ایشوم دارای تعدادی چوپان و رفیق چوپان نیز می‌باشد. وظایف چوپان عبارتند از بردن دام به مرتع، محافظت از گله، جلوگیری از اختلالات دام‌های ایشوم با دام سایر گله‌داران می‌باشد. رفیق نیز وظیفه دارد که چوپان را در چرا و مدیریت گله دام کمک و همراهی دهد. معمولاً در هر گله (بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ رأس دام) سامان‌های عرفی (ایشوم)، یک چوپان و یک رفیق چوپان حضور دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که چوپان فرد با تجربه‌تری نسبت به رفیق می‌باشد به همین دلیل مدیریت گله بر عهده اوست. همچنین این مطلب نیز باید گفته شود که هم چوپان و هم رفیق خود نیز تعدادی دام در گله‌ای که به چرا می‌برند دارند و بر همین اساس نیز تعداد روزهایی که در یک ماه باید شبانی کنند طی تقویمی که از سوی سراپایشوم تهیه می‌شود مشخص می‌گردد.

با توجه به نتایج جمع‌بندی اظهارات مصاحبه شوندگان با بیشترین فراوانی و تکرار و مطالعه منابع می‌توان دانش بومی بهره‌برداران مرتع را در منطقه موردمطالعه به دسته‌های مختلفی تقسیم نمود که هر یک از آنها به عنوان یک الگوی اکولوژیکی در نظام سنتی ایران از جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی خاصی برخوردار هستند. این موارد از گذشته‌های دور تا به امروز در بین دامداران با تجربه و دارای آگاهی بالا به صورت یک فرهنگ عمومی و قابل احترام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. که در این بخش به برخی از آنها اشاره می‌شود.

### ساختمار اجتماعی

#### هرم قدرت و تقسیم وظایف

بزرگ طایفه، بزرگ تیره و سراپایشوم: هر ایشوم (سامان عرفی) بزرگتری دارد به نام «سراپایشوم» که ایشوم به نام او خوانده می‌شود: مانند ایشوم امیدعلی محمدی سلیمانی. وظایف سراپایشوم عبارت است از انتخاب قلمرو، تعیین زمان حرکت و زمان‌بندی چرا، اجاره مرتع و پس‌چر زراعت (سیفال) و حفاظت از حدود مرتع ایشوم، اخذ پروانه چرا و معاملات و عقد قرارداد. سراپایشوم‌ها به وسیله ریش‌سفید تیره (بزرگ تیره) انتخاب و یکی از ریش‌سفیدان و بزرگان تیره‌ها به



شکل ۱- نهاد اجتماعی عشاير محمدی سلیمانی

**کوار (کاوار):** به خانه‌های ساخته شده از چوب و گرته (گونه‌ای از جنس نی) گفته می‌شوند که معمولاً در مناطق قشلاقی از آنها استفاده می‌شود و به صورت موقتی بوده و هر ساله امکان بازسازی آن وجود دارد. در ضمن این نکته را نیز باید ذکر کرد که از کوار علاوه براینکه به عنوان محلی برای زندگی استفاده می‌شود کاربردهای دیگری نظیر انبار مواد لبندی نیز دارد.

**سیاه‌چادر:** در ایلات شهرستان جیرفت طراحی نیاکان ایل منجر به تولید سکونتگاهی با قابلیت حمل شده که به عنوان یک معماری بومی پذیرفته و نقل و برقایی و برچیدن آن بسیار راحت است. سیاه‌چادر به شکلی هوشمندانه طراحی شده که استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود در محیط را به همراه دارد و توسط زنان عشایر بافته شده و بوسیله مردان برپا می‌شود.

**مروه:** معمولاً محل استقرار هر ایشوم را به وسیله سنگ‌چینی مشخص می‌کنند. در واقع می‌توان گفت برای نشان دادن محوطه هر ایشوم آن را در اصطلاح محلی مره می‌کشنند. که این کار به وسیله سنگ‌چیدن یا نشانه‌های خاص انجام می‌شود و هدف آن هشدار و جلوگیری از تجاوز سایر بهره‌برداران به حریم خصوصی یک ایشوم می‌باشد.

**کورم:** کورم محل نگهداری گوسفندان تازه متولد شده از دو تا سه ماهگی آنها می‌باشد. کورم‌ها معمولاً از گل و چوب (گلی- چوبی) یا شاخه‌های درختان (چوبی) توسط افراد بومی در سامان عرفیشان ساخته می‌شود. این محل همانطور که گفته شد محل نگهداری دام با سن کمتر از سه ماه بوده و تا زمانی که دامها آمادگی برای چرا پیدا کنند از آنها در این محل نگهداری می‌شود.

**کهله یا گاش:** کهله یا همان آغل به محل نگهداری دامها گفته می‌شود که معمولاً در منطقه اسفندقه به دو صورت سنگی- گلی و سنگی چوبی به وسیله افراد محلی ساخته می‌شوند.

**پرچ:** به محل دوشیدن گوسفندان در زبان محلی پرچ گفته می‌شود. پرچ محوطه‌ای می‌باشد که اطراف آن را با سنگ و چوب محصور کرده‌اند. شیردوشی به وسیله زنان عشایر انجام می‌شود.

### شیوه بهره‌برداری از مراتع (نوع حقوق عرفی)

شیوه بهره‌برداری بر طبق حقوق عرفی در منطقه بصورت مشاعی و مشاعی مفروز است. در بهره‌برداری مشاعی پروانه چرا هر سامان عرفی به صورت مشاع به نام مرتعداران ذیحق آن سامان صادر می‌گردد و بهره‌برداران براساس سیاهه لیست پروانه مرتعداری از مراتع بهره‌برداری می‌نمایند. این شیوه بهره‌برداری گروهی را مشاعی غیرمفروز یعنی بهره‌برداران بدون تفکیک سامان‌های عرفی به همان شیوه عرف از مراتع خود به صورت گروهی استفاده می‌نمایند. در این نوع شیوه بهره‌برداری ممکن است چند سامان عرفی در منطقه دارای مراتع مشترکی بوده که بر اساس ضوابط خاصی از آن استفاده می‌کنند. اما در مشاعی مفروز بهره‌برداران بعضی از سامان‌های عرفی بصورت عرف براساس سهم دام و مراتع افراد حدود بهره‌برداری را تفکیک می‌نمایند و به آن پاییند هستند.

### قسمت‌های مختلف یک ایشوم (سامان عرفی)

به هر سامان عرفی در زبان محلی در منطقه اسفندقه، ایشوم گفته می‌شود. ایشوم قسمتی از یک مراتع می‌باشد که به تنها یا به صورت ترکیبی از بهره‌برداران اداره شده و در واقع محل سکونت اعضای خانواده و دام در طول دوره کوچ (چه در مناطق بیلاقی چه در منطقه قشلاقی) می‌باشد و عمدتاً مرزهای آن از سوی همچنین یک مجاور به رسمیت شناخته می‌شود. ایشوم همچنین یک واحد اجتماعی، اقتصادی و اصلی ترین گروه خویشاوندی در هر گروه ایلی به شمار می‌رود. اعضای ایشوم گله مشترک دارند و بسته به قدرت و منزلت اجتماعی و اقتصادی، صاحب تعدادی دام در گله یا گله‌های ایشوم هستند.

**کپر:** خانه‌های موقت عشایری که به وسیله گل و سنگ و چوب در داخل یک ایشوم ساخته می‌شوند. معمولاً این خانه‌ها هر ساله بازسازی شده و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرند. کپرها به وسیله خود عشایر ساخته می‌شوند و در ساخت آنها از مصالح محلی مخصوص به آن منطقه استفاده می‌کنند.

**گله استاق:** گله استاق گوسفندان و بزهای نر، ماده‌های نزاییده، گوسفندان با سن یکسال به بالا و اخته‌ها را شامل می‌شود. این گله در مناطق دور از ایشوم چرا داده می‌شوند و معمولاً شب در مرتع می‌مانند و به آغل بر نمی‌گردند. گله استاق ممکن است تا ۱۵ کیلومتر هم از ایشوم دور شود و به چرا پردازد. همراه هر گله معمولاً یک چوپان و یک رفیق حضور دارند.

**گله زاییده:** گله زاییده بزها و گوسفندان آیستان یا زاییده را شامل می‌شود. این گله از حدود ۱۵ آبان هر سال از گله استاق جدا شده و به صورت جداگانه تا اول تیر ماه چرا می‌شوند. معمولاً دامها در آذر می‌زایند که به این موقع از سال در اصطلاح محلی ماه قوس می‌گویند. این گله نیز مانند گله استاق توسط دو نفر شامل چوپان و رفیق به مرتع برده می‌شود اما شب باید حتماً به ایشوم برای دوشیدن و مراقبت بیشتر برگردانده شوند. اما این گله نیز وارد آغل نمی‌شود و در یک محل مخصوص بدون حصار نگهدارشته می‌شوند.

معمولأ بردن گله استاق و زاییده به صورت دوره‌ای بین کسانی که دامشان در گله (به عنوان چوپان و رفیق) می‌باشد با قرعه و بر اساس تعداد دام در یک ماه تقسیم می‌شود. نمونه‌ای از تقویم چرایی گله‌های استاق و زاییده در جدول (۲) آورده شده است.

**گله کمر:** معمولاً این گله در داخل ایشوم و یا اطراف آن به چرا می‌پردازد. سگ گله کار مراقبت از این گله را بر عهده دارد. در شب این گله وارد کورم یا کهله (آغل) می‌شود.

**آبشور:** آبشور به محل شرب آب دام‌ها گفته می‌شود که در منطقه موردنظر به صورت فلزی یا سیمانی ساخته شده است.

### تنوع ترکیب گله

در منطقه مورد مطالعه با توجه به مصحابه‌های صورت گرفته با خبرگان عشاير آنان بیان می‌داشتند که نزدیک به ۸۰ درصد دام منطقه را بزها تشکیل می‌دهند و تنها حدود ۲۰ درصد گله دام اختصاص به گوسفندان دارد آنها در ذکر دلایل این امر بیان نمودند که پرورش بز به خاطر بالا بودن دوقلو زایی، مقاومت به بیماری و مشکلات کمتر در تأمین علوفه و جایگاه نگهداری از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. همچنین به دلیل شرایط سخت منطقه از لحاظ توپوگرافی (کوهستانی و صخره‌ای در مناطق بیلاقی)، اقلیم، حضور گونه‌های بوته‌ای و خشبي و علوفه محدود با خوشخوارکی کم، در منطقه بزها مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دهند و نسبت به دیگر نشخوارکنندگان رجحان و برتری ویژه‌ای دارند. آن‌ها معتقدند که در بین دام‌ها بز بیشتر متکی به مرتع منطقه بوده و در مقایسه با گوسفند هزینه کمتری برای نگهداری دارد.

### انواع گله‌های دام

عواشر منطقه موردمطالعه دام خود را به سه گروه گله با ترکیب مختلف بر اساس سن، جنس و آبستنی تقسیم کرده و هر کدام را به صورت جداگانه به مرتع برده و چرا می‌دهند. در زیر به تفصیل در مورد انواع گله‌های دام در مرتع منطقه توضیح داده خواهد شد.

جدول ۲- نمونه‌ای از تقویم چرایی گله‌های استاق و زاییده

گروه	نام	نقش	مجموع تعداد	گردش اول	گردش دوم	گردش سوم	گردش اول	گردش دوم	گردش سوم	گردش اول	گله زاییده	گله استاق	گله زاییده	گردش اول	گردش دوم	گردش سوم
۱	علی مس	چوپان رفیق	۲۶۰	۱۳ روز یک ماه	-	-	-	-	-	۱۳ روز یک ماه	-	-	-	-	-	-
۲	مراد مس	چوپان رفیق	۱۴۰	-	۷ روز یک ماه	۷ روز یک ماه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	محمد مس	چوپان رفیق	۲۰۰	۱۰ روز یک ماه	-	-	۱۰ روز یک ماه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع																
۶۰۰																

منطقه می‌توان به در حال توسعه بودن گیاهان خوشخوارک و با ارزش رجحانی بالا و جایگزینی با گیاهان کم‌ارزش اشاره کرد. همچنین از دیگر علایم گرایش مشبت می‌توان به پراکنش مناسب پوشش لاشبرگ و عدم ملاحظه فرسایش تشدیدشونده در منطقه اشاره کرد. دلیل این موضوع را از یکی از تحصیل‌کردهای مرتعداری عشاير منطقه جویا شدیم که او در پاسخ گفت که به‌دلیل اسکان عشاير و مهاجرت تعدادی از گله‌داران تعداد دام موجود در منطقه قشلاقی سال به سال کمتر شده ولی از جهتی به‌دلیل آثار خشکسالی‌های دو دهه گذشته هنوز وضعیت و تولید علوفه به شرایط عادی و نرمال خود باز نگشته است.

**چرا و تغذیه دام در حالت‌های مختلف فیزیولوژیک** در نظام دامداری سنتی، تغذیه دام به‌طور عمده از طریق بهره‌برداری از مرتع انجام می‌گیرد. از همین‌رو دامداران عشاير دارای تجربه و تخصص چگونگی بهره‌برداری مرتع هستند. عشاير محمدی سلیمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند آنان از شیوه‌های زیر به‌منظور مدیریت چرا و تغذیه دام استفاده می‌کنند:

**زمان قوچ‌گذاری (فحلی):** تغذیه در این دوره زمانی از نظر دامداران فوق العاده مهم است، چرا که تغذیه مناسب باعث هماهنگ شدن فحلی، هماهنگ شدن زایش‌ها و افزایش دوقلوایی خواهد شد. به همین دلایل حدود یک ماه قبل از جفت‌گیری، دام تحت رژیم غذایی به شرح زیر قرار می‌گیرد.

در این زمان باید دام را دور از استرس نگه داشت و فاصله مکانی بین آب و محل تعییف دام کم باشد. روش چرانیدن دام در این شرایط به شرح زیر می‌باشد؛ بعد از ظهر گوسفندان را برای چرا علوفه به مرتع می‌برند. این کار تا ساعت ۹-۸ شب ادامه می‌باید سپس تا ساعت ۱۲ شب به گله استراحت داده می‌شود. پس از این مدت دوباره دام به مدت ۴ ساعت به چرا مشغول می‌شود. سپس گله استراحت داده شده و چرای بعدی به تشخیص چوپان و باتوجه به شرایط گله چند ساعت بعد انجام

### قطعه‌بندی مرتع و تأثیر نوع مدیریت سنتی بر وضعیت، تولید و گرایش مرتع بیلاقی و قشلاقی

عشایر منطقه از دو سیستم چرایی باز و بسته برای تعییف دامهای خود استفاده می‌کنند. معمولاً در اواخر زمستان و در فصل بهار که علوفه به‌فور در مرتع دیده می‌شود بدون قطعه‌بندی از مرتع استفاده می‌شود. اما در فصل تابستان و زمستان که علوفه مرغوب و با کیفیت بهشدت کاهش می‌یابد و وضعیت مرتع کاهش یافته و تولید علوفه کم می‌شود مرتع را به صورت دوره‌ای (سیستم چرایی تناوبی) و با توجه به تقسیم‌بندی که از قبل توسط سرایشوم انجام می‌شود چرا می‌کنند. تقسیم‌بندی مرتع یا به صورت طبیعی بر اساس یال آبراهه که به آن تل گفته می‌شود و یا بر اساس اسم یک منطقه خاص با نام مشخص مثلاً کوه سیاه انجام می‌شود. در برخی موارد با سنگ چین محدوده چرایی را مشخص می‌کنند که به آن مره گفته می‌شود. در این شیوه بهره‌برداری قطعه‌بندی مرتع بر اساس میزان تولید علوفه مرتع، نوع پوشش گیاهی، وسعت و شبیه منطقه انجام می‌شود.

در مرتع بیلاقی اسفندقه نتایج تحقیقات کارشناسان منابع طبیعی همچنین بازدید میدانی اینجانب و همکاران نشان می‌دهد وضعیت، تولید مرتع و گرایش آن در اکثر قسمت‌ها خوب و مشبت می‌باشد که این وضعیت از یک طرف به تعداد دام کمتر از ظرفیت چرای مرتع و از طرفی دیگر به شیوه‌های مدیریتی صحیح آن بستگی دارد. در واقع این وضعیت را می‌توان نتیجه شرایط آب و هوایی مناسب، دانش اکولوژیکی بومی گله‌داران، پایبند بودن به قوانین عرفی، مشارکت متقابل گله‌داران دانست. درواقع براساس اصول علمی مرتعداری، شیوه حاضر از سیستم چرای تناوبی پیروی می‌نماید. این شیوه بهره‌برداری کاملاً منطبق بر دوره رویشی گیاهان است.

این در حالی است که مرتع قشلاقی اسفندقه وضعیت متوسط، تولید علوفه کم ولی گرایش مشبت داشتماند. از جمله علایم نشان‌دهنده گرایش مشبت در

### حافظه اکولوژیک عشاير

#### انواع روش‌های شناسایی دام: ۱- رنگ کردن:

قسمتی از بدن دام را با رنگ مخصوصی به نام گلک که از یک گل قرمز رنگ بدست می‌آید برای شناسایی دامها رنگ می‌کنند. این رنگ بهدلیل طبیعی بودن هیچگونه عوارضی برای دام نداشته و حدود یکسال دوام دارد.

۲- دروش کردن: بریدن گوش دام با تیغ یا چاقو را برای شناسایی دام هر شخص دروش کردن می‌نماید.

۳- داغ کردن: روش دیگر نشانه‌گذاری دامها برای شناسایی هر چه بهتر داغ کردن روی بینی دام بوسیله میله و یا سیم گداخته می‌باشد.

۴- شناسایی طبیعی: معمولاً اکثر گله‌داران منطقه دام خود را از روی رنگ دام و شکل گوش می‌توانند تشخیص دهند. تقسیم‌بندی دامها بر اساس رنگ و شکل گوش در جدول (۱) آورده شده است.

می‌شود. این روش چراندن در طول یک شب‌انه‌روز است که برای هر روز تا پایان قوچ‌گذاری تکرار می‌شود.

**زمان آبستنی (حاملگی):** تغذیه در این دوره به دو بخش تقسیم می‌شود؛ در سه ماه آغازین، تغذیه دام در این ماه‌ها چندان تفاوتی با جیره نگهداری ندارد. در دو ماه پایانی، دام‌های آبستن عصرها یکی دو ساعت زودتر از سایر گله بازگردانده شده و با کاه و جو تعییف می‌شوند. در صورت عدم آمادگی مرتع برای چرا، برای مثال، در هنگام بارش‌ها، صبح نیز با کاه و جو به صورت سبک تغذیه می‌شوند.

**زمان شیوده‌ی:** در زمان شیردهی، دام‌ها به شدت تغذیه می‌شوند. در این حالت برای بدست آوردن شیر بیشتر، ظهرها برده‌ها را تا صبح روز بعد از مادرشان جدا می‌کنند. روش چرا مانند زمان قوچ‌گذاری است با این تفاوت که آخرین مرحله استراحت کمتر بوده و دام ماده در این مرحله توسط چوپان به سمت محل دوشیدن هدایت می‌شود.

جدول ۳- تقسیم‌بندی و شناسایی دام بر حسب رنگ و شکل گوش

اصطلاح محلی	شكل گوش	رنگ
مور کبر	-	بدن قهوه‌ای و صورت سفید
مور سرخ	-	بدن سفید و صورت قهوه‌ای
گیش زرد	-	بدن کاملاً زرد
مور سیاه	گوش کوچک	بدن کاملاً سیاه
رش سیاه	گوش بزرگ	بدن کاملاً سیاه
مور گازار	گوش کوچک	بدن کاملاً سفید
رش گازار	گوش بزرگ و پهن	بدن کاملاً سفید

یکی از روش‌های تشخیص دامها، طبقه‌بندی دامها بر اساس جنسیت و سن آنها است. ترکیب گله عشاير محمدی سلیمانی از گوسفند و بز تشکیل شده است اما تعدادی از عشاير بهتازگی رو به پرورش گاو نیز آورده‌اند و تعدادی گاو نیز دارند. در مجموع گله‌داران منطقه دامها را به دو دسته کلی نر و ماده تقسیم نموده و در هر طبقه سنی یک اسم خاصی را برای انواع مختلف دام در نظر می‌گیرند. این اسمی و اصطلاحات نشان‌دهنده اشراف بر نیازهای متفاوت دام در مراحل مختلف فیزیولوژیکی در مدیریت مرتع و دام است. در جدول (۴) به تفکیک

عواصیر بهندرت در این منطقه در تشخیص دام‌های ایشان اشتباه می‌کنند اما بهدلیل جلوگیری از سوءتفاهم و یا نزاع هر شخص موظف است برای دام‌های خود علامت خاصی داشته باشد. به گفته یکی از اهالی منطقه حتی زنان و فرزندان عشاير محمدی سلیمانی دارای حافظه اکولوژیک قوی بوده و توان تشخیص سریع دام‌های خانواده را دارند.

طبقه‌بندی و نامگذاری انواع دام بر اساس سن و جنس

اصطلاحات و نامهای محلی بزها، گوسفندان و گاوها بر اساس طبقات سنی و جنسی آنها بیان شده است.

جدول ۴- نامگذاری و طبقه‌بندی بومی انواع دام بر حسب سن و جنس

گاو				گوسفند				بز			
اصطلاح محلی	جنس	سن	اصطلاح محلی	جنس	سن	اصطلاح محلی	جنس	سن	اصطلاح محلی	جنس	سن
پارک	نر/ماده	از تولد تا شش ماهگی	کمر	نر/ماده	از تولد تا سه ماهگی	کمر	نر/ماده	از تولد تا سه ماهگی	کمر	نر/ماده	از تولد تا سه ماهگی
گستر	ماده	از شش ماهگی تا دو سالگی	بره	نر/ماده	از سه تا شش ماهگی	کهره	نر/ماده	از سه ماهگی تا یک سالگی	کهره	نر/ماده	از سه ماهگی تا یک سالگی
جلب	نر	از شش ماهگی تا دو سالگی	شیشک	نر/ماده	از شش ماهگی تا یک سالگی	کودار	ماده	یک سالگی تا دو سالگی	کودار	ماده	یک سالگی تا دو سالگی
گاو	ماده	از دو سالگی به بالا	میش	ماده	از یک سالگی تا دو سالگی	چپش	نر	یک سالگی تا دو سالگی	چپش	نر	یک سالگی تا دو سالگی
نر گاو	نر	از دو سالگی تا چهار سالگی	غوج	نر	از یک سالگی تا دو سالگی	گیسه	ماده	دو سالگی تا سه سالگی	گیسه	ماده	دو سالگی تا سه سالگی
گاو کار	نر	از چهار سالگی به بالا	دو بر-شش بر-پیره میش	نر/ماده	از دو سالگی تا شش سالگی	نوکن (نری)	نر	دو سالگی تا سه سالگی	نوکن (نری)	نر	دو سالگی تا سه سالگی
				ماده	از شش سال به بالا	توشتیر	ماده	سه ساله تا شش سالگی	توشتیر	ماده	سه ساله تا شش سالگی
			پیره غوج	نر	از شش سال به بالا	شیرکن	نر	سه ساله تا شش سالگی	شیرکن	نر	سه ساله تا شش سالگی
						پیره بز	ماده	از شش سال به بالا	پیره بز	نر	از شش سال به بالا
							نری پیر				از شش سال به بالا

۳- در برخی از موارد زنگوله را به گردن کلها و بزهای بزرگ (سن بیش از سه سال) می‌بندند که باعث تحرک بیشتر دامهای کوچکتر شده و به اصطلاح این دامها را رئیس گله می‌نامند.

استفاده از سگ گله: سگ‌ها از حیواناتی هستند که از قدیم‌الایام با انسان خو گرفته و اهلی شده‌اند و در کار نگهبانی از گله و احشام همواره در کمک دامداران بوده‌اند و عنتایر منطقه اسفندیقه جیرفت هم همیشه چند قلاده سگ در کنار دام‌هایشان نگه می‌دارند. معمولاً به ازای هر ۱۰۰ رأس دام عشاير منطقه از ۳ تا ۵ قلاده سگ استفاده می‌کنند. این سگ‌ها در اطراف گله جایی را برای نظارت انتخاب می‌کنند و به ظاهر اکثرًا در حال استراحت هستند ولی در صورت خطر بسیار سریع دخالت می‌کنند و خود را بین جانوران درنده و گله دام قرار می‌دهند و در صورت ادامه حضور جانوران مهاجم با آن‌ها درگیر می‌شوند.

### دانش بومی در حفاظت گله

۱- استفاده از زنگوله: در گله‌های مختلف استفاده از زنگوله مرسوم بوده و معمولاً به چند دلیل از این وسیله استفاده می‌شود. که در زیر به تعدادی از استفاده‌های آن اشاره می‌شود.

۱- برای پیدا کردن محل چرای کل‌های بزرگ که تحرک زیادی داشته و در اصطلاح محلی به آنها نری‌های یاغ گفته می‌شود.

۲- برای آگاه کردن چوپان از حمله گرگ یا حیوانات وحشی: معمولاً در بهار و تابستان که گله به مراثع با فاصله از ایشوم توسط چوپانان بردہ می‌شود و بهناچار شب مجبور به ماندن در منطقه می‌باشند در این حالت که به آن دست هوشاد گفته می‌شود به تعدادی از کل‌ها و بزها که سن بیشتر از دو سال دارند زنگوله بسته که در صورت حمله حیوانات وحشی از جمله گرگ چوپانان را با رمیدن (فرار کردن و ایجاد صدا) از حضور حیوانات وحشی آگاه سازند.

مو و شستن در آب گرم و خشک کردن، از آنها در صنایع دستی استفاده کرده و یا در بازارهای محلی می‌فروشنند.

**فروش دام:** هر ساله در اوخر خداداد یا اوایل تیرماه قبل از نودم که پایان سال دامی و شروع سال دامی جدید می‌باشد عشاير تمام گله‌ها را در ایشوم خود جمع کرده و هر شخص موظف است دام فروشی خود را تا ۵ تیر از گله‌ها جدا کرده و به فروش برساند. دام فروشی را عشاير منطقه به سه دسته تقسیم می‌کنند که شامل بز و گوسفندان نر پیر، بز و گوسفند ماده پیر و بز و گوسفندان جوان گوشته می‌باشد.

#### چرخه مدیریت سالانه دام عشاير

شکل شماره (۲) خلاصه‌ای از چرخه مدیریت عشاير محمدی سليماني را در منطقه اسفندقه شهرستان جيرفت نشان می‌دهد. اين چرخه مدیریتی را می‌توان تقويم سالانه عشاير نيز نام‌گذاري کرد که هر ساله بهصورت دقیق رعایت می‌شود. این چرخه مدیریتی منطبق با شرایط اقلیمی، توپوگرافی و زیستمحیطی منطقه بوده و نتیجه تجربه نیاکان آنها می‌باشد که نسل به نسل و سینه به سینه به عشاير کنونی رسیده است و از این جهت بسیار حائز اهمیت می‌باشد. البته در این قسمت ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاریخ‌های ذکر شده در شکل (۲) ممکن است در هر سال تحت تأثیر شرایط آب و هوایی تغییرات اندکی داشته باشند.


#### برخی از فعالیت‌های مدیریتی و اقتصادی عشاير

**نری‌ریزی (فصل آبستن):** در اوایل تیرماه گله‌های استاق و زاییده با هم یکی شده و فصل جفت‌گیری و آبستنی شروع می‌شود به این موقع از سال در اصطلاح محلی نودم گفته می‌شود که معنای آن این است که نود روز از نوروز گذشته است. دامهای ماده معمولاً در ماه قوس (آذر ماه) یک یا دو قلو می‌زایند. چندقولزایی در منطقه کمتر مشاهده شده است. به گوسفندان و بزهایی که سر تاریخ هر ساله در آذر ماه می‌زایند قوسی گفته می‌شود و به دامهایی که در خارج از فصل زایش می‌زایند کموری گفته می‌شود.

**بخته کردن (اخته):** به بزهای بخته شیرکن گفته می‌شود. بخته کردن از سن هشت ماهگی به بعد انجام می‌شود. بخته کردن انواع مختلفی دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود.

۱- روش سنتی که با تیغ انجام می‌شود. ۲- روش صنعتی که با قیچی انجام می‌شود.  
دلیل بخته کردن نرهای جوان شور کردن آنها است. یعنی نرها پس از هشت ماهگی در صورتی که جفت‌گیری نکنند ادرار خود را می‌خورند و گوشت آنها بوی ماک (ادرار) می‌گیرد. معمولاً تمام دامهای جوان گوشته که برای فروش در نظر گرفته شده‌اند در دو فصل تابستان یا زمستان بخته می‌شوند.

**پشم و کرک‌چینی:** عشاير منطقه معمولاً در اوایل بهار هنگامی که هوا رو به گرمی می‌رود طی مراسمی با وسیله به نام دو کارد توسط افراد خبره پشم گوسفندان و کرک و مو بزها را می‌چینند. پس از چیدن پشم، کرک و



شکل ۲- چرخه مدیریت دام عشاير محمدی سلیمانی

می‌دارند شبانان زمان و مکان چرای دام را در عرصه چراغاه متناسب با اقتضایات محیطی و انسانی تنظیم می‌کند و فنونی را برای حفاظت از دام و علوفه، هدایت گله و تنظیم ترکیب و تولید گله به کار می‌بنند مطابقت دارد.

تنوع ترکیب گله، جدا کردن گله‌های دام و تعدیل تعداد دام همگی به منظور بهره‌برداری بهینه از مرتع انجام می‌شود. از آنجا که هر کدام از انواع دام دارای ویژگی و سازگاری خاصی هستند، تنوع ترکیب گله موجب استفاده حداکثر از علوفه مرتعی می‌شود، به علاوه این ترکیب متنوع موجب کاهش خطر ناشی از بیماری‌ها و خشکسالی و مانند آن می‌شود. ترکیب گله‌های بهره‌برداران منطقه موردمطالعه نشانه اشراف بر رفتار تغذیه‌ای و میزان تحرک و نیز توجه به شرایط توپوگرافی منطقه است. این بخش از نتایج با مطالعات قربانی (۱۳۹۱)، یوسفی و عبادی (۱۳۹۱) طهماسب (۱۳۹۱) که بیان می‌دارند گله‌داران به خوبی از فواید تنوع ترکیب گله آگاهی دارند و نشان دهنده دانش بومی غنی آنها در این زمینه است مطابقت دارد.

احتیاج غذایی گوسفندان مادر در مراحل قبل و بعد از جفتگیری، در طول مدت بارداری و در زمان شیردهی بسیار متفاوت است، بنابراین باروری زیاد و راندمان پرورشی مطلوب ایجاب می‌کند که گوسفندان مادر در هر یک از

## بحث و نتیجه‌گیری

دانش سنتی و بومی بهره‌برداران مرتع میراث ملی گرانقدری محسوب می‌شود که برای برنامه‌های مدیریتی و توسعه اجتماعی، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند و به شناسایی، اولویت‌بندی و ساماندهی منابع محلی کمک می‌نماید. معرفی این دانش سنتی در بین اقشار جامعه باعث رویکرد مثبت نسبت به شغل شبانی شده و می‌تواند استحکام ساختار اجتماعی را در میان بهره‌برداران تقویت کند.

بطورکلی براساس یافته‌های این پژوهش اکثر بهره‌برداران منطقه از نظر میزان دانش بومی و تجربه شغلی در سطح بالایی قرار دارند. نتایج جمع‌بندی اظهارات مصاحبه‌شوندگان نشان داد بهره‌برداران مرتع به راحتی می‌توانند تقسیم مکانی پراکنش دام، محل‌های تأمین آب شرب گله و مسیر حرکت گله را به خوبی تعیین نمایند که با نتایج مطالعات بارانی (۱۳۸۲) و اوکرا (۲۰۱۲) نیز مطابقت دارد. آنها همچنین می‌توانند با اجرای سیستم‌های چرایی سنتی مانند چرا در شب، چرای تنایوی، مدت توقف دام، چگونگی حفاظت از گله و فرق قسمت‌های مختلف مرتع ضمن حفاظت مرتع از تمام قسمت‌های یک محدوده عرفی به صورت یکنواخت استفاده نمایند. این بخش از نتایج با مطالعات حیدری و سعیدی گرگانی (۱۳۹۰) و کاوانا و همکاران (۲۰۰۵) که بیان

دام را از نظر نژاد، ظرفیت تولید، بیماری و مانند آن مشخص می‌کند. عشاير نیز در جایگاه بدیهی پرورش‌دهندگان دام، برای شناسایی دامهای خود، به‌گونه‌ای دور از انتظار، سازوکارهایی دارند که امکان شناسایی دام را برای آنها میسر می‌سازد. ایل محمدی سلیمانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلکه در طول سالیان دراز، سازوکارهای را بدین منظور تدارک دیده و با بهره‌گیری از همین سازوکارهای به ظاهر ساده، ضرورت شناسایی دامها در طول قرن‌های متتمادی برطرف شده است. انواع روش‌های نشانه‌گذاری و شناسایی دام در منطقه اسفندقه عبارتند از رنگ کردن، دروش کردن (بریدن گوش)، داغ کردن و شناسایی طبیعی. اینگونه فرهنگ و رفتار در طی قرن‌ها از نزاع و سوءتفاهمات جلوگیری کرده و مدیریت گله‌ها را برای بومیان آسان‌تر می‌نماید. بر اساس مطالعات قربانی (۱۳۹۱)، طهماسب (۱۳۹۱) و شاهحسینی (۱۳۸۴) شناسایی دام نزد سایر ایلات و عشاير کشورمان نیز کمابیش به همین صورت انجام می‌پذیرد.

در منطقه موردمطالعه قطعه‌بندی مرتع و حرکت دادن گله بوسیله شبانان و در نتیجه استفاده از مناطق مختلف چرایی باعث دسترسی به کلیه علوفه موجود در مرتع شده و همچنین باعث چرای یکنواخت می‌شود. بنابراین قطعه‌بندی مرتع و رعایت فصل مناسب چرا و حرکت دادن دام به قسمت‌های مختلف مرتع برای حفظ معیشت پایدار گله‌داران امری ضروری بوده که آنان این امر را به تجربه آموخته‌اند. این دانش برای تعدادی از عشاير و دامداران سایر نقاط کشور نیز توسط قربانی و همکاران (۲۰۱۳) و یوسفی و عبادی (۱۳۹۱) گزارش شده است.

به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده تجارب زمان آزموده مردم محلی را از طریق مدیریت مشارکتی به خدمت بگیریم، چرا که برای دستیابی به اهداف توسعه بوم‌شناسخی، بویژه در محیط‌هایی با پیچیدگی شرایط واسطه گردش سالانه‌شان دارای شناخت کاملی از شرایط زیست‌بومشان هستند، ما را با دنیایی از دانش آشنا خواهد کرد. بهره‌بردارانی که توانمندی تولید اقتصادی پایدار از

مراحل متناسب با بیاز به‌طور کامل تغذیه شوند. این نکته بر دامدارانی که خود و پدارنشان تجربه تعامیل دیرین با دام را دارند پوشیده نیست از این روست که با آنچه در اختیار دارند سعی در تغذیه بهتر دام در چنین موقعیت‌هایی دارند. باروری گوسفند مادر به‌وسیله چگونگی تغذیه قبل از جفتگیری شدیداً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این بخش از نتایج با مطالعات پاپزن و افسارزاده (۱۳۸۹) و فرنانز گیمنز و سوئیفت (۲۰۰۳) که بیان می‌دارند تغذیه اضافی هدفدار قبل از جفتگیری و شرایط پرورشی مناسب (وزن زنده) می‌تواند موجب رهایی تعداد بیشتری تخمک و در نتیجه افزایش درصد دوقلوزایی شود و این تعلیف اضافی باعث می‌شود، فحلی بعد از شیردهی سریع‌تر و با شدت بیشتری ظاهر شود مطابقت دارد.

الگوی زیست کوچندگی حاصل انتباط با شرایط اقلیمی سرزمین‌های خشک و سکونتگاه‌های عشايري حاصل انتباط با شرایط کوچندگی است. عشاير به تبع نوع زندگی و ضرورت‌های زیستی، سکونتگاه‌هایی با مشخصات ویژه دارند که در همسازی کامل با شرایط حاكم بر زندگی‌شان است. در منطقه موردمطالعه از سه نوع سکونتگاه به نام‌های کپر (ساخته شده از سنگ، گل و چوب)، کوار (ساخته شده از چوب) و سیاه‌چادر (ساخته شده از کرک و موی بز) استفاده می‌شود. این سکونتگاه‌ها همگی با مصالح محلی و به صورت دستساز توسط خود عشاير بنا شده‌اند. به همین منظور این سکونتگاه‌ها همسو با طبیعت بوده و باعث تخریب خاک و محیط زیست نمی‌شوند. این سازه‌ها به‌دلیل سادگی و هزینه کم ساخت، تعمیرات و نگهداری و حتی قابل حمل بودن (سیاه چادر) کاملاً سازگار با شیوه زندگی عشايري هستند. این بخش از تحقیق با مطالعات پاپزن و افسارزاده (۱۳۸۹) و شاهحسینی (۱۳۸۴) که بیان می‌دارند سازه‌های سنتی سکونتگاهی عشاير چهارفصل است که با اندک تغییرات، خود با تغییرات فصول هماهنگ می‌گردند و در آن علاوه بر رعایت شرایط لازم برای زندگی، به جنبه‌های هنری نیز توجه شده است همسو می‌باشد.

امروزه شناسایی دامها در دامداری‌های بزرگ از طریق پلاکزنی به گوش دامها، که در حکم کارت شناسایی آنهاست، صورت می‌گیرد. این شیوه وضعیت هر

مطلوب را جهت بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی توسعه داد. مهمتر اینکه، این سیستم و پایداری مرتبط با آن به روشنی بهترین گزینه برای توسعه پایدار را نشان می‌دهد.

اراضی مرتّعی را دارد و در صورت تطابق با شرایط زندگی جدید، و احیای نهادهای سنتی و بهره‌گیری از دانش غنی آنها در زمینه دامداری و مدیریت مرتع می‌توان موارد

## References

1. Afsharzadeh, N., & A.H. Papzan, 2011. Indigenous knowledge of animal nutrition Kalhor tribe's nomads. Journal of Rangeland, 5(3): 322-333.
2. Barani, H., A.A. Mehrabi, M.R. Moghadam, & M. Farhadi, 2003. Investigation of spatial and time pattern of grazing on eastern of Alborz. Iranian journal of Natural Resource, 56(1, 2): 117-130. (In Persian)
3. Borhani, M., 2013. Evaluation of range management plans, technical and ecological aspects of rangeland Semirom Isfahan Province. Thesis range management, Tehran University. (In Persian)
4. Chandrasekhar, K., K.S. Rao, R.K. Maikhuri, & K.G. Saxena, 2006. Ecological implications of traditional livestock husbandry associated land use practices: A case study Himalaya, India. Environments. Volume, April 2007, 299-314.
5. Fernandez-Gimenez Maria, E., & M. David Swift, 2003. Strategies for sustainable grazing management in the developing world. The 7th International Rangeland Congress, 123-129.
6. Ghorbani, M., 2012. The role of social networks in range exploitation mechanisms (Case Study: Taleghan), PhD thesis, Department of Natural Resources, Tehran University. (In Persian)
7. Ghorbani, M., H. Azarnivand, A.A. Mehrabi, H. Nayebi, & K. Seeland, 2013. The Role of Indigenous Ecological Knowledge in Managing Rangelands Sustainably in Northern Iran. Ecology and Society Journal, 18(2): 1-15.
8. Golzari, A., & S.M. Mirdamadi, 2010. Indigenous knowledge in a practical approach to sustainable development, Journal of Agriculture and Natural Resources, 8 (30): 28-32. (In Persian)
9. Grenier, L., 1988. Working with indigenous knowledge, A guide for researcher. 50P.
10. Heydari, Qh., & H.R. Goraghani Saeedi, 2011. Introduction to exploitation of native grasslands in the ecotourism industry (Case Study: the usual summer pastures larijan). Proceedings of the First International Conference on Sustainable Development in Tourism Management and Shiraz, 154-162. (In Persian)
11. Kavana, P.Y., J.B. Kizima, & Y.N. Msanga, 2005. Evaluation of grazing pattern and sustainability of feed resources in pastoral areas of Eastern zone of Tanzania, livestock research center. Livestock Research for Rural Development, 17 (1): 226-234.
12. Lorry Jafarabadi, A., 2012. Evaluation of Esfandaqeh villages, rural geography of the seminar course, martyr Bahonar University, 43. (In Persian)
13. Okereke, E., 2012. Indigenous knowledge system, the need for reform and the way forward global advanced research, journal of Agricultural science. 1(8): 201-209.
14. Papzan, A., & N. Afsharzadeh, 2010. Identification of indigenous knowledge, reproduction and animal among women nomads Kalhor tribe. Rural Development Quarterly, 13 (4): 180-161. (In Persian)
15. Papzan, A., and N. Afsharzadeh, 2011. Native mechanisms in range management of Kalhor tribe's nomads, Iranian journal of Range and Desert Research, 17(3): 476-488. (In Persian)
16. Seyed, M.S., 2012. The investigation of the knowledge of pastures grazed pastures in the preservation and restoration. Third National Conference on Sustainable Development desertness deal with the Iranian desert. September. Arak. 384-379. (In Persian)
17. Shah Hosseini, R., 2005. Sangsari nomadic tribes, of the desert coast to the heights of the Alborz, publisher garden ideas, printing. 296 pp. (In Persian)
18. Shah Vali, M., & M. Ardakani, 2006. Principles, concepts and knowledge of indigenous agriculture. Tehran, Ministry of Agriculture, Research and rural issues. (In Persian)
19. Tahmash, R., 2012. Investigation the effect of traditional methods for exploitation and management of rangelands (case study: pastures nomadic tribes of Fars six blocks), Master Thesis, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Surrey. 121 pp. (In Persian)
20. Yosefi, & M. Ebadi, 2012. Evaluation of traditional management and husbandry flocks on half-dried region in Iran (village Khvravnd city Khomeini). Third National Conference desertness. Arak. September. 37-31. (In Persian)