

عوامل مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری در ایران: یک مطالعه‌ی کیفی

فاطمه هاشمی^{۱*}، علیرضا نیکبخت نصرآبادی^۲، فریبا اصغری^۳

مقاله‌ی پژوهشی

چکیده

گزارش خطاهای حرفه‌ای برای ارتقای امنیت بیمار نه تنها در بیمارستان که در مرکز سربایی مراقبت نیز امری اساسی و یک فعالیت ضروری محسوب می‌گردد. متاسفانه، پرستاران نیز مانند بسیاری از پرسنل تیم پزشکی بیشتر اشتباهات و خطاهای کاری خود را گزارش نمی‌کنند. هدف مطالعه‌ی حاضر تبیین عوامل مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری از طریق کشف تجربیات پرستاران بالینی و مدیران پرستاری در خصوص این موضوع بود.

این پژوهش مطالعه‌ای کیفی است که با مشارکت ۱۱۵ پرستار شاغل در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شیراز انجام پذیرفته است. اطلاعات به کمک بحث گروهی نیمه‌سازمان یافته در ۱۷ جلسه جمع‌آوری و سپس بر اساس رویکرد تحلیل محتوای قراردادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. طبقات اصلی پدیدار شده در این مطالعه عبارت بودند از:

الف) نگرش کلی پرستاران نسبت به خطاهای کاری، ب) موانع گزارش خطاهای پرستاری و ج) انگیزانده‌های گزارش خطأ.

گزارش خطاهای اطلاعات فوق العاده گرانبهایی را برای پیشگیری از بروز خطاهای بعدی و ارتقاء ایمنی بیماران فراهم می‌نماید. در مجموع، با توجه به موانع و انگیزانده‌های گزارش خطاهای پرستاری لازم است که قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شود و در آن قوانین نحوه گزارش‌دهی خطأ و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن از جمله خود خطأ به‌طور واضح تعریف و تعیین گردد.

واژگان کلیدی: خطاهای پرستاری، ایمنی بیمار، موانع گزارش خطأ، انگیزانده‌های گزارش خطأ

^۱ مربی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

^۲ دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۳ استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

* نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، تلفن: ۰۹۱۷۷۱۴۲۱۱۳

مقدمه

وجود شرایط کاری نامطلوب برای پرستاران و پزشکان است. مشکلات سیستم‌ها می‌تواند از طریق گزارش ۳ نوع خطای پیشگیری شوند: خطاهایی که به بیمار آسیب رسانده، خطاهایی که رخ داده اما به بیمار آسیب نرسانده و خطاهایی که می‌توانستند آسیب برسانند اما درست قبل از آسیب رسیدن به بیمار جلو وقوع آن‌ها گرفته شده است؛ چرا که از طریق گزارش خطا می‌توان انواع خطاهای را با افراد دست اندرکار مراقبت سلامت در میان گذاشت و شیوه‌ی پیشگیری از وقوع مجدد آن‌ها را آموزش داد (۱۲، ۱۱). لذا گزارش خطاهای حرفه‌ای برای ارتقای امنیت بیمار نه تنها در بیمارستان که در مراکز سربپایی مراقبت نیز امری اساسی و یک فعالیت ضروری محسوب می‌گردد (۱۴، ۱۳، ۱۱). متأسفانه، پرستاران نیز مانند بسیاری از پرسنل تیم پزشکی بیشتر خطاهای کاری خود را گزارش نمی‌کنند (۱۵). جولایی و همکاران کمتر بودن گزارش خطاهای دارویی از تعداد خطاهای رخ داده را نگران کنند، و لزوم مورد مطالعه قرار دادن موانع گزارش‌دهی را گوشزد نموده‌اند (۶). مطالعه‌ی حاضر با هدف کشف عوامل مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری طراحی و اجرا گردیده است.

روش کار

این پژوهش به صورت یک مطالعه‌ی کیفی با هدف تبیین عناصر مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری از طریق کشف تجربیات آنان در خصوص این موضوع بوده که در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شیراز انجام گردیده است. روش‌های تحقیق کیفی این امکان را فراهم می‌کنند تا قرائت‌های مختلفی از یک واقعیت به ظهور برسد (۱۶). در این پژوهش اطلاعات با استفاده از روش focus group جمع‌آوری گردید که بهترین روش برای جمع‌آوری اطلاعات و کشف نگرش درباره‌ی موضوعات بالقوه آسیب‌پذیر و تبیین باورهایی است که رفتاری را تحمیل می‌کنند (۱۹ - ۱۷، ۱۴). ۱۷ گروه متمرکز همگن مشکل از

على‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در تکنولوژی و مهارت‌های مراقبت سلامت، بسیاری از بیماران در اثر خطاهای پزشکی دچار آسیب یا مرگ می‌شوند. به علاوه، میزان بالایی از این خطاهای هزینه‌های گرافی را به دنبال دارد که در پژوهش‌های متعددی در کشورهای مختلف گزارش شده است (۲، ۱). بخش قابل ملاحظه‌ای از خطاهای پزشکی، خطاهایی است که توسط کادر پرستاری و در هنگام ارائه خدمات مراقبتی به‌وقوع می‌پیوندد، به‌طوری که این خطاهای سالانه منجر به مرگ و آسیب‌رسانی به هزاران نفر و هم‌چنین افزایش هزینه‌های درمان می‌گردد (۳). در ایران یافته‌های حاصل از پژوهش‌های پراکنده در این زمینه حاکی از وقوع ۱۶/۷ درصد خطاهای دارویی در بیمارستان‌های آموزشی شهر ۴۱/۶۶ سنتنج است. به علاوه، ۱۰ درصد خطای دارویی و ۴۱/۶۶ درصد خطاهای دارویی در شرف وقوع در بین دانشجویان پرستاری شهرستان اراک گزارش‌گردیده است (۵، ۴). هم‌چنین، میانگین وقوع خطاهای دارویی در طول سه ماه در بیمارستان‌های مورد مطالعه در شهرستان تهران ۱۹/۵ مورد برای هر پرستار گزارش شده است (۶). بنابراین، می‌توان گفت که در کار با بیمار، خطا تهدیدی جدی، اجتناب‌ناپذیر و همیشگی برای اینمی بیمار محسوب می‌گردد (۸، ۷). ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، علیرغم دقت و تحری که در انجام مهارت‌های ایشان دارند از این‌گونه خطاهای مصنون نیستند (۹). به عنوان مثال، در پژوهشی که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام گردید، گزارش شد که ۳۰ درصد از پرستاران تحت مطالعه در طول ۲۸ روز مطالعه حداقل یک مورد خطا داشته‌اند. در آمریکا نیز حدود ۲۰۰۰ مرگ مرتبط با خطاهای پرستاری در بین ۱۰۰۰۰ بیمار در طی یک دهه گزارش‌گردیده است (۱۰). خطاهای حین کار صرف‌نظر از این‌که به بیمار آسیب برسانند یا نرسانند نشان‌دهنده‌ی مشکلات زیادی در سازمان هستند. یکی از این مشکلات عدم وجود فرهنگ اینمی و

واقعی‌شان را نسبت به خطای طرح شده در سناریو و موضوعات مطرح شده پیرامون آن به گفت‌و‌گو بگذارند. گفت‌و‌گوهای هر جلسه ضبط و یادداشت شد.

جهت تعیین طبقات اصلی و خرد طبقات عوامل مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد. به این صورت که اطلاعات هم‌زمان جمع‌آوری، تحلیل، طبقه‌بندی و مقوله‌بندی شدن‌دتا اطلاعات به دست آمده معنی‌دار، جامع کل نظرات، معتبر و دقیق باشد و در نهایت به شناخت ویژگی‌ها، خلاصه‌ها و آسیب‌های مرتبط با پدیده‌ی مورد بررسی پردازد (۲۳، ۲۲). شروع عملیات تحلیل، بعد از اولین جلسه‌ی گروهی و کدگذاری و دسته‌بندی بعد از جلسه‌ی گروهی دوم آغاز شد. این کار به پژوهشگر کمک می‌کرد تا بتواند سایر سؤالات مورد نیاز را طراحی و مسیر مطالعه را بهتر هدایت نماید. به این ترتیب، مراحل زیر در تحلیل داده‌ها به دقت دنبال گردید: نوار بحث‌های گروهی یک به یک و کلمه به کلمه، نسخه‌نویسی شدن (۲۳، ۲۲). سپس، سطر به سطر مورد بررسی قرار گرفته و با صورت جلساتی که توسط مشاهده‌کننده نوشته شده بود نیز تطبیق داده شد، و جملات معنی‌داری که مرتبط با موضوع اصلی پژوهش بودند، علامت‌گذاری شد. مفهوم اصلی جملات معنی‌دار به صورت کد، استخراج شده و دسته‌بندی کدها آغاز گردید. به این ترتیب که کدهایی که دارای مفاهیم مشترکی بودند تحت یک طبقه قرار داده شده و نامگذاری گردید. با هر جلسه بحث گروهی جدید، ممکن بود طبقات قبلی بازنگری و حتی ادغام یا طبقه‌ی جدیدی ایجاد گردد. سپس با نظارت یک ناظر با تجربه در تحلیل داده‌های کیفی، کار طبقه‌بندی و نام‌گذاری طبقات مورد بازنگری قرار گرفت. به این ترتیب، تم‌های اصلی مطالعه استخراج و ارتباط بین طبقات مشخص گردید.

ملاحظات اخلاقی

شرح و بیان هدف پژوهشگر و اخذ رضایت آگاهانه

مترون‌ها، سوپر وایزورها، سرپرستاران، و پرستاران صاحب‌نظر بیمارستان‌های دو دانشگاه تشکیل و هدایت شدند. تعداد افراد در هر گروه ۵ تا ۷ نفر و طول مدت جلسات ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بود (۱۷ - ۲۱). با هماهنگی دفاتر پرستاری دو دانشگاه از تمامی مترون‌ها و سوپر وایزورهای صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات دعوت شد و در هر بیمارستان از سرپرستاران و پرستاران صاحب‌نظر در فیلدها و بخش‌های مختلف به تعداد و تا زمانی که دیگر یافته‌ی جدیدی حاصل نشود و در واقع به تکرار و اشتعاب داده‌ها (data saturation) ختم شود، دعوت گردید. یک سناریو از خطای پرستاری به منظور طرح در جلسات بحث متمرکز گروهی از طریق مرور منابع (۱۷) تهیه و به‌وسیله‌ی تیم پژوهش مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفت و به‌منظور شفاف‌سازی و درک یکسان، پس از نظرخواهی از چند تن از پرستاران کار آزموده و صاحب‌نظر تغییراتی در آن داده شد (۱۴). رهبری و هدایت تمام جلسات بحث متمرکز گروهی توسط دو پژوهشگر از سه پژوهشگر مشارکت‌کننده در این طرح صورت گرفت.

قبل از شروع جلسات از مشارکت‌کنندگان رضایت آگاهانه برای ثبت و ضبط بحث‌ها گرفته شد. هر جلسه با همان سناریو از خطای پرستاری شروع گردید. سپس از شرکت کنندگان سؤال شد که «فرد خطای پرستاری کنندگان در سناریو باید خطای رخ داده را به چه کسی گزارش کند؟» سپس در ادامه نظر افراد درباره‌ی گزارش نمودن یا عدم گزارش خطای رخ داده در سناریو و نیز خطاهای مشابه پرسیده شد. به عبارتی، چگونگی برخورد شخصی شرکت‌کنندگان و نحوه ارائه‌ی گزارش خطای فوق در شرایط مشابه و هم‌چنین دلیل ارائه‌ی عدم ارائه‌ی گزارش از خطای مذکور و خطاهای مشابه سؤال شد. سپس پژوهشگران با روش پرسش و پاسخ، بحث گروهی را در سطح وسیع (عوامل همراه با گزارش خطای، نوع خطای، جنبه‌های قانونی، اقتصادی و اخلاقی گزارش خطای و ...) شکافتند و زمینه‌ای را فراهم کردند تا حتى المقدور شرکت‌کنندگان در فضایی آزاد و خلاق، تجربیات و رفتارهای

جدول شماره‌ی ۱ - تم‌های اصلی و فرعی استحصال شده

نگرش پرستاران نسبت به خطاهای کاری	عناصر مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری
فردي	
سيستمي	
ترکيب فردي و سيستمي	
موانع گزارش خطاهای کاري	
عوامل مرتبط با پرستار	
درک پرستار از وقوع و شدت خطاهای سازمانی	
فسار كار / بار زياد مسؤوليت	
انگيزاننده‌های گزارش خطاهای پرستار	
عوامل مرتبط با پرستار	
عوامل مربوط به خطاهای سازمانی	

(الف) نگرش کلی پرستاران نسبت به خطاهای کاری

شرکت‌کنندگان در پژوهش نگرش‌های فردی، سیستمی و ترکیبی از فردی و سیستمی را به گونه‌ای درک کرده بودند که در بروز رفتار و عملکردشان نسبت به خطاهای تأثیرگذار بود. شرکت‌کنندگان دارای نگرش فردی تصورشان بر این بود که پرستاران باید از هر گونه لغزش یا خطاهای کاملاً مبری باشند. آن‌ها همچنین بر این باور بودند که هرگاه خطایی در کار پرستاری از کسی سرزند، همان فرد مقصراً است و باید مورد تنبیه قرار گیرد. به عنوان مثال، یکی از پرستاران باسابقه می‌گوید: «به نظر من پرستار اصلاح نباید خطاهای داشته باشد. شغل ما شغلی نیست که در اون اشتباه کنیم. ما با جون آدمها سر و کار داریم هیچ اشتباهی تو این شغل پذیرفتی نیست». یا شرکت‌کننده دیگری می‌گوید: «پرستاری که خطاهای داشته باشد فرم مخصوص حادثه پر کنده و مجازات بشه چون که مقصراً».

مشارکت‌کنندگان دارای نگرش سیستمی بر این باور بودند که پرستار نیز مانند هر انسانی ممکن است در انجام کار پرستاری مرتکب خطاهای شود. آن‌ها همچنین خطاهای را یک رخداد چند عاملی می‌دانستند و اعتقاد داشتند که در بسیاری از موارد

به صورت مکتوب به منظور مشارکت شرکت‌کنندگان در جلسات بحث و شرکت در بحث‌های گروهی، ضبط صدای آن‌ها، تهیی نوشتار از صحبت‌هایشان، انجام هماهنگی‌های مربوط برای حضور در محیط پژوهش و تعهدات لازم برای در اختیار گذاشتن یافته‌ها در صورت تمایل افراد، حفظ گمنامی و اختیار انصراف در هر مرحله از پژوهش از ملاحظات اخلاقی این پژوهش بوده است.

نتایج

مشارکت‌کنندگان این پژوهش شامل ۱۱۵ پرستار با سوابق خدمتی بین ۳ تا ۲۷ سال و دامنه‌ی سنی بین ۲۳ تا ۵۴ سال بودند. ۸۰ پرستار و سرپرستار شرکت‌کننده، در بخش‌های داخلی و جراحی عمومی، جراحی و داخلی‌های تخصصی، مراقبت‌های ویژه، اطفال و نوزادان، روان‌پزشکی، اورژانس و ترومما، زنان و زایمان، درمانگاه‌های تخصصی و همچنین ۳۵ مترون و سوپر وایزور شرکت‌کننده در تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تخصصی دو دانشگاه مشغول به کار بودند. بیشتر شرکت‌کنندگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس پرستاری (۱۱۱ نفر) و از وضعیت استخدام رسمی قطعی (۷۷ نفر) برخوردار بودند. ۱۹ نفر رسمی آزمایشی، ۱۶ نفر پیمانی و سه نفر پرسنل طرحی بودند. مدرک تحصیلی ۴ نفر از شرکت‌کنندگان کارشناسی ارشد بود.

پس از تحلیل داده‌ها، تم‌ها یا طبقات اصلی عناصر مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری به صورت (الف) نگرش کلی پرستاران نسبت به خطاهای کاری، (ب) مواعظ گزارش خطاهای پرستاری، (و) (ج) انگیزاننده‌های گزارش خطاهای پرستاری، (و) (ج) انگیزاننده‌های گزارش خطاهای پرستاری به دست آمد. هر کدام از طبقات اصلی حاوی طبقات فرعی دیگری نیز بودند که در جدول شماره‌ی ۱ نشان داده شده است.

خطا، به عنوان موانع اصلی گزارش خطای در بین شرکت‌کنندگان در پژوهش مطرح شد.

(الف) عوامل مرتبط با پرستار: نوعی ادراکات شرکت‌کنندگان در پژوهش است که آن‌ها را از وظیفه‌ی مهم گزارش نمودن خطای به مافوق و پزشک مسؤول بیمار باز می‌داشت. از جمله‌ی این عوامل ترس از قوانین و تهدیدات شغلی، ترس از ضررهای اقتصادی، ترس از آبرو و حیثیت، ضعف در دانش و آگاهی نسبت به خطایی که رخ داده، ضعف در دانش و مهارت پرستار در خصوص چگونگی مدیریت خطای، کاهش مسؤولیت‌پذیری و تعهد کاری پرستار است. دست‌چینی از بیانات پرستاران شرکت‌کننده در پژوهش عبارتند از: «اگر ما خطای را گزارش کنیم علیه خودمون استفاده می‌شه. هیچ حمایت قانونی نداریم. تحت تهدید هستیم، مشکلات ما در نظام پزشکی بررسی می‌شه. پزشکان به ضرر ما و به نفع خودشان رأی می‌دن. می‌ترسیم شغل‌مون از دست بدیم. اخطار چپ و راست از دفتر پرستاری برآمون می‌اد». یا «یک پرستار به خاطر اشتباهی که خودش هم به تنها یی مقصّر نبود مجبور به پرداخت ۱۰ میلیون دیه شد. مگه ما چقدر حقوق می‌گیریم که مجبور به پرداخت دیه هم بشیم؟» یا «با ما بد برخورد می‌کنند، ما رو حقیر می‌شمند. احساس بی‌کفایتی در ما به وجود می‌ارزند». یا «ممکنه کسی به اشتباه خودش واقف نباشه، گزارش هم نمی‌کنه». یا «اطلاعات پرستاران در این زمینه کم است، آموزش ضعیف عمل کرده». یا «پرسنل با هم فرق دارند، به خود فرد، احساس مسؤولیتش، تعهدش نسبت به کار هم بستگی داره».

(ب) درک پرستار از وقوع و شدت خطای فاکتورهای طبقه‌بندی شده در این گروه بر اساس تجربیات و ادراکات مشارکت‌کنندگان مربوط به خطای می‌شد که آن‌ها را از اقدام به گزارش نمودن خطای باز می‌داشت. این فاکتورها شامل درجه و شدت خطای و نداشتن پیامد منفی و نیز ابهام در تعریف خطای بود. این جملات به کرات از مشارکت‌کنندگان شنیده می‌شد: «وقتی اشتباهی می‌کنیم تا جایی که مشکل برا بیمار پیش

خطای دارای علت منحصر به فرد نیست و نقایص و کاستی‌های متعددی در سازمان در بروز خطای توسط یک فرد دخالت دارد. این گروه هنگام بروز خطای به مقصّر دانستن یکنفر به تنها یی و مجرم شمردن او اعتقاد نداشتند. صحبت این پرستار جوان دیدگاه بسیاری از شرکت‌کنندگان را در این گروه نشان می‌دهد: «در حال حاضر، مردم فکر می‌کنند ما بیمارستانی‌ها نباید اشتباه کنیم. در حالی که هر انسانی ممکنه خطای کنه. خطای تو شغل‌های دیگه هم هست. وانگهی وقتی یکنفر اشتباه می‌کنه فقط به خودش برنمی‌گرده، دلایل زیادی داره».

رویکرد گروهی از شرکت‌کنندگان نسبت به خطای تلفیقی از دو نگرش فردی و سیستمی بود. این گروه بر این تفکر بودند که هرچند در سازمان مشکلات و نقایص متعددی وجود دارد که در بروز خطای توسط یک نفر نقش دارد، اما تأثیرگذاری ویژگی‌هایی مانند دانش، مهارت، مسؤولیت پذیری^۱، و پاسخگویی^۲ پرستار در پیشگیری از وقوع خطای بروز آن بسیار حائز اهمیت است. این گروه معتقد بودند که مشکلات و نقایص موجود در سازمان دلیل تبرئه‌ی پرستار از خطای و مشکلی که برای بیمار به وجود آورده، نمی‌باشد. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «با وجود تمامی مشکلات، من معتقدم باز هم هر فردی خودش هم مسؤوله و باید پاسخگوی اشتباهاتش باشه». این مطالعه نشان داد که شرکت‌کنندگان مسن‌تر و با سوابق کاری بیش‌تر و مترون‌ها و سوپر وایزورها بیش‌تر دارای نگاه فردی و افراد جوان‌تر و کم سابقه‌تر، پرستاران و سرپرستاران بیش‌تر دارای نگاه سیستمی یا ترکیبی از نگاه فردی و سیستمی نسبت به خطای پرستاری هستند.

ب) موانع گزارش خطای

پرستاران شرکت‌کننده در این پژوهش از عواملی به عنوان مهارکننده در گزارش خطای شاکی بودند. این عوامل در طبقه‌ی موانع گزارش خطای قرار گرفتند. از آن جمله، عوامل مرتبط با پرستار، مربوط به سازمان و نیز درک پرستار از وقوع و شدت

¹ Responsibility

² Accountability

فشار کار زیاد و بار مسؤولیت فراوان پرستاران بود که آن‌ها را از گزارش نمودن خطا باز می‌داشت. این عوامل شامل کمبود وقت پرسنل، وقت‌گیر بودن گزارش خطا و کار اضافی ایجاد شده در ارتباط با گزارش خطا می‌شد. دست‌چینی از بیانات شرکت‌کنندگان: «خیلی کار سر ما ریخته، پرسنل کم، بیمار زیاد و ... ما وقت برای گزارش خطا و مشکلات همراه با آن نداریم. مهم اینه من بتونم با این وقت کم برای بیمار اقدامی انجام بدم».

ج) انگیزانده‌های گزارش خطا

(الف) عوامل مرتبط با پرستار: این عوامل شامل داشتن دانش و مهارت مدیریت خطا توسط پرستار، مسؤولیت‌پذیری، تعهد کاری، و پاسخ‌گویی حرفاًی می‌باشد. دست‌چینی از تجربیات و گفته‌های پرستاران در این ارتباط:

«پرسنل باسواند و کارآمد، اشتباهاتشونو گزارش می‌کنند». یا «سیستم آموزشی باید تأثیرگذار عمل کنه». یا «به خود فرد هم مربوطه، این‌که پرستار چقدر مسؤولیت‌پذیره مهمه».

(ب) عوامل مربوط به خود خطا: در این حیطه لزوم واضح سازی تعریف خطا، شدت و پیامد منفی خطا، سوددهی گزارش برای بیمار و ارتکاب خطا توسط خود فرد انگیزانده بودند. از جمله تجربیاتی که بیان گردید:

«خطاهای کلاس بالا گزارش بشه. وقتی اشتباه من موجب صدمه رسیدن به بیمار شده و آشکار هست باید گزارش کنم». یا «باید برام روشن بشه چه خطایی گزارش کنم؟» یا «اگه گزارش خطا در بهبودی بیمار تأثیر داره گزارش می‌کنم». یا «وقتی خودم اشتباه کردم، گزارش می‌کنم».

(ج) عوامل سازمانی: عناصر قرار گرفته در این طبقه بر اساس تجربیات مشارکت‌کنندگان به سازمان محل کارشان مربوط می‌شد تا گزارش نمودن خطا توسط آنان را تسهیل نماید. غالب بودن جو حمایتی در سازمان، شانه خالی نکردن مدیران و پزشکان از بار مسؤولیت خطایی که رخ داده و مشارکت آن‌ها با فرد مرتكب خطا در پاسخگویی، وجود سیستم گزارش‌دهی بی‌نام، مواردی بودند که توسط

نیومنده و توزستیم کنترل کنیم نیازی به گزارش نیست». یا «ممکنه یه کاری از نظر من صحیح باشه، از نظر شما یا سرپرستار خطای باید بدونیم اصلاً خطا چی هست؟! مثلاً اگه به‌حاطر شلوغی بخش داروی بیمار دیر داده می‌شه، خطا هست؟»

(ج) عوامل سازمانی: اغلب شرکت‌کنندگان اذعان داشتند که فاکتورهایی در سازمان محل کارشان وجود دارد که موجب اجتناب آن‌ها از گزارش نمودن خطا می‌شود. برخوردهای ناخوشایند و واکنش نامناسب قبلی سازمان از جمله مدیران، پزشکان و همکاران، همچنین عدم تناسب واکنش مدیر با شدت خطا موجب می‌گردد که پرستار خطاها خود را گزارش نکرده و لاپوشانی کنند. گلچینی از بیانات شرکت‌کنندگان در پژوهش عبارت است از: «وقتی پزشک داد می‌زنه، ارتباطش نامناسبه، خطاهما را، حتی خطاها خودش رو به پرستار نسبت می‌ده، جرأت گفتن خطا از ما گرفته می‌شه و نمی‌گیم» یا «وقتی اشتباهاتمونو می‌گیم، با برخورد تند و ناعادلانه رو به رو می‌شیم (خطاهارا، تهدید‌ها ...)، آیا باید خطا گفته بشه؟!»

یکی دیگر از مفاهیم عمده‌ای که از داده‌های مرتبط با عنصر سازمان به دست آمده و باعث عدم گزارش خطا می‌گردید ضعف در فرهنگ ایمنی بود که به شکل آستانه‌ی محدود تحمل خطا، عدم پاسخگویی تیمی، یگانه قلمداد کردن فرد به عنوان مقصراً، استفاده از فرهنگ عیب‌جویی، سرزنش و شرمنده نمودن افراد مطرح گردید. در این ارتباط عبارتی از جمله زود از کوره در رفتن مسؤولان و پزشکان در مقابل خطا، شانه خالی کردن پزشک، مدیر و سایر اعضای تیم مراقبت از بار مسؤولیت خطا، و یک تن جواب دادن و کتک خوردن از ملاقاتی بیمار و دادگاه رفتن، یگانه مقصراً دانستن پرستار، سرزنش، عیب‌جویی و تحقیر فرد مرتكب خطا به تنها‌ی، توسط مشارکت‌کنندگان بیان شد.

(د) فشار کار/بار زیاد مسؤولیت: عوامل طبقه‌بندی شده در این گروه براساس ادراکات شرکت‌کنندگان مربوط به حجم و

برخی فرایندهای ذهنی فرد از جمله فراموشی، بی‌توجهی، کمبود انگیزه، بی‌دقیقی، غفلت و اهمال ناشی می‌شوند. در حالی که در رویکرد سیستمی، انسان‌ها خطای کارند و حتی در بهترین سازمان‌ها امکان خطای وجود دارد و در زمان وقوع خطای پی‌بردن به چون و چراً آن اهمیت دارد و نباید کسی را سرزنش کرد (۲۴). به هر حال، هر کدام از رویکردهای فردی و سیستمی، فلسفه‌ها و دلایل متفاوتی را نسبت به خطاهای انسانی دارند که درک این تفاوت‌ها در مقابل با آن‌ها دارای کاربردی مهم است و شاید تلفیقی از دو رویکرد نامبرده در مدیریت و کنترل خطاهای کاری در رشتۀ پرستاری بتواند جوابگو باشد. به این معنی که باید پذیرفت همواره مجموعه‌ای از شرایط امکان بروز خطای فراهم می‌کند، ولیکن به منظور کنترل خطاهای عکس عملکرد پیروان رویکرد فردی، علت‌یابی واقعه‌ی نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی، این را نیز در نظر بگیریم که ما نمی‌توانیم شرایط انسانی را تغییر دهیم، اما می‌توانیم شرایط کار انسان را عوض کنیم.

درونمایه یا تم اصلی بعدی در این مطالعه، موانع گزارش خطاهای پرستاری است. برنامه‌های بهبود سازمان می‌تواند با موانعی روبرو شود. گزارش نمودن خطاهای کاری یک فعالیت ضروری برای ارتقای امنیت بیمار است، اما همواره عواملی باعث کاهش آن می‌شوند (۲۵، ۱۴، ۱۱). بر اساس ادراکات شرکت‌کنندگان در پژوهش، موانع گزارش خطاهای کاری در حرفه‌ی پرستاری در ۴ طبقه‌ی فرعی عوامل مرتبط با پرستار، مربوط به خطای مرتبط با سازمان و مربوط به فشار کار یا بار زیاد مسؤولیت قرارگرفته‌اند. هر چند پژوهش حاضر درباره‌ی عوامل مرتبط با گزارش خطاهای پرستاری^۱ می‌باشد، اما ۳ طبقه‌ی فرعی شناسایی شده در آن که از سوی شرکت‌کنندگان به عنوان مانع گزارش خطای مطرح شده است مشابه با ۳ عامل کشف شده درباره‌ی اظهار خطای^۲ در مطالعه‌ی Fein و همکاران است، یعنی عوامل مرتبط با پرستار، مربوط

شرکت‌کنندگان مطرح گردید. عباراتی از بیانات پرستاران: «تو بیمارستان ما آگه مشکل‌کاری پیش بیاد پزشکان ما رونتها نمی‌گذارند، با هم حاشش می‌کنیم». یا «ما در وقت خطای نیاز شدید داریم در کمون کنند تا جرأت گزارش خطای پیدا کنیم». یا «عدم مجازات و سرزنش فرد مرتكب خطای». یا «وقتی خطای پیش می‌بینم فقط دنبال مقصص نگرددیم، علت رو پیدا کنیم». یا «باید پزشک و سرپرستار هم پاسخ‌گو باشند نه این‌که مقابل پرسنل وايسن». یا «آگه در گزارش خطاهای به اسم فرد توجه نشه. بدون نوشتن اسم‌مون خطای رو بنویسيم خوب محسنه».

شرکت‌کنندگان در این پژوهش علی‌رغم ترس‌ها و تهدیدات متفاوتی که مانع گزارش نمودن خطای شد، این اعتقاد را داشتند که مبالغه اطلاعات مرتبط با خطای گزارش نمودن آن جزء وظایف پرسنل پرستاری است تا بدین طریق اقدامات اصلاحی لازم برای بیمار انجام شود و بتوان از ایجاد صدمه‌ی ایجاد معتقد بودند که گزارش خطاهایی که در کار رخ داده می‌تواند در آموزش به سایر پرسنل پرستاری و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد خطای مؤثر واقع گردد.

بحث

در بررسی حاضر که درباره‌ی گزارش خطاهای پرستاری انجام گردید، سه تم اصلی با چندین طبقه‌ی فرعی انتزاع گردید. یکی از تم‌های استخراج شده نگرش کلی شرکت‌کنندگان نسبت به خطای کاری در حرفه‌ی پرستاری دارای پرستاری نسبت به خطاهای کاری در حرفه‌ی پرستاری دارای نگرش و رویکرد فردی می‌باشد، اما شرکت‌کنندگان جوان‌تر با رویکرد سیستمی به خطاهای کاری نگاه می‌کنند و در این میان گروهی نیز خطاهای را با تلفیقی از دو رویکرد می‌بینند. نیز می‌گوید که خطای انسانی با دو رویکرد فردی و سیستمی می‌تواند دیده شود که هر کدام فلسفه و دلایل متفاوتی دارند. در رویکرد فردی فرض بر آن است که کارهای بد از افراد بد سر می‌زنند. به نظر می‌رسد اقدامات غیرایمن از

¹ Report of nursing error

² Disclosure of error

گزارش خطاهاي فاقد پيامد سوء مى تواند به دليل ترسها و تهديدات متعددی باشد که فرد مرتکب خطا احساس مى کند (۲۷، ۳۵، ۳۶) يا مربوط به عدم حمایت همکاران و مدیران از اظهار كننده خطا باشد (۷). اين در حالی است که به ويزه گزارش خطاهاي در شرف وقوع در آموزش محيط به منظور پيشگيري از وقوع مجدد آنها در آينده و در نتيجه کاهش ميزان كلی خطا و افزايش ايماني بيمار بسيار حائز اهميت است (۱۱، ۶).

عوامل مربوط به سازمان محل کار پرستار از ديگر طبقات فرعی در طبقه اصلی موانع گزارش دهی خطا در پژوهش حاضر است. عدم برداری نسبت به خطا و تحمل آن (۱۷) و واکنش نامناسب سازمان، مدیران و همکاران نسبت به خطا و فرد مرتکب خطا (۳۷، ۳۶، ۲۸، ۲۱) همچنين عدم تناسب واکنش مدیر با شدت خطا (۳۶، ۳۴) و وجود فرهنگ سرزنش / شرمنده کردن انسانها (۳۵) از عوامل تهدیدكننده و از موانع گزارش خطاست. در حال حاضر، متأسفانه، به ويزه در مورد پرستاران، مقصري قلداد نمودن و سرزنش فردی، بارزترین واکنش نسبت به خطا و فرد مرتکب خطا به حساب می آيد (۱۱). بر اساس ادراکات شركت‌كننده‌گان در مطالعه‌ي حاضر، در صورت وقوع خطا غالباً حتى در مواردی که پرستار مقصري نیست وی را مقصري می‌شمارند. اين گونه اجحافها مى تواند موجب آسیب روحی در فرد و ايجاد ترس در جامعه‌ي پرستاري گردد. همچنين، آسیب‌هایی که از اشتباهات گذشته در ذهن ارائه‌كننده خدمات مراقبت سلامت باقی مانده، مى تواند تمایل به اظهار خطا را محدود کند (۱۱).

شرکت‌كننده‌گان در مطالعه‌ي حاضر نيز گزارش خطا را مرتبط با واکنش و برخوردهایی می‌دانند که به هنگام گزارش خطا اقلي از سوی مدیران و همکاران دریافت نموده‌اند، به اين معني که اگر واکنش و برخورد با آنها مناسب با خطا انجام شده نبوده، يا اين‌که مورد حمایت قرار نگرفته‌اند، و در آنها ترس‌های مختلف ايجاد شده، از اقدام مجدد به گزارش خطا ممانعت ورزیده و لاپوشاني مى‌نمایند. آن‌دسته از مدیران

به خطا، و مرتبط با سازمان (۱۷) که اين مى‌تواند به دليل يكسان بودن ماهيت و دلایل گزارش خطاهاي کاري به مدیران مافق با ماهيت و دلایل اظهار خطا به بيمار باشد؛ به اين معني که اظهار خطا به بيمار و افراد مهم خانواده‌ي او در واقع گونه‌اي دیگر از گزارش نمودن خطاست (۱۱). ترس‌های مختلف شامل ترس از قوانین و تهدیدات شغلی، ترس از ضررهای اقتصادي، ترس از آبرو و حیثیت، ترس از عواقب سوء گزارش (۲۶-۲۸)، همچنان برخی از ويزگی‌های فردی پرستار از جمله کاهش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی حرفة‌ای و نیز ضعف در شناخت خطا یا کمبود دانش و مهارت درباره‌ي نحوه گزارش خطا، برجسته‌ترین موانع گزارش خطا در طبقه‌ي فرعی فاكتورهای مرتبط با پرستار می‌باشند. وجودان، تعهد و احساس مسئولیت فردی، به علاوه جرم ندانستن خطاهاي کاري در پرستاري توسط مدیران و حمایت آنها از گزارش‌كننده‌گان خطاهاي کاري و در نتيجه عدم تقویت ترس‌های مختلف در کسانی که مرتکب خطا در کار شده‌اند، همچنان تلاش در جهت تقویت، آموزش و تشویق پرستاران به منظور شناخت خطاهاي کاري و گزارش آنها در محیط خالی از مجازات و تنبیه، گزارش خطاهاي کاري را افزایش مى‌دهد (۱۷، ۱۱).

عوامل مرتبط با خطا از ديگر طبقات فرعی شناسايي شده در تم اصلی موانع گزارش خطا در اين پژوهش است. هر چند شركت‌كننده‌گان در پژوهش حاضر درباره‌ي تاثير‌گذاري اين عوامل توافق همکاني نداشتند، اکثريت آنها همانند بسياري از مطالعات ديگر شدت خطا و پيامد آن را در تصميم فرد به گزارش خطا مؤثر دانسته‌اند. بر اساس ادراکات شركت‌كننده‌گان در پژوهش حاضر شديد و جدي نبودن خطا به گونه‌اي که منجر به صدمه بيمار نشود (۲۹-۳۳) و ابهام درتعريف خطا (۳۴) آنها را از گزارش خطا باز مى‌داشت. آنها گزارش خطاهاي فاقد پيامد صدمه را منوط به عدم برخوردهای تند، تهدیدآمیز و سیزه‌جویانه‌ي مدیران مى‌دانند. عدم تمایل اعضای تيم مراقبت سلامت نسبت به

که بر اساس ادراکات آنان در طبقات فرعی عوامل مربوط به پرستار و مرتبط با خطا قرار گرفتند. در مطالعات دیگران سود دهی گزارش خطا در زمینه‌های متفاوت از جمله تصحیح پیامد حاصل از آن، ارتقای مراقبت ایمن، و آموزش همکاران به عنوان انگیزانده مطرح گردیدند (۲۶ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۷). در حالی که شرکت‌کنندگان در این پژوهش تنها سوددهی گزارش خطا برای بیمار و تأثیر در روند بهبودی بیمار را انگیزانده گزارش خطا می‌دانستند.

تفاوت نگرش این دو گروه شرکت‌کننده در دو مطالعه شاید به دلیل مطرح نبودن یا کم مطرح بودن موضوع کلی گزارش خطا در محیط‌های بالینی ما باشد. به این معنی که اگر موضوع گزارش خطا و عوامل مرتبط با آن توسط مراکز آموزش مدام پرستاری به صورت شفاف در بین پرستاران مطرح گردد و منافع گزارش‌دهی خطا به آن‌ها آموزش داده شود، بدیهی است پرستاران با دامنه‌ی اطلاعاتی وسیع‌تر و دید بازتری متوجه این موضوع بوده و سایر منافع گزارش‌دهی خطا مثل آموزش برای خود و دیگران، حمایت برای گزارشگر، بازخورد منظم و ارتقای کیفیت خدمات سلامت را مد نظر قرار خواهد داد (۱۴). به‌طور کلی، بر اساس نگرش و ادراکات شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر، فرهنگ ایمنی سازمان از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم پرستاران درباره گزارش خطا‌های کاری است. نبود فرهنگ ایمنی یا نقص در آن، مانع گزارش‌دهی خطا گشته و در حضور فرهنگ ایمنی انگیزش پرستاران برای گزارش خطاها تقویت خواهد شد. مؤلفه‌های کاهش‌دهنده فرهنگ ایمنی در این پژوهش عبارتند از: عدم تحمل و بردازی سازمان، مدیران و همکاران نسبت به خطا، عدم حمایت حرفة‌ای، تحریر و سرزنش فردی که مرتکب خطا شده و عیب‌جویی از او و یگانه مقصو قلمداد نمودن او، عدم حمایت گزارش‌کننده خطا توسط مدیران و بر عکس عیب‌جویی و تنبیه گزارش‌کننده توسط آن‌ها، عدم همکاری پزشکان و عدم پاسخ‌گویی تیمی.

Wolf و همکاران نیز معتقدند، آن‌دسته از متخصصان

مراقبت سلامت که گزارش‌کنندگان خطا را حمایت نمی‌کنند، به موازات آن‌که با خطاهای مراقبت سلامت همانند جرم برخورد می‌کنند (۱۱)، ترس‌های مختلف را در ارائه‌کنندگان خدمات سلامت افزایش می‌دهند (۳۸ ، ۱۱). بنابراین، لازم است این آسیب‌ها و ترس‌های باقی‌مانده در ذهن ارائه‌کنندگان خدمات سلامت با تلاش‌های تشویق‌کننده گزارش خطا در محیطی ایمن و غیرمجازات‌کننده، جایگزین گردد (۱۱ ، ۷). بار مسؤولیت و فشار کار زیاد از دیگر زیر طبقه‌ها در تم اصلی موانع گزارش خطا‌های پرستاری در پژوهش حاضر است که در مطالعه‌ی Elder و همکاران نیز شایع ترین مانع گزارش خطا (۱۴) و در مطالعات دیگر محققان هم به عنوان یکی از موانع آشکارسازی و گزارش خطا شناسایی گردید (۳۹ ، ۳۷). شرکت‌کنندگان در این پژوهش، مشارکت مدیران و پزشکان در پاسخ‌گویی (پاسخ‌گویی تیمی) و شرکت‌کنندگان در پژوهش دیگران شیفت بار مسؤولیت به گزارشگر اختصاصی سازمان (۱۴) را جهت کاهش و رفع این مانع پیشنهاد نمودند.

درونمایه یا تم اصلی بعدی در این مطالعه انگیزانده‌های گزارش خطا‌های پرستاری است. انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب می‌شود. انگیزانده چیزی است که در رفتار فرد تأثیر نموده و موجب تشویق فرد به انجام کاری می‌شود و در آن‌چه او انجام خواهد داد، تفاوت به وجود می‌آورد. انگیزانده‌ها موتور محرکه‌ی اقدامات پرستاری هستند. انگیزانده‌های گزارش خطا موجب تشویق پرسنل پرستاری به گزارش خطا می‌شوند. دانش و مهارت مواجهه با خطا توسط پرستار (۱۷) و برخی از ویژگی‌های فردی پرستار مانند مسؤولیت پذیری، و بروز خطا توسط خود شوند (۱۴) به علاوه شدید بودن و پیامد منفی خطا (۱۷) از جمله انگیزانده‌هایی بودند که توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر همانند مشارکت‌کنندگان در سایر مطالعات (۱۴) به عنوان انگیزانده‌های گزارش خطا مطرح گردیدند.

گزارش‌دهی را از دوش یک فرد به تنها یی کم می‌کند و این چیزی است که در پژوهش حاضر همانند مطالعه‌ی دیگران به عنوان انگیزاندۀ گزارش‌دهی شناسایی شد (۱۴). سیستم ثبت خطای بدون نام هم که در مطالعه حاضر توسط برخی از شرکت‌کنندگان پیشنهاد شد، موجب کاهش بار مسؤولیت همکاران و تعویت گزارش‌دهی می‌گردد (۱۴، ۱۱).

نتیجه گیری

خطاهایی که در کار رخ می‌دهند، نشان دهنده‌ی مشکلات زیادی در کل سیستم هستند و در مجموع بیانگر عدم وجود فرهنگ ایمنی و وجود شرایط کاری نامطلوب برای پرستاران است. مشکلات سیستم‌ها می‌تواند از طریق گزارش انواع خطاهای پیشگیری شود. اصولاً توجه سازمان به مقوله‌ی گزارش انواع خطاهای اطلاعات فوق العاده گرانبها یی را برای پیشگیری از بروز خطاهای بعدی فراهم می‌نماید.

در مجموع، با توجه به موانع و انگیزاندۀ‌های گزارش خطاهای پرستاری شاید لازم باشد که قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شود و در آن قوانین نحوه‌ی گزارش‌دهی خطا و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن از جمله خود خطا به‌طور واضح تعریف و تبیین گردد. به علاوه، آموزش پرستاران و مدیران پرستاری درباره‌ی اهداف سیستم‌های گزارش خطا و شیوه‌ی استفاده از اطلاعات خطاهای رخ داده در ارتقای خدمات ایمن پرستاری و در نتیجه ایمنی بیمار پیشنهاد می‌گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از یافته‌های پژوهش مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی (۸۷-۰۴-۵۰-۷۲۶۸) و دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۴۴۷۶-۸۷) است که با حمایت مالی این دو دانشگاه انجام شده است. بدین‌وسیله ضمن تشکر و قدردانی، مراتب تشکر خالصانه‌ی تیم تحقیق به حضور کلیه‌ی مشارکت‌کنندگان پرستار در رده‌های مختلف در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شیراز اعلام می‌گردد.

بالینی که در فرهنگ سرزنش و مجازات کار می‌کنند، بدليل ترس از مجازات شدن، خطاهای را گزارش نمی‌کنند. یک سنت دیرینه در مراقبت سلامت عبارت است از «تکرار عبارت نام شما، شما مقصو هستید، شما شرم‌منده‌اید». ترس از انتقام و مجازات منجر به معمول شدن سکوت و خاموشی می‌شود در حالی که سکوت کشنه است و افراد حرفه‌های مراقبت سلامت نیاز به گفت‌وگو و محاوره درباره‌ی مسائل و مشکلات مهم محیط کارشان مانند خطاهای و رفتارهای خطرناک همکاران دارند (۱۱). زمانی که افراد و سازمان‌ها قادر به حرکت از فرهنگ تقصیر و سرزنش فردی به‌سوی یک فرهنگ ایمنی باشند، یعنی جایی که تقصیر، سرزنش و شرم‌منه کردن فردی، حذف، گزارش و اظهار خطا تشویق می‌شود، و نیز جایی که آسیب‌ها و ترس‌های باقی‌مانده در ذهن ارائه‌کنندگان خدمات سلامت با تلاش‌های تشویق کننده گزارش خطا در محیطی ایمن و غیر مجازات کننده، جایگزین می‌گردد (۳۴، ۱۱، ۷)، سازمان‌ها قادر خواهند بود سیستم‌های گزارش خطا را رسمی کرده و گزارش نمودن تمامی انواع خطاهای را افزایش دهند (۱۱، ۷).

به علاوه، گزارش خطا می‌تواند با حمایت مدیران از گزارش کنندگان خطا و آموزش به پرسنل درباره‌ی اهداف گزارش خطا، افزایش یابد (۴۰). به‌منظور دستیابی به هدف مهم افزایش گزارش خطا، ارائه‌کنندگان خدمات سلامت و سایرین باید بدانند که اولاً گزارش بدون مجازات خطاهای موجب ارتقای ایمنی کار می‌شود و ثانیاً عیوب و کاستی سازمان‌هاست که موجب ایجاد خطا می‌شود (۴۱). به علاوه، ارتقای ارتباطات صحیح و همکاری بین اعضای تیم سلامت^۱ لازمه‌ی یک محیط ایمن است و در سایه‌ی فرهنگ ایمن، ارتباطات باز، گزارش خطاهای و پاسخگویی تیمی در بین تمامی ارائه‌کنندگان خدمات سلامت تسهیل شده و به عنوان یک قاعده مورد توجه قرار خواهد گرفت. پاسخگویی تیمی نیز بار مسؤولیت و فشار روانی

^۱ Communication and collaboration

۱۰- هاشمی ف. پاسخ اخلاقی به خطای پرستاری.

مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی ۱۳۸۷؛ دوره ۱ (شماره ۴): ۴۵-۳۱.

- 11- Wolf ZR, Hughes RG. Error reporting and disclosure. In: Hughes R, eds. Patient Safety and Quality: An Evidence- Based Handbook for Nurses. Rockville: AHRQ Publication; 2008, p. 1-47.
- 12- Hevia A, Hobgood C. Medical error during residency: to tell or not to tell. Ann Emerg Med 2003; 42(4): 565-70.
- 13- Balas MC, Scott LD, Rogers AE. Frequency and type of errors and near errors reported by critical care nurses. Can J Nurs Res 2006; 38(2): 24-41.
- 14- Elder NC, Graham D, Brandt E, Hickner J. Barriers and motivators for making error reports from family medicine offices: a report from the American Academy of Family Physicians National Research Networks (AAFP NRN). J Am Board Fam Med 2007; 20 (2): 115-23.

۱۵- باغچقی ن، کوهستانی ح، باغچقی ن. گزارش کردن خطاهای پرستاری. خلاصه مقالات دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران؛ سال ۱۳۸۷؛ تهران، ایران؛ مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی؛ ۱۳۸۷.

۱۶- ادیب حاج باقری م، پرویزی س، صلصالی م. روش‌های تحقیق کیفی. تهران: بشری؛ ۱۳۸۶.

- 17- Fein S, Hilborne L, Kagawa-Singer M, et al. A conceptual model for disclosure of medical errors. In: Henriksen K, Battles JB, Marks ES, eds. Advances in Patient Safety: From Research to Implementation. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2005, Vol 2.
- 18- Tang FI, Sheu SJ , Yu S, Wei IL, Chen CH. Nurses relate the contributing factors involved in medication errors. J Clin Nurs 2007; 16(3): 447-57.

۱۹- ام. ان. راهنمای هدایت گروه‌های متمرکز. ترجمه هاشمی ف، منصوری پ. دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز. ۱۳۸۶.

- 20- Anselmi ML, Peduzzi M, Dos Santos CB.

منابع

- 1- Anonymous. Health Grades Quality Study. Third Annual Patient Safety in American Hospitals Study. <http://www.healthgrades.com/media/dms/pdf/patientsafetyInAmericanHospitalsStudy2006.pdf> (accessed on 2010)
- 2- Valentin A, Capuzzo M, Guidet B, et al. Errors in administration of parenteral drugs in intensive care units: multinational prospective study. BMJ 2009; 338: b814 .
- 3- Howe JP. Nursing Error Lawyer, Nursing Error Lawyer. <http://www.jamesphowe.com/Medical%20Malpractice%20-%20Nursing%20Error.htm> (accessed on 2010)
- ۴- پنجوینی س. بررسی میزان و نوع اشتباہات دارویی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر سنتندج. مجله‌ی پژوهش در پرستاری ایران ۱۳۸۵؛ دوره ۱ (شماره ۱): ۶۴-۵۹.
- ۵- کوهستانی ح، باغچقی ن. بررسی اشتباہات دارویی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی. مجله‌ی علمی – پژوهشی پزشکی قانونی ۱۳۸۶؛ شماره ۴۸: ۵۵-۲۴۹.
- ۶- جولایی س، حاجی بابایی ف، پیروی ح، حقانی ح. بررسی وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران و ارتباط آن با شرایط کاری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی ۱۳۸۸؛ دوره ۳ (شماره ۱): ۷۶-۶۵.
- 7- Chard R. How perioperative nurses define, attribute causes of, and react to intraoperative nursing errors. AORN J 2010; 91(1): 132-45.
- ۸- اصغری ف، یاوری ن. اظهار خطای پزشکی. مجله دیابت و لیپید ایران ۱۳۸۴؛ ویژه‌نامه‌ی اخلاق و تاریخ پزشکی: ۳۵-۲۵.
- 9- Crigger NJ. Always having to say you're sorry: an ethical response to making mistakes in professional practice. J Nurs Ethics 2004; 11(6): 568-76.

- and nurses to document medical errors in pediatric patients. *Pediatrics* 2004; 114(3): 729-35.
- 33- Karsh BT, Escoto KH, Beasley JW, Holden RJ. Toward a theoretical approach to medical error reporting system research and design. *Appl Ergon* 2006; 37(3): 283 - 95.
- 34- Wakefield DS, Wakefield BJ, Uden-Holman T, Blegen MA. Perceived barriers in reporting medications administration errors. *Best Pract Benchmarking Health* 1996; 1(4): 191-7.
- 35- Stratton KM, Blegen MA, Pepper G, Vaughn T. Reporting of medication errors by pediatric nurses. *J Pediatr Nurs* 2004; 19(6): 385-92.
- 36- Wakefield BJ, Uden- Holamen T, Wakefield DS. Development and validation of the medication administration error reporting survey. In: Henriksen K, Battles JB, Marks ES, eds. *Advances in Patient Safety: From Research to Implementation*. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2005, Vol 4, p. 475-89.
- 37- Wakefield BJ, Blegen MA, Uden-Holman T, Vauhn T, Chrischilles E, Wakefield DS. Organizational culture, continuous quality improvement, and medication administration error reporting. *Am J Med Qual* 2001; 16(4): 128-34.
- 38- Hsiao GY , Chen IJ, YU S, Wei IL, Fang YY, Tang FI. Nurses' knowledge of high-alert medications: instrument development and validation. *J Adv Nurs* 2010; 66 (1): 177-90.
- 39- Jones L, Arana G. Is downsizing affecting incident reports? *Jt Comm J Qual Improv* 1996; 22(8): 592-4.
- 40- Chiang HY, Lin SY, Hsu SC, Ma SC. Factors determining hospital nurses' failures in reporting medication errors in Taiwan. *Nurs Outlook* 2010; 58(1): 17-25.
- 41- Kohn LT, Corrigan J, Donalson MS. *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. Washington, DC: National Academies Press 1999.
- Errors in the administration of intravenous medication in Brazilian hospitals. *J Clin Nurs* 2007; 16(10): 1839-47.
- 21- Mayo AM, Duncan D. Nurse perceptions of medication errors: what we need to know for patient safety. *J Nurs Care Qual* 2004; 19(3): 209-17.
- 22- Eto S, Kyngas H. The qualitative content analysis process. *J Adv Nurs* 2008; 62(1):107-15.
- 23- Speziale HS, Carpenter DR. *Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative*. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
- 24- Reason J. Human error: models and management. *BMJ* 2000; 320: 768-70.
- 25- Sutcliffe KM. Defining and classifying medical error: lessons for learning. *Qual Saf Health Care* 2004; 13(1): 8-9.
- 26- Uribe CL, Schweikhart SB, Pathak DS, Dow M, March GB. Perceived barriers to medical-error reporting: an exploratory investigation. *J Healthc Manag* 2002; 47(4): 263-79.
- 27- Chiang HY, Pepper GA. Barriers to nurses' reporting of medication administration errors in Taiwan. *J Nurs Scholarsh* 2006; 38(4): 392-9.
- 28- Wakefield DS, Wakefield BJ, Borders T, Uden-Holman T, Blegen M, Vaughn T. Understanding and comparing differences in reported medication administration error rates. *Am J Med Qual* 1999; 14(2): 73-80.
- 29- Lawton R, Parker D. Barriers to incident reporting in a healthcare system. *Qual Saf Health Care* 2002; 11(1): 15-8.
- 30- Coyle YM, Mercer SQ, Murphy- Cullen CL, Schneider GW, Hynan LS. Effectiveness of a graduate medical education program for improving medical event reporting attitude and behavior. *Qual Saf Health Care* 2005; 14(5): 383-8.
- 31- Jeffe DB, Dunagan WC, Garbutt J, et al. Using focus groups to understand physicians' and nurses' perspectives on error reporting in hospitals. *JT Comm J Qual Saf* 2004; 30(9): 471-9.
- 32- Taylor JA , Brownstein D, Christakis DA, et al. Use of incident reports by physicians