



امین‌سازی و اصلاح میقات ایران

مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
جلد دوم، شماره چهارم، زمستان ۸۸
۲۳-۳۸
www.ejcp.info



دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل علف‌های هرز مزارع توتون (*Nicotiana tabacum*)

پرویز شیمی^۱، احمد رهبری^۲ و محram مصباح^۳

^۱ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ^۲ کارشناس موسسه تحقیقات توتون کشور - مازندران (تیرتاش)، ^۳ کارشناس موسسه تحقیقات توتون کشور - گیلان (رشت)

چکیده

به منظور بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل علف‌های هرز پهنه‌برگ و باریک برگ مزارع توتون در استان‌های مازندران و گیلان، آزمایشی در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل علف‌کش‌های ارادیکان، ترفلان و روئینت به ترتیب به میزان ۶، ۵ و ۲ لیتر در هکتار قبل از نشاء کاری و مخلوط با خاک، علف‌کش‌های استامپ، لاسو، گل و تاپ استار به ترتیب به میزان ۵، ۲ و ۰.۲ لیتر در هکتار بعد از نشاء کاری قبل از سبزشدن علف‌های هرز، علف‌کش تینوس به میزان ۵۰ گرم در هکتار به همراه ۲ درصد مویان سیتوگیت پس از خاک‌دهی توتون و اوایل رشد علف‌های هرز، علف‌کش‌های گالانت سوپریو و فوکوس به ترتیب به میزان ۰.۷۵ و ۰.۲ لیتر در هکتار در مرحله ۳ برگی تا پنج‌هزار باریک برگ‌ها بودند. علف‌های هرز پهنه‌برگ در دو تیمار اخیر به طور دستی و جین گردیدند. تیمارهای وجین و عدم وجین علف‌های هرز نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان دادند که مبارزه با علف‌های هرز در مزارع توتون باعث افزایش عملکرد و کیفیت توتون شده و درآمد زارع افزایش می‌یابد. جهت مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در صورت وجود علف هرز اویار‌سلام، علف‌کش ارادیکان و در غیر این صورت، استفاده از ترفلان توصیه می‌گردد. در صورت عدم موفقیت علف‌کش‌های پیش از کاشت یا پیش رویشی در کنترل علف‌های هرز خانواده گندمیان، می‌توان قبل از به ساقه رفتن توتون، یکی از دو علف‌کش گالانت سوپریا فوکوس را مصرف نمود. انجام یک تا دو نوبت وجین دستی علف‌های هرز نیز می‌تواند مزارع توتون را در طی فصل رشد عاری از مزاحمت آنها نگه دارد.

واژه‌های کلیدی: توتون، علف هرز، علف‌کش

* - مسئول مکاتبه: parvizshimi@yahoo.com

مقدمه

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تولید و کاهش کمیت و کیفیت محصول توتون، وجود علف‌های هرز می‌باشد. کشاورزان عموماً برای کم کردن تراکم علف‌های هرز در مرحله داشت توتون، سه نوبت علف‌های هرز آن را به طور دستی و چین می‌نمایند که این امر هزینه تولید توتون را بالا می‌برد. امروزه می‌توان با کاربرد صحیح علف‌کش‌های متنوع و انتخابی هر محصول، تولید را اقتصادی نمود (مویدزاده و جعفرزاده، ۱۹۹۶). به هر حال، توجه به کاربرد صحیح علف‌کش‌ها از ضروریات مدیریت علف‌های هرز در کشاورزی است.

موسوی (۲۰۰۱) در بررسی‌های صورت گرفته اعلام داشته است که علف‌های هرز می‌توانند تا ۸۰ درصد به توتون خسارت وارد آورند. وزیری و مویدزاده (۱۹۹۲) نشان دادند که علف‌کش‌های لاسو و ارادیکان توانستند علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک‌برگ توتون را به ترتیب به میزان ۷۰ و ۹۹ درصد کنترل نمایند. بررسی‌های به عمل آمده توسط ابطالی و گمین چی (۱۹۹۷) نشان داد که کاربرد پیش‌کاشت علف‌کش ارادیکان در کنترل اویارسلام (*Cyperus spp.*) تأثیر بهتری از سایر تیمارها داشته است. به هر حال، کاربرد پیش‌کاشت علف‌کش استامپ و ترفلان در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ بر ارادیکان ارجحیت دارند. گمین چی (۱۹۹۲) با انجام مطالعه‌ای در منطقه تیرتاش مازندران اعلام داشت که از نظر درصد کنترل مجموع علف‌های هرز و همچنین به لحاظ اقتصادی، تیمار ۵ لیتر ارادیکان به همراه ۱ لیتر ترفلان در هکتار به اضافه یکبار و چین تکمیلی، بر سایر تیمارها برتری آماری داشت. مصباح (۲۰۰۰) نشان داد که در مزارع توتون گیلان ترکیب علف‌کش‌های استامپ به میزان ۲ لیتر به اضافه ۳ لیتر در هکتار ارادیکان توانستند تأثیری همانند و چین بر میزان افزایش عملکرد برگ خشک توتون داشته باشند. رنجبر چوبه و همکاران (۱۹۹۵) در مزارع توتون رشت، مشخص کردند که کمترین میزان تراکم اویارسلام مربوط به کاربرد پیش‌کاشت علف‌کش ارادیکان و لاسو بوده است. مویدزاده و جعفرزاده (۱۹۹۶) در بررسی‌های دو ساله در ارومیه اعلام داشتند که بیشترین خسارت علف‌های هرز بر توتون قبل از خاک‌دهی پای بوته مشاهده می‌شود. بنابراین استفاده صحیح از علف‌کش به صورت اختلاط با خاک می‌تواند تا حدود زیادی این معطل را حل کرده و خسارت را پایین آورد. آنها همچنین در بررسی‌های خود اعلام کردند که با توجه به عملکرد توتون و تعداد علف‌های هرز در واحد سطح، کاربرد پیش از نشاء‌کاری علف‌کش‌های استامپ و ترفلان جزو سوم با کارایی بالا در آزمایش‌های دو ساله بودند.

لهسائی زاده (۱۹۹۲) نشان داد علف کش پولیت بهترین نتیجه را در کنترل علف های هرز یک ساله مزارع تباکو از خود نشان داد. دیمسکا و همکاران (۲۰۰۴) با آزمایش کارابی علف کش های دورینول، آلاکلر و تریفلورالین، توانستند به طور انتخابی علف های هرز مزارع توتوون را کاهش داده عملکرد و کیفیت توتوون را افزایش دهنده بود. دیمیر و همکاران (۲۰۰۳) با بررسی مخلوط علف کش هایی همچون پندیمتالین و کلومازون قبل از نشاء کاری، پندیمتالین پیش رویشی و کاربرد علف کش کلومازون پس از نشاء کاری به صورت نواری (۴ سانتی متر)، اس- متالاکلر به همراه کلومازون قبل از نشاء کاری، اس- متالاکلر به صورت پیش رویشی و کاربرد نواری کلومازون پس از نشاء کاری، استوکلر و دی کلامید پس از پس رویشی، پیش از نشاء و کاربرد نواری کلومازون پس از نشاء کاری، استوکلر و دی کلامید پس از نشاء کاری، پندیمتالین و دی متانامید پیش از نشاء کاری بروی علف های هرز نشان داد که تمامی تیمارها موجب افزایش عملکرد توتوون و کاهش زیست توده^۱ علف های هرز غالب مزرعه نظیر سوروف (*Chenopodium album*), سلمه تره (*Echinochloa crus-galli*), آمبروزیا (*Ambrosia* sp.), هفت بند (*Polygonum aviculare*), گاوبنده (*Abutilon theophrasti*) و علف های هرز چند ساله ای همچون قیاق (*Sorghum halepense*) و پیچک صحرابی (*Circium arvense*) نسبت به شاهد گردیدند. مخلوط علف کش های پندیمتالین و کلومازون علاوه بر کاهش زیست توده علف های هرز، بالاترین میزان محصول برگی توتوون را به همراه داشت.

پاؤنسکو و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند علف کش های پیش از نشاء پندیمتالین، دی متانامید و متالاکلر در کنترل علف های هرز تک لپه یک ساله و برخی از علف های هرز دو لپه مؤثر بودند. دیمسکا (۱۹۹۸) در یک بررسی ۳ ساله نشان داد که علف کش اکسی فلورفن بهترین اثرات کنترلی را بر روی علف های هرز غالب مزرعه توتوون داشت. در یک بررسی دیگر، لولاس و کازمیدو (۱۹۹۷) گزارش کردند که بهترین تیمارهای علف کشی به کار رفته علف کش های اپتم، اکسی فلورفن تویازو پیر + پیولیت بودند. طبق گزارش اسمیت و پیدین (۱۹۹۷) مشخص شد که علف کش سولفن ترازانون موجب کنترل مطلوب علف های هرز اویارسلام، حلقه (*Imperata cylindrica*) و تاج خروس (*Amaranthus spp.*) گردید.

آزمایش حاضر با هدف بررسی کارایی علف‌کش‌های موجود در ایران و قابل استفاده در مزارع توتون جهت کنترل علف‌های هرز غالب این مزارع در استان‌های مازندران و گیلان طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها

مشخصات تیمارهای آزمایش در گیلان و مازندران: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۱ تیمار زیر به اجرا در آمد: ارادیکان (ای‌بی‌تی‌سی ۸۲ درصد امولسیون) ۶ لیتر در هکتار بلافاصله قبل از نشاء‌کاری و مخلوط با خاک توسط شن‌کش، تریفلورالین (ترفلان ۴۸ درصد امولسیون) ۲ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و مخلوط با خاک توسط شن‌کش، سیکلوات (رونیت ۷/۷۲ درصد امولسیون) ۵ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و مخلوط با خاک توسط شن‌کش، پندیمتالین (استامپ ۳۳ درصد امولسیون) ۵ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و پاشش در سطح خاک (پیش‌رویشی علف‌های هرز)، آلاکلر (اسو ۴۸ درصد امولسیون) ۵ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و پاشش در سطح خاک (پیش‌رویشی علف‌های هرز)، اکسی‌فلوروفن (گل ۲۴ درصد امولسیون) ۲ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و پاشش در سطح خاک (پیش‌رویشی علف‌های هرز)، اکسادیارژیل (تاب استار ۳ درصد امولسیون) ۲ لیتر در هکتار قبل از نشاء‌کاری و پاشش در سطح خاک (پیش‌رویشی علف‌های هرز)، ریم سولفورون (تیتوس ۲۵ درصد دی‌اف)، ۵۰ گرم در هکتار به همراه ۲ درصد سیتوگیت پس از خاک‌دهی توتون و اوایل رشد علف‌های هرز، هالوکسی فوب پی متیل (گالانت سوپر ۱۰/۸ درصد امولسیون) ۰/۷۵ لیتر در هکتار در مرحله ۳ برگی تا پنجه‌زنی باریک‌برگ‌ها و جین دستی علف‌های هرز پهن‌برگ، سیکلوكسیدیم (فوکوس ۱۰ درصد امولسیون) ۲ لیتر در هکتار در مرحله ۳ برگی تا پنجه‌زنی باریک‌برگ‌ها، و جین دستی علف‌های هرز پهن‌برگ، شاهد بدون علف هرز (در طول فصل رشد به طور دستی و جین گردید). هر کرت آزمایش (5×8 مترمربع) به دو قسمت مساوی تقسیم گردید، نیمه بالای کرت شاهد با علف هرز و نیمه پایینی تحت تیمار قرار داده شد.

مشخصات عملیات اجرایی آزمایش در گیلان و مازندران: در مازندران آزمایش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش واقع در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۴۴ دقیقه شرقی و با ارتفاع ۱۴ متر از سطح دریا انجام گرفت. طبق آمار هواشناسی متوسط بارندگی 30 ساله منطقه 617 میلی‌متر است که به طور عمده در پاییز و زمستان اتفاق

می‌افتد. در اوایل اردیبهشت ماه پس از آماده‌سازی زمین و کوددهی تمامی تیمارها براساس توصیه کودی مرکز تحقیقات توتون تیرتاش به میزان ۱۰۰ کیلوگرم نیترات آمونیم، ۱۰۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و ۳۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار صورت گرفت. یک روز بعد از اعمال علفکش‌های پیش‌کشت، اقدام به انتقال نشاء‌های توتون رقم کوکر ۳۴۷ ویرجینیا (آماده شده با روش شناور در آب) به زمین اصلی گردید. نشاء‌ها در بستر کشت ترکیبی {خاک نوشهر+ خاک لنگرود+ نیوبان} ۷۰ درصد به همراه پرلیت ۳۰ درصد} با کود فرتی گرو (ازت+ فسفر+ پتاس هر کدام به میزان ۵۰ گرم در لیتر) تهیه شده بود. پس از آماده‌سازی ردیف‌های کشت و دادن پس آب، نشاء‌کاری با رعایت فاصله بین بوته ۵۰ سانتی‌متری و بین ردیف ۱۰۰ سانتی‌متری انجام گرفت.

در گیلان، آزمایش در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات توتون رشت واقع در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۰ درجه و ۳۷ دقیقه شرقی و با ارتفاع صفر از سطح دریا انجام گرفت. طبق آمار هواشناسی، متوسط بارندگی ۱۰۸۵ میلی‌متر است که به‌طور عمده در پاییز و زمستان اتفاق می‌افتد. رقم توتون استفاده شده ویرجینیا ای-۱، مصرف کود پایه ازت ۴۵ کیلوگرم، فسفر ۴۸ کیلوگرم و پتاس ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. کود پاشی مزارع براساس توصیه‌های تجزیه خاک انجام شد. نشاء‌کاری در تاریخ ۲۹/۰۶/۸۶ انجام گردید. هر کرت آزمایش شامل ۴ خط کشت و ۴ بوته توتون بود.

آمار برداری و تجزیه و تحلیل داده‌ها: ضمن شناسایی علف‌های هرز، قبل از خاک‌دهی توتون، تعداد علف‌های هرز به تفکیک پهنه برگ، باریک برگ و جگن‌ها از ۱ مترمربع هر نیم کرت شمارش گردید. قبل از اولین برداشت توتون، علف‌های هرز به تفکیک پهنه برگ، باریک برگ و جگن‌ها از سطح ۱ مترمربع هر نیم کرت کف‌بر شده پس از خشک کردن در اطاق‌های گرم مخصوص توتون با درجه حرارت ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت، وزن خشک آنها تعیین گردید. سایر آمار تهیه شده شامل عملکرد سبز توتون در هکتار، تعیین ارزش توتون تولید شده در سطح هکتار و میزان نیکوتین توتون بودند. در گیلان میزان نیکوتین توتون تعیین نگردید.

نظر به اینکه هر تیمار با شاهد متناظر خود مقایسه شد، کلیه داده‌ها بر حسب درصد تغییرات نسبت به شاهد ارایه شدند. به هر حال، در مازندران، نتایج میزان درصد نیکوتین به صورت عدد اصلی ارائه شدند.

آمار تهیه شده با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه واریانس شده تیمارها توسط آزمون چند دامنه‌ای دانکن مقایسه گردیدند.

نتایج و بحث

با توجه به تفاوت شرایط آب و هوایی و فلور علف‌های هرز دو منطقه آزمایش نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت یک نتیجه کلی ارایه گردیده است.

۱- مازندران: علف‌های هرز مهم آزمایش این منطقه، اویارسلام (*Cyperus esculentus*), آفتاب پرست (*Amaranthus retroflexus*), تاج خروس (*Heliotropium europium*), تاجریزی سیاه (*Chenopodium album*), سلمک (*Solanum nigrum*), سلمک (*Polygonum aviculare*) (*Setaria*), گوش بره (*Chrozophora tinctoria*) و دم روپا (viridis) بودند.

یکنواخت ترین علف‌های هرز کرت‌های آزمایشی، اویارسلام و دم روپا بودند که آماربرداری جداگانه از آن‌ها به عمل آمد. سایر علف‌های هرز خصوصاً پهن برگ‌ها، پراکنش یکنواختی نداشته و به صورت مجموع در کرت آماربرداری گردیدند. لازم به توضیح است که اویارسلام به علت تراکم کم هنگام شمارش علف‌های هرز قبل از خاکدهی توتوون، شمارش نگردید.

نتایج تجزیه واریانس داده‌های آزمایش نشان دادند که اثر علف کش پر درصد تغییرات تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در سطح یک درصد معنی‌دار بوده است (جدول ۱).

جدول ۱- تجزیه واریانس درصد کنترل علف‌های هرز در مازندران.

منابع تغییرات	درجه آزادی	درصد کنترل	درصد کنترل علف‌های هرز	درصد کنترل علف‌های هرز	وزن خشک	شمارش	وزن خشک	شمارش	وزن خشک	شمارش	وزن خشک	باریکبوگ
تکرار	۳											
علف کش	۷											
خطا	۲۱											
ضریب تغییرات	-											
نفاوت معنی‌دار موجود نمی‌باشد، **نفاوت معنی‌دار در سطح ۱ درصد موجود است.												

براساس نتایج مقایسه میانگین‌ها با آزمون دانکن (جدول ۲) اویارسلام فقط در دو تیمار ارادیکان و رونیت به ترتیب به میزان ۸۰ و ۹۲ درصد کترل شده است، که این دو تیمار علاوه بر شاهد، با یکدیگر نیز تفاوت معنی‌دار داشته‌اند. موسوی (۲۰۰۱) استفاده از ارادیکان را در مزارع توتون برای کترل اویارسلام توصیه نموده است. کترل اویارسلام توسط علف‌کش ارادیکان در مزارع توتون نیز در گزارش رنجبر چوبه و همکاران (۱۹۹۵) آمده است. رونیت به عنوان یک علف‌کش کترل‌کننده اویارسلام در مزارع چغندر قند کشور توصیه شده (مصلی‌نژاد و همکاران، ۲۰۰۲) و تاملین (۲۰۰۴) نیز گزارش نموده که این علف‌کش کترل‌کننده اویارسلام می‌باشد. به هر حال، استفاده از این علف‌کش در مزارع توتون تا به حال گزارش نشده است. بر اساس تغییر تراکم، بیشترین کترل علف‌های هرز پهنه‌برگ در اوایل فصل و قبل از خاکدهی توتون، در تیمارهای استامپ و گل به ترتیب با ۸۷ و ۸۶ درصد کترل رخ داد. ترفلان با ۷۷ درصد کترل در ردیف بعدی قرار گرفت. کمترین کترل علف‌های هرز پهنه‌برگ نیز در تیمارهای تیتوس و رونیت به ترتیب با ۴۴ و ۴۰ درصد کترل مشاهده گردید. بر اساس تغییر وزن خشک، بیشترین کترل پهنه‌برگ‌ها در تیمارهای ارادیکان، ترفلان، گل و تاپ‌استار به ترتیب با ۵۳، ۴۶، ۴۶ و ۴۴ درصد کترل رخ داده از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند. این در حالی است که ابطالی و گمین چی (۱۹۹۷) قدرت پهنه‌برگ‌کشی ارادیکان را کمتر از ترفلان گزارش کرده‌اند. لاسو و استامپ به ترتیب با ۴۲ و ۴۰ درصد کترل در گروه بعدی قرار گرفتند. رونیت نیز با ۳۰ درصد کترل در گروه بعداز آن قرار گرفت. رشد دوباره علف‌های هرز و یا سبزشدن بذور جدید علف‌های هرز پهنه‌برگ در تیمار تیتوس باعث شده در مرحله از آماربرداری این تیمار، میزان کترل علف‌های هرز پهنه‌برگ صفر درصد ثبت شود. با بررسی آمار کترل علف‌های هرز پهنه‌برگ در اول فصل (شمارش) و آخر فصل (وزن خشک)، می‌توان نتیجه گرفت که درصد کترل در اوایل فصل کمی بیشتر از آخر فصل بوده است زیرا علف‌های هرز تازه سبز شده و یا رشد مجدد علف‌های هرز کترل نشده، وزن خشک نهایی را افزایش داده‌اند. تیمارهای آلاکلر، فوکوس، استامپ و رونیت به ترتیب با ۹۹، ۹۷، ۹۴، و ۹۲ درصد کترل دم روپا بهی بیشترین تاثیر را بر مهار این علف هرز داشتند. هر چند که رونیت از نظر آماری با سه علف‌کش اول تفاوت معنی‌دار داشت. تیمارهای ارادیکان، گالانت سوپر، ترفلان و گل به ترتیب با ۸۸، ۸۷ و ۸۰ درصد کترل دم روپا بهی، درواقع بین ۸۰ تا ۹۰ درصد این علف هرز را مهار نمودند. تیمارهای تاپ‌استار و تیتوس به ترتیب با ۲۶ درصد و ۱۵ درصد

کترل کمترین کترل علف هرز باریکبرگ را در این مرحله داشته‌اند. بیشترین کترل دم روباهی در اواخر فصل و براساس وزن خشک در تیمارهای فوکوس (۱۰۰ درصد)، ترفلان (۹۷ درصد)، استامپ (۹۵ درصد) و آلاکلر (۹۳ درصد) بود که از لحاظ آماری با یکدیگر برابر بودند. گالانت سوپر واردیکان به ترتیب با ۸۹ و ۷۹ درصد کترل در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. این یافته‌ها با نتایج گزارش شده توسط پونسکو و همکاران (۲۰۰۲) برای فوکوس و گالانت سوپر، دیمسکا (۱۹۹۸) برای ترفلان ولاسو، و بودمیر و همکاران (۲۰۰۳) برای استامپ، هم‌خوانی دارد. با بررسی آمار کترل علف‌های هرز باریکبرگ در اول فصل (شمارش) و آخر فصل (وزن خشک)، نتیجه گیری می‌شود که درصد کترل در اوایل و اوخر فصل نسبتاً برابر بوده و فقط رونیت و گل افت شدید کترل داشته‌اند. این می‌تواند به علت ماندگاری کوتاه مدت این دو علف‌کش در خاک باشد (تاملین، ۲۰۰۴). بالاترین افزایش عملکرد سبز توتون در تیمار شاهد بدون علف هرز (۱۴۸ درصد) مشاهده شد. تیمارهای فوکوس (۱۴۳ درصد) و گالانت سوپر (۱۰۶ درصد) در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند و هر سه تیمار با یکدیگر تفاوت معنی‌دار داشتند (جدول ۲). دلیل بالا بودن عملکرد در تیمارهای اخیر کترل خوب علف‌های هرز توسط آنها بوده ولذا عملکرد به مثابه و جین دستی به دست آمده است. سایر تیمارها نیز شامل لاسو ۹۹ درصد، ترفلان ۹۰ درصد، استامپ ۸۴ درصد، اردیکان ۷۸ درصد، گل ۶۶ درصد، تیتوس ۵۴ درصد، رونیت ۳۵ درصد و تاپ استار ۳ درصد در عملکرد مؤثر بوده‌اند.

درصد بالاتر نیکوتین نشانه مرغوبیت گیاه توتون است. در این آزمایش، بالاترین درصد نیکوتین در تیمارهای شاهد بدون علف هرز (۲/۴ درصد) و استامپ (۲/۲ درصد) مشاهده گردید. تیمارهای فوکوس، اردیکان، گالانت سوپر، ترفلان و لاسو به ترتیب با ۲، ۱/۹، ۱/۹، ۱/۸ و ۱/۸ درصد نیکوتین به لحاظ آماری با تیمارهای فوق برابر بودند. این مسئله را باید در نظر داشت که در تیمارهای فوکوس و گالانت سوپر، سایر علف‌های هرز و جین دستی شده بودند. کمترین میزان نیکوتین در تیمارهای شاهد با علف هرز و تاپ استار مشاهده گردید. در اینجا نیز اثر منفی علف‌های هرز باریکبرگ بر روی میزان نیکوتین توتون مشهود است، زیرا بالاترین درصد نیکوتین در تیمارهای کترل مطلوب علف‌های هرز باریکبرگ رخ داد. مسانگکای (۱۹۹۰) گزارش کرده است که کترل علف‌های هرز در مزارع توتون باعث افزایش نیکوتین در توتون می‌گردد.

جدول ۲- مقایسه میانگین داده‌های آزمایش در مازندران^{**}.

	درصد افزایش درآمد	درصد نیکوتین توتوون	درصد افزایش [*] عصرکرد سبز	درصد کتریل [*] باریکبرگ‌ها (وزن خشک)	درصد کتریل [*] باریکبرگ‌ها (شمارش)	درصد کتریل [*] پیونزبرگ‌ها (وزن خشک)	درصد کتریل [*] پیونزبرگ‌ها (وزن خشک)	درصد کتریل [*] پیونزبرگ‌ها (وزن خشک)
۱۶۷ ^e	۱/۹ abcd	۷۸ ^g	۷۴ ^c	۸۸ ^{cd}	۵۰ ^{ab}	۶۹ ^c	۸ ^b	۸ ^b
۱۷۰ ^c	۱/۸ abcd	۹۰ ^c	۹۷ ^a	۸۵ ^{de}	۵۳ ^{ab}	۷۷ ^b	۰ ^c	۰ ^c
۱۷۸ ^e	۱/۵ def	۲۵ ^j	۴۹ ^d	۹۱ ^{bc}	۳۰ ^c	۴ ^c	۹۱ ^a	۹۱ ^a
۱۷۳ ^c	۱/۲ ab	۸۶ ^f	۹ ^{ab}	۹۴ ^{ab}	۴۳ ^b	۸۷ ^a	۰ ^c	۰ ^c
۲۱۹ ^c	۱/۸ abcd	۹۹ ^d	۹۱ ^{ab}	۹۹ ^a	۴ ^b	۷۱ ^{bc}	۰ ^c	۰ ^c
۱۷۳ ^e	۱/۵ def	۷۱ ^h	۵۰ ^d	۴۷ ^{ab}	۴ ^a	۸۷ ^a	۰ ^c	۰ ^c
۵۱ ^h	۱/۳cef	۳۴ ^k	۱۸ ^f	۲۰ ^f	۴۴ ^{ab}	۰۹ ^d	۰ ^c	۰ ^c
۱۵۱ ^f	۱/۱ cdef	۵ ⁱ	۳۰ ^e	۱۰ ^g	۰ ^d	۲۴ ^c	۰ ^c	۰ ^c
۲۴۳ ^d	۱/۹ abcd	۱۰ ^c	۸۹ ^b	۸۷ ^{cd}	-	-	-	-
۲۷۲ ^b	۲abc	۱۴ ^b	۱۰ ^a	۹۷ ^{ab}	-	-	-	-
۳۷۰ ^a	۲/۴ ^a	۱۴ ^a	-	-	-	-	-	-
-	۱/۳ ^f	۱۳ ^f	-	-	-	-	-	-

حروف مشابه در مقلوب اعداد در هر سوتون نمایانگر عدم تناوی معنی دار بر اساس آزمون چند دامنه‌ای داشتن در سطح ۱ درصد می‌باشد. درصد نسبت به شاهد اختصاصی هر تیمار.

بالاترین درصد افزایش درآمد در تیمار شاهد بدون علف هرز (۴۲۰ درصد)، پس از آن فوکوس (۳۷۲ درصد)، سپس لاسو (۲۶۹ درصد) و پس از آن گالانت سوپر (۲۴۳ درصد) بود که همگی با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. علت بالا بودن درصد افزایش درآمد در تیمارهای فوکوس و گالانت سوپر کترل مطلوب علفهای هرز باریکبرگ ووجین سایر علفهای هرز در این تیمارها می باشد. به هر حال هزینه وجین به مقدار زیادی از درآمد ناخالص حاصله کاسته و می توان نتیجه گرفت که تیمار علف کش لاسو از جهت حصول درآمد خالص بیشتر، مفرون به صرفه تر می باشد. وزیری و مویدزاده (۱۹۹۲) نیز علف کش لاسو را به عنوان یک علف کش مناسب در مزارع توتون تأیید نموده اند. نتیجه کلی در منطقه مازندران: مبارزه با علفهای هرز در مزارع توتون باعث افزایش عملکرد و کیفیت توتون شده درآمد زارع افزایش می یابد. این آزمایش نشان داد که برای کترل علف هرز اویارسلام در مزارع توتون باید در وحله اول از علف کش روئیت و در صورت عدم دسترسی، از علف کش اردیکان استفاده گردد. برای کترل علفهای هرز پهن برگ، به جز تیتوس، سایر علف کش ها علفهای هرز پهن برگ را حدود ۵۰ درصد کترل نمودند. کترل علفهای هرز باریکبرگ توسط باریکبرگ کش های فوکوس و گالانت سوپر به خوبی انجام شد ولی برای کترل توأم علفهای هرز پهن برگ و باریکبرگ لازم است از یکی از علف کش های ترفلان، استامپ و یا لاسو استفاده گردد. یادآوری می شود که علف کش های لاسو و استامپ در اوایل فصل رشد در توتون موقتاً ایجاد سوختگی نمودند.

- ۲- گیلان: در این منطقه، یکنواخت ترین علف هرز کرت های آزمایشی، اویارسلام بود که آماربرداری جداگانه از آن به عمل آمد. سایر علفهای هرز خصوصاً پهن برگ ها، پراکنش یکنواختی نداشته و به صورت مجموع در کرت آماربرداری گردیدند. این ها شامل پهن برگ های گاوپنبه، سلمک، تاتوره (*Xanthium stramorium*) و توق (*Datura stramonium*) و علفهای هرز باریکبرگ گاورس (*Paspalum disticum*)، بند واش (*Digitaria sanguinalis*) و اسب واش (*Setaria glauca*) بودند.

نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان دادند که اثر علف کش بر درصد تغییرات تراکم و وزن خشک علف های هرز در سطح یک درصد معنی دار بوده است (جدول ۳).

جدول ۳- تجزیه واریانس درصد کنترل اویارسلام و علفهای هرز پهنه برگ براساس شمارش و وزن خشک در گیلان.

میانگین مربuat (MS)						منابع تغییرات
درصد کنترل علفهای هرز پهنه برگ (وزن خشک)	درصد کنترل علفهای هرز	درصد کنترل اویارسلام	درصد کنترل اویارسلام (شمارش)	درجه آزادی		
۱۸ ^{ns}	۲۶ ^{ns}	۱۲۸ ^{ns}	۹ ^{ns}	۳	تکرار	
۱۸۵۲ ^{**}	۲۲۵۹ ^{**}	۳۸۱۵ ^{**}	۳۹۴۰ ^{**}	۷	علف هرز	
۲۲	۱۶	۱۷	۱۸	۲۱	خطا	
۱۹	۸	۱۷	۱۳	-	ضریب تغییرات	

^{ns}تفاوت معنی دار موجود نمی باشد، ^{**}تفاوت معنی دار در سطح ۱ درصد موجود است.

براساس مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن (جدول ۴) علف کش ارادیکان، اویارسلام را به میزان ۸۹ درصد کنترل نمود. رونیت همین علف هرز را در مراحل اولیه رشد با اختلاف معنی داری نسبت به ارادیکان تا ۶۴ درصد در آماربرداری اول فصل و ۳۷ درصد در آمار گیری وزن خشک در اخر فصل، مهار نمود. ترفلان در اول و آخر فصل به ترتیب ۴۷ و صفر درصد اویارسلام را مهار نمود. احتمالاً اویارسلام کنترل شده در اول فصل نوع بذری آن بوده که توسط ترفلان کنترل شده اما به مرور زمان غده های اویارسلام سبز شده اند و دیگر این علف کش قادر به کنترل آنها نبوده است. رونیت که در مازندران وزن خشک اویارسلام را تا ۹۲ درصد کاهش داد، در گیلان، فقط ۳۷ درصد آن را کاهش داد. شاید شرایط استثنایی خشک منطقه باعث این پدیده شده باشد. براساس آمار ۱۰ ساله شهر رشت، میانگین بارش سالیانه ۱۰۸۵ میلی متر است، حال آنکه در سال اجرای طرح، ۷۱۱ میلی متر بوده است. برخلاف نتیجه مازندران، تیتوس در اواخر فصل زراعی، اویارسلام را ۴۷ درصد کنترل نمود که هر چند مطلوب نیست، لیکن نسبت به صفر درصد مازندران قابل ملاحظه می باشد. ضمناً هیچ منبعی، از جمله سازنده علف کش، مدعی نیست که این علف کش کنترل کننده اویارسلام است. علف کش تا پ استار که در مزارع برنج برای کنترل جگن ها استفاده می شود (مصلی نژاد و همکاران، ۲۰۰۲) فقط توانست این علف هرز را حدود ۳۰ درصد کنترل نماید ولی در مازندران اصلاً توانست آنرا کنترل نماید.

بیشترین کتترل علف‌های هرز پهن‌برگ در طول فصل، توسط علفکش ترفلان رخ داد که در شمارش اول فصل ۸۷ درصد و آخر فصل ۶۹ درصد تفاوت نسبت به شاهد نشان داد. در اول فصل، رونیت (۶۳ درصد) و اردیکان (۶۲ درصد) پهن‌برگ‌ها را کتترل نمودند که از نظر آماری با ترفلان تفاوت آماری داشتند. گل و تیتوس با ۵۴ درصد کتترل نیز در ردیف بعدی قرار گرفتند که از نظر آماری داشتند. کتترل سایر تیمارها زیر ۳۰ درصد بود که از نظر آماری با تیمارهای فوق تفاوت معنی‌دار داشتند. در پایان فصل (وزن خشک علف‌های هرز پهن‌برگ) به جز ترفلان که کتترل ۶۹ درصد از خود نشان داد، سایر تیمارها ضعیف عمل نمودند. مویدزاده و چغفرزاده (۱۹۹۶) نیز در کارایی بالای ترفلان در مزارع توتون آذربایجان غربی صحه گذارداند.

جدول ۴ - مقایسه میانگین داده های آزمایش در گیلان**:

***** حروف مشابه در مقابل اعداد در هر ستون نمایانگر عدم تفاوت معنی دار براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱ در صد می باشد، در صد نیست به شاهد اختصاصی هر تمار.**

مطلوب ترین تیمارهای کترل کننده علفهای هرز باریکبرگ در اوایل فصل که توانستند بیش از ۹۰ درصد این علفهای هرز را کترل نمایند شامل، گل (درصد ۹۶)، گالانت سوپر ۹۴ درصد، فوکوس ۹۴ درصد و اردیکان ۹۰ درصد بودند. به هر حال تفاوت آماری بین این تیمارها با یکدیگر معنی دار نبود. در پایان فصل (وزن خشک علفهای هرز) تنها فوکوس (درصد ۹۸) و گالانت سوپر (درصد ۹۷) کترل مطلوب علفهای هرز باریکبرگ را حفظ کردند و در سایر تیمارها باریکبرگ‌ها کمتر از ۷۰ درصد کترل شدند. بوری (۱۹۸۶) از آزمایش خود در شرایط تایلند، کارایی خوب علفکش گالانت سوپر را در کترل علفهای هرز باریکبرگ توتون گزارش نموده است.

برای عملکرد سبز توتون، هیچ تیماری نتوانست با تیمار وجین علفهای هرز رقابت نماید به طوری که عملکرد نسبت به شاهد با علف هرز ۳۳۰ درصد افزایش یافت. در اینجا اهمیت رقابت علفهای هرز با گیاه توتون روشن می‌شود. موسوی (۲۰۰۱) گزارش نموده است که علفهای هرز می‌توانند تا ۸۰ درصد به توتون صدمه وارد آورند. در یک آزمایش ۴ ساله، هاسرو میلر (۱۹۷۵)، نشان دادند که در صورت عدم مبارزه با علفهای هرز در مزارع توتون، عملکرد آن ۲۶ درصد کاهش می‌یابد. بیشترین درصد افزایش عملکرد سبز توتون نسبت به شاهد با علف هرز، مربوط به تیمارهای علف کش اردیکان (درصد ۲۶۴) و گالانت سوپر (درصد ۲۴۹) بود که با یکدیگر نیز تفاوت معنی دار داشتند. افزایش عملکرد در ردیف بعدی ناشی از کاربرد تیتوس (درصد ۱۴۰)، ترفلان (درصد ۱۲۷)، رونیت (درصد ۱۱۶) و فوکوس (درصد ۱۱۵) گزارش گردید. چهار تیمار اخیر با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. افزایش عملکرد در سایر تیمارها جزیی و در دامنه حدکثر ۲۹ درصد (استامپ) و حداقل ۵ درصد (لاسو) بود.

محاسبه درصد افزایش درآمد زارع نیز نشان داد که هیچ یک از تیمارهای مبارزه شیمیایی با علفهای هرز نتوانستند با تیمار وجین علفهای هرز رقابت نموده و درآمد را تا حدود ۱۰ برابر افزایش دهند. بالاترین افزایش درآمد در تیمارهای علفکش در تیمار فوکوس با ۵۰۷ درصد افزایش بود که نسبت به تیمار وجین تفاوت معنی دار داشت. کمترین افزایش درآمد با ۳۲ درصد در تیمار گل ملاحظه گردید.

نتیجه کلی در منطقه گیلان: مبارزه با علفهای هرز در مزارع توتون باعث افزایش عملکرد و درآمد حاصل از توتون شده سود زارع از این کشت افزایش می‌یابد. این یافته با نتایج هاوزر و مایلر (۱۹۷۵)

مطابقت کامل دارد. آزمایش حاضر نشان داد که برای کنترل علف هرز اویارسلام در مزارع توتون باید از علفکش اردیکان استفاده نمود. برای کنترل علفهای هرز پهنبرگ، علفکش ترفلان بهترین نتیجه را داشته است. برای کنترل علفهای هرز باریکبرگ استفاده از باریکبرگکش‌های گالانت سوپر و فوکوس بسیار مناسب است لیکن برای کنترل تؤمن علفهای هرز پهنبرگ توصیه می‌شود قبل از کاشت علفکش ترفلان حتماً مصرف شود.

منابع

- Abtali, Y., and Gaminchi, A. 1997. Efficacy of some herbicides in tobacco fields. Annual Research Report. Tirtash Tobacco Research Center, Iran, Mazandaran.
- Budimir, A., Burkic, M., Boic, M., and kozumplik, V. 2003. Effect of Different Herbicides on Weed Populationand Leaf Yield of Tobacco. Coresta Meeting, Agro-Phyto Groups, 2003, Bucharest, Apost 29.
- Buri, S. 1986. Efficacy of post-emergence herbicides in tobacco. Research report, Crop Research Center, Thailand.
- Dimeska, V. 1998. the Effects of some Selective Herbicides Application on the Weed Flora and Tobacco. Bull. Spec. Coresta, 1998, Congress Brighton, 104p, Abstract.
- Dimeska, V., Stojkov, S., and Gveroska, B. 2004. Effects of application of selective herbicides on weeds, yield and quality of tobacco. Tutun, 2003, 53: 5-6, Pp: 157-66.
- Gaminchi, A. 1992. Comparing herbicides to control weeds in tobacco fields, Annual Research Report. Tirtash Tobacco Research Center, Iran, Mazandaran.
- Hauser, E.W., and Miler, J.D. 1975. Flue-cured tobacco and quality as affected by weed control methods. Weed Res. 15: 4. 211-215.
- Lahsaei-zadeh, A. 1992. Comparig four pre-emergence herbigated herbicides in tobacco fields. Annual Research Report. Shiraz Tobacco Research Center, Iran, Fars.
- Lolas, P.C., and Kosmidou, O.N. 1997. Weed control experiments in tobacco with new herbicides. Corresta Meet. Agro-Phyto Groups.
- Masangkay, R.F. 1990. Response of burley tobacco (*Nicotinia tabacum* L. var. KY 10) to different weed control methods and nitrogen levels. Thesis. Philipines University, Los Banos, College, Laguana, 101p.
- Mesbah, M. 2000. Investigating eptam and pendimethalin as a mixed herbicide to control weeds in tobacco fields. Annual Research Report. Rasht Tobacco Research Center, Iran, Gilan.
- Moayed-zadeh, N., and Jaffar-zadeh, N. 1996. Comparing efficacy of some herbicides in tobacco fields. Annual Research Report. Urumyeh Tobacco Research Center, Iran, W. Azarbaijan.
- Mossalla Nejad, H., Noroozian, M., and Mohammad-Beigi, A. 2002. An Index of crop Pests, Diseases and weeds and pesticide Recommendations. Plant Protection Organization, Iran, 112p.
- Mussavi, M.R. 2001. Integrated weed management (principles and methods). Myad publishers, Tehran, 491p.

- Paunescu, A., Stanescu, D., Paunescu, V.M., and Udrescu, E. 2002, Aspects of the Chemical Control of Weeds in Tobacco Fields in Romania. Coresta Congress, New Orleans, 2002, Agro-Phyto Groups, Abstract.
- Ranjbarchubeh, M., Sharifi, M.M., Moradian, M., and Mussavi, M.R. 1995. Comparing efficacy of some herbicides in tobacco fields. Annual Research Report. Rasht Tobacco Research Center, Iran, Guilan.
- Smith, W.D., and Peedin, G. 1997. Effects of Sulfentrazone on Weed Control and Phytotoxicity in Flue-Cured Tobacco. Coresta Meet. Agro-Phyto Groups, Montreux, 1997, 29p.
- Tomlin, C.D.S. 2004. The Pesticide Manual. British Crop Protection Council, 1250p.
- Vaziri, M., and Moayed-zadeh, N. 1992. Pre-emergence control of weeds in tobacco fields. Annual Research Report. Urumyeh Tobacco Research Center, Iran, W. Azarbaijan.



EJCP., Vol. 2 (4): 23-38
www.ejcp.info



Investigating efficiency of some herbicides to control weeds in tobacco fields (*Nicotiana tabacum*)

P. Shimi¹, A. Rahbari² and M. Mesbah³

¹Researcher at Iranian Research Institute of Plant Protection, ²Researcher at Tobacco Research Center, Mazandaran, ³Researcher at Tobacco Research Center, Guilan

Abstract

Efficacy of many herbicides to control broad- and narrow-leaf weeds (grass weeds) in tobacco fields of Mazandaran and Guilan provinces was investigated. The experiment was Randomized Complete Blocks Design in four replications and the following treatments: Eptam (Eradicane 82% EC) at 6 L.ha⁻¹ which incorporated pre-planting (ppi), Trifluralin (Treflan 48% EC) at 2 L/ha ppi, Cycloate (RoNeet 72.7% EC) at 5 L/ha ppi, Pendimethalin (Stomp, 33% EC) at 5 L.ha⁻¹ pre-emergence, Alachlor (Lasso 48% EC) at 5 L.ha⁻¹ pre-emergence., Oxyfluorfen (Goal 24% EC) at 2 L.ha⁻¹ pre-emergence., Oxadiargyl (Top Star 30% EC) at 2 L.ha⁻¹ pre-emergence., Rimsulfuron (Titus 25% DF) at 50 gr.ha⁻¹ + 2% surfactant (Cytogate) post-emergence, Haloxyfop-P- methyl (Galant Super 10.8% EC) at 0.75 L/ha post-emergence, Cycloxydim (Focus 10% EC) at 2 L.ha⁻¹. post-emergence, weed-less check. Results showed that weed control in tobacco fields increases yield and quality of tobacco and consequently farmers' income. For chemical control of weeds in tobacco fields, if the problem of *Cyperus* spp. exists, Eradicane herbicide is recommended as a pre-planting incorporated herbicide. If no *Cyperus* spp. is present, Treflan is suggested to be sprayed, because, it controls broadleaf weeds better. If grass weeds cause problem, one of the two graminicides, Galant Super or Focus, may be sprayed before stem extension.. One or two mechanical weeding also may follow, as needed.

Keywords: Tobacco; Weeds; Herbicides

*- Corresponding Author; Email: parvizshimi@yahoo.com