



## ارزیابی تحمل به شوری ارقام سورگوم علوفه‌ای با استفاده از شاخص‌های حساسیت و تحمل به تنش

امین آناقلی<sup>۱</sup>، سیدعلی طباطبایی<sup>۲</sup> و عزیز فومن<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup>عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری، <sup>۲</sup>عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد،

<sup>۳</sup>عضو هیات علمی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

### چکیده

به منظور بررسی تحمل به شوری لاین‌های امید بخش سورگوم علوفه‌ای داخلی این آزمایش در دو مرحله آزمایشگاهی و مزرعه‌ای انجام گردید. در مرحله جوانه‌زنی تیمارهای آزمایش شامل سطوح شوری ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دسی‌زیمنس بر متر و یک تیمار آب مقطر به عنوان شاهد و ارقام شامل KFS<sub>1</sub>, KFS<sub>2</sub>, KFS<sub>3</sub>, KFS<sub>4</sub>, MFS<sub>1</sub>, MFS<sub>2</sub>, MFS<sub>56</sub> و LFS<sub>56</sub> بودند. در آزمایش مزرعه‌ای نیز ارقام فوق در دو شرایط تنش شوری (با آب ۱۱ dS/m) و بدون تنش شوری (با آب ۲dS/m) طی سال‌های ۸۴ و ۸۳ کشت گردیدند. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی با افزایش شوری محیط کشت، T<sub>50</sub> (مدت زمان لازم برای ۵۰ درصد جوانه‌زنی) افزایش یافت. همچنین بدون در نظر گرفتن نوع رقم، آستانه تحمل در مرحله جوانه‌زنی ۸/۳۷ dS/m با شیب ۱/۶۴ درصد برآورد گردید. در شرایط مزرعه‌ای و غیرشور بیشترین عملکرد تر را رقم KFS<sub>2</sub> با متوسط ۷۷/۲۵ تن در هکتار تولید کرد و پس از آن رقمهای KFS<sub>3</sub> و KFS<sub>4</sub> بیشترین عملکردها را داشتند. در شرایط تنش شوری بالاترین عملکرد تر مربوط به رقم KFS<sub>3</sub> با متوسط ۵۵/۶۳ تن در هکتار بود. در این شرایط رقم KFS<sub>2</sub> بطور متوسط ۴۹/۴۴ تن در هکتار تولید کرد. براساس شاخص حساسیت و تحمل به تنش ارقام KFS<sub>2</sub> و KFS<sub>3</sub> را می‌توان از لحاظ پایداری عملکرد ارقام مناسبی دانست.

واژه‌های کلیدی: پایداری عملکرد، تنش شوری، سورگوم

\* - مسئول مکاتبه: anagholi@yahoo.com

## مقدمه

رشد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا تحت تاثیر تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده می‌باشد و کشاورزی در آن نقاط با صرف هزینه بیشتر و بازده کمتر انجام می‌گیرد. در ایران، وسعت اراضی سور حدود ۴۴/۵ میلیون هکتار می‌باشد که به درجات مختلف دچار مشکل شوری و قلیائیت هستند (بنایی و همکاران، ۲۰۰۵). مساله شوری در اغلب مناطق مورد کشت سورگوم در دنیا مطرح است (تیلور و همکاران، ۱۹۷۵). سورگوم علوفه‌ای در جهان به دو صورت لاین‌های خالص و ارقام هیبرید مورد کشت و کار قرار می‌گیرد. خصوصیات مورفولوژیکی این گیاه سبب شده است که به عنوان شاخص گیاهان زراعی مقاوم به خشکی معرفی شود از لحاظ درجه تحمل به شوری نیز به عنوان یک گیاه نیمه متحمل با آستانه تحمل به شوری  $dS/m = 6/8$  شناخته شده است (فرانکویس و همکاران، ۱۹۸۴). این گیاه براساس تقسیم بندی گیاهان در مقاومت به تنش شوری، در کلاس نیمه متحمل قرار می‌گیرد (ماس و هافمن، ۱۹۷۷). اما در بین ارقام یک گونه زراعی، تحمل به تنش شوری می‌تواند بسیار متفاوت باشد. این تفاوت‌ها در داخل گونه‌های زراعی می‌تواند به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی تحمل به نمک اهمیت پیدا کند. سانسری و همکاران (۲۰۰۲) عنوان کردند که احتمالاً لاین‌های انتخاب شده سورگوم در مناطق نیمه‌خشک مقاومت بیشتری به شوری نشان دهند.

یکی دیگر از مباحث مهم در برنامه‌های به نزادی و معروفی رقم مقاوم و سازگار به عوامل محیطی، عکس العمل ژنوتیپ(ها) در محیط‌های متفاوت می‌باشد. از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ‌ها به شرایط محیطی مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط است، در واقع پایداری عملکرد یک ژنوتیپ از طریق عدم تغییرات قابل ملاحظه اثر متقابل ژنوتیپ با محیط وقتی که شرایط محیطی ثابت نباشد ارزیابی می‌شود، بنابراین در بررسی مواد آزمایشی در برنامه‌های به نزادی ژنوتیپ‌هایی سازگار ارزیابی می‌شوند که واریانس اثر متقابل آنها با محیط انداز باشد. برای ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ‌ها در شرایط محیطی مختلف، شاخص‌های متفاوتی ارائه شده است که از آنها می‌توان برای تعیین مقاومت و یا حساسیت ژنوتیپ‌ها به تنش‌های محیطی استفاده کرد. روزلی و هامبلین (۱۹۸۱) شاخص‌های  $Tol^1$  (شاخص تحمل به تنش) و  $MP^2$  (شاخص متوسط محصولدهی) را معرفی کرده‌اند. انتخاب ژنوتیپ‌های برتر در این شاخص‌ها براساس  $Tol$  کمتر و  $MP$  بیشتر می‌باشد. آن‌ها

1- Tolerance index

2- Mean productivity

شرط لازم را برای ایجاد ارتباط مثبت و منطقی بین شاخص‌های  $Tol$  و  $MP$  در این دانستند که واریانس ژنتیکی در محیط تنفس بزرگتر از محیط غیرتنفس باشد. فیشر و مائورر (۱۹۷۸) شاخص حساسیت به تنفس<sup>۱</sup> (SSI) را پیشنهاد کردند. فرناندز (۱۹۹۲) نیز شاخص مقاومت به تنفس<sup>۲</sup> (STI) را معرفی کرد. این شاخص‌ها در قسمت مواد و روش‌ها تشریح گردیده‌اند. در شاخص SSI به دلیل استفاده از ثابت سختی شرایط محیط (SI) و در شاخص STI به دلیل استفاده از ثابت میانگین هندسی ( $\sqrt{Y_p \times Y_s}$ ), کارایی بیشتری در انتخاب لایه‌ای برتر دارند با این وجود با تغییر سختی محیط (SI) در شاخص SSI ممکن است نتایج متفاوتی در سال‌ها و مناطق مختلف بدست آید. در شاخص STI نیز به دلیل خاصیت ضرب اعداد ممکن است یک مربع میانگین هندسی ثابت برای جفت‌هایی از اعداد که با یکدیگر تفاوت آشکار دارند وجود داشته باشد (نادری و همکاران، ۲۰۰۰). لذا در این بررسی سعی شده است تا از شاخص‌های مهمتر و همچنین میزان تولید در شرایط تنفس و غیر تنفس استفاده شود. ارقام خالص سورگوم علوفه‌ای در ایران حاصل طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد که کراس و خالص‌سازی آنها به روش بالک پدیگری در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج و مشهد انجام گرفته است که برخی از لایه‌های امیدبخش آن در این آزمایش از لحاظ مقاومت به شوری بررسی خواهند شد.

## مواد و روش‌ها

این آزمایش در دو مرحله آزمایشگاهی و مزرعه‌ای به ترتیب در آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات شوری و ایستگاه تحقیقات شوری صدوق با مختصات جغرافیائی  $32^{\circ} 03' 00''$  شمالی و  $54^{\circ} 14' 00''$  شرقی و ارتفاع از سطح دریا  $1134$  متر واقع در  $25$  کیلومتری شهرستان یزد به مدت دو سال (۸۴ و ۸۳) انجام گردید. در مرحله آزمایشگاهی نیمارهای آزمایش شامل سطوح شوری  $5$ ،  $10$ ،  $15$ ،  $20$ ،  $25$  و  $30$  دسی زیمنس بر متر و یک تیمار آب مقطر به عنوان شاهد و رقم شامل ارقام داخلی سورگوم علوفه‌ای  $LFS_{56}$ ،  $MFS_1$ ،  $KFS_2$ ،  $KFS_3$ ،  $KFS_4$ ،  $MFS_2$  و  $MFS_1$  بودند که به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در  $3$  تکرار اجرا گردید. شوری محیط کشت با نمک‌های کلرید

1- Stress susceptibility index  
2- Stress tolerance index

سدیم و کلرید کلسیم به نسبت وزنی  $2\text{NaCl}:1\text{CaCl}_2$  ایجاد گردید. سرعت جوانه زنی از رابطه زیر محاسبه گردید

$$GR = \frac{x_1}{y_1} + \frac{x_2 - x_1}{y_2} + \dots + \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n} \quad (1)$$

که در آن  $x_n$  درصد بذور جوانه زده در شمارش  $n$  ام و  $y_n$  تعداد روز از ابتدای کشت تا زمان شمارش  $n$  ام می‌باشد. میزان  $T_{50}$  یا مدت زمان لازم برای ۵۰٪ جوانه زنی بر حسب روز نیز از رابطه زیر حساب گردید

$$T_{50} = t_i \left( \frac{\frac{N+1}{2} - n_i}{\frac{n_j - n_i}{n_j}} \right) \times (t_j - t_i) \quad (2)$$

که در آن  $N$ ، بذرهای جوانه‌زده در پایان آزمایش،  $n_i$  و  $n_j$ ، تعداد بذرهای جوانه زده در روزهای انتخابی  $t_i$  و  $t_j$  و بالاخره  $t_i$  مدت زمان لازم برای حداقلتر جوانه‌زنی می‌باشد. برای محاسبه الگوی کاهش جوانه‌زنی نسبت به شوری از روابط ۳ و ۴ استفاده گردید.

$$Y_r = 100 - [l \times (EC - A_0)] \quad (3)$$

$$Y_r = \frac{Y_m}{1 + \left( \frac{C}{C_{50}} \right)^p} \quad (4)$$

که در اولی آستانه تحمل به شوری ( $A_0$ ) در مرحله جوانه‌زنی براساس مدل خطی و شیب خط (۱) به دست می‌آید. براساس مدل بعدی نیز، غلطی از شوری که ۵۰ درصد جوانه‌زنی کاهش می‌یابد ( $C_{50}$ ) به دست می‌آید. در این معادله ( $Y_m$ ) درصد جوانه‌زنی در شرایط بدون تنفس می‌باشد که در این آزمایش به صورت نسبی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شد.  $C$  غلط نمک یا شوری محیط و  $P$  ثابت تجربی است. برای نرمال بودن اعداد درصد جوانه زنی در تجزیه واریانس آن از تبدیل زاویه‌ای  $\text{Arc sin } \sqrt{x}$  استفاده گردید. در آزمایش مزرعه‌ای، ارقام فوق در دو شرایط تنفس شوری و بدون تنفس شوری در سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی کشت گردیدند. شوری آب آبیاری

برای شرایط شور و غیرشور به ترتیب ۱۱ و ۲ دسی‌زیمنس بر متر بود. برای محاسبه شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص مقاومت به تنش (STI) از روابط زیر استفاده گردید:

$$SSI = \frac{1 - \frac{Y_s}{Y_p}}{1 - \frac{\bar{Y}_s}{\bar{Y}_p}} \quad (5)$$

$$STI = \frac{Y_p \times \bar{Y}_s}{\bar{Y}_p^2} \quad (6)$$

که  $\bar{Y}_p$ ،  $\bar{Y}_s$  و  $Y_p$  به ترتیب عملکرد ژنوتیپ در شرایط تنش، عملکرد ژنوتیپ در شرایط بدون تنش، میانگین عملکرد ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و میانگین عملکرد ژنوتیپ‌ها در شرایط بدون تنش می‌باشد. برای محاسبه شاخص‌های دیگر نیز از روابط زیر استفاده گردید:

$$Tol = Y_p - Y_s \quad (7)$$

$$MP = \frac{Y_p + Y_s}{2} \quad (8)$$

$$GMP = \sqrt{Y_p \times Y_s} \quad (9)$$


برای انجام محاسبات آماری، تجزیه واریانس و بدست آوردن ضرائب معادلات از نرم‌افزار SAS و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن و سطح احتمال ۵ درصد استفاده شد.

## نتایج و بحث

جوانه زنی: براساس رابطه ۳، آستانه تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی بدون درنظر گرفتن نوع رقم  $m^{8/37}dS/m$  و شب خط کاهش جوانه زنی  $1/64$  درصد محاسبه گردید. در این معادله غلظتی از شوری که در آن عملکرد یا صفت مورد مطالعه  $50$  درصد کاهش می‌یابد از رابطه  $C_{mid}=(0.5/l)+A_0$  قابل برآورد است که در این آزمایش  $dS/m^{38/8}$  محاسبه گردید. براساس رابطه ۴ نیز  $C_{50}$  به میزان  $dS/m^{43/47}$  برآورد گردیده است. با توجه به شکل ۱ به نظر میرسد که دقیت برآورد  $50$  درصد کاهش جوانه زنی بر اساس مدل لگاریتمی بیشتر از مدل دو خطی باشد چراکه نقاط واقعی بر روی مدل لگاریتمی پراکنش مناسبتری دارند، اما مدل دو خطی نیز بدلیل اینکه نقطه

شروع کاهش جوانهزنی را نشان می دهد، می تواند بسیار مفید باشد. در معادله ۴،  $p$  یک ثابت تجربی می باشد که  $2/21$  برآورد گردید (برای جزئیات بیشتر به مقاله آنالی، ۲۰۰۸ مراجعه شود). در بین ارقام مورد بررسی رقم های KFS<sub>2</sub> و KFS<sub>4</sub> با  $81/7$  و  $81/2$  درصد بالاترین درصد جوانهزنی را داشتند و پس از آن رقم های KFS<sub>1</sub> و MFS<sub>1</sub> در گروه بعدی قرار گرفتند. فرانکویس و همکاران (۱۹۸۴) نیز عنوان کرده بودند که سورگوم در مرحله جوانه زنی نسبت به مراحل بعدی رشد تحمل بیشتری به شوری دارد و در شوری های بالای  $22 \text{ dS/m}$  درصد جوانهزنی بالایی بدست می آید.

در این آزمایش بالاترین سرعت جوانهزنی در شوری های  $0$  و  $5 \text{ دسی زیمنس}$  بر متر مشاهده شد. در شوری  $10 \text{ دسی زیمنس}$  بر متر کاهش محسوسی در سرعت جوانهزنی مشاهده گردید و با افزایش درجه شوری تا  $15 \text{ دسی زیمنس}$  بر متر این کاهش تغییر چندانی نداشت و پس از آن تقریباً با سرعت یکنواختی کاهش پیدا کرد (جدول ۲) براین اساس می توان از رابطه  $Y = -0.83X + 43.9$  ( $R^2 = 0.97$ ) تغییرات سرعت جوانهزنی را برآورد کرد. تاخیر در سرعت جوانه زنی سورگوم به علت تنفس شوری در آزمایش فرانکویس و همکاران (۱۹۸۴) نیز مشاهده گردید، آنها عنوان کردند که شوری بالای  $8/2 \text{ dS/m}$  باعث تاخیر در سرعت جوانه زنی گردید و در شوری های بالا، جوانه زنی در  $10$  روز کامل شد.



شکل ۱- تغییرات درصد جوانهزنی بدون توجه به نوع رقم و بر اساس مدل خطی و لگاریتمی

در بین ارقام مورد بررسی بالاترین سرعت جوانهزنی در رقم  $KFS_2$  مشاهده گردید که با رقم  $MFS_1$  تفاوت معنی داری نداشت. رقم  $LFS_{56}$  سرعت جوانهزنی بسیار پائینی داشت که بسیار متفاوت نسبت به بقیه ارقام می باشد، رقم  $KFS_3$  نیز دارای سرعت جوانهزنی پائینی می باشد (جدول ۳). رحیمی و چائی چی (۲۰۰۵) از این لحاظ رقم کیمیا را مقاومترین و رقم اسپید فید را حساسترین رقم در بین ارقام مورد بررسی خود معرفی کردند. ماس و همکاران (۱۹۸۶) نیز ضمن اشاره به تفاوت سرعت جوانهزنی ارقام سورگوم در اثر تنش شوری، عنوان کردند که این گیاه در مراحل مختلف رشدی نیز به تنش شوری مقاومت های متفاوتی را نشان می دهد. در آزمایش جوانهزنی کمترین مقدار  $T_{50}$  در شوری های ۰ و ۵ دسی زیمنس بر متر محاسبه گردید (جدول ۲). تیمارهای شوری ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر نیز با  $T_{50}$  های ۲/۰ و ۲/۶ روز در سطح احتمال ۵ درصد در گروه برتر قرار گرفت. تیمار ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دسی زیمنس بر متر با ۳/۲، ۴/۷ و ۶/۱ روز به ترتیب در گروه های بعدی قرار گرفتند (جدول ۲). بر اساس معادلات رگرسیون معادله درجه ۲ ( $Y = 1/80 - 0/05 X + 0/006 X^2$ ) با  $R^2 = 0/99$  برآش بهتری برای تغییرات  $T_{50}$  نسبت به شوری دارد. کمترین مقدار  $T_{50}$  در رقم ۱ با ۱/۹ روز مشاهده شد و رقم های  $KFS_1$ ،  $KFS_4$ ،  $MFS_1$  و  $MFS_2$  تقریباً با اختلاف ۱ روز در گروه آماری برتر قرار گرفتند. بیشترین مقدار  $T_{50}$  در رقم  $KFS_3$  با ۵/۱ روز محاسبه گردید. کمترین تغییرات  $T_{50}$  در رقم  $KFS_2$  و بیشترین تغییرات در رقم  $KFS_3$  بود (جدول ۳). در آزمایش مشابه که در گیاه جو انجام گردید مقدار  $T_{50}$  برای ارقام حساس در شرایط تنش شوری ۶ روز و برای ارقام مقاوم ۳ روز بود (تاجبخش و صادقی، ۱۹۹۹). به طور کلی در این آزمایش رقم  $KFS_2$  دارای درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی خوبی بود و مدت زمان رسیدن به ۵۰ درصد جوانهزنی نیز در آن کمتر از ارقام دیگر بود. ولی همانطوری که عنوان گردید نمی توان فقط بر اساس تحمل به شوری بیشتر در مرحله جوانهزنی یا مرحله خاصی از رشد رقمی را متحمل معرفی نمود بنابراین بهتر است واکنش طبیعی گیاه در شرایط واقعی و مزرعه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

جدول ۱- میانگین مربوط صفت های مورد بررسی در آزمایش جوانهزنی

منابع تغییر	درجه آزادی	درصد جوانهزنی	سرعت جوانهزنی	$T_{50}$
*	۶	۱۴۴/۴**	۱۷۵۲/۲**	۵۱/۰**
رقم	۶(۵)†	۱۱۲۰/۴**	۳۹۰۴/۴**	۲۳/۰**
شوری × رقم	۳۶(۳۰)	۸/۳۸*	۸۷/۳*	۴/۹ <sup>ns</sup>
خطا	۹۸(۷۴)	۱۲/۰۴	۵۲/۵	۳/۸
CV (%)	-	۱۸/۸	۲۳/۱	۲۳/۱

\* و \*\*: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪ و غیر معنی دار می باشد.

†: درجه آزادی های داخل پرانتز مربوط به  $T_{50}$  می باشد.

جدول ۲- مقایسه میانگین صفت‌های مورد بررسی سورگوم در آزمایش جوانهزنی در شوری‌های مختلف.

شوری	جوانهزنی (درصد)	سرعت جوانهزنی (درصد در روز)	T <sub>50</sub> (روز)
۰	۷۰/۹ <sup>ab</sup>	۴۲/۰ <sup>a</sup>	۱/۸ <sup>a</sup>
۵	۷۳/۱ <sup>a</sup>	۴۱/۸ <sup>a</sup>	۱/۷ <sup>a</sup>
۱۰	۶۳/۸ <sup>bc</sup>	۳۴/۲ <sup>b</sup>	۲/۷ <sup>ab</sup>
۱۵	۶۶/۷ <sup>abc</sup>	۳۳/۷ <sup>bc</sup>	۲/۷ <sup>ab</sup>
۲۰	۶۱/۲ <sup>cd</sup>	۲۷/۷ <sup>cd</sup>	۳/۲ <sup>b</sup>
۲۵	۵۵/۰ <sup>de</sup>	۲۳/۰ <sup>de</sup>	۴/۷ <sup>c</sup>
۳۰	۴۸/۸ <sup>e</sup>	۱۷/۹ <sup>e</sup>	۷/۱ <sup>d</sup>

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سورگوم آزمایش جوانهزنی در ارقام مختلف.

رقم	جوانه زنی (درصد)	سرعت جوانهزنی (درصد در روز)	T <sub>50</sub> (روز)
KFS <sub>1</sub>	۷۱/۴ <sup>b</sup>	۳۵/۳ <sup>bc</sup>	۳/۷ <sup>a</sup>
KFS <sub>2</sub>	۸۱/۷ <sup>a</sup>	۴۴/۱ <sup>a</sup>	۱/۹ <sup>a</sup>
KFS <sub>3</sub>	۵۸/۳ <sup>c</sup>	۲۵/۹ <sup>d</sup>	۵/۱ <sup>b</sup>
KFS <sub>4</sub>	۸۱/۲ <sup>a</sup>	۳۵/۰ <sup>c</sup>	۳/۰ <sup>a</sup>
MFS <sub>1</sub>	۷۰/۰ <sup>b</sup>	۳۹/۹ <sup>ab</sup>	۲/۹ <sup>a</sup>
MFS <sub>2</sub>	۶۶/۹ <sup>b</sup>	۳۶/۳ <sup>bc</sup>	۲/۸ <sup>a</sup>
LFS <sub>56</sub>	۱۰/۰ <sup>d</sup>	۳/۲ <sup>e</sup>	-

عملکرد کل علوفه تر: براساس نتایج مزرعه‌ای و تجزیه مرکب دو ساله آزمایش، اثر سال بر عملکرد کل علوفه‌تر در شرایط غیرشور معنی‌دار نبود ولی در شرایط شور در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار گردید (جدول ۴). متوسط عملکرد در شرایط غیرشور در سال اول آزمایش ۶۶/۱۲ تن در هکتار بود و در سال دوم به ۶۱/۷۹ تن در هکتار رسید. در شرایط تنش شوری متوسط عملکرد در سال اول و دوم به ترتیب ۴۵/۴۹ و ۲۷/۷۳ تن در هکتار گردید. این امر به علت سختی شرایط محیطی (SI) در سال دوم آزمایش بود که در سال اول و دوم به ترتیب ۰/۳۳ و ۰/۵۵ بود. در تجزیه سالانه این آزمایش اثر

رقم در سال اول آزمایش در هر دو شرایط در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۴) و در سال دوم آزمایش اثر رقم در شوری  $dS/m$  ۲ در سطح احتمال ۵ درصد و در شوری  $dS/m$  ۱۱ در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار گردید (جدول ۴). براساس تجزیه مركب دو ساله آزمایش نیز در شرایط شور و غیرشور اثر رقم در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار گردید (جدول ۴). بیشترین عملکرد کل علوفه‌تر را طی دو سال در شرایط غیرشور رقم KFS<sub>2</sub> با متوسط  $77/25$  تن در هکتار تولید کرد و پس از آن رقم‌های KFS<sub>3</sub> و KFS<sub>4</sub> با  $73/22$  و  $70/05$  تن در هکتار بیشترین عملکردها را داشتند. رقم‌های KFS<sub>1</sub> و KFS<sub>2</sub> نیز در شرایط غیرشور عملکردهای بالایی را تولید کردند، در این بین رقم‌های MFS<sub>1</sub> و MFS<sub>56</sub> به ترتیب با  $45/15$  و  $57/78$  تن در هکتار کمترین عملکرد کل علوفه‌تر را بخود اختصاص دادند (جدول ۵). در شرایط تنفس شوری بالاترین عملکرد کل علوفه تر مربوط به رقم KFS<sub>3</sub> با متوسط  $55/63$  تن در هکتار بود. رقم KFS<sub>2</sub> که بالاترین عملکرد را در شرایط غیرشور داشت، در شرایط شور به طور متوسط  $49/44$  تن در هکتار تولید کرد (جدول ۵). کاهش عملکرد ارقام KFS<sub>2</sub> و KFS<sub>3</sub> در شرایط شور نسبت به شرایط غیرشور بر اساس جدول ۵ به ترتیب  $36$  درصد و  $24$  درصد بود. رقم KFS<sub>4</sub> در شرایط تنفس شوری به طور متوسط طی دو سال دارای عملکردی معادل  $39/51$  تن در هکتار بود که بر اساس جدول ۵ نسبت به شرایط غیرشور  $43/6\%$  کاهش نشان می‌دهد. پس از آن رقم‌های KFS<sub>1</sub> و LFS<sub>56</sub> قرار داشتند که دارای عملکردهای  $35/61$  و  $30/24$  تن در هکتار بودند، این ارقام نسبت به شرایط غیرشور کاهش عملکردی معادل  $43/3$  درصد و  $4/7$  درصد داشتند (جدول ۵). کمترین عملکرد کل علوفه تر در این آزمایش مربوط به ارقام MFS<sub>1</sub> و MFS<sub>2</sub> به ترتیب با  $18/76$  و  $10/27$  تن در هکتار بود. این ارقام نیز کاهش عملکردی معادل  $47/7$  و  $55/9$  درصد نسبت به شرایط غیرشور داشتند. بطورکلی ارقام MFS<sub>1</sub>, MFS<sub>2</sub>, MFS<sub>56</sub> در شرایط غیرشور نیز دارای پتانسیل پائین بودند و عملکردهای بالایی را تولید نکردند. در این آزمایش اثر متقابل سال  $\times$  رقم در شرایط تنفس شوری در سطح احتمال ۱ درصد معنی‌دار گردید، چرا که رقم‌های KFS<sub>1</sub>, KFS<sub>4</sub>, KFS<sub>2</sub> و LFS<sub>56</sub> در سال دوم عملکردهای بسیار پائین را نسبت به سال اول تولید کردند. ولی در شرایط غیرشور تغییرات عملکرد کل علوفه تر در سال دوم نسبت به سال اول زیاد شدید نبود. علت این امر را می‌توان در شاخص‌های حساسیت و تحمل به تنفس جستجو کرد.

مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد (۳) شماره ۱۳۸۹

جدول ۴ - میانگین مریعات عملکرد کل علوفه تر ارقام سورگوم در سالهای مختلف و تجزیه مرکب.

منابع تغییر	سال اول (۲dS/m)	سال اول (۱۱dS/m)	سال دوم (۲dS/m)	سال دوم (۱۱dS/m)	سال دوم (۲dS/m)	سال دوم (۱۱dS/m)	تجزیه مرکب (۲dS/m)	تجزیه مرکب (۱۱dS/m)
سال	-	-	-	-	-	-	-	-
تکرار	۳/۱۴ ns	۳۱۶/۵۸ *	۲۰/۵۸ ns	۲۰/۹۴ ns	۷۸/۷۵ †	۲۰/۹۴	۳۱۴/۵ †	۳۳۱۴/۶ *
رقم	۵۱۸/۹ **	۵۱۶/۱۹ **	۳۱۵/۶۹ *	۶۴۳/۲۱ **	۶۹۹/۲۴ *	۶۴۳/۲۱	۹۸۵/۲۸ *	۱۷۴/۱۲ ns ‡
خطا	۴۱/۸۳	۳۶/۳۸	۹۵/۱۰	۲۰/۳۸	۱۳۵/۴۶ ns ‡	۱۳۵/۴۶ ns ‡	۱۷۴/۱۲ ns ‡	۱۴/۵۵
CV%	۱۳/۵۰	۱۷/۶۴	۱۵/۷۸	۱۶/۲۸	۱۲/۹۴	۱۲/۹۴	۱۴/۵۵	-

ns، \* و \*\*: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد و ۱ درصد می باشند.

† و ‡: به ترتیب خطای سال و خطای رقم در تجزیه مرکب آزمایش می باشند.

جدول ۵- مقایسه میانگین عملکرد کل علوفه تر (تن در هکتار) در ارقام مختلف سورگوم.

رقم	سال اول (۲dS/m)	سال اول (۱۱dS/m)	سال دوم (۲dS/m)	سال دوم (۱۱dS/m)	تجزیه مرکب (۲dS/m)	تجزیه مرکب (۱۱dS/m)	تجزیه مرکب (۲dS/m)	تجزیه مرکب (۱۱dS/m)
KFS <sub>1</sub>	۶۵/۷۹ab	۵۲/۸۷ab	۱۸/۳۵d	۵۹/۷۸ab	۶۲/۷۸ab	۴۹/۴۴ab	۳۵/۶۱bcd	-
KFS <sub>2</sub>	۷۷/۶۷a	۵۵/۹۳ab	۴۲/۹۴b	۷۹/۸۴a	۷۷/۲۵a	۴۹/۴۴ab	-	-
KFS <sub>3</sub>	۷۴/۶۷ab	۵۹/۰۰ a	۵۲/۲۵a	۷۱/۷۷a	۷۳/۲۲ab	۵۵/۶۳a	-	-
KFS <sub>4</sub>	۷۲/۸۳ab	۴۹/۷۱ab	۲۹/۳۵c	۶۷/۲۷ab	۷۰/۰۵ab	۴۹/۵۱abc	-	-
MFS <sub>1</sub>	۳۸/۵۷ c	۲۲/۶۷ c	۱۴/۸۵d	۵۱/۷۲b	۴۵/۱۰c	۱۸/۷۶d	-	-
MFS <sub>2</sub>	۷۰/۳۳ab	۳۳/۳۳ c	۲۰/۸۷d	۵۲/۵۹b	۶۱/۴۶abc	۲۷/۱۰c	-	-
LFS <sub>56</sub>	۶۳/۰۰ b	۴۵/۰۰ b	۱۵/۴۸d	۵۲/۰۵b	۵۷/۷۸bc	۳۰/۲۴d	-	-

شاخص های حساسیت و مقاومت به تنش: بر اساس شاخص های MP و Tol اگر رقمی دارای MP بالا و Tol کم باشد، آن رقم یا ژنوتیپ از لحاظ داشتن عملکرد بالا و نیز ثبات عملکرد، مناسب می باشد. بر این اساس رقم های KFS<sub>2</sub> و KFS<sub>3</sub> در هر دو سال آزمایش دارای MP بالایی بودند بنابراین می توان گفت که این دو رقم از لحاظ عملکرد دارای تولید بالاتری نسبت به بقیه هستند. از بین این دو، رقم KFS<sub>3</sub> دارای شاخص Tol کمتری است بنابراین می توان گفت که تغییرات عملکرد آن در شرایط تنش و غیرتنش کمتر از رقم KFS<sub>2</sub> بوده است و دارای ثبات عملکرد بیشتری می باشد. بر اساس این دو شاخص رقم KFS<sub>4</sub> نیز دارای MP نسبتاً بالایی بود ولی به دلیل داشتن تولید کم در

شرایط شور، شاخص  $T_{OL}$  بالایی را داشت. رقم  $KFS_1$  در سال اول آزمایش دارای مقادیر  $T_{OL}$  کمتری بود و  $MP$  آن نیز نسبتاً بالا بود ولی در سال دوم آزمایش مقدار  $T_{OL}$  آن زیاد گردید یعنی در سال دوم با شدیدتر شدن شدت تنفس، میزان کاهش عملکرد بیشتری در شرایط شور نسبت به شرایط غیر شور داشت. ارقام  $MFS_{56}$  و  $LFS_2$  نیز در سال اول آزمایش دارای  $MP$  نسبتاً بالایی بودند ولی در سال دوم آزمایش میانگین تولید آنها در شرایط شور و غیرشور ( $MP$ ) کاهش یافت. این کاهش عملکرد آنها بیشتر برای شرایط غیرتنش اتفاق افتاد. در بین ارقام مورد بررسی براساس این دو شاخص رقم  $MFS_1$  دارای  $MP$  پائین‌تری نسبت به بقیه بود، هر چند که اختلاف عملکرد آن نیز در شرایط شور و غیرشور زیاد نبود ولی به دلیل داشتن تولید کم رقم مناسبی نیست (جدول ۶ و ۷). براساس شاخص‌های تحمل به تنفس (STI) و حساسیت به تنفس (SSI) نیز ارقامی مناسب هستند که دارای STI بالاتر و SSI کمتر باشند. بر همین اساس در سال اول آزمایش رقم‌های  $KFS_3$  و  $KFS_2$  دارای STI بالاترین مقدار STI بودند چرا که در هر دو شرایط تولید بالایی داشتند، ارقام  $KFS_1$  و  $KFS_4$  نیز دارای STI بالایی در سال اول بودند ولی این ارقام در سال دوم آزمایش نتوانستند در شرایط شور عملکرد بالایی را تولید کنند و در نتیجه مقدار STI کمتری برای آنها در سال دوم بدست آمد ولی ارقام  $KFS_2$  و  $KFS_3$  در سال دوم نیز نسبت به بقیه ارقام شاخص STI بالایی داشتند. براساس شاخص SSI در سال اول آزمایش کمترین مقدار آن مربوط به ارقام  $KFS_1$  و  $KFS_3$  بود ولی در سال دوم به دلیل تولید کم رقم  $KFS_1$  در شرایط تنفس، شاخص SSI آن زیاد گردید ولی رقم  $KFS_3$  همچنان کمترین مقدار SSI را داشت (جدول ۶ و ۷). براساس این دو شاخص حساسیت‌رين ارقام در بین ارقام مورد آزمایش رقم‌های  $MFS_1$ ،  $MFS_2$  و  $LFS_{56}$  می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که ارقام  $KFS_3$  و  $KFS_2$  مناسب‌رين ارقام از لحاظ پایداری عملکرد می‌باشند.

جدول ۶- شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش شوری ارقام مورد بررسی در سال اول آزمایش

STI	SSI	Tol= $Y_p - Y_s$	GMP	MP	$Y_s$	$Y_p$	رقم
۰/۸۰	۰/۶۵	۱۲/۹	۵۸/۸	۵۹/۳	۵۲/۹	۶۵/۸	KFS <sub>1</sub>
۰/۹۹	۰/۸۹	۲۱/۷	۶۵/۸	۶۶/۸	۵۵/۹	۷۷/۷	KFS <sub>2</sub>
۱/۰۱	۰/۶۵	۱۵/۷	۶۶/۱	۶۶/۸	۵۹/۰	۷۴/۷	KFS <sub>3</sub>
۰/۸۳	۱/۰۰	۲۳/۲	۶۰/۰	۶۱/۲	۴۹/۷	۷۲/۸	KFS <sub>4</sub>
۰/۶۵	۰/۹۱	۱۸/۰	۵۳/۲	۵۴/۰	۴۵/۰	۶۳/۰	MFS <sub>1</sub>
۰/۲۰	۱/۳۴	۱۵/۹	۲۹/۴	۳۰/۶	۲۲/۷	۳۸/۶	MFS <sub>2</sub>
۰/۵۳	۱/۶۸	۳۷/۰	۴۸/۳	۵۱/۸	۲۳/۳	۷۰/۳	LFS <sub>56</sub>

جدول ۷- شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش شوری ارقام مورد بررسی در سال دوم آزمایش

STI	SSI	Tol= $Y_p - Y_s$	GMP	MP	$Y_s$	$Y_p$	رقم
۰/۲۸	۱/۲	۴۱/۴	۳۲/۹	۳۹/۱	۱۸/۳	۵۹/۸	KFS <sub>1</sub>
۰/۸۷	۰/۸	۳۳/۹	۵۷/۴	۵۹/۹	۴۲/۹	۷۶/۸	KFS <sub>2</sub>
۰/۹۸	۰/۵	۱۹/۵	۶۱/۲	۶۲/۰	۵۲/۲	۷۱/۸	KFS <sub>3</sub>
۰/۵۲	۱/۰	۳۷/۹	۴۴/۳	۴۸/۳	۲۹/۳	۷۷/۳	KFS <sub>4</sub>
۰/۲۱	۱/۲	۳۷/۱	۲۸/۲	۳۴/۰	۱۵/۰	۵۲/۰	MFS <sub>1</sub>
۰/۲۰	۱/۳	۳۶/۹	۲۷/۳	۳۳/۳	۱۴/۸	۵۱/۷	MFS <sub>2</sub>
۰/۲۹	۱/۱	۳۱/۷	۳۳/۰	۳۶/۷	۲۰/۹	۵۲/۶	LFS <sub>56</sub>

#### منابع

- Anagholi, A. 2008. Salinity tolerance indexes in three cotton cultivars (*Gossypium hirsutum* L.). J. Agric. Sci. Natur. Resour. 15(3): 90-97.
- Banaei, M.H. Moameni, A., Bybordi, M. and Malakouti, M.J. 2005. The soils of Iran. New achievement in perception, management and use. Soil and Water Res Ins. Iran. Sana Pub.
- Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: Adatation of food crop temperature and water stress. E. G. Kus (ed). Pp: 257-270. Asian Vegetable Research and Department Center, Shanhua, Taiwan.
- Fischer, R.A., and Maurer, R. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I.grain yield responses. Aust. J. Agric. Res. 29: 897- 917.
- Francois, L.E., Donovan, T.J. and Maas, E.V. 1984. Salinity effects on seed yield, growth and germination of grain sorghum. Agron. J. 76: 741-744.

- Maas, E.V., and Hoffman, G.J. 1977. Crop salt tolerance—current assessment. *Journal of Irrigation and Drainage. Div. ASCE.* 103:115– 134.
- Maas, E.V., Hoffman, G.J., Chaba, G.D., Poss, J.A., and Shannon, M.C. 1983. Salt sensitivity of corn at various growth stages. *Irrig. Sci.* 4: 45 – 57.
- Maas, E.V., Poss, J.A., and Hoffmann, G.J. 1986. Salinity sensitivity of sorghum at three growth stages. *Irri. Sci.* 7: 1–11.
- Naderi, A., Majidi Hervan, E., Hashemi Dezfuli, A., Rezaei, A. and Nor-Mahamadi, G. 2000. Efficiency analysis of indices for tolerance to environmental stresses in field crops and introduction of a new index. *Seed. Plant.* 15: 390-402.
- Rahimi, A. and Chaichi, M.R. 2005. Evaluation of NaCl priming and salinity levels on germination trait in three cultivars of sorghum (*Sorghum hарensis*). First national forage crops congress of Iran. Abouryhan Campus- University of Tehran. pp.160.
- Rosielle, A.A., and Hamblin, J. 1981. Theoretical aspect of selection for yield in stress and non-stress environment. *Crop Sci.* 21: 943 – 946.
- Sunseri, F., Palazzo, D., Montemurro, N. and Montemurro, F. 2002. Salinity tolerance in sweet sorghum (*Sorghum bicolor* L. Moench): Field performance under salt stress. *Ital. J. Agron.* 2: 111 – 116.
- Tajbakhsh, M. and Sadeghi, A. 1999. Effects of saline stress resulted from sodium chloride on cell membranes and embryo of different barley cultivars. *Seed. Plant.* 15: 251-261.
- Taylor, R.M., Young, E.F. and Rivera, R.H. 1975. Salt tolerance in cultivars of grain sorghum. *Crop Sci.* 15: 735-740.



EJCP., Vol. 3 (1): 89-102  
www.ejcp.info



## Evaluation of salinity tolerance of forage sorghum varieties with stress tolerance and susceptibility indices

**A. Anagholfi<sup>1</sup>, S.A. Tabatabaei<sup>2</sup> and A. Foman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Scientific member of National Salinity Research Center, <sup>2</sup>Scientific member of Agricultural Research and Natural Resources of Yazd Province, <sup>3</sup>Scientific member of Mays and Forage Sorghum Department of Seed and Plant Improvement Institute

### Abstract

The objective of this study was evaluation of salt tolerance of elite forage sorghum lines in laboratory and field conditions. Salinity treatments were 5, 10, 15, 20, 25, 30 decimeters per meter in laboratory and distilled water as control. Lines were KFS<sub>1</sub>, KFS<sub>2</sub>, KFS<sub>3</sub>, KFS<sub>4</sub>, MFS<sub>1</sub>, MFS<sub>2</sub> and LFS<sub>56</sub>. The lines also cultivated in saline and non saline field conditions during 2004-2005. Electrical conductivity of irrigation water was 2 and 11 decimeters per meter in non saline and saline conditions. Results showed that T<sub>50</sub> (days until 50% germination) increased as salinity increased. The salinity threshold value at germination stage regardless to lines was 8.37 dS.m<sup>-1</sup> with slope of 1.6%. Upon field experiment, the KFS<sub>2</sub> line produced the maximum of 77.25 ton.ha<sup>-1</sup> fodder yield in non saline condition, followed by KFS<sub>3</sub> and KFS<sub>4</sub> lines. The KFS<sub>3</sub> line also produced the maximum fodder yield of 55.63 ton.ha<sup>-1</sup> in saline condition. Total fodder yield of KFS<sub>2</sub> line was 49.44 ton.ha<sup>-1</sup> in this condition. At all, KFS<sub>3</sub> and KFS<sub>4</sub> are the sustainable lines on basis of susceptible and tolerant indices.

**Keywords:** Yield Stability; Salinity Stress; Sorghum.

---

\*- Corresponding Author; Email: anagholfi@yahoo.com