



ارزیابی عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی بذر در ارقام پرمحصول کلزا تحت تأثیر مقادیر مختلف گوگرد

معرفت مصطفوی راد^۱، * زین العابدین طهماسبی سروستانی^۲،

سیدعلی محمد مدرس ثانوی^۲ و امیر قلاوند^۲

^۱ دانشجوی دکتری رشته زراعت دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
و منابع طبیعی اراک، ^۲ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ابتدا به منظور تعیین ارقام پرمحصول کلزا، دو آزمایش مزرعه‌ای در سال‌های زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک اجراء شد و ۱۵ رقم زمستانه کلزا در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. ارقام لیکورد، مودنا و اوکاپی به ترتیب، بیش‌ترین عملکرد دانه در هکتار را داشتند. در مرحله دوم، به منظور ارزیابی عملکرد دانه، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی بذر در ارقام پرمحصول کلزا تحت تأثیر مقادیر مختلف گوگرد، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در همان منطقه به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل ارقام کلزا دارای سه سطح V_1 (اوکاپی)، V_2 (مودنا) و V_3 (لیکورد) و مقادیر گوگرد دارای سه سطح S_1 (صفر)، S_2 (۴۰) و S_3 (۸۰) کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار) بودند. اثر متقابل رقم \times میزان گوگرد بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. اثر متقابل ۴۰ کیلوگرم گوگرد \times رقم مودنا بیش‌ترین میزان اسید اولئیک و میزان مس در بذر را داشت. اثر متقابل ۸۰ کیلوگرم گوگرد \times رقم لیکورد بالاترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان آهن در بذر را نشان داد. در این پژوهش، بین عملکرد کمی و کیفی رابطه معکوس وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: کلزا، گوگرد، اسیدهای چرب، عناصر ریزمغذی

* مسئول مکاتبه: tahmaseb@modares.ac.ir

مقدمه

کلزا (*Brassica napus* L.) از دانه‌های روغنی عمده جهان در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. سطح زیر کشت کلزا در جهان از ۸/۲ میلیون هکتار در سال ۱۹۷۰ به بیش از ۳۰/۲ میلیون هکتار تا سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است (فائو، ۲۰۰۷). مهم‌ترین هدف تولیدکنندگان و به‌نژادگران کلزا، افزایش عملکرد دانه در واحد سطح می‌باشد که این صفت به‌شدت تحت تأثیر شرایط محیطی و اثر متقابل محیط و رقم قرار می‌گیرد (مرجانویک و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین روغن با ارزش‌ترین جزء دانه کلزا است. میزان و ترکیب روغن کلزا به‌طور عمده به‌صورت ژنتیکی تعیین می‌شود (فیلسند و همکاران، ۱۹۹۱) ولی به مقدار قابل‌توجهی نیز تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرد. با بررسی تأثیر شرایط محیطی بر درصد روغن کلزا در یک ناحیه مدیترانه‌ای مشاهده شده است که اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل آن‌ها بر درصد روغن کلزا معنی‌دار بود (گونازکرا و همکاران، ۲۰۰۶). بررسی و تعیین سازگاری ارقام مختلف کلزا در مناطق مختلف کشور جهت افزایش کمی و کیفی عملکرد دانه، لازم است. راه‌کارهای مختلفی برای افزایش تولید دانه کلزا وجود دارد. یکی از راه‌کارهای مؤثر در این راستا، یافتن تیپ‌های ایده‌آل و متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه است (جیانگ و همکاران، ۱۹۹۴). به این ترتیب گزینش ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه جهت دستیابی به عملکرد مطلوب دانه و روغن کلزا ضروری است.

گوگرد نقش مهمی در ترکیب شیمیایی دانه ایفا می‌کند و درصد روغن (چاودری و همکاران، ۱۹۹۲) و گلوکوزینولات دانه را افزایش می‌دهد (عبدل و فیاضول، ۲۰۰۶) و کاربرد مقدار مناسبی از گوگرد در مناطقی که با فقر گوگرد مواجه هستند می‌تواند عملکرد کلزا را ۴ برابر افزایش دهد (مک‌گارت و ژائو، ۱۹۹۶). گوگرد یکی از اجزای ساختمانی اسیدهای آمینه سیستین و متیونین می‌باشد و در سنتز پروتئین‌ها و آنزیم‌ها نقش اساسی دارد. بنابراین فراهمی ناکافی گوگرد می‌تواند عملکرد و کیفیت محصول کلزا را تحت تأثیر قرار دهد (شرر، ۲۰۰۱). نشان داده شده است که با افزایش کاربرد گوگرد، میزان پروتئین دانه به مقدار زیادی افزایش یافت (ناتال و همکاران، ۱۹۸۷). در مطالعات مشابهی، افزایش اندک و بعضاً مقداری کاهش در میزان پروتئین دانه نیز گزارش شده است (مالهی و گیل، ۲۰۰۲؛ گرانت و همکاران، ۲۰۰۳). ترکیب اسیدهای چرب در ارقام مختلف کلزا بسته

به شرایط اقلیمی منطقه، متفاوت گزارش شده است (ولدنگ و همکاران، ۱۹۹۷). مهم‌ترین اسیدهای چرب بذور کلزا شامل لینولئیک، لینولنیک، اولئیک، استئاریک و پالمیتیک اسید می‌باشد (ماتسون و گراندی، ۱۹۸۵). همبستگی منفی بین اسیدهای چرب پالمیتیک و اولئیک وجود دارد (مولر و شیرهولت، ۲۰۰۲) و گزینش برای افزایش اسید اولئیک سبب کاهش اسید پالمیتیک می‌شود. همچنین رابطه معکوس بین میزان اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک در آفتابگردان (فلاجلا و همکاران، ۲۰۰۲) و کلزا (عبدل و فیاضول، ۲۰۰۶) گزارش شده است. افزایش گوگرد در خاک میزان گلوکوزینولات دانه را افزایش می‌دهد چون گلوکوزینولات و پروتئین مسیر بیوستتزی مشترکی دارند (بلوخینا و همکاران، ۲۰۰۳). اغلب خاک‌های زراعی ایران به دلایل متعددی از قبیل قلیایی بودن، کمبود مواد آلی و حلالیت کم عناصر ریزمغذی، دچار کمبود آهن، روی و منگنز می‌باشند. از طرفی دانه‌های روغنی نیاز بالایی به عناصر ریزمغذی به‌ویژه آهن، منگنز، بور و روی دارند (ملکوتی و تهرانی، ۲۰۰۱). نیاز کلزا به عنصر روی دو برابر گندم گزارش شده است (ناتال و همکاران، ۱۹۹۳). به این ترتیب کاربرد گوگرد می‌تواند از طریق بهبود اسیدیته خاک در محیط ریشه گیاه، نقش مهمی در فراهمی و جذب عناصر ریزمغذی ایفا نماید. اگرچه کلزا برای تولید روغن و پروتئین کنجاله استفاده می‌شود، وجود سطوح معنی‌داری از عناصر ریزمغذی در کلزا سبب شده است تعیین و شناسایی فاکتورهای مختلف تغذیه از بافت‌های رویشی کلزا به‌عنوان سبزی خوردن محور بسیاری از پژوهش‌ها قرار گیرد، چون کلزا می‌تواند مقادیر قابل‌توجهی از عناصر پرمصرف و کم‌مصرف مورد نیاز در رژیم غذایی را تأمین نماید (میلر و همکاران، ۲۰۰۹). هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات مقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و محتوی عناصر ریزمغذی بذر در سه رقم کلزای پرمحصول زمستانه در شرایط اقلیمی سرد اراک بود.

مواد و روش‌ها

به‌منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد و برخی صفات مهم زراعی در ارقام زمستانه کلزای (*Brassica napus L.*) سازگار با مناطق سرد و خشک ایران و تعیین ارقام پرمحصول کلزا، ابتدا در طی سال‌های زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و ۱۳۸۶-۱۳۸۷ تعداد ۱۵ رقم کلزای دو صفر تیپ زمستانه در

مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک واقع در عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۲ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۷۷۵ متر از سطح دریا در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. سپس آزمایش دیگری در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در همان منطقه به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار جهت بررسی اثرات مقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب روغن و میزان عناصر غذایی ریزمغذی در بذور سه رقم کلزای پرمحصول زمستانه انجام شد. تیمارها شامل ارقام کلزا دارای سه سطح V_1 (اوکاپی)، V_2 (مودنا) و V_3 (لیکورد) و مقادیر گوگرد دارای سه سطح S_1 (صفر)، S_2 (۴۰ کیلوگرم در هکتار) و S_3 (۸۰ کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار) بودند. هر کرت شامل ۲ پشته ۶۰ سانتی‌متری و ۶ خط کشت به فاصله ۱۵ سانتی‌متر و به طول ۶ متر بود و در تمام آزمایش‌ها مقدار ۱۵۰ و ۷۵ کیلوگرم به ترتیب نیتروژن و فسفر خالص در هکتار از منبع اوره و سوپر فسفات تریپل استفاده شد و تمامی عملیات زراعی کلزا براساس روش‌های متداول انجام شد. پس از رسیدگی با حذف حاشیه، محصول کلزا با دست برداشت و میزان عملکرد دانه در هکتار بر مبنای رطوبت ۱۲ درصد و درصد روغن دانه به روش 1NMR (تایواری و همکاران، ۱۹۷۴)، پروتئین دانه‌های آسیاب شده کلزا با دستگاه اینفراماتیک^۲ (غلامحسینی و همکاران، ۲۰۰۷) و گلوکوزینولات و اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا^۳ (کایوشیک و اگنیورتی، ۱۹۹۹) و عناصر ریزمغذی به روش جذب اتمی^۴ (نصری و همکاران، ۲۰۰۸) اندازه‌گیری شدند. پس از انجام آزمون بارتلت و اطمینان از متجانس بودن واریانس اشتباه آزمایشی، تجزیه واریانس مرکب داده‌های آزمایش‌های اول و تجزیه واریانس ساده داده‌های آزمایش دوم با استفاده از برنامه آماری SAS و مقایسه میانگین‌ها به روش LSD انجام گرفت.

- 1- Nuclear Magnetic Resonance
- 2- Inframatic 8620 Percor
- 3- High Performance Liquid Chromatography
- 4- Atomic Absorption

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال بر عملکرد و دیگر صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. به این ترتیب می‌توان دریافت که بیشترین تفاوت عملکرد از سالی به سال دیگر ناشی از تغییرپذیری سالیانه محیط رشد می‌باشد. ارقام مختلف کلزا از نظر ارتفاع بوته، طول دوره رشد، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد دانه و روغن تفاوت معنی‌داری داشتند (جدول ۱). نصری و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که اثر رقم بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد تفاوت‌های معنی‌دار داشت. مقایسه میانگین داده‌ها (جدول ۲) نشان داد که ارقام لیکورد، مودنا و اوکاپی به ترتیب در مقایسه با دیگر ارقام بیش‌ترین عملکرد دانه را دارا بودند که می‌تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده از منابع رشد در راستای افزایش عملکرد دانه در واحد سطح باشد. در این پژوهش، رقم لیکورد از نظر تعداد خورجین در بوته (۱۹۹/۷۵)، وزن هزاردانه (۴/۴۰۳ گرم)، عملکرد دانه (۳۷۹۴/۶۷ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (۲۸۹۵/۴۴ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب بر ارقام مودنا و اوکاپی برتری داشت. تعداد خورجین در بوته و وزن هزاردانه به ترتیب از فاکتورهای مهم افزایش عملکرد کلزا گزارش شده است (تیلور و اسمیت، ۱۹۹۲). در این مطالعه رقم آناتول و لیکورد از نظر تعداد خورجین در بوته تفاوت معنی‌دار نداشتند ولی با توجه به وجود مکانسیم جبرانی بین اجزای عملکرد (جنسن و همکاران، ۱۹۹۶)، رقم لیکورد تعداد دانه بیش‌تری در هر خورجین داشت از طرفی طول دوره رشد لیکورد بیش‌تر از آناتول بود و به این ترتیب عملکرد دانه بیش‌تری نسبت به آناتول تولید کرد. چنین استنباط می‌شود که تولید تعداد مناسبی از خورجین‌ها که بتوانند چرخه رشد خود را به‌طور طبیعی کامل کنند، می‌تواند نقش بارزی در افزایش عملکرد دانه ایفا کنند و در زراعت کلزا تنها بالا بودن تعداد خورجین در بوته نیز نمی‌تواند دست‌یابی به عملکرد بالا را تضمین کند.

جدول ۱- تجزیه واریانس مرکب صفات اندازه گیری شده در ارقام کلزا

منابع تغییر	درجه آزادی	ارتفاع بوته	تعداد شاخه‌های فرعی	دوره رشد	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	عملکرد روغن
سال	۱	۴۲۳/۱۴ ^{**}	۱/۰۳۰ ^{**}	۴۲۲/۵۰ ^{**}	۵۵۵/۵۵ ^{**}	۳۰۹/۶۸ ^{**}	۱۱۱/۰ ^{**}	۱۵۱/۷۷۸ ^{**}	۶۸/۲۷۸ ^{**}
(سال) تکرار	۴	۶۲/۰	۳۲/۰	۰/۳۳	۸۹۳/۰	۶۱۰/۰	۷۵۰/۰	۳۰/۰۲۲	۷۶۰/۷۸۶
واریته	۴	۶۶۷/۷۸ ^{**}	۵۷۷/۱ ^{NS}	۴۲۴/۱۸ ^{**}	۸۷۶/۵۸ ^{**}	۸۷۵/۷۷ ^{**}	۰۶۰/۰ ^{**}	۵۰/۵۱۱۶۷ ^{**}	۷۳۸/۷۴۲۴۴۶۴ ^{**}
سال × واریته	۱۴	۲۲۹/۷۲ ^{**}	۰/۲۷۹ ^{NS}	۲۰/۲۳۲ ^{**}	۲۰/۰۷۰ ^{**}	۰۸۶/۸ ^{**}	۰۳۳۱/۰ ^{**}	۳۴/۱۱۲۳۷۱ ^{**}	۰۷۵/۵۵۳۳۱۷ ^{**}
خطا	۵۶	۵۷۱/۰	۷۰/۲۰۰	۱۴/۰	۱۶۳/۰	۸۳۱۰/۰	۳۵۰۰/۰	۱۳/۱۵۳	۱۱۸/۷۷۰
C.V.% ضریب تغییرات		۰/۳۵	۲/۸۷	۰/۰۵	۷۵/۰	۳۴/۰	۶۶/۱	۱۶/۰	۶۶/۵

^{**} معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ^{NS} معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد، ^{NS} غیر معنی دار.

جدول ۲- میانگین صفات اندازه گیری شده در ارقام مختلف کلزا در تجزیه مرکب

عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	وزن هزار دانه (گرم)	تعداد دانه در خورچین	تعداد خورچین در بوته	تعداد خوشه‌های فرعی	ارتفاع بوته (سانتی متر)	سال
۳۰۴/۵۶ ^b	۳۰۱۴/۴۹ ^b	۳/۶۷۴ ^b	۲۸/۰۸ ^a	۱۰۸/۴ ^b	۴/۶۵ ^b	۱۱۶/۹۳ ^{ab}	۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۲۱/۲۹ ^a	۳۰۵۵/۴۷ ^{ab}	۳/۸۴۵ ^a	۲۷/۳ ^b	۱۲۴/۵۵ ^a	۴/۸۶۹ ^a	۱۱۱/۵ ^b	۱۳۸۶-۱۳۸۷
۱۸۰۹/۵۰ ^b	۲۲۵۶/۸۳ ^{ab}	۳/۵۳۲ ^f	۲۱/۸۳ ^k	۱۹۹/۷۵ ^a	۶/۴۰ ^b	۹۱/۳۷ ^j	وارسته Anatol
۲۰۳۴/۴۵ ^g	۲۵۹۶/۵۰ ^l	۳/۶۵۸ ^{de}	۲۹/۲۵ ^b	۱۱۶/۲۲ ^c	۵/۰۵ ^{de}	۱۱۰/۳۸ ^h	Billy
۲۲۲۲/۱۱۷/۱۱۷ ^{cd}	۲۹۰۰/۱۷۱/۱۷۱ ^{gh}	۳/۵۲۳ ^f	۳۸/۱۶۷ ^{ab}	۸۴/۶۳ ^k	۵/۰۰ ^e	۱۲۰/۹۷ ^d	Talayeh
۲۴۰۰/۴۷/۰/۰/۰ ^{gh}	۳۰۰۷/۵۰ ^f	۳/۸۳۰ ^c	۲۱/۶۷۱ ^l	۱۱۶/۲۳ ^c	۳/۸۶۶ ^j	۱۳۴/۰۸ ^a	GK Helena
۲۴۹۶/۳۰/۳۰/۳۰/۳۰ ^{bc}	۳۱۸۰/۵۰ ^e	۳/۶۵۱ ^{de}	۲۸/۳۳ ^d	۹۹/۰۱۷ ^h	۲/۳۳۳ ^k	۱۱۷/۶۷ ^c	Gkh 1103
۲۵۰۹/۰۶/۰۶/۰۶/۰۶ ^{bc}	۳۱۷۶/۶۷ ^c	۳/۶۲۳ ^c	۲۶/۰۰ ⁱ	۹۱/۰۸۳ ⁱ	۵/۲۳۳ ^c	۱۱۵/۹۸ ^f	GKH 305
۲۸۹۵/۵۴/۴۴ ^a	۳۷۵۴/۶۷ ^{ab}	۴/۴۰۳ ^{ab}	۲۸/۳۳ ^d	۱۹۹/۷۵ ^a	۶/۶۰ ^a	۱۳۲/۳۳ ^b	Licord
۲۵۷۹/۰۰ ^b	۳۲۴۶/۳۳ ^{cd}	۳/۴۳۸ ^g	۲۷/۹۲ ^f	۸۹/۱۶۶ ^j	۴/۳۶۷ ^g	۱۰۶/۳۷ ^j	Lilian
۲۲۱۳/۸۷/۸۷/۸۷/۸۷ ^{cd}	۲۷۵۹/۳۳ ^k	۳/۵۳۲ ^f	۲۸/۹۳ ^c	۱۰۷/۷۷ ^c	۳/۶۱۷ ^j	۱۱۳/۹۵ ^g	Lioness
۲۸۶۰/۳۷ ^{ab}	۳۶۵۵/۰۰ ^b	۳/۴۵۵ ^g	۲۶/۵۷ ^h	۱۰۴/۷۰ ^f	۴/۱۱۷ ^{gh}	۱۰۳/۰۲ ^k	Modena
۲۲۳۳/۳۰/۳۰/۳۰/۳۰ ^{de}	۲۸۵۶/۱۷ ⁱ	۳/۵۱۵ ^g	۲۸/۲۶ ^e	۱۳۲/۰۸۳ ^b	۴/۷۸۳ ^f	۱۱۷/۶ ^c	Oase
۲۱۱۳/۰۸ ^g	۳۲۶۶/۶۷ ^c	۳/۵۱۸ ^g	۲۷/۲۶ ^e	۱۰۲/۹۵ ^g	۶/۶۶۷ ^{ab}	۱۰۵/۳۳ ^l	Okapi
۲۲۲۱/۷/۷/۷/۷ ^{gh}	۲۸۱۹/۷/۷/۷/۷ ^{lm}	۴/۱۱۳ ^b	۲۶/۶۱ ^h	۱۰۲/۴۲ ^g	۵/۱۶۷ ^{kl}	۱۰۵/۴۵ ^l	Opera
۲۳۵۴/۳۶۵ ^l	۲۹۷۳/۳۳ ^{gh}	۳/۸۳۸ ^d	۲۸/۰۶ ^e	۱۰۲/۴۲ ^g	۴/۱۰۰ ^h	۱۲۲/۸ ^c	SLM046
۲۴۴۰/۶۰ ^{abcd}	۳۰۱۹/۱۷ ^f	۴/۱۱۷ ^b	۲۳/۶۷ ^l	۱۱۰/۶۷ ^d	۳/۸۵ ⁱ	۱۱۶/۴۴ ^f	Zarfam

میانگین‌های با حروف مشابه در هر ستون اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد آزمون LSD ندارند.

در این پژوهش رقم طلا به بیشترین تعداد دانه در خورجین را دارا بود اما تعداد خورجین در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد کمتری نسبت به رقم لیکورد داشت که بیانگر نقش کم‌تر تعداد دانه در خورجین در افزایش عملکرد دانه در مقایسه با دیگر اجزای عملکرد می‌باشد. نتایج این پژوهش با یافته‌های تحقیقاتی تیلور و اسمیت (۱۹۹۲) مطابقت دارد. در آزمایش سوم، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام کلزا بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده به استثنای اسید چرب لینولنیک تأثیر بسیار معنی‌دار داشت و همچنین اثر مقادیر مختلف گوگرد و برهم‌کنش رقم \times گوگرد بر عملکرد دانه، ترکیب اسیدهای چرب و دیگر صفات مورد مطالعه بسیار معنی‌دار بود (جدول ۳). که با نتایج محققان دیگر مطابقت داشت (جان و همکاران، ۲۰۰۲؛ گرانت و همکاران، ۲۰۰۳؛ مالهی و گیل، ۲۰۰۶؛ مالهی و همکاران، ۲۰۰۷). مقایسه میانگین‌ها (جدول ۴) نشان داد که رقم لیکورد از نظر عملکرد دانه و روغن، گلوکوزینولات کنجاله، اسیدهای چرب استئاریک و لینولنیک و میزان عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس و منگنز بر ارقام دیگر برتری داشت. در این پژوهش رقم اوکاپی کم‌ترین عملکرد دانه و بیشترین میزان اسیدهای چرب پالمیتیک و اولئیک را دارا بود. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد کمی و کیفی روغن کلزا روند معکوسی دارند. همچنین به نظر می‌رسد که ارقام پربازده کلزا در مقایسه با ارقام کم‌محصول، محتوی گلوکوزینولات بیش‌تری هستند و به این ترتیب گزینش در جهت کاهش گلوکوزینولات ممکن است با کاهش عملکرد توأم باشد. به‌علاوه چنین استنباط می‌شود که فراهمی و جذب عناصر ریزمغذی مورد مطالعه، بسته به نوع رقم می‌تواند نقش بارزی در شکوفایی پتانسیل عملکرد ژنتیکی کلزا در واحد سطح داشته باشد. در این پژوهش بر خلاف نتایج جان و همکاران (۲۰۰۲)، از نظر اسید چرب لینولنیک تفاوت معنی‌داری در بین ارقام کلزا مشاهده نشد ولی ارقام کلزا از نظر اسید لینولنیک و سایر اسیدهای چرب تفاوت معنی‌داری داشتند. در این آزمایش، با کاربرد گوگرد تا ۴۰ کیلوگرم در هکتار، عملکرد دانه و روغن (کیلوگرم در هکتار) در ارقام اوکاپی و مودنا افزایش یافت و سپس روند نزولی پیدا کرد در حالی که عملکرد لیکورد تا میزان ۸۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار روند افزایشی داشت (جدول ۵). این امر می‌تواند بیانگر تفاوت در نیاز فیزیولوژیک ارقام مختلف کلزا به گوگرد و یا قابلیت بیش‌تر رقم لیکورد در جذب منابع رشد در راستای افزایش عملکرد باشد. مالهی و همکاران (۲۰۰۷) گزارش کرده‌اند که عملکرد دانه در تمام گونه‌های کلزا در سطح ۳۰ کیلوگرم

گوگرد خالص در هکتار حداکثر بود و میزان روغن و پروتئین دانه در ارقام و گونه‌های مختلف کلزا در اثر کاربرد گوگرد افزایش یافت و تمامی گونه‌ها و ارقام کلزا جهت دستیابی به عملکرد مطلوب دانه واکنش مشابهی به گوگرد نشان دادند. به موازات افزایش کاربرد گوگرد در خاک، میزان گلوکوزینولات کنجاله نیز افزایش پیدا کرد، چون گلوکوزینولات یک ترکیب گوگردی است (فیسمنس و همکاران، ۲۰۰۰). به علاوه تیمار ۴۰ کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار از نظر اسیدهای چرب استتاریک و اولئیک بر تیمارهای دیگر برتری داشت. با توجه به این‌که بخش اعظمی از روغن کلزا را اسید چرب اولئیک تشکیل می‌دهد و از فاکتورهای مهم کیفیت روغن کلزا به‌شمار می‌رود، با کاربرد مقدار ۴۰ کیلوگرم گوگرد خالص در هکتار می‌توان به افزایش نسبی عملکرد دانه و کیفیت روغن کلزا دست یافت. در این راستا نشان داده شده است که کاربرد مقادیر مناسب گوگرد، کارایی مصرف منابع به‌وسیله گیاه زراعی را در جهت افزایش عملکرد، تغییر می‌دهد (کرامر و همکاران، ۲۰۰۲). در این پژوهش گوگرد تأثیر بیش‌تری بر روی سنتز اسید اولئیک داشت (فلاجلا و همکاران، ۲۰۰۲) و در تیمار ۴۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار میزان اسید اولئیک حداکثر بود، چون فراهمی گوگرد در زمان پر شدن دانه از تبدیل اسید اولئیک به اسید اروسیک و کاهش آن جلوگیری می‌کند (جان و همکاران، ۲۰۰۲). با این‌حال، با افزایش کاربرد گوگرد تا ۸۰ کیلوگرم در هکتار مقدار اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک کاهش ولی لینولینیک افزایش پیدا کرد. در این راستا، ترکیب اسیدهای چرب در ارقام مختلف کلزا بسته به نوع شرایط محیطی، متفاوت گزارش شده است (ولدونگ و همکاران، ۱۹۹۷). همانند یافته‌های تحقیقاتی دیگر محققان، در این آزمایش نیز روند متفاوتی از تأثیر گوگرد بر ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا مشاهده گردید (گوارت و لمی، ۲۰۰۰؛ دانیل و همکاران، ۲۰۰۱). میزان عناصر ریزمغذی مس و روی در بذر تا سطح ۴۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار افزایش ولی در تیمار ۸۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار، محتوی عناصر ریزمغذی مس و روی روند کاهشی و میزان آهن و منگنز بذر روند افزایشی نشان داد. افزایش میزان آهن و منگنز بذر در اثر افزایش کاربرد گوگرد تا ۸۰ کیلوگرم در هکتار می‌تواند ناشی از کاهش اسیدیته و فراهمی و جذب بیش‌تر آن‌ها در خاک توسط گیاه باشد. مقادیر مختلف گوگرد و اثر متقابل رقم \times گوگرد نیز تأثیر معنی‌داری بر تمامی صفات مورد مطالعه داشت که با یافته‌های جان و همکاران (۲۰۰۲) و مالهی و همکاران (۲۰۰۷) هماهنگی دارد

(جدول ۵). اثر متقابل ۴۰ کیلوگرم گوگرد × رقم مودنا بیش‌ترین میزان اسید اولئیک و میزان مس در بذر و اثر متقابل ۸۰ کیلوگرم گوگرد × رقم لیکورد بالاترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان آهن در بذر و اثر متقابل تیمار شاهد گوگرد × رقم اوکاپی بیش‌ترین میزان اسید چرب لینولئیک را نشان داد (جدول ۵). حال آن‌که بیش‌ترین تجمع منگنز و روی در بذر کلزا به اثر متقابل ۴۰ کیلوگرم گوگرد × رقم لیکورد اختصاص داشت. بنابراین بسته به نوع رقم، افزایش جذب و تجمع عناصر ریزمغذی در بذر سبب افزایش کمیت و کیفیت عملکرد کلزا می‌شود (یانگ و همکاران، ۲۰۰۹) و می‌تواند مقادیر قابل‌توجهی از عناصر ریزمغذی مورد نیاز در رژیم غذایی انسان را تأمین نماید (میلر و همکاران، ۲۰۰۹). در حالی‌که برخی محققان، گزارش کرده‌اند که تفاوت معنی‌داری از نظر محتوی عناصر ریزمغذی آهن، روی و مس، در بین ارقام کلزا وجود نداشت (میلر و همکاران، ۲۰۰۹؛ نصری و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین همبستگی منفی بین عملکرد دانه با اسیدهای چرب اولئیک و لینولئیک وجود داشت که بیانگر وجود رابطه معکوس بین عملکرد کمی و کیفی کلزا می‌باشد. در این آزمایش عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی‌دار با اسیدهای چرب استئاریک و لینولئیک داشت (جدول ۶). به‌نظر می‌رسد که فاکتورهای مزبور نقش مهمی در عملکرد دانه کلزا دارند. به‌ویژه بالا بودن عملکرد دانه در رقم لیکورد ممکن است ناشی از بالا بودن درصد اسید لینولئیک باشد، چون این اسید چرب نقش مهمی در فتوسنتز ایفا می‌کند (هاگلی و همکاران، ۱۹۸۹) و برای توسعه دانه گرده ضرورت دارد (مک‌کن و بروس، ۱۹۹۶). اولئیک اسید با اسیدهای چرب لینولئیک، لینولنیک و پالمیتیک همبستگی منفی و معنی‌دار داشت. در این راستا نتایج مشابهی در آفتابگردان (فلاجلا و همکاران، ۲۰۰۲) و کلزا (مولر و شیرهولت، ۲۰۰۲؛ عبدل و فیاضول، ۲۰۰۶) گزارش شده است بنابراین گزینش برای افزایش اسید اولئیک سبب کاهش اسیدهای چرب مزبور می‌شود. به‌طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد گوگرد، فراهمی و جذب عناصر ریزمغذی را افزایش می‌دهد و در افزایش کمیت و کیفیت عملکرد کلزا تأثیرگذار است و رقم لیکورد قابلیت بالایی در جذب عناصر ریزمغذی در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح دارد.

جدول ۳- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در ارقام کلزا تحت تأثیر مقادیر مختلف گوگرد

منابع تغییر	درجه آزادی	عملکرد دانه (کتلوگرم در هکتار)	درصد روغن	درصد پروتئین	عملکرد روغن (کتلوگرم در هکتار)	گلوزینولات (میکرومول در کلوگرم)	پالمیتیک (درصد)	استئاریک (درصد)	اولئیک (درصد)	لینولئیک (درصد)	لینولئیک (درصد)	لینولئیک (درصد)	آهن (میلی گرم در کلوگرم)	منگنز (میلی گرم در کلوگرم)	مس (میلی گرم در کلوگرم)	روی (میلی گرم در کلوگرم)
تکرار	۲	۵۹۱۹۱/۳۵ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۴ ^{ns}	۳۳۳/۱۶۱ ^{ns}	۳۱۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}
واریته	۲	۵۹۹۹۲/۲۴ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۳۳۳/۱۶۱ ^{ns}	۳۱۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}
مقدار گوگرد	۲	۱۹۹۳۳۱۸/۳۳ ^{ns}	۲/۸۹/۱ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۳۳۳/۱۶۱ ^{ns}	۳۱۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}
واریته × مقدار گوگرد	۴	۱۹۰۰۶۸/۰ ^{ns}	۲/۲۰/۸ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۳۳۳/۱۶۱ ^{ns}	۳۱۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}
خطا	۱۶	۷۸۰۶۸/۰ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۳ ^{ns}	۳۳۳/۱۶۱ ^{ns}	۳۱۰/۰۰۳ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۰/۰۰۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۰۰/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}	۳۳۳/۰۰۰ ^{ns}
ضریب تغییرات (CV%)		۱/۲۷	۰/۳۰	۰/۲۰	۷۶/۱	۳۶/۰	۳/۰	۶/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۳/۰	۰/۰	۱/۰	۱/۰	۰/۰

ns معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ns غیر معنی دار.



جدول ۴- میانگین اثر مقادیر مختلف گوگرد بر عملکرد دانه و روغن، ترکیب اسیدهای چرب روغن و تجمع عناصر غذایی ریزمغذی در بذور کلزا

روغن (میلی گرم در کیلوگرم)	مس (میلی گرم در کیلوگرم)	منگنز (میلی گرم در کیلوگرم)	آهن (میلی گرم در کیلوگرم)	لیئولینیک (درصد)	لیئولینیک (درصد)	اولئیک (درصد)	استئاریک (درصد)	پالمیتیک (درصد)	گلوکوزینولات (میکرومول در کیلوگرم)	عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	درصد پروتئین t (درصد)	درصد روغن (درصد)	عملکرد دانه روغن (درصد)	تیمار
۵۸۰۰۰۰ ^a	۵۷۸۷۰	۱۸۰۳۰۳ ^a	۵۰۲/۵۳ ^a	۱۷/۱۹۸ ^b	۳۴۳/۱۱ ^a	۶۶/۲۶ ^b	۲/۱۹ ^b	۴/۲۷۳ ^b	۶۶۳۷	۴۲۷۳ ^b	۳۳/۳۴ ^a	۴۲/۵۳ ^a	۳۳۰۳/۲۲ ^b	S ₃
۵۸۱۰۷۰ ^a	۵۷۸۷۰	۱۶۶۶/۹۱۱ ^a	۶۲۰/۶۹ ^b	۱۶۰/۱۱ ^a	۶۶۳/۸ ^b	۸۸/۶۶ ^a	۷۱/۶۸ ^a	۴/۱۳/۸ ^a	۶۷۰۶۳۱	۴۲۷۸ ^a	۳۷/۴۱ ^a	۴۲/۸۰ ^b	۳۴۶۳/۵۲ ^a	S ₂
۵۸۰۷۰/۵۰	۵۷۸۷۰	۱۶۶۶/۹۱۱ ^a	۶۲۰/۶۹ ^b	۱۶۰/۱۱ ^a	۶۶۳/۸ ^b	۸۸/۶۶ ^a	۷۱/۶۸ ^a	۴/۱۳/۸ ^a	۶۷۰۶۳۱	۴۲۷۸ ^a	۳۷/۴۱ ^a	۴۲/۸۰ ^b	۳۴۶۳/۵۲ ^a	S ₁
۵۸۰۷۰/۵۰	۵۷۸۷۰	۱۶۶۶/۹۱۱ ^a	۶۲۰/۶۹ ^b	۱۶۰/۱۱ ^a	۶۶۳/۸ ^b	۸۸/۶۶ ^a	۷۱/۶۸ ^a	۴/۱۳/۸ ^a	۶۷۰۶۳۱	۴۲۷۸ ^a	۳۷/۴۱ ^a	۴۲/۸۰ ^b	۳۴۶۳/۵۲ ^a	V ₃
۵۸۰۷۰/۵۰	۵۷۸۷۰	۱۶۶۶/۹۱۱ ^a	۶۲۰/۶۹ ^b	۱۶۰/۱۱ ^a	۶۶۳/۸ ^b	۸۸/۶۶ ^a	۷۱/۶۸ ^a	۴/۱۳/۸ ^a	۶۷۰۶۳۱	۴۲۷۸ ^a	۳۷/۴۱ ^a	۴۲/۸۰ ^b	۳۴۶۳/۵۲ ^a	V ₂
۵۸۰۷۰/۵۰	۵۷۸۷۰	۱۶۶۶/۹۱۱ ^a	۶۲۰/۶۹ ^b	۱۶۰/۱۱ ^a	۶۶۳/۸ ^b	۸۸/۶۶ ^a	۷۱/۶۸ ^a	۴/۱۳/۸ ^a	۶۷۰۶۳۱	۴۲۷۸ ^a	۳۷/۴۱ ^a	۴۲/۸۰ ^b	۳۴۶۳/۵۲ ^a	V ₁

میانگین‌ها با حروف مشابه در هر ستون اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد آزمون LSD ندارند.

۱، V₁، V₂، V₃ ارقام کلزا به ترتیب اولی، مودنا و لیکورد و S₁، S₂ و S₃ مقدار گوگرد به ترتیب صفر، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار.



جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل بین مقادیر مختلف گوگرد و ارقام کلزا

روی	مس	منگنز	آهن	لینولیک	لینولیک	اولیک	استتاریک	پالمیتیک	گلوکزینولات	عملکرد	درصد	عملکرد	درصد	پروتئین	درصد	روغن	درصد	روغن	درصد	تیماز	
(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(میلی مول در هکتار)	(میلی مول در هکتار)	(درصد)	(میلی مول در هکتار)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(کیلوگرم در هکتار)	
۵۵/۴۳ ^{af}	۵/۳۸ ^c	۱۸۲/۸۷ ^c	۲۵۶/۹۱۳ ^c	۷/۸۲۹ ⁱ	۱۷/۵۳۶ ^a	۶۶/۵۴۳ ^a	۲/۱۷۴ ^e	۴/۳۵۷ ^h	۴/۳۱۱ ^h	۱۲۸۳/۳۳ ^c	۲۵/۵۹ ^a	۲۹۸۷/۱۱۴ ^f	۴۲/۹۴ ^{bc}	۲۵/۵۹ ^a	۴۲/۹۴ ^{bc}	۴۲/۹۴ ^{bc}	۲۵/۵۹ ^a	۴۲/۹۴ ^{bc}	۲۵/۵۹ ^a	۲۹۸۷/۱۱۴ ^f	S ₁ V ₁
۵۳/۷۹ ^g	۵/۳۶ ^d	۱۷۵/۹۳ ^c	۲۴۹/۸۱۴ ^f	۷/۹۹۳ ^c	۱۷/۴۸۹ ^a	۶۶/۳۸۸ ^f	۲/۱۷۰ ^{ef}	۴/۳۰۳ ^c	۳/۳۹۴ ⁱ	۱۴۰۲/۶۲ ^c	۲۱/۵۳ ^c	۳۳۵۸/۱۱ ^d	۴۳/۰۱ ^b	۲۱/۵۳ ^c	۴۳/۰۱ ^b	۴۳/۰۱ ^b	۲۱/۵۳ ^c	۴۳/۰۱ ^b	۲۱/۵۳ ^c	۳۳۵۸/۱۱ ^d	S ₁ V ₂
۵۷/۹۱ ^b	۵/۵۸ ^b	۱۷۲/۳۶ ^f	۱۵۱/۶۸۷ ^h	۷/۹۷۷ ^f	۱۷/۳۷۵ ^b	۶۶/۵۴۴ ^d	۲/۲۱۷ ^c	۴/۲۴۵ ^c	۴/۶۹۱ ^g	۱۴۰۵/۵۱ ^c	۲۴/۸۶ ^{bc}	۳۲۷۷/۶۷ ^d	۴۲/۸۹ ^{bc}	۲۴/۸۶ ^{bc}	۴۲/۸۹ ^{bc}	۴۲/۸۹ ^{bc}	۲۴/۸۶ ^{bc}	۴۲/۸۹ ^{bc}	۳۲۷۷/۶۷ ^d	S ₁ V ₃	
۵۷/۴۳ ^c	۵/۳۷ ^{cd}	۱۶۳/۱۹۹ ^g	۲۵۶/۱۱۱ ^e	۷/۸۵۳ ^h	۱۶/۹۷۱ ^e	۶۷/۲۵۵ ^b	۲/۱۶۱ ^f	۴/۳۳۳ ^c	۷/۳۳۷ ^g	۱۴۷۱/۳۳ ^b	۲۵/۶۳ ^{ab}	۳۵۲۰/۰۰ ^b	۴۱/۷۳ ^c	۲۵/۶۳ ^{ab}	۴۱/۷۳ ^c	۴۱/۷۳ ^c	۲۵/۶۳ ^{ab}	۴۱/۷۳ ^c	۳۵۲۰/۰۰ ^b	S ₂ V ₁	
۵۵/۲۴ ^f	۶/۵۳ ^{ab}	۱۸۶/۲۰ ^q	۳۳۶/۵۱۴ ^g	۷/۷۷۷ ^h	۱۶/۹۶۶ ^e	۶۷/۳۱۹ ^a	۲/۲۳۷ ^b	۴/۱۵۴ ^c	۷/۶۶۱ ^f	۱۴۷۱/۵۳ ^b	۲۱/۵۴ ^c	۲۴۰۲/۷۸ ^c	۴۳/۵۳ ^{ab}	۲۱/۵۴ ^c	۴۳/۵۳ ^{ab}	۴۳/۵۳ ^{ab}	۲۱/۵۴ ^c	۴۳/۵۳ ^{ab}	۲۴۰۲/۷۸ ^c	S ₂ V ₂	
۶۱/۳۱ ^e	۵/۶۸ ^d	۱۷۷/۷۱ ^h	۳۷۹/۴۲ ^e	۸/۴۵۷ ^g	۱۷/۱۱۷ ^f	۶۷/۳۵۸ ^h	۲/۲۵۵ ^b	۴/۲۶۴ ^c	۷/۶۸۱ ^f	۱۴۷۱/۵۱ ^c	۲۳/۸۴ ^d	۲۵۵۶/۷۸ ^b	۴۲/۹۷ ^{ab}	۲۳/۸۴ ^d	۴۲/۹۷ ^{ab}	۴۲/۹۷ ^{ab}	۲۳/۸۴ ^d	۴۲/۹۷ ^{ab}	۲۵۵۶/۷۸ ^b	S ₂ V ₃	
۵۵/۱۳ ^{cd}	۵/۳۶ ^{cd}	۱۷۲/۵۵ ^f	۳۵۹/۵۵ ^f	۸/۳۳۴ ^e	۱۷/۲۱۳ ^f	۶۶/۳۸۶ ^h	۲/۱۶۷ ^{ef}	۴/۳۱۸ ^b	۸/۶۶۷ ^g	۱۴۴۴/۵۱ ^c	۲۴/۷۸ ^{ab}	۳۱۴۰/۳۳ ^c	۴۲/۷۳ ^c	۲۴/۷۸ ^{ab}	۴۲/۷۳ ^c	۴۲/۷۳ ^c	۲۴/۷۸ ^{ab}	۴۲/۷۳ ^c	۳۱۴۰/۳۳ ^c	S ₃ V ₁	
۵۵/۶۵ ^e	۵/۴۷ ^d	۱۸۱/۱۷۱ ⁱ	۵۸۲/۲۹ ^a	۸/۲۷۷ ^h	۱۷/۲۵۶ ^c	۶۶/۳۷۴ ^g	۲/۲۰۷ ^{cd}	۴/۲۹۵ ^c	۸/۶۹۵ ^g	۱۳۶۰/۷۲ ^d	۲۱/۳۱ ^f	۳۱۶۵/۷۸ ^c	۴۳/۰۱ ^b	۲۱/۳۱ ^f	۴۳/۰۱ ^b	۴۳/۰۱ ^b	۲۱/۳۱ ^f	۴۳/۰۱ ^b	۳۱۶۵/۷۸ ^c	S ₃ V ₂	
۵۷/۱۳ ^{cd}	۶/۵۰ ^a	۱۸۶/۷۶ ^h	۵۶۵/۷۵ ^b	۸/۳۴۳ ^e	۱۷/۱۲۵ ^d	۶۶/۵۱۳ ^h	۲/۱۹۹ ^d	۴/۲۰۴ ^f	۸/۳۴۳ ^g	۱۵۳۳/۶۱ ^a	۲۴/۰۰ ^d	۳۱۰۳/۵۳ ^c	۴۲/۵۶ ^d	۲۴/۰۰ ^d	۴۲/۵۶ ^d	۴۲/۵۶ ^d	۲۴/۰۰ ^d	۴۲/۵۶ ^d	۳۱۰۳/۵۳ ^c	S ₃ V ₃	

میانگین‌های با حروف مشابه در هر ستون اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد آزمون LSD ندارند.

S₁، S₂ و S₃ مقدار گوگرد به ترتیب صفر، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار. V₁ و V₂ و V₃ ارقام کلزا به ترتیب اوکایی، مودنا و لیکورد.

جدول ۶- ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده در ارقام کلزا تحت تأثیر مقادیر مختلف گوگرد

روی	مس	مگنیز	آهن	لیونیک	لیونیک	لیونیک	لیونیک	اولیک	استاریک	پالمیتیک	گلوزیرینولات	گلوزیرینولات	روغن	درصد	پروتئین	درصد	روغن	درصد	عملکرد	
(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(میلی گرم در کیلوگرم)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(میلی مول در هکتار)	(میلی مول در هکتار)	(کیلوگرم در هکتار)	(کیلوگرم در هکتار)	(کیلوگرم در هکتار)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(کیلوگرم در هکتار)	
۱	-۰/۱۷۱ ^{ns}	-۰/۱۵۳ ^{ns}	-۰/۰۴۸ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	-۰/۰۰۰ ^{ns}	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	
																			درصد روغن	
																				درصد پروتئین
																				عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)
																				گلوزیرینولات (میکرومول در هکتار)
																				پالمیتیک (درصد)
																				استاریک (درصد)
																				اولیک (درصد)
																				لیونیک (درصد)
																				آهن (میلی گرم در کیلوگرم)
																				مگنیز (میلی گرم در کیلوگرم)
																				مس (میلی گرم در کیلوگرم)
																				روی (میلی گرم در کیلوگرم)

معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد. ^{ns} معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد. ^{**} غیر معنی دار.

منابع

- Abdul, M., and Fayyazul, H. 2006. Effects of sulphur on fatty acid accumulation in *Brassica* cultivars. *Int. J. Agric. Biol.* 5: 588-592.
- Blokhina, O., Virolainen, E., and Fagerstedt, K.V. 2003. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: A review. *Annu Bot*, 91: 179-194.
- Chaudhary, S.K., Gogulwar, N.M., and Singh, A.K. 1992. Effect of sulphur and nitrogen on seed yield and oil content of mustard (*Brassica juncea* L.). *Indian J. Agron.* 37: 839-840.
- Daniel, J., Miralles, B., Ferro, C., and Slafer, A. 2001. Developmental responses to sowing date in wheat, barley and rapeseed. *Field Crops Res.* 71: 3. 211-223.
- Fieldsend, J.K., Murray, F.E., Bilborrow, P.E., Milford, G.F.J., and Evans, E.J. 1991. Glucosinolate accumulation during seed development in winter sown oilseed rape (*B. napus*), P 686-694. In: McGregor, D.I. (ed.). Proceedings of the Eighth International Rapeseed Congress, Saskatoon, Canada.
- Fismes, J., Vong, P.C., Guckert, A., and Frossard, E. 2000. Influence of sulfure on apparent N-use efficiency, yield and quality of oilseed rape (*Brassica napus* L.) grown on a calcareous soil. *Europ J. Agron.* 12: 127-141.
- Flagella, Z., Rotunnon, T., Tarantino, E., Di-Caterina, R., and Decaro, A. 2002. Changes in seed yield and oil fatty acid composition of high oleic sunflower (*Helianthus annus* L.) hybrids in relation to sowing date and water regime. *Europ J. Agron.* 17: 3. 221-230.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2007. Available at <http://www.faostat.fao.org/site/567/efault.aspx>. Last access on 01.12.2008.
- Gholamhoseini, M., Ghalavand, A., Modarres Sanavy, S.A.M., and Jamshidi, E. 2007. Effects of zeolite compost application in loamy sand field on grain yield and other traits of sunflower. *Environ. Sci.* 5:(1) 23-36(in Persian).
- Govarts, C., and Lemey, J. 2000. Characterization of triglycerides isolated from Jojoba oil. *J. Amer. Oil Chem. Soc.* 77: 1325-1328.
- Grant, C.A., Clayton, G.W., and Johnston, A.M. 2003. Sulphur fertilizer and tillage effects on canola seed quality in the black soil zone of western Canada. *Can. J. Plant Sci.* 83: 745-758.
- Gunasekera, C.P., Martin, L.D., Siddique, K.H.M., and Walton, G.H. 2006. Genotype by environment interactions of Indian mustard (*B. Juncea* L.) and canola (*Brassica napus* L.) in Mediterranean-type environments: II. Oil and protein percents in seed. *Europ J. Agron.* 25: 13-21.
- Hugly, S., Kunt, L., Browse, J., and Somerville, C. 1989. Enhanced thermal tolerance of photosynthesis and altered chloroplast ultrastructure in a mutant of *Arabidopsis* deficient in lipid desaturastion. *Plant Physiol*, 90: 1134-1142.
- Jan, A., Khan, N., Khan, I.A., and Khattak, B. 2002. Chemical composition of canola as affected by nitrogen and sulphure. *Asian J. Plant Sci.* 1: 519-521.

- Jensen, C.R., Mogensen, V.O., Mortensen, G., and Fieldsen, J.K. 1996. Seed glucosinolate, oil and protein contents of field grown rape (*Brassica napus* L.) affected by soil drying and evaporative demand. *Field Crops Res.*, 47: 93-105.
- Jiang, J., Frieb, B., and Gill, B. 1994. Recent advances in alien gene transfer in wheat. *Euphytica*. 73: 199-212.
- Kaushik, N., and Agnihorti, A. 1999. High performance liquid chromatographic method for separation and quantification of intact glucosinolates. *Chromatographia*. 49: 4. 281-284.
- Kramer, A.W., Timothy, A.D., Horwath, W.R., and Kessel, C.V. 2002. Combining fertilizer and organic input synchronize N supply in alternative cropping system in California. *Agric. Ecosys. Environ.* 91: 233-243.
- Malakoti, M.J., and Tehrani, M.M. 2001. Effects of Micronutrients on the Yield and Quality of Agricultural Products 'Micro Nutrients with Macro Effects'. Second Impression, Tarbiat Modares University Press, 299p. (In Persian)
- Malhi, S.S., Gan, Y., and Raney, J.P. 2007. Yield, seed quality and sulphure uptake of *Brassica* oilseed crops in response to sulfur fertilization. *Agron. J.* 99: 570-577.
- Malhi, S.S., and Gill, K.S. 2002. Effectiveness of sulphate-S fertilization at different growth stages for yield, seed quality and S uptake of canola. *Can. J. Plant Sci.* 82: 665-674.
- Malhi, S.S., and Gill, K.S. 2006. Cultivar and fertilizer S rate interaction effects on canola yield, seed quality and S uptake. *Can. J. Plant Sci.* 86: 91-98.
- Marjanovic-Jeromela, A., Marinkovic, R., Mijic, A., Zdunic, Z., Ivanovska, S., and Jankulovska, M. 2008. Correlation and path analysis of quantitative traits in winter rapeseed (*Brassica napus* L.). *Agric. Conspectus Sci*, 73: 1. 13-18.
- Mattson, F.H., and Grundy, S.M. 1985. Comparison of the effect of dietary saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids on plasma lipids and lipoproteins in men. *J. Lipid Res.* 26: 194-202.
- Mc Conn, M., and Browse, J. 1996. The critical requirement for linolenic acid is pollen development, net photosynthesis, in an Arabidopsis mutant. *Plant Cell*. 8: 403-416.
- Mc Grath, S.P., and Zhao, F.J. 1996. Sulphur uptake, yield response and the interaction between N and S in winter oilseed rape (*Brassica napus* L.). *J. Agric. Sci.* 126: 53-62.
- Miller, R.L., Sistani, N.A., and Cebert, E. 2009. Comparative mineral composition among canola cultivars and other cruciferous leafy greens. *J. Food Compos. Anal.* 22: 112-116.
- Moller, C., and Schierholt, A. 2002. Genetic variation of palmitate and oil content in a winter oilseed rape doubled haploid population segregating for oleat content. *Crop Sci.* 42: 379-384.
- Nasri, M., Khalatbari, M., Zahedi, H., Paknejad, F., and Tohidi-Moghadam, H.R. 2008. Evaluation of Micro and Macro Elements in Drought Stress Condition

- in Cultivars of Rapeseed (*Brassica napus* L.). Amer. J. Agric. Biol. Sci. 3: 3. 579-583.
- Nuttall, W.F., Boswell, C.C., Sinc, A.G., Moulin, S.A., Townley-Smith, L.J., and Gallway, G.L. 1993. The effect of time application and placement of sulphur fertilizer source on yield of wheat, canola and barley. Common. Soil Sci. Plant Anal. 24: 2143-2202.
- Nuttall, W.F., Ukrainetz, H., Stewart, J.W.B., and Spurr, D.T. 1987. The effect of nitrogen, sulphur and boron on yield and quality of rapeseed (*Brassica napus* L. and *Brassica campestris* L.). Can. J. Soil Sci. 67: 545-559.
- Scherer, H.W. 2001. Sulphure in crop production. European J. Agron. 14: 81-111.
- Taylor, A.J., and Smith, C.J. 1992. Effect of sowing date and seeding rate on yield and yield Components of irrigated Canola (*Brassica napus* L.) grown on a red-brown earth in south eastern Australia. Aust. J. Agric. Res. 43: 1629-1641.
- Tiwari, P.N., Gambhir, P.N., and Rajan, T.S. 1974. Rapid and non-destructive determination of seed oil by pulsed NMR technique, J. Amer. Oil Chem. Soc. 51: 104-109.
- Voldeng, H.D., Cober, E.R., Hume, D.J., Gillard, C., and Morrison, M.J. 1997. Fifty eight years of genetic improvement of short season soybean cultivars in Canada. Crop Sci. 37: 428-431.
- Yang, M., Shi, L., Xu, F.S., Lu, J.W., and Wang, Y.H. 2009. Effects of B, Mo, Zn, and their interactions on seed yield of rapeseed (*Brassica napus* L.). Pedosphere, 19: 1. 53-59.



Evaluation of yield, fatty acids combination and content of micro nutrients in seeds of high yielding rapeseed varieties as affected by different sulphur rates

M. Mostafavi-Rad¹, * Z. Tahmasebi-Sarvestani², S.A. Mohammad Modarres-Sanavy² and A. Ghalavand²

¹Ph.D. Student of Agronomy Dept., Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University and Scientific Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province, Arak, Iran, ²Scientific member of Agriculture Faculty, Tarbiat Modares University

Abstract

First of all, in order to determine the high yielding rapeseed varieties, two field experiments were performed in 2006-2008 cropping seasons in Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi Province, Arak (34° 5' N; 49° 42' E, and 1775 m above sea level), Iran. In this research, 15 winter rapeseed varieties were compared in a randomized complete block design with three replications. Means comparison showed that Licord, Modena and Okapi had the greatest seed yield, respectively. In second phase, in order to assesment of the effects of different sulphur (S) rates on seed yield, fatty acids composition and seed micro nutrient content in three high yielding winter rapeseed varieties, the other experiment carried out during 2008-2009 cropping seasons at the same site. Experimental design was a factorial arrangement based on randomized complete block with three replications. Three rapeseed varieties ($V_1=Okapi$, $V_2=Modena$ and $V_3=Licord$) and three rates of sulphur ($S_1=0$, $S_2=40$ and $S_3=80$ kg S/ha) comprised the experimental factors. The interactions between sulphur×varieties were significant for seed yield, fatty acids and other measured traits. The interactions between 40 kg/ha Sulphur×Modena had the highest ratio of oleic acid, seed Cu content. The interaction effect between 80 kg/ha sulphur×Licord showed the highest seed and oil yield and seed Fe content. In this research, there was inverse relationship between quantitative and qualitative yield.

Keywords: Rapeseed; Sulphur; Fatty acids; Micro nutrient

* Corresponding Author; E-mail: tahmaseb@modares.ac.ir