

آب‌های زیرزمینی دشت‌های شهرکرد، بروجن، سفید دشت، کیار، فلارد و خانمیرزا لازم است میزان برداشت آب به ترتیب ۴۸، ۳۲، ۶۶، ۳۰، ۱۳ و ۱۲ درصد کاهش یابد. در مورد دشت‌های فارسان، شلمزار و گندمان نتایج نشان داده که می‌توان به ترتیب ۴۵، ۳۸ و ۳۰ درصد در برداشت از منابع آب این دشت‌ها افزایش ایجاد کرد. لذا نتایج حاصل می‌تواند به منظور برنامه‌ریزی صحیح سرزمین بخصوص منابع آب و زمین منطبق با ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی در هر روستا استفاده شود.

**کلید واژه‌ها:** کاربری اراضی، تصاویر ماهواره‌ای، منابع آب، استان چهارمحال و بختیاری.

#### مقدمه

در نواحی خشک و نیمه خشکی مانند ایران، مهمترین عامل رشد کشاورزی آب می‌باشد. در این مناطق با توجه به کمبود نزولات جوی و جریان‌ات سطحی عمده‌ترین فشار به روی آب‌های زیرزمینی وارد می‌شود [۵].

امروزه حدود ۶۰ درصد خدمات اکوسیستم‌ها که در برنامه‌ی ارزیابی اکوسیستم هزاره‌ی سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت در حال تنزل کیفیت یا استفاده به ترتیبی ناپایدار است تنزل کیفیت این خدمات در نیمه‌ی اول قرن حاضر به وضعی وخیم رسیده است [۴]. خورمالی و همکاران (۲۰۰۳) تغییرات و ارزیابی خصوصیات خاکشناسی و موقعیت توپوگرافی و شیب را در کاربری اراضی مهمترین چالش‌های بخش حوزه منابع طبیعی می‌دانند [۶].

یوسفی فرد و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی در منطقه چشمه‌علی استان چهارمحال بختیاری چهار کاربری شامل مرتع با پوشش گیاهی تقریباً خوب، مرتع با پوشش گیاهی ضعیف، دیمزار و دیمزار رها شده را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مقدار مواد آلی و فسفر قابل دسترس طی تغییر کاربری اراضی مرتعی کاهش یافته است. [۱۶].

Angus و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیقی در انگلیس، مهم‌ترین اثرات تغییرات اراضی در ۵۰ سال آینده را در کشور بیان نمودند که مشخص گردید تفاوت آشکاری بین خط مشی‌های بخش کشاورزی و خط مشی‌های زیست محیطی و منابع طبیعی به وجود خواهد آمد [۲].

پرسی و همکاران (۲۰۰۱) که بر روی پیامدهای زیست محیطی

## بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آبهای زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: چهارمحال بختیاری)

قاسم مرتضایی فریزندی<sup>۱</sup> و اصغر کهنل<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۶

#### چکیده:

آب، مهمترین جزء مجموع منابع طبیعی مورد نیاز برای بقای زندگی انسان، پیشرفت و بهبود آن به شمار می‌رود. صرف نظر از ارزش حیاتی آب، به عنوان یکی از عوامل ضروری در صنعت، تجارت، کشاورزی، تفریحات سالم و زیباسازی محیط نیز ضروری است. هر چند که انسان بدون آب توانایی ادامه زندگی را ندارد اما آب می‌تواند عامل تهدیدکننده سلامتی، آسایش و رفاه انسان به شمار می‌آید. بنابراین مطالعه دقیق رفتار آب در ابعاد گوناگون ضروری به نظر می‌رسد و مدیریت صحیح منابع آب باید یکی از فعالیت‌های مهم جامعه به شمار آید. در بسیاری از مناطق ایران از جمله عرصه تحقیق، تغییرات عمده کاربری‌ها در ارتباط با منابع آب زیرزمینی، سبب عدم تعادل سرزمین در طول زمان شده و باعث آشفتنگی و تخریب اکولوژیک شده است که با مدیریت صحیح می‌توان به حفظ پایداری حوزه آبخیز کمک نمود. تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر کاربری اراضی در تغییر منابع آب می‌باشد. لذا با استفاده از تصویر TM در اردیبهشت ماه سال ۲۰۱۲ اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی دشت‌های فارسان، گندمان، شلمزار، کیار، خانمیرزا و شهرکرد شد. از این رو مراحل پیش‌پردازش تصویر انجام گرفت و تصویر با نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و نقاط برداشت شده از مطالعات میدانی تدقیق شد. و با استفاده از داده‌های منابع آب مربوط به سال آبی ۲۰۱۲، مطالعات میدانی اولیه و تکمیلی و سایر اطلاعات اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه شد. نتایج نشان داد که به جز دشت‌های فارسان، شلمزار و گندمان سایر دشت‌های استان بایبلان منفی مواجه هستند و همچنین برای تعادل بخشی به

۱ نویسنده مسئول، دانشیار پژوهشگر، مطالعه‌کننده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی تهران،

پست الکترونیک: mortezaii@acecr.ac.ir

۲ دانشیار پژوهشگر، مطالعه‌کننده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی

( $>10\%$ )، دیمزار و دیمزار رها شده، نمونه‌های خاک از عمق ۱۰ تا ۱ سانتی‌متر در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار برداشته شد. نشان داد که مقدار مواد آلی و فسفر قابل دسترسی طی تغییر کاربری اراضی مرتعی کاهش یافته و بیشترین کاهش در دیمزار مشاهده و به ترتیب ۵۰٪ و ۶۸/۸٪ بود. به طور کلی می‌توان گفت تغییر کاربری اراضی از عرصه‌های منابع طبیعی نظیر مرتع به کاربری‌های دیگر که کشت و کار نقش اساسی را در آنها ایفا می‌کند باعث کاهش کیفیت خاک گشته و خاک سطحی را در برابر فرسایش حساس می‌نماید [۱۶].

این تحقیق می‌کوشد که با استفاده از اطلاعات مربوط به ماهواره لندست و دیگر اطلاعات تهیه شده، میزان تغییرات کاربری‌ها در دوره تحقیق (از سال ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۹۱) و پیش‌بینی تغییرات در آینده در حوزه آبخیز در زمینه آب، کشاورزی و منابع طبیعی را به منظور رسیدن به پایداری محیط زیست تعیین نماید.

### مواد و روش‌ها:

حوزه آبخیز منطقه مطالعاتی در پایین‌دست منطقه حفاظت شده سبز کوه با وسعت ۵۶۳۰۸ هکتار در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از مرکز استان چهارمحال و بختیاری و ۳۰ کیلومتری شهر لردگان مابین عرض شمالی  $29^{\circ}31'$  تا  $29^{\circ}31'$  و طول شرقی  $50^{\circ}50'$  تا  $50^{\circ}51'$  قرار گرفته است. این منطقه در شهرستان‌های بروجن، لردگان و کیار قرار دارد. بلندترین ارتفاع منطقه مربوط به کوه هزار دره با ارتفاع ۳۸۷۰ متر و کمترین ارتفاع ۱۱۲۰ متر از سطح دریا می‌باشد [۱۱]. این منطقه قسمتی از حوزه آبخیز کارون شمالی محسوب می‌گردد و جزء مناطق حاصلخیز کشور محسوب می‌شود (شکل ۱).

همچنین اقلیم منطقه طبق مدل آمبرژه، نیمه مرطوب معتدل با حداقل دمای  $3/1$  درجه زیر صفر و حداکثر  $37/7$  درجه بالای صفر و متوسط بارندگی سالیانه حدود ۵۶۵ میلیمتر برآورد شده است (جدول ۲). این حوزه یکی از مناطق ممنوعه کشور از لحاظ حفر چاه به منظور بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود [۱۱]. به دلیل سوء مدیریت و برداشت بی‌رویه از منابع سفره آب زیرزمینی، در چند سال اخیر شاهد خشکسالی‌های متوالی بوده به


تغییرات پوشش و کاربری اراضی در نیو سالت ولز استرلیا تحقیق کردند به این نتیجه رسیدند که در طول دوره تحقیق سطح اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی افزایش و مناطق طبیعی همچون علفزارها و محدوده‌های جنگلی کاهش داشته است. این تغییرات را در اثر رشد جمعیت و فعالیت‌های انسانی و تغییر برخی از سیاست‌های دولت دانسته که البته برخی از پیامدهای زیست محیطی همچون کویرزایی، شور و قلیایی شدن اراضی، تخریب علفزارها و دفعات بیشتر سیلاب‌ها را به همراه داشته است [۹].

نتایج چالش‌های مدیریت یکپارچه منابع آب نشان داد که کشورهای در حال توسعه با چالش‌های بیشتر در زمینه مدیریت منابع آب روبه‌رو هستند اول به دلیل اینکه بسیاری از ذخایر زیر بنایی آب خیلی کمتر از کشورهای توسعه یافته در اقلیم‌های مشابه می‌باشد. و از این رو در اولویت نیازها توجه به عملکردهای بهتر از لحاظ تکنیکی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی نیز می‌شود و دوم نیز سرمایه‌گذاری‌های توام و سنگین برای حل مسائل غیر بنیادی است [۷].

نتایج طولانی‌مدت در ایستگاه‌های مورد بررسی نشان داد که مدیریت منابع طبیعی در حوزه آبخیز مناطق نیمه خشک در حفظ منابع آب سطحی زیرزمینی تأثیر زیادی دارد و فعالیت‌های اثرگذار بر منابع آب از جمله کشاورزی، پیامدهای زیادی را مشمول منابع طبیعی می‌کند و پایش و ارزیابی سه مقوله ذکر شده در مدیریت و برنامه‌ریزی کاربردی محیط زیست کمک مهمی خواهد کرد [۱۱].

آلفارا و همکاران (۲۰۰۴) در تحقیقی بر روی حوزه رودخانه دریاچه نایواشا در کشور کنیا به این نتیجه رسیدند که اصلی‌ترین مشکل موجود مربوط به بخش کشاورزی می‌باشد به طوری که در بعضی از قسمت‌ها بیش از نیاز آبیاری تخصیص آب انجام می‌شود. در حالی که بر عکس، در مناطقی دیگر کل نیاز تامین نمی‌گردد. در حقیقت مشکل اصلی در مدیریت غیر اصولی است [۱].

تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط یوسفی و همکاران ۱۳۸۹، در منطقه چشمه‌علی استان چهارمحال بختیاری که با هدف مقایسه برخی از شاخص‌های کیفیت خاک در چهار کاربری اراضی، شامل مرتع با پوشش گیاهی تقریباً خوب ( $<20\%$ )، مرتع با پوشش گیاهی ضعیف



شکل ۱: منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال بختیاری

Fig 1: The study area in Chaharmahal Bakhtiari province



مطالعه شامل تفاضل تصویر، آنالیز مؤلفه‌های اصلی، تفاضل شاخص نرمال شده پوشش گیاهی، آنالیز مؤلفه‌های متعارف، تفاضل روشنایی و روش مقایسه پس از طبقه‌بندی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، به منظور تعیین آستانه در روش‌هایی که نیازمند تعیین آستانه هستند از روش آماری استفاده و مشخص گردید که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه با (۱) انحراف از میانگین قرار دارد. پس از تعیین آستانه تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردید. برای ارزیابی دقت تکنیک‌های آشکارسازی تغییرات، از نقشه واقعیت زمینی و بازدیدهای زمینی استفاده شد و دقت کل و ضریب کاپا برای هر کدام محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که روش تفاضل باند مادون قرمز به ترتیب با دقت کل و ضریب کاپای ۸۵٪ و ۷۸٪ بیشترین دقت و روش تفاضل ۲CCA به ترتیب با دقت کل و ضریب کاپای ۲۹٪ و ۱۶٪ کمترین دقت را در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی منطقه دارند [۴]. (شکل ۲).

از آنجایی که محدوده مالکیت کشاورزی هر چاه به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۵ هکتار است، لذا با نقشه حاصل از طبقه‌بندی تصویر ماهواره‌ای، قسمتی از محدوده اراضی کشاورزی آبی هر حلقه چاهی که مرز بین دو روستا بود از هم تفکیک شدند. به منظور بررسی برداشت منابع آب زیرزمینی لازم است سطح اراضی کشاورزی به تفکیک دیم و آبی تفکیک شود. از طرفی به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی از شش لایه اطلاعاتی شامل نقشه‌های طبقات ارتفاعی، منابع آب، طبقات جهت، آبراهه‌ها و کانال‌های زهکشی، تصویر ماهواره‌ای لندست TM مربوط به خرداد ماه سال ۲۰۱۱، تصاویر زمین مرجع (Google Earth Pro 7.1.2) همچنین مطالعات میدانی در دو سطح اولیه و تکمیلی استفاده گردید.

نقشه طبقات ارتفاعی: طبق بررسی‌های میدانی، خط تراز متوسط ۱۹۰۰ متر به بالا تحت مالکیت منابع طبیعی و اراضی بایر محسوب می‌شود غیر از دو محدوده در قسمت‌های جنوب شرقی و شمال غربی دشت که اراضی کشاورزی تا خط تراز ۲۰۰۰ متری تحت مالکیت کشاورزان و حدود ۱۵ درصد کل اراضی دشت است. لذا از این نظم مشهود در محیط به منظور جداسازی دو کاربری کشاورزی و بایر استفاده شد.

نقشه طبقات جهت: از آنجایی که اراضی کشاورزی دشت در محدوده شیب صفر تا ۱۰ درصد قرار دارد لذا دشت طبق خطوط توپوگرافی مورد استفاده، بدون جهت است. از این رو از نقاط ارتفاعی حاصل از مطالعات میدانی اولیه و منابع آب به منظور مشخص تر شدن جهت اراضی استفاده گردید.

نقشه آبراهه‌ها و کانال‌های زهکشی: در مطالعات میدانی اولیه مشخص شد که برخی از اراضی روستایی توسط کانال‌های زهکشی و آبراهه‌های فصلی قابل تفکیک هستند لذا با استفاده از این نقشه محدوده برخی از اراضی روستایی تفکیک شد (جدول ۳).

نقشه راه‌ها: این نقشه شامل راه‌های بین روستاها و اراضی

نحوی که در حال حاضر نیمی از چاه‌های آن خشکیده‌اند و نیمی دیگر کم آب شده‌اند. و همچنین شور شدن آب‌های زیرزمینی و زمین‌های کشاورزی، تهدید شدید دامداری منطقه، کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، بایر و روند بیابانی شدن اراضی کشاورزی و مرتعی منطقه را سبب شده است.


لازم به ذکر است که در طی سالیان گذشته توسعه کشاورزی و کاهش عرصه‌های منابع طبیعی، تقاضا برای استفاده از منابع آب زیر زمینی را بالا برده و طی چند سال اخیر چالش‌های مختلفی را در بخش‌های منابع بوجود آورده است. از طرف دیگر نیز چاره‌ای جز تولید بخش کشاورزی، علی‌رغم این تنزیل کیفیت نیست و پایداری محیط‌زیست در کشاورزی دیگر نه یک انتخاب بلکه واقعیتی گریزناپذیر است. بسیاری از معضلات محیط زیست منطقه مذکور در حوزه کشاورزی است پس راه حل‌ها را نیز باید در این حوضه یافت. در حال حاضر چندان روشن نیست که چگونه این چالش‌ها از سوی اکوسیستم‌ها تعدیل و همساز می‌شوند. آن هم اکوسیستم‌هایی که انسان آنها را اداره می‌کند و بر آنها اثر می‌گذارد. نیاز به تحقیق در این زمینه و نیز برنامه‌ریزی جهت اقداماتی مؤثر و با هدف کاهش اثرات منفی، به خوبی احساس می‌شود. به طور کلی تعیین تغییرات شامل کاربرد مجموعه داده‌های چند زمانه به منظور مشخص کردن مناطقی است که کاربری و پوشش زمینی آنها در تاریخ‌های مختلف تصویربرداری، تغییراتی داشته‌اند. این تغییرات ممکن است ناشی از تغییرات پوشش در کوتاه مدت مانند برف، سیلاب، تغییرات کاربری چون توسعه شهری و تبدیل اراضی طبیعی به کشاورزی و یا سایر کاربری‌ها باشد [۴].

از این رو پایش تغییرات کاربری اراضی در بازه‌های زمانی از طریق تکنیک سنجش از دور در مدت کوتاه‌تر، با هزینه کمتر و با دقت بالاتری حاصل می‌شود تلفیق سنجش از دور<sup>۱</sup> و داده‌های سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی<sup>۲</sup> در کاهش هزینه، کوتاه نمودن زمان و افزایش جزئیات و دقت اطلاعات می‌تواند بسیار مؤثر باشد. [۸]. لذا در این تحقیق با استفاده از تصویر TM در سه زمان، مربوط به سال‌های ۱۹۸۷، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱، نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و با استفاده از داده‌های منابع آب مربوط به ۱۳۹۱ تغییرات با استفاده از روش طبقه‌بندی نظارت شده و بهره‌گیری از روش حداکثر احتمال در چهار طبقه اراضی کشاورزی آبی، دیم، مناطق مرغزار و بایر استخراج گردید و اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه شد و با مطالعات میدانی اولیه و تکمیلی نقاط برداشت شده تدقیق شد تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای امکان آشکارسازی تغییرات آن را در طول یک دوره فراهم می‌سازد. روش‌های مختلفی نیز برای آشکارسازی تغییرات وجود دارد. در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندست مربوط به سال‌های ۱۹۸۷، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ استفاده و شش تکنیک آشکارسازی تغییرات در منطقه فوق‌الذکر در این

1- Remote Sensing (RS)

2- Geographic Information System (GIS)





شکل ۲ توزیع مکانی نقاط مورد مطالعه در نقشه توپوگرافی در چهار کاربری آبی، دیم، مرتع و جنگل در موقعیت‌های مختلف شیب تفکیک تصاویر از شش طریق تفاضل تصویر، آنالیز مؤلفه‌های اصلی، تفاضل شاخص نرمال شده پوشش گیاهی، آنالیز مؤلفه‌های متعارف، تفاضل روشنایی و روش مقایسه پس از طبقه‌بندی

Fig 2: The spatial distribution of the studied topographic map use the four farming, pasture and forest in different situations slope Resolution of six through subtraction, image, principal component analysis, normalized difference vegetation index, the components of conventional analysis, The difference between the brightness and contrast after classification

طریق تفاضل تصویر، آنالیز مؤلفه‌های اصلی، تفاضل شاخص نرمال شده پوشش گیاهی، آنالیز مؤلفه‌های متعارف، تفاضل روشنایی و روش مقایسه پس از طبقه‌بندی برای تفکیک مرزها استفاده شده است و با مطالعات میدانی و در مناطقی که هیچ کدام از داده‌های فوق در دسترس نبود از برداشت با GPS استفاده شده است.

مساحی و مکان دار نمودن قطعات اراضی زراعی و باغی حوزه آبخیز با استفاده از روش برداشت با دستگاه‌های GPS دو

کشاورزی مربوط به روستاهاست که صحت آن توسط نقاط کنترل زمینی بازبینی شد. و همانند نقشه آبراهه‌ها در تفکیک برخی از اراضی کشاورزی منطقه مورد استفاده قرار گرفت مطالعات میدانی تکمیلی: به منظور تعیین مرز دقیق‌تر مرز مالکیت‌ها در قسمت‌هایی که هیچ کدام از داده‌های در دسترس کمک نمی‌کرد از GPS استفاده شد. همانطور که در مبحث مواد و روش‌ها توضیح داده شد از شش

جدول ۱ نقاط GPS همراه با مهمترین خصوصیات برداشت شده  
Table 1. GPS points with the most important characteristics were taken

مهمترین خصوصیات برداشت شده		نقاط GPS برداشت شده		
		X	Y	ردیف Row
مرز دو یا چند کاربری The border of two or more users	شاخص ترین عارضه جدا کننده The most index separator			
کشاورزی دیم و آبی - مرغزار Rainfed and irrigated agriculture - Meadows	کانال زهکشی Drainage channels	511295	348894	1
کشاورزی آبی - مرغزار irrigated agriculture - Meadows	جاده آلونی - ده صحرا Alloni Road- Sahra village	508459	348846	2
کشاورزی دیم - آبی Irrigated - Rainfed agriculture	کانال زهکشی Drainage channels	512278	348856	3
کشاورزی آبی - بایر Bayer- irrigated agriculture	خط تراز ۱۹۰۸ متر در راستای نزدیکترین مالکیت چاه The balance of 1908 m The nearest property	505425	348697	4
بایر - کشاورزی دیم Bayer- Rainfed agriculture	خط تراز ۱۹۰۲ The balance of 1902	504889	348634	5
بایر - کشاورزی دیم Bayer- Rainfed agriculture	خط تراز ۱۹۰۴ The balance of 1904	510927	348292	6
بایر - کشاورزی دیم Bayer- Rainfed agriculture	خط تراز ۱۸۹۶ The balance of 1896	510601	348307	7
بایر - کشاورزی آبی Bayer- irrigated agriculture	خط تراز ۱۸۸۲ The balance of 1882	514859	348563	8
کشاورزی دیم و آبی - بایر Bayer- Irrigated - Rainfed agriculture	جاده - ۲۰۰ متری مسیر انتقال گاز Road - 200 meters along the gas pipeline.	514878	348681	9
کشاورزی آبی - بایر Bayer- irrigated agriculture	کارخانه شن - جاده Sand factory- Road	515362	348444	10

جدول ۲ مهمترین پارامترهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک لردگان (۹۱-۷۴)  
Table 2. The most important climate parameters Lordegan synoptic station (91-74).

متوسط سالانه رطوبت نسبی (درصد)	Temperature (° C) (سانتیگراد درجه) دما			متوسط سالانه بارندگی (میلی متر) The annual average rainfall (mm)	ماه شاخص Month Index
	میانگین حداقل	میانگین سالانه	میانگین حداکثر		
The annual average relative humidity (percent)	Average minimum	Average annual	Average maximum		
31.92	7.85	19	27	2.5	مهر - Mehr
49.25	2.5	11	18.3	40	آبان - Aban
64.46	-0.7	6	12	138	آذر - Azar
65.56	-2.8	3.5	9.3	140	دی - Dey
56.25	-1.00	7	13	83	بهمن - Bahman
50.85	1.9	10	16	101	اسفند - Esfand
48.12	6.5	15.5	22	62.5	فروردین - Farvardin
34.80	10	21.3	28	6	اردیبهشت - Ordibehesht
24.7	14	26.9	35	0.1	خرداد - Khordad
25.11	17.9	29.6	37.1	1.1	تیر - Tir
22.5	17.4	29.2	37.7	0.2	مرداد - Mordad
24.5	12.5	24.7	33	0.03	شهریور - Shahrivar
42.2	8.2	17	25	565	شاخص سالانه The annual index

۱ منبع: شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال بختیاری ۱۳۹۱



GPS و تصاویر ماهواره‌ای برای تفکیک مرز قطعات وجود ندارد، از نقشه‌برداری زمینی استفاده شده است.  
GPSهای Rover دستگاه‌های GPS دو فرکانسه‌ای هستند که به منظور برداشت عملیاتی عوارض مختلف در قالب خط، پلیگون و نقطه (به عنوان مثال موقعیت اراضی کشاورزی و غیره) همانند

فرکانسه GeoExplorer به عنوان و دستگاه Base به صورت میدانی و کنترل دقت برداشت و تفسیر چشمی مرز قطعات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به عنوان Background لایه‌های GIS اراضی کشاورزی صورت می‌گیرد. در اراضی باغی و مناطق کوهستانی و در شرایط آب و هوای ابری که امکان استفاده از دستگاه‌های



شکل ۳ وضعیت اراضی در حوزه آبخیز مورد مطالعه

Fig 3. The situation in the catchment area of study.


جدول ۳ وضعیت اراضی و منابع آب بخش جوانمردی حوزه آبخیز (۱۳۹۱)<sup>۱</sup>

Table 3. The water resources of javanmardy watershed lands (1391).

ردیف	شهر/روستا	منابع آب (چاه)-تعداد	اراضی بایر(هکتار)	اراضی آبی(هکتار)
Row	village / Town	Water sources (wells)- Number	Bayer land (ha)	Irrigated lands (ha)
۱	افغان(قلعه)-Afghan(Fort)	6	3	89
۲	بابا منصور-Baba mansor	14	34	39
۳	باغ بهزاد-Garden Behzad	13	160	40
۴	آلونی-Aloni	25	169	205
۵	مزعل(قلعه)-Mazel(Fort)	11	37	86
۶	هندو-Hendo	24	101	139
۷	کوشکی-Koshki	3	31	14
۸	کلامونی-Klamonii	15	265	31
۹	جوانمردی-javanmardy	8	44	68
۱۰	سفیلان-Safilan	32	49	182
۱۱	خسروآباد-Khosroabad	1	21	10
۱۲	سیله-Sileh	4	79	29
۱۳	سلح چین-Salh Chin	25	59	203
۱۴	سرتنگ دینار-Sartang Dinar	19	139	153
	مجموع-Sum	200	3270	1288

۱. منبع: شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال بختیاری ۱۳۹۱

هکتار (ha)



شکل ۴ متوسط اختصاص اراضی آبی نسبت به منبع قابل برداشت با توجه به مالکیت اراضی هر محدوده روستایی

Fig 4. The allocation of land to harvest water at the source with respect to the ownership of land in the rural area

آب نسبت به اراضی آبی کشاورزی در کل محدوده حاشیه دشتی نسبت به دیگر نواحی کمتر است.

### نتیجه گیری

در این تحقیق از شش لایه اطلاعاتی شامل نقشه‌های طبقات ارتفاعی، منابع آب، طبقات جهت، راه‌های روستایی، آبراهه‌ها و کانال‌های زهکشی، تصویر ماهواره‌های لندست TM، همچنین مطالعات میدانی در دو سطح اولیه و تکمیلی به منظور تهیه نقشه محدوده مالکیت‌های اراضی استفاده گردیده است. طبق نتایج به دست آمده بیشترین تراکم منابع آبی در محدوده وسط حوزه آبخیز متمرکز شده که سهم بیشتر آن در روستاهای مرکزی مانند، ده صحرا و ده ترکان است و به نسبت کمترین اراضی آبی با توجه به منابع آبی در دسترس دارند که برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی باعث خشکی چاه‌های کشاورزی و کاهش سطح اراضی آبی در این مناطق است طبق تصویر طبقه‌بندی شده، عمده اراضی دیم در حاشیه زمین‌های کشاورزی آبی پراکنش یافته و در واقع مرز بین اراضی آبی و بایر یعنی در حاشیه منطقه حدود ۹۰ درصد اراضی دیم در موقعیت مخروطه افکنه‌های سنگریزه‌دار مشاهده می‌شود و بقیه اراضی دیم در حاشیه اراضی کشاورزی آبی و اراضی مرغزار در وسط دشت استقرار دارند و نمود بهتر اراضی آبی از لحاظ سطح یکپارچگی در وسط منطقه است یعنی در مناطقی از جنوب و جنوب شرقی محدوده مرغزار، شاهد این نوع هستیم. همچنین محدوده مرغزار در

دستگاه‌های GPS دستی (GPSهای تک فرکانسه) ولی با دقت مسطحاتی حدود یک متر استفاده می‌شود. نکته مهم در مورد این GPSها این است که همزمانی برداشت توسط دستگاه‌های Rover و Base رعایت گردد، یعنی زمانی که کاربر با Rover برداشت می‌کند دستگاه Base نیز فعال بوده و موقعیت ماهواره‌های محدوده خود را ثبت نماید. پس از برداشت یک زمین زراعی توسط کاربر فایل برداشت شده تخلیه گردیده و به منظور پردازش وارد محیط نرم‌افزاری مانند Pathfinder یا GPS Analysis 2 می‌شود سپس فایل برداشت شده توسط Base مربوط به همان روز نیز وارد این محیط می‌گردد و خطاهای مربوط به برداشت صورت گرفته توسط کاربر با Rover سرشکن گردیده و دقت به حدود زیر ۲۰ سانتی متر می‌رسد. و مقادیر با دقت فوق کالیبره شده است. و روی هم قرار گرفتن این نقاط صرفاً بصورت ظاهری است (جدول ۱) در جدول (۳)، سطح کل اراضی کشاورزی با توجه به محدوده‌ی حوزه آبخیز، حدود ۴۵۵۸ هکتار است که از این میزان ۲۸/۲۶ درصد اراضی آبی، ۷۱/۷۴ درصد اراضی دیم تشکیل داده است [۱]. علت اصلی کاهش منابع آبی، استحصال بی‌رویه منابع آب زیرزمینی در نتیجه‌ی مدیریت غیراصولی برداشت منابع آب زیرزمینی، خشکسالی، تناوب کشت غیر علمی از جمله مهمترین عوامل در این زمینه است (شکل ۳).

در شکل (۴) وضعیت بخشی از اراضی آبی نسبت به منبع قابل برداشت نشان داده شده است. به طور کلی وضعیت اختصاص منابع



همچنین متخصصین از قبیل آلفا ۲۰۰۴، پرسلی و همکاران ۲۰۰۱، که نتایج تحقیقات کاربردی آنها در حین انجام مطالعات مورد استفاده قرار گرفته به اتفاق نقش خصوصیات خاک مناطق مختلف را در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی و نقش آن در منابع آب را مورد بررسی قرار داده‌اند که نتایج آنها نشان داده همبستگی بالایی بین این دو عامل می‌باشد و یادآور این نکته است که با کاربری غیراصولی ساختار خاک دچار تحول شده و حتی تاثیر شگرفی در ذخیره منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌گذارد را بیان می‌نماید. و تحقیق ذیل نیز نتایج سایر محققین را تأیید می‌نماید [۹۰].

در تحقیق دیگری نیز که یوسفی فرد ۲۰۱۰، در منطقه چشمه‌علی استان چهارمحال بختیاری با هدف مقایسه برخی از شاخص‌های کیفیت خاک در چهار کاربری اراضی، نشان داد که مقدار مواد آلی و فسفر قابل دسترسی طی تغییر کاربری اراضی مرتعی کاهش یافته و بیشترین کاهش در دیم‌زار مشاهده شده است [۱۶].

به طور کلی می‌توان گفت تغییر کاربری اراضی از عرصه‌های منابع طبیعی نظیر مرتع به کاربری‌های دیگر که کشت و کار نقش اساسی را در آنها ایفا می‌کند باعث کاهش کیفیت خاک گشته و خاک سطحی را در برابر فرسایش حساس می‌نماید. این مطالعه نشان داد که با تغییر الگوی کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی، تا حدودی می‌توان به شرایط تعادل آب زیر زمینی دست یافت.

لذا به منظور پایداری سفره‌های زیرزمینی لازم است سازمان‌های مدیریت آب، چون شرکت آب منطقه‌ای منابع آب استان با در نظر گرفتن سطح اختصاصی اراضی آبی و میزان برداشت منابع آب با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی موجود در منطقه برنامه‌ریزی منابع آب بر پایه محدوده‌های مالکیت اراضی هر روستا اجرا نماید. با توجه به داده‌های ارائه شده، عوامل مؤثر در شکل‌گیری بحران آب در دشت فوق بسیار متفاوت بوده و نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی می‌باشد.

اقلیم منطقه، کاهش نزولات جوی و تبخیر زیاد منجر به افزایش املاح در آبخوان شده که می‌تواند یکی از عوامل عمده تاثیرگذار در این بحران بوده باشد. خشکسالی به صورت غیرمستقیم تأثیر زیادی در افت سطح آب زیرزمینی گذاشته که تکرار این پدیده در طی سالیان متمادی، همراه با اضافه برداشت در دشت تأثیرات جبران‌ناپذیری در ایجاد بحران آب در دشت مورد مطالعه شده است. مجموعه عوامل فوق همراه با لیتولوژی سازندهای تبخیر(نمک و گچ) منطقه منجر شده تا علاوه برافت سطح آب، کیفیت آب نیز دستخوش تغییر قرار گرفته و بحران جدی را در منطقه رقم بزند.

### سپاسگزاری

از شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری به دلیل در اختیار قرار دادن اطلاعات منابع آب تشکر و قدردانی می‌شود.

قسمت مرکزی منطقه با آمیزه اندکی از اراضی بایر طبقه‌بندی شده است که مساحت این محدوده ۷/۴ درصد از سهم کل اراضی را به خود اختصاص داده است

در سری زمانی بین سال ۱۹۸۷ اولین دوره تصاویر نسبت به سال ۲۰۰۰ دومین سری زمانی کاربری دیم و بایر کاهش داشته و کاربری آبی و مرغزار روند افزایشی داشته است. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ کاهش اراضی آبی و مرغزار را شاهد هستیم که خود دلیلی گویا بر روند کاهش سفره آب زیرزمینی در منطقه مطالعاتی است.

از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۱ تنها روند افزایشی در اراضی دیم بوده است و بیشترین کاهش سطح اراضی مربوط به اراضی آبی است که خود دلیلی بر کاهش سطح آب زیرزمینی و در نتیجه هزینه بالای برداشت آب سفره در طول دوره زمانی مذکور است. افزایش اراضی آبی از سال ۱۹۸۷ لغایت ۲۰۰۰ به عواملی چون افزایش چاه‌های استحصال برای مصرف کشاورزی در نتیجه افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، رشد مظاهر تکنولوژی همچون افزایش ادوات کشاورزی و تا حدودی سیاست‌های نادرست ارگان‌های مرتبط با کاربری اراضی و منابع آب دخیل بوده است.

۱۴ حلقه چاه پیرومتریکی که در مناطق مختلف منطقه با توزیع نسبتاً همگنی استقرار دارند به خوبی تغییرات افت سطح آب زیرزمینی را بازگو می‌کنند. به طور معمول شرکت آب منطقه‌ای استان به صورت منظم، سطح آب زیرزمینی را در چاه‌های پایش به صورت ماهانه ثبت می‌کند و طبیعتاً بالاترین سطح آب را در اسفند و یا اردیبهشت ماه هر سال و پایین‌ترین افت سطح آب زیرزمینی را در شهریور و یا مهرماه هر سال خواهیم داشت. لذا افت سالانه سطح آب زیرزمینی از تفاضل بین دو مقدار حداکثر و حداقل سطح آب زیرزمینی در ماه‌های ذکر شده محاسبه گردید. و بررسی‌های انجام شده در طی مقاطع ۱۹۸۷، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ نشان‌دهنده کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی در اثر این تغییری کاربری‌ها می‌باشد. به دلیل سوء مدیریت و برداشت بی‌رویه از منابع سفره آب زیرزمینی، در چند سال اخیر شاهد خشکسالی‌های متوالی بوده‌ایم به نحوی که در حال حاضر نیمی از چاه‌های منطقه مطالعاتی خشکیده و نیمی دیگر کم آب شده‌اند. و همچنین شور شدن آب‌های زیرزمینی و زمین‌های کشاورزی، تهدید شدید دامداری منطقه، کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، بایر و روند بیابانی شدن اراضی کشاورزی و مرتعی منطقه را سبب شده است.

نتایج تحقیقات نشان داده که به جز دشت‌های فارسان، شلمزار و گندمان سایر دشت‌های استان با بیلان منفی مواجه هستند و همچنین برای تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی دشت‌های شهرکرد، بروجن، سفیددشت، کیار، فلارد و خانمیرزا لازم است میزان برداشت آب به ترتیب ۱۳، ۳۰، ۶۶، ۳۲، ۴۸ و ۱۲ درصد کاهش یابد. در مورد دشت‌های فارسان، شلمزار و گندمان نتایج نشان داده که می‌توان به ترتیب ۴۵، ۳۸ و ۳۰ درصد در برداشت از منابع آب این دشت‌ها افزایش ایجاد کرد.



10. Pots chin, M. 2009. Land use and the state of the natural environment. *Land Use Policy*. 170 -177.
11. Regional Water Purab Consulting Engineers, 2009, Report on ground-breaking Khanmirza plain, DOE research design, Bakhtiari Province. (In Persian)
12. Sabouhi. M. et.al. In 2007. Assessment of groundwater management strategies: a case study Narimani Plain, Khorasan Province, *Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, Year 11, No. I (b). (In Persian)
13. Svancarra, L.K., et.al (2005), Policy-driven versus evidence-based conservation: a review of political targets and biological needs, *Bioscience* 55:989-95.
14. Tsui, cc, Chen, sHsieh, C.f (2004) Relationships between soil properties and slope position in a lowland rain Forest of southern Taiwan, *Journal of Geoderma*, 123: 131-142.
15. WRI (World Resources Institute) (2003), protected areas, *Earth Trends data tables: Biodiversity and protected areas* Washington. D.C. Available at <http://earthrends.wri.org>.
16. Yosefifard M. Jalalyan A. Khademi H 2010, Soil degradation during the change of land use pasture springs area Chaharmahal Bakhtiari Province. *Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*. Volume 14, Number 1.

1. Alfara (2004), modeling water resource management in lake Naivisha International Institute of Geo information science and earth observation enched, the Netherland.
2. Angers D.A.Chantigny M.H.1997. Different methods of land use change detection using satellite images (Case study: M. dry area)
3. Ehsani, M. and Khalid, H., 2003. Agricultural water productivity, printing, Tehran, National Committee on Irrigation and Drainage (In Persian)
4. Fathi.h, Arkhi, s. 2013, Different methods of land use change detection using satellite images (Case study: M. dry area) *Journal of arid ecosystems* Pr3. N1:56-68
5. Guner, s, tufekcioglu, A, Gulenay, S and Kucuk, m (2010), Land – use type and slope position effects on soil respiration in black locust plantations in artvin, turkey, *journal of agricultural research*, 5: 719-7.
6. Khor mali. F, and ablahi A (2003), Origin and distribution of flay minerals in calcareous arid and semiarid soils of Fars province southern Iran, *clay mineral*, 38: 511-527.
7. Makhdoum, M.F (2008), Management of protected areas and conservation of biodiversity in Iran, *international journal of environmental studies*, 65: 4, 563-585.
8. Mohammad esmail.z. (2010) Branch monitoring land use changes using remote sensing techniques. *Soil Research, Soil and Water Sciences*, Volume 24, Number 1.
9. Plessey, R.I, K, Taffs (2001), Scheduling conservation action in production landscapes: priority areas in western new south wales defined by irreplaceability and vulnerability to vegetation loss, *Boil Conserve*, 100: 355-376.