

بررسی تغییرات قند خون ضمن جراحی دندان عقل نهفته با بی‌حسی موضعی حاوی اپی‌نفرین

عباس حقیقت^{*}، ناصر کاویانی^۱، آمنه دادخواه^۲

چکیده

مقدمه: اپی‌نفرین موجود در محلول‌های بی‌حسی موضعی باعث افزایش قند خون می‌شود. اضطراب نیز باعث افزایش قند خون می‌شود. طی این مطالعه، تغییرات قند خون در حین جراحی دندان عقل نهفته با استفاده از بی‌حسی موضعی با ۲ کارپول (3/6 cc) لیدوکائین ۲ درصد حاوی اپی‌نفرین $\frac{1}{80000}$ بررسی شد.

مواد و روش‌ها: بر این بررسی توصیفی تحلیلی و آینده‌ذگر، ۲۱ فرد سالم ۳۰ تا ۱۷ ساله که برای جراحی دندان عقل نهفته مندیبل به بخش جراحی مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. قبل از شروع جراحی، دستورهای لازم به طور یکسان به همه مراجعه‌کنندگان داده شد. سپس، در چهار مرحله (۱۵ دقیقه پیش از جراحی، بلافارسله پیش از تزریق بی‌حسی، ۷ و ۱۵ دقیقه پس از تزریق بی‌حسی) قند خون آنان با گلوكومتر اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار Paired Samples T-test تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: تغییرات قند خون در چهار مرحله اندازه‌گیری معنی‌دار بود ($p<0.001$). میانگین قند خون از $97/19 \pm 9/93$ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله یک، به $107/48 \pm 15/57$ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله چهار رسید. میانگین قند خون، در مرحله دو اندکی کاهش نشان داد و سپس در مراحل سه و چهار به گونه‌ای معنی‌دار بالا رفت.

نتیجه‌گیری: پس از تزریق داروی بی‌حسی و آغاز جراحی، میزان قند خون افزایش پیدا کرد ولی میانگین میزان قند خون از ۱۱۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بالاتر نرفت. بنابراین تزریق دو کارپول لیدوکائین همراه با اپی‌نفرین باعث افزایش قند خون به میزان خطرناکی نمی‌شود.

کلید واژه‌ها: قند خون، جراحی دندان عقل نهفته، بی‌حسی موضعی، اپی‌نفرین.

* دکتر عباس حقیقت متخصص جراحی فک و صورت، استادیار دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان haghigat@dnt.mui.ac.ir

۱: دکتر ناصر کاویانی، متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه استادیار دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲: دکتر آمنه دادخواه دندان‌پزشک

این مقاله در تاریخ ۸۵/۴/۲۷ به دفتر مجله رسیده در تاریخ ۸۵/۵/۱۰ اصلاح شده و در تاریخ ۸۵/۶/۱۹ تأیید گردیده است.

مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان ۲۶ ۲۳:(۳) ۱:۳۸۵

مقدمه

دندانپزشکی وجود دارد، می‌تواند باعث تغییر قند خون گردد[5]؛ اما پرسش این است که این تغییرات چگونه است؟ و آیا این اندازه تغییر در افراد سالم می‌تواند نگران کننده باشد؟

تنگ کننده‌های عروقی، که همراه با داروهای بی‌حسی موضعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر شیمیایی همانند میانجی‌های دستگاه سمپاتیک هستند. این داروهای علاوه بر اثر تنگ کننده‌ی عروقی، اثرات بالینی بسیار دیگری نیز دارند[6-9]. افزایش سطح آدرنالین پلاسمای پی تزریق بی‌حسی موضعی دارای اپی‌نفرين در دندانپزشکی، به خوبی اثبات شده است؛ ولی اختلاف دیدگاه‌ها بر سر این است، که چه اندازه دارو باید تزریق شود تا افزایش سطح آدرنالین پلاسمای اندازه‌ای برسد که باعث تغییرات قند خون گردد[11].

در پژوهشی، اثر $4/4$ میلی‌گرم از داروی بی‌حسی موضعی متفاوت، یعنی زایلوکائین (لیدوکائین 2 درصد دارای اپی‌نفرين $\frac{1}{80000}$ IU/ml و سیتائست (پریلوکائین 3 درصد دارای فلی‌پرسین به میزان $0/03$) بر تغییرات قند خون در دو گروه از افراد، برسی شده است. داروی بی‌حسی دارای اپی‌نفرين (زایلوکائین) قند خون را در دو گروه به طور چشم‌گیر افزایش داد، در حالی که داروی بدون اپی‌نفرين (سیتائست)، باعث کاهش قند خون شد[12].

در برسی دیگری، اثرات همودینامیک و بیوشیمیایی لیدوکائین 2 درصد دارای اپی‌نفرين $\frac{1}{80000}$ ، با لیدوکائین 2 درصد بدون اپی‌نفرين در جراحی دندان عقل مقایسه شده است؛ غلظت قند خون و سطح پتانسیم پلاسمای در کاربرد دو دارو، اختلافی معنی دار نشان داده است[13].

بررسی غلظت قند خون، نوراپی‌نفرين، اپی‌نفرين و انسولين خون در چهار مرحله در جراحی دندان عقل، مشخص کرده است که: قند خون و اپی‌نفرين پلاسمای به گونه‌ای معنی دار افزایش داشته اوج افزایش این دو متغیر، همزمان پس از تزریق بی‌حسی موضعی بوده است. نوراپی‌نفرين هم مقادیر افزایش نشان داده است، ولی این افزایش معنی دار نبوده اوج آن پس از آغاز جراحی بوده است. در این مطالعه، علت افزایش قند خون نشست اپی‌نفرين موجود در داروی بی‌حسی به جریان خون ذکر شده است. در برسی مذکور، از لیدوکائین 2 درصد دارای اپی‌نفرين $\frac{1}{80000}$ و به اندازه $24 \pm 0/3$ میلی‌لیتر استفاده شده بود[13]. شایان ذکر است که بیماران با بیماری‌های زمینه‌ای مختلف به دندانپزشک مراجعه می‌کنند. ترکیب لیدوکائین با اپی‌نفرين، شایع‌ترین داروی بی‌حسی موضعی مورد استفاده می‌باشد این دارو و همچنین استرس کار باعث تغییرات قند خون می‌شوند. در دندانپزشکی امکانات

قند خون، روزانه به وسیله چند هورمون و عامل عصبی در گستره کوچک 72 تا 144 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر تنظیم می‌شود. قند خون در حالت ناشتا کمتر از 110 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر است. پس از خوردن غذه میزان قند و انسولین خون افزایش می‌باید و این امر به ترکیب، اندازه و زمان مصرف غذا بستگی دارد. افزایش قند خون، یک ساعت پس از صرف غذا به حداقل رسیده، پس از سه تا چهار ساعت به حالت طبیعی باز می‌گردد[2-1].

مداخلات جراحی دهان و دندان، باعث تحریک احساسات و ایجاد اضطراب و ترس می‌شود. این تحریکات، هم‌زمان از دو مسیر متفاوته یعنی دستگاه عصبی اتونومیک و غدد درون‌ریز، سبب تغییرات فیزیولوژیک می‌گردد. تغییر در غلظت قند خون، به عنوان یکی از واکنش‌های حیاتی مرتبط با این دو دستگاه شناخته شده است[3].

همه حالات غیرفیزیولوژیک را می‌توان به گونه‌ای فشار عصبی انگاشت؛ انواع ضربه عفونت، تغییرات دمای محیط، اعمال جراحی و هرگونه بیماری تضعیف کننده از این دست است. در انواع فشار روانی چون جراحی، ترشح مجموعه‌ای از هورمون‌های گوناگون برای رویارویی با آن حالت غیرعادی اتفاق می‌افتد، تا بدن بتواند حالت فیزیولوژیک و طبیعی خود را حفظ کند. یک گروه از هورمون‌هایی که به ترشح آن‌ها در پاسخ به فشار افزوده می‌شود، گلوكورتيکوئيدها هستند. گلوكورتيکوئيدها، که سردهسته آن‌ها کورتیزول است، تولید قند را از مواد غیر قندی افزایش می‌دهند[4]. کاتکول‌آمین‌ها نیز، به عنوان میانجی‌های دستگاه عصبی اتونومیک، اثری چشم‌گیر بر پاسخ به فشار عصبی می‌گذارند. وضعیت سوخت و ساز بالا (هیپرمتاپولیک) که پس از فشار عصبی دیده می‌شود، به فعل شدن دستگاه آدرنرژیک مربوط است. غلظت هر دو کاتکول‌آمین اصلی، یعنی اپی‌نفرين و نوراپی‌نفرين، پس از فشار عصبی در پلاسمای افزایش می‌باید. کاتکول‌آمین‌ها اثرات سوخت و سازی، هورمونی و همودینامیک متعددی بر جمعیت‌های سلولی گوناگون اعمال می‌کنند. اپی‌نفرين، گلیکوژنولیز و گلوكوتوزنر را در کبد افزایش می‌دهد. این هورمون سبب کاهش ترشح انسولین می‌شود، اما ترشح گلوكاغن را افزایش می‌دهد. همه این عوامل به هنگام بروز حالت فشار روانی و اضطراب باعث ایجاد هیپرگلیسمی می‌شوند[5-7]. تغییر ناگهانی در غلظت قند خون به هنگام اعمال دندانپزشکی، مانند جراحی دندان عقل نهفته، مشکلاتی را هم برای بیمار و هم برای دندانپزشک ایجاد می‌کند[8]. فشار روانی و اضطراب، که به درجه‌های گوناگون در افراد مراجعت‌کننده برای اعمال


برای اطمینان از عدم ورود دارو به جریان خون در هنگام بلاک کردن، آسپیرلیسیون انجام می‌شد. در صورتی که بیمار در روز عمل ناشتا بود، به هنگام جراحی دچار مشکلات پزشکی می‌شد و یا به ماده بی‌حسی بیشتری نیاز داشت، از مطالعه کثار گذاشته می‌شد طول مدت جراحی 15 تا 20 دقیقه تعیین شده بود و در صورتی که طول جراحی خارج از این محدوده قرار می‌گرفت، بیمار از بررسی کثار گذاشته می‌شد. در نهایت تعداد 21 نمونه مورد نیاز جهت مطالعه انتخاب شدند.

نتایج

از 21 بیمار شرکت کننده در این طرح، 17 نفر زن و 4 نفر مرد بودند. میانگین سنی این افراد $21/57 \pm 2/9$ سال بود. با استفاده از آزمون Paired Samples T-test، تغییرات قند خون در مراحل مختلف نسبت به مرحله اول معنی‌دار بود ($p < 0.001$). میانگین قند خون از $97/19 \pm 9/93$ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله یک به $107/48 \pm 15/57$ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر در مرحله چهارم رسید. میانگین قند خون در مرحله دوم، نسبت به مرحله اول اندکی کاهش شان داد و سپس در مراحل سوم و چهارم نسبت به مرحله اول بالا رفت. از نظر آماری این افزایش معنی‌دار بود ($p < 0.005$). نمودار شماره یک، این تغییرات را نشان می‌دهد. میانگین قند خون در افراد مورد بررسی، از 110 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بیشتر نشد (جدول ۱).

جدول ۱: شاخص‌های توصیفی مقادیر قند خون در مراحل مختلف اندازه‌گیری در بیماران مورد مطالعه

زمان اندازه‌گیری	میانگین	حداکثر	حداقل	انحراف معیار
9/928	97/19	114	79	15 دقیقه قبل از بی‌حسی موضعی
12/062	94/24	116	71	قبل از بی‌حسی موضعی
11/547	99/86	123	76	7 دقیقه پس از بی‌حسی موضعی



نمودار ۱: میانگین تغییرات قند خون در چهار مرحله‌ی اندازه‌گیری

آزمایشگاهی اندازه‌گیری قند خون وجود ندارد و موارد کاهش و افزایش قند خون در بیماران به سختی قابل تشخیص است. بنابراین، با توجه به مسائل فوق، آکاهی از میزان تغییرات قند خون در حین کار دندان‌پزشکی اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه تغییرات قند خون در اعمال جراحی دندان‌پزشکی با استفاده از گلوکومتر، که کاربرد آسانی دارد، بررسی شد تا دامنه تغییرات قند خون حین جراحی در بیماران مشخص شود [14, 15].

مواد و روش‌ها

در یک بررسی توصیفی - تحلیلی و آینده‌نگر، از میان افراد 17 تا 30 ساله، که در پاییز سال 1384 برای جراحی دندان عقل نهفته فک پایین، به بخش جراحی تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند، 21 نفر برای شرکت در طرح انتخاب شدند. انتخاب افراد پس از مشاوره آماری (بر پایه فرمول $\frac{z^2 \delta^2}{d^2} = 16$)، $d=6/1$ ، $n=3$ ، $\delta=2$ و $z=1.96$ و پس از دریافت رضایت از مراجعین، صورت گرفت.

بیماران مشکل پزشکی سیستمیک نداشته، تا زمان مطالعه جراحی دهان و دندان انجام نداده بودند. دندان نهفته مورد نظر در همه آنان، مولر سوم فک پایین بود. درجه سختی جراحی آن‌ها به کمک پرتونگاری و معاینه تعیین شد در افرادی انتخاب شده، جراحی از گونه نهفته در بافت سخت و درجه سختی آن تقریباً یکسان، و طول مدت جراحی مورد نیاز 15 تا 20 دقیقه بود. از بیماران خواسته می‌شد که سه ساعت پیش از جراحی صبحانه معمولی خورده پس از آن تا هنگام جراحی چیزی نخورند. در صورت عدم رعایت مولرد فوق، بیمار از بررسی کثار گذاشته می‌شد. همه جراحی‌ها از ساعت 9 تا 10 بامداد انجام گرفت. پاتزده دقیقه پیش از تزریق بی‌حسی موضعی، نخستین نمونه خون مowirgی با گلوکومتر (Accu-Chek Active)، که از پیشرفته‌ترین انواع گلوکومتر استه آزمایش می‌شد. دقت این نوع گلوکومتر در مقایسه با آزمون‌های آزمایشگاهی پذیرفتی بوده است [16]. پاتزده دقیقه پیش از نخستین نمونه گیری، بیماران بر روی یونیت قرار گرفته، برای جراحی آماده می‌شدند. نمونه خون دوم، قبل از تزریق بی‌حسی موضعی آزمایش می‌شد. پس از حصول اطمینان از تأثیر بی‌حسی موضعی، جراحی آغاز می‌گردید. نمونه خون سوم و چهارم، به ترتیب 7 و 15 دقیقه پس از تزریق بی‌حس کننده موضعی تهیه می‌شد مقدار بی‌حس کننده موضعی استفاده شده برای همه بیماران، دو کارپول (3/6 سی سی) لیدوکائین 2 درصد با این فرین $\frac{1}{80000}$ بود. بیشتر دارو به صورت بلاک اینفرا-اوئولار، و چند قطره هم به صورت انفیلتره در وستیبول باکال تزریق می‌شد.

بحث

با توجه به یافته‌های این بررسی، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است حضور بیمار در بخش جراحی قبل از شروع کار، باعث سازگاری وی با محیط و کاهش اضطراب شود؛ این مسئله نیز ممکن است باعث کاهش قند خون بیمار شود^[3-5]. قند خون در افراد سالم، به هنگام جراحی دندان عقل نهفته با بی‌حسی موضعی با دو کاربول ۱/۸ سی‌سی محلول لیدوکائین ۲ درصد همراه با ابی‌هرین $\frac{1}{80000}$ افزایش پیدا می‌کند، ولی هیپرگلیسمی یا هیپوگلیسمی دیده نمی‌شود. هرچند این تغییر معنی دار است، اما قند خون از (۱۱۰ میلی‌گرم بر هسی‌لیتر) تجاوز نمی‌کند. البته افزایش قند خون در مرحله سوم به عنوان نشانه اثر سیستمیک آدنالین Nakamura و Meechan قابل توجه است و با مطالعات اگرورژن [۱۱-۱۳]، افزایش بیشتر قند خون در مرحله چهارم Kogure می‌تواند به علت استرس جراحی باشد و با مطالعه

مطابقت دارد[۳]

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه، می‌توان گفت که استفاده از دو کاربول لیدوکائین ۲ درصد همراه با ابی‌هرین $\frac{1}{80000}$ باعث افزایش خطرناک قند خون حین کار دندان‌پزشکی نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود برای مراقبت و درمان بهتر بیماران دیابتی حین کار دندان‌پزشکی، مطالعه مشابهی نیز در بیماران دیابتی انجام شود.

قدردانی

انجام این پژوهش با تأیید و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان میسر گردیده است. بدین وسیله از آن معاونت تشرک و قدردانی می‌گردد.

منابع

- آندرئولیت. مبانی طب داخلی سیسیل: بیماری‌های غدد و متابولیسم. ترجمه فانی م ج. ویرایش پنجم. تهران: تیمورزاده، ۱۳۸۰: صص. ۹-۸۳۷-۶. ۸۶۴-۶.
- Greenwood M, Meechan JG. General medicine and surgery for dental practitioners. Part 6: The endocrine system. Br Dent J 2003; 195(3):129-33.
- Kogure K, Nishida K. [Measurement of blood glucose variations due to surgical stress]. Shigaku 1989; 77(2):453-63.
- شیریفی م. ر. اصول پايه و کاربردی فیزیولوژی غدد درون ریز. چاپ اول. اصفهان: کنکال، ۱۳۸۰: ۱۶۸-۷۶.
- شوارتزس. ترجمه کامل چکیده اصول جراحی شوارتز. ترجمه رمزی. تهران: نور دانش، ۱۳۸۲: ۱۰: ۱۶۸-۷۶.
- Meedhan JG. Epinephrine, magnesium, and dental local anesthetic solutions. Anesth Prog 1996; 43(4):99-102.
- Chu CA, Sindelar DK, Neal DW, Allen EJ, Donahue EP, Cherrington AD. Comparison of the direct and indirect effects of epinephrine on hepatic glucose production. J Clin Invest 1997; 99(5):1044-56.
- Salins PC, Kuriakose M, Shamma SM, Tauro DP. Hypoglycemia as a possible factor in the induction of vasovagal syncope. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(5):544-9.
- Malamed SF. Handbook of local anesthesia. 5 ed. Philadelphia: Mosby; 2004 p. 41-7, 61-5
- Sisk AL. Vasoconstrictors in local anesthesia for dentistry. Anesth Prog 1992; 39(6):187-93.
- Nakamura Y, Matsumura K, Miura K, Kurokawa H, Abe I, Takata Y. Cardiovascular and sympathetic responses to dental surgery with local anesthesia. Hypertens Res 2001; 24(3):209-14.
- Meechan JG. The effects of dental local anaesthetics on blood glucose concentration in healthy volunteers and in patients having third molar surgery. Br Dent J 1991; 170(10):373-6.
- Meechan JG, Thomson CW, Blair GS, Rawlins MD. The biochemical and haemodynamic effects of adrenaline in lignocaine local anaesthetic solutions in patients having third molar surgery under general anaesthesia. Br J Oral Maxillofac Surg 1991; 29(4):263-8.
- Kumar G, Sng BL, Kumar S. Correlation of capillary and venous blood glucometry with laboratory determination. Prehosp Emerg Care 2004; 8(4):378-83.
- تربیت ح. مقایسه دقیق اندازه گیری قند خون به روش گلوکومتر با روش آزمایشگاه پایان نامه دکتری تخصصی داخلی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی.
- Bilen H, Kiliçaslan A, Akçay G, Çapoðlu I. Blood Glucose Monitoring Performance of "Roche Accu-Check Go" Glucometer Device at Moderately High Altitude. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2005; 4:115-8.