

بررسی میزان فعالیت ویژه آنژیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای طی حرکات ارتودونسی: یک مطالعه مقدماتی

دکتر علیرضا عمرانی^۱، دکتر منوچهر مصری پور^۲، دکتر رها کوثری اصفهانی^{*}، دکتر آرش متقی^۳

چکیده

مقدمه: آنالیز مایع شیار لثه‌ای ابزار مناسبی برای ارزیابی روندهای بیوشیمیایی مرتبط با ترن اور استخوان آلتوئولار می‌باشد. هدف این پژوهش، بررسی فعالیت ویژه آنژیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای طی اجرای تکنیک اسلامیدینگ برای عقب بردن دندان کائین بود.

مواد و روش‌ها: برای این پژوهش تجربی-آزمایشگاهی، ۵ بیمار ۲۰-۲۴ ساله مبتلا به بیرون زدگی دنتوآلتوئولار هر دو فک انتخاب شدند. بعد از کشیدن پره مولرهای اول، تکنیک ارتودونسی اسلامیدینگ برای عقب بردن دندان کائین اجرا شد. نمونه‌های مایع شیار لثه‌ای از قسمت دیستال هر دندان کائین به کمک کن کاغذی در فواصل بلافصله پس از نصب اپلاینس‌ها، فعال سازی اولیه، ۱۵ روز و ۳۰ روز پس از آن، جمع آوری شد. فعالیت اسید فسفاتاز و مقدار میکروپروتئین به روش رنگ سنجی (colorimetric) تعیین شد. حرکت دندان در فواصل زمانی اندازه گیری شد. از آزمون‌های غیرپارامتری Mann-Whitney و Freedman ضریب همبستگی پیرسون برای آنالیز داده‌ها استفاده شد ($\alpha = 0.05$).

یافته‌ها: پس از فعال سازی اپلاینس‌ها، میانگین فعالیت ویژه اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای افزایش معنی‌داری یافت ($p value = 0.001$). علاوه بر این، تغییرات فعالیت ویژه اسید فسفاتاز در فواصل زمانی بین مراحل نمونه گیری، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد ($p value < 0.001$). بین فعالیت ویژه اسید فسفاتاز و حرکت دندان، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت ($p value = 0.215$).

نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن محدودیت‌های این پژوهش، میزان فعالیت اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای طی حرکات ارتودونسی قابل اندازه گیری است. این میزان در طی حرکات ارتودونسی در سمت فشار افزایش می‌یابد.

کلید واژه‌ها: اسید فسفاتاز، مایع شیار لثه‌ای، حرکت دندانی.

*: دستیار تخصصی، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
(مؤلف مسئول) raha_kowsari@yahoo.com

: استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان، اصفهان، ایران.

: استاد، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان، اصفهان، ایران.

: استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان، اصفهان، ایران.

این مقاله در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۸ به دفتر مجله رسیده، در تاریخ ۹۰/۱/۱۸ اصلاح شده و در تاریخ ۹۰/۱/۲۹ تأیید گردیده است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
۱۲۱ تا ۱۱۴، (۲۷)، ۱۳۹۰

مقدمه

نیز مشاهده شده است[۱۶، ۵]. به کمک روش‌های بافت شناسی و بیوشیمیایی، پژوهش گران افزایش فعالیت اسید فسفاتاز[۱۷] و کاهش فعالیت آلکالین فسفاتاز موش‌ها را در ناحیه فشار[۱۸]، [۵] و افزایش فعالیت اسید فسفاتاز[۵] و آلکالین فسفاتاز[۱۸، ۵] را در ناحیه کشش در اطراف دندان‌های تحت درمان ارتودننسی تا ۷ روز بعد از فعال سازی وسیله‌ها در آن موش‌ها گزارش کردند.

حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا فعالیت آنژیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای ممکن است به عنوان یک نشانگر بیولوژیکی تشخیصی در تعیین پاسخ استخوان به نیروهای ارتودننسیک وارد به دندان مطرح گردد و توسط آن ریمودلینگ استخوان طی حرکات ارتودننسی کنترل شود، تا بتوان از وارد شدن نیروهای کنترل نشده به دندان و بافت‌های نگهدارنده آن ضمن حرکات ارتودننسی جلوگیری نمود یا خیر. در واقع اگر ممکن باشد که نتایج وارد شدن نیروهای ارتودننسی از نظر بیولوژیک زیر نظر گرفته شود و قابل پیشگویی باشد، نه تنها استفاده از دستگاه‌های ارتودننسی و هدایت حرکات را می‌توان بر پایه پاسخ‌های فردی انجام داد و بنابراین تأثیر درمان را بیشتر نمود، بلکه حل مشکلات مربوط به ریتشن نیز به کمک زیر نظر گرفتن سرعت ترن اور استخوان اطراف دندان ممکن است ساده‌تر گردد.

برای یافتن پاسخ این سؤال، این پژوهش طراحی شد تا میزان فعالیت اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای قبل و حین عقب بردن دندان کائین پس از کشیدن دندان‌های پره مولر اول با کمک تکنیک ارتودننسی اسلامیدینگ، مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش‌ها

افراد مورد پژوهش در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی شامل ۵ بیمار مراجعه کننده به مطب دندان‌پزشکی خصوصی جهت انجام درمان‌های ارتودننسی ثابت، با میانگین سنی ۲۰-۲۴ سال بودند. شرایط ورود به پژوهش عبارت بود از: ۱- وجود مال اکلوزن کلاس I دندانی به صورت بیرون زدگی دندان‌های هر دو فک و نیاز به کشیدن هر ۴ پره مولر اول و درمان ارتودننسی ثابت جهت عقب بردن ۴ دندان کائین. ۲- وجود حداقل بی نظمی سیستمیک. ۳- عدم استفاده از داروهای ضد التهاب قبل و در طول پژوهش. ۴- حداکثر ۲ میلی‌متر عمق پروینگ در کل

درمان‌های ارتودننسی ممکن به اصول بیومکانیک است. در واقع، پاسخ بیولوژیکی به سیستم نیرو باعث ایجاد حرکت دندان می‌شود[۱]. به دنبال اعمال فشار به دندان‌ها، ریمودلینگ استخوان شامل دوره‌های فعالیت، تحلیل و تشکیل در هر دو سمت فشار و کشش در اطراف دندان اتفاق می‌افتد که به ایجاد پاسخ التهابی حاد در بافت‌های پریودنتال منجر می‌گردد[۱-۴]. بررسی‌ها نشان داده‌اند که استئوکلاست‌ها در مرکز این توالی ریمودلینگ قرار دارند و مسؤول تحلیل استخوان و حرکت دندان هستند[۴]. نشان داده شده است که به دنبال اعمال نیرو توسط دستگاه‌های ارتودننسی ثابت در موش‌ها، تعداد استئوکلاست‌ها در لاکوناهای تحلیلی در نواحی فشار بعد از دو روز افزایش می‌یابد[۵]. علاوه بر استئوکلاست‌ها، ماکروفازها و فیبروبلاست‌ها نیز در پروسه تخریب بافتی در سمت فشار شرکت می‌کنند[۶-۵]. همه این سلول‌های تحلیلی، فعالیت زیادی از اسیدهیدرولازها را نشان می‌دهند[۷-۸]. علاوه بر این، مشخص شده است که استئوکلاست‌ها فعالیت بسیار زیادی از اکسیدوردوکتازها دارند[۵]. بنابراین طبیعی است که فعالیت آنژیم‌ها در مایع شیار لتهای هم تحت تأثیر حرکات ارتودننسی واقع شود؛ در حقیقت آنالیز مایع شیار لتهای ممکن است ابزار مفیدی جهت ارزیابی روند بیوشیمیایی زمینه‌ای مرتبط با ترن اور استخوانی در طول حرکت ارتودننسی دندان باشد[۹-۱۰]، که از این جمله بررسی آنژیم اسید فسفاتاز است. با این حال، پژوهش‌های کمی بر روی این آنژیم در لیگامان پریودنتال و تغییرات احتمالی آن در طول زمان در اثر نیروهای ارتودننسی وارد به دندان‌ها انجام شده است[۱۱، ۵].

اسید فسفاتاز از آنژیم‌هایی است که به طور معمول برای بررسی متابولیسم استخوان در نظر گرفته می‌شود[۱۲، ۱۳، ۵]. استئوکلاست‌ها استخوان را تجزیه می‌کنند و اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات با جذب فعال استخوان به واسطه استئوکلاست‌ها افزایش می‌یابد[۱۳، ۵]. تغییر در فعالیت اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز در سرم و استخوان به عنوان نشانگرهایی برای کنترل و زیر نظر گرفتن تغییرات استخوانی در چندین بیماری به کار گرفته شده است[۱۴]. استئوکلاست‌های حاوی مقداری زیاد اسید فسفاتاز، در بررسی روی موش در طی حرکات مختلف ارتودننسی

استفاده صحیح از مسوак و نخ دندان در روز پذیرش هر بیمار به وی آموزش داده می‌شد و در هر یک از مراحل بعدی نیز کاربرد صحیح این وسایل دوباره ارزیابی می‌گردید. پس از ردیف کردن دندان‌ها (به مدت یک ماه)، دستگاه اسلایدینگ برای عقب بردن کائین‌ها مورد استفاده قرار گرفت. تکنیک اسلایدینگ به کمک سیم ۱۶ میل با سطح مقطع گرد استیل و به وسیله زنجیر الاستومریک که نیرویی در حدود ± 200 گرم به دندان اعمال می‌کرد، اجرا گردید. در هر مرحله فعال سازی، نیرو به وسیله نیروستنج اندازه گیری می‌شد تا نیروی مساوی برای دندان‌ها و در افراد مختلف به کار رود (شکل ۲). به این ترتیب دو مین نمونه گیری از مایع شیار لثه‌ای بالا فاصله پس از بستن دستگاه‌های فوق انجام شد تا مسطح و ردیف کردن جزیی اولیه ثبت گردد.



شکل ۲. اندازه‌گیری میزان حرکت دندان با استفاده از کولیس دیجیتال بر حسب میلی‌متر

سومین نمونه گیری، ۱۵ روز بعد از نمونه گیری دوم و چهارمین نمونه گیری یک ماه پس از نمونه گیری دوم انجام گرفت و در هر یک از مراحل ۱۵ روزه و یک ماهه، اقدام به فعال سازی مجدد گردید.

در هر یک از مراحل چهارگانه، فاصله بین دو شاخص ثابت و کاملاً مشخص، یعنی برآکت‌های دندان‌های لترال اینسایزور و کائین، با کولیس دیجیتال (KT ltd, China) با دقت صدم میلی‌متر اندازه گیری شد تا مقدار حرکت دندان ثبت گردد. بعد از انتقال هر نمونه به آزمایشگاه، اندازه گیری آنزیم با

دندان‌های بیمار و عدم وجود خونریزی به هنگام پروب کردن. ۵- عدم حضور شواهد رادیوگرافی تحلیل استخوان پریودنال. اولین نمونه گیری بعد از نصب وسایل ارتودنی ثابت و قبل از شروع حرکت اولیه دندان کائین انجام گرفت. برای نمونه گیری از مایع شیار لثه‌ای در هر یک از مراحل، پس از تمیز کردن دهان و در حضور ساکشن قوی در دهان بیمار و استفاده از دهان بازن، هر ناحیه نمونه گیری توسط رل پنبه ایزوله می‌گردید. هرگونه پلاک فوق لثه‌ای قبل از نمونه گیری توسط رل پنبه به آرامی برداشته می‌شد و جریان هوای ملایم به مدت ۵ ثانیه جهت خشک کردن ناحیه به کار می‌رفت. سپس کن کاغذی شماره ۱۵ (Gapudent, China) به روش اینتراسولکولار به آرامی و با تأکید بر اجتناب از آسیب مکانیکی ناحیه، در شیار لثه در ناحیه دیستال دندان کائین قرار می‌گرفت و تا زمانی که مایع شیار لثه‌ای به اندازه ۶-۶ میلی‌متر کن کاغذی را به وضوح خیس می‌نمود، در محل باقی می‌ماند (شکل ۱)[۱۹-۲۴]. سپس با کمک یک پنس مستقیم ظریف، کن کاغذی به آرامی از شیار لثه خارج می‌شد و در لوله آزمایشی که از قبل به همین منظور آماده شده، حاوی 0.5 میلی لیتر سرم فیزیولوژی بود، قرار می‌گرفت و در لوله محکم بسته می‌شد. لوله آزمایش چندین بار به آرامی تکان داده می‌شد به گونه‌ای که سرم فیزیولوژی به طور کامل در کن کاغذی نفوذ کرده، مایع شیار لثه‌ای از کن کاغذی وارد سرم فیزیولوژی گردد. نمونه‌ها برای جلوگیری از غیر فعال شدن آنزیم، تا زمان انتقال به آزمایشگاه در یخچال در دمای 4°C درجه سانتی گراد نگهداری می‌شدند.



شکل ۱: نمونه‌گیری از مایع شیار لثه‌ای با کمک کن کاغذی در شرایط جداسازی با رل پنبه


دندان و تغییر فعالیت ویژه آنزیم در فاصله زمانی بین مراحل ۲ و ۳ و مراحل ۳ و ۴ مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

میانگین فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در زمان‌های مختلف در نمودار ۱ آمده است. بر اساس آزمون فریدمن، بین میانگین فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز در چهار زمان مورد بررسی در تکنیک اسلایدینگ اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت ($p < 0.001$). میانگین حرکت دندان بالا فاصله بعد از نصب وسایل و ۱۵ روز پس از فعال سازی اولیه، $1/13$ میلی‌متر و از آن زمان تا روز ۳۰ (مرحله ۴ نمونه گیری)، $1/21$ میلی‌متر اندازه گیری شد. بر اساس آزمون من ویتنی، میانگین مقدار حرکت دندان در فاصله زمانی بین شروع فعال سازی و ۱۵ روز بعد از آن با فاصله زمانی بین ۱۵ و ۳۰ روز پس از فعال سازی در تکنیک اسلایدینگ، اختلاف آماری معنی‌داری نداشت ($p = 0.215$). در ارزیابی همبستگی تغییر فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز و مقدار حرکت دندان، میانگین حرکت بین زمان‌های شروع فعال سازی تا ۱۵ روز پس از آن، $0/475$ میلی‌متر و تا ۳۰ روز بعد، $0/576$ میلی‌متر مشاهده شد که مقدار p value به ترتیب $0/086$ و $0/086$ به دست آمد. بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه بین تغییر فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز و مقدار حرکت دندان در فاصله زمان‌های شروع فعال سازی ۱۵ روز پس از آن و بعد از ۳۰ روز، در تکنیک از نظر آماری معنی‌دار نبود ($p = 0.215$).


استفاده از کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم به روش کینتیک انجام می‌شد [۲۵].

اندازه گیری فعالیت اسید فسفاتاز، بر اساس انجام واکنش زیر است:



در واقع اسید فسفاتاز واکنش‌های فوق را در محیط بافری سیترات با $\text{pH} = 4/8$ کاتالیز می‌کند و پارا نیترو فنول تولید می‌شود که زرد رنگ است و بنابراین افزایش جذب در 405 نانومتر متناسب با فعالیت اسید فسفاتاز موجود در نمونه خواهد بود.

روش اندازه گیری آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای به علت رقیق شدن مایع شیار لتهای در 500 حجم از سرم فیزیولوژی با تغییراتی نسبت به روش اندازه گیری آن در سرم انجام گرفت. این تغییرات شامل استفاده از حجم بیشتری از نمونه (200 میکرولیتر از نمونه مایع شیار لتهای به جای 20 میکرولیتر از سرم) و غلظت سوبسترانی 10 برابر بیشتر از غلظت مورد استفاده در روش اندازه گیری معمول آنزیم در سرم بود. از آزمون غیر پارامتریک فریدمن چهت مقایسه میانگین فعالیت ویژه آنزیم در زمان‌های مختلف استفاده شد. آزمون Mann-Whitney چهت مقایسه میانگین مقدار حرکت دندان در فاصله زمانی بین مراحل ۲ و ۳ و مراحل ۳ و ۴ به کار رفت. آزمون ضریب همبستگی پیرسون چهت بررسی رابطه مقدار حرکت



نمودار ۱. میانگین فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز (ACP) به تفکیک مراحل نمونه‌گیری در تکنیک اسلایدینگ

بحث

مقدار ریمودلینگ استخوان برای افزایش سطح بیوشیمیایی اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای، کافی نبوده است. برخی پژوهش‌های دیگر نیز یک دوره تأخیری بین تغییرات شدید در بار مکانیکی وارد شده به استخوان و ایجاد حداکثر پاسخ را نشان داده‌اند. از جمله در پژوهش Insoft و همکاران [۲۶] که در بخش مقطعی پژوهش خود، فعالیت فسفاتازها را در سه گروه هدگیر/ بایت پلیت، بايونیتور، و کنترل در اطراف مولر اول مانگیلا بررسی کردند، حداقل ۷ ماه طول کشید تا بعد از شروع درمان، تغییر معنی‌داری در فعالیت فسفاتازها در مایع شیار لتهای مشخص گردد. در این پژوهش نیز در مقایسه میانگین تغییر فعالیت اسید فسفاتاز در فواصل زمانی بین مراحل چهارگانه نمونه گیری، اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد. Gu و همکاران [۲۹] نیز ضمن بررسی تأثیر فعال سازی مجدد دستگاههای ارتودنسی پس از افت نیروی اولیه در rat، نشان دادند که فعال سازی مجدد به افزایش حرکت دندان و افزایش اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات منجر می‌گردد. Hashimoto [۳۰] با استفاده از مگنت به همراه دستگاههای ارتودنسی نرمال در گریه، افزایش ریمودلینگ استخوان، سرعت حرکت دندان و اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات را در بافت‌های تحت درمان ارتودنسی مشاهده نمود.

آزمون ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط تغییر فعالیت اسید فسفاتاز با مقدار حرکت دندان در فاصله زمانی بین مراحل دوم و سوم و همین طور مراحل سوم و چهارم انجام شد و ارتباط آماری معنی‌داری در فواصل زمانی مذکور بین تغییر فعالیت اسید فسفاتاز و مقدار حرکت دندان به دست نیامد. این یافته‌ها با یافته‌های حاصل از پژوهش Insoft و همکاران [۲۶] مطابقت ندارد. آنها دریافتند که اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای در طی دوره بیشترین مقدار حرکت دندان، افزایش معنی‌داری پیدا می‌کند. تفاوت در معنی‌داری ارتباط بین تغییر فعالیت اسید فسفاتاز و حرکت دندان در پژوهش فعلی و پژوهش Insoft ممکن است تیجه هرگونه تفاوت در روش پژوهش، نظریه تعداد نمونه‌ها، نوع حرکت ارتودنسی دندان، نحوه نمونه گیری (وسیله مورد استفاده در نمونه گیری)، طول مدت پژوهش و روش اندازه گیری فعالیت آنژیم اسید فسفاتاز باشد.

افزایش معنی‌دار فعالیت ویژه آنژیم اسید فسفاتاز موجود در مایع شیار لتهای در سمت فشار و هم‌خوانی آن با

در محنتیات مایع شیار لتهای، از حضور اسید فسفاتاز در این مایع یاد شده است [۲۶، ۲۰، ۱۲]. به عنوان یک اگزودا، مایع شیار لتهای بازتابی از تغییرات متابولیک در پریودنشیوم خواهد بود و به نظر می‌رسد که بتواند ابزار خوبی برای ارزیابی فرآیندهای بیوشیمیایی مرتبط با ترن اور استخوان در طی حرکات ارتودنتیک دندان باشد. بنابراین انجام پژوهشی که به این موضوع بپردازد، ضروری می‌نمود.

در همه گروه‌ها، فعالیت ویژه اسید فسفاتاز در طی زمان و با فعال سازی دستگاه‌ها وارد شدن نیروی فشاری به استخوان در سمت دیستال دندان به تدریج افزایش یافت. این یافته با تیجه تعدادی از پژوهش‌های هیستومورفومتریک [۲۷-۲۸، ۱۵-۱۶، ۵]، که افزایش سلول‌های حاوی اسید فسفاتاز را در طی حرکات ارتودنسی دندان در سمت فشار توضیح داده‌اند، همخوانی دارد. البته اغلب این پژوهش‌ها روی نمونه‌های حیوانی انجام شده است، ولی پژوهش‌هایی [۲۲، ۲۷] هم نشان داده‌اند که متعاقب افزایش میزان آنژیم‌های ناحیه دندان در حال حرکت، مقادیر آنژیم‌های موجود در مایع شیار لته نیز افزایش می‌یابند.

اطلاعات موجود در مورد سرم نشان داده است که فعالیت فسفاتازها پس از وارد شدن نیروی ارتودنسی بستگی به زمان دارد و افزایش اولیه و زود هنگام اسید فسفاتاز، که پس از آن کاهش می‌یابد، در حقیقت اولین بخش چرخه ریمودلینگ استخوان آلوئولار طی حرکات ارتودنسی دندان‌ها می‌باشد [۲۳]. در مدل‌های حیوانی نیز به وسیله اندازه گیری فسفاتازها و نیز طی پژوهش‌های هیستومورفومتریک، یافته‌های مشابهی از دوره تحلیل، معکوس شدن روند فعالیت و تشکیل به دست آمده است [۲۳، ۲۲]. این اطلاعات پیشنهاد می‌کنند که دوره‌های متعدد ریمودلینگ استخوان بعد از فعال سازی دستگاههای ارتودنسی، ممکن است با مراحل مختلف این درمان‌ها هماهنگ باشند؛ که این مسأله به کمک ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در مایع شیار لتهای قابل بررسی است.

پس از اولین زمان فعال سازی دستگاه (زمان نمونه گیری دوم)، یک دوره تأخیری تا رسیدن به حداکثر فعالیت ویژه آنژیم اسید فسفاتاز (زمان نمونه گیری چهارم) مشاهده شد (نمودار ۱)، که به این صورت قابل توجیه است که شاید در این مدت هنوز

نتیجه‌گیری

روند تغییرات فعالیت ویژه اسید فسفاتاز، مشابه شواهد هیستومورفومتری تحلیل استخوان در مراحل اولیه درمان ارتودنسی است. بنابراین، اندازه‌گیری فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لتهای ممکن است روش مفیدی برای زیر نظر گرفتن پاسخ‌های بافتی به درمان ارتودنسی باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله بر پایه پایان‌نامه دکترای عمومی به شماره ۲۳۸۱۰۲۰۱۸۲۲۰۰ مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان نوشته شده است.

پژوهش‌های هیستومورفومتریک، این نظریه را مطرح می‌کند که ممکن است بتوان توسط نمونه‌گیری از مایع شیار لتهای برای تعیین فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز، تحلیل استخوان آلوئولار را بررسی نمود. البته پیش از اعلام قطعی چنین نظریه‌ای، لازم است اطلاعات حاصل از پژوهش‌های هم‌زمان طولی بیوشیمیایی و هیستومورفومتریک در یک دوره کامل از حرکت ارتودنسی دندان تا پایان فاز نگهداری درمان‌های ارتودنسی، آن را تأیید کنند.

افزایش تعداد نمونه‌ها و زمان پیگیری بیماران، در مطالعات آتی توصیه می‌گردد. اندازه‌گیری هم‌زمان فعالیت ویژه آنزیم و تغییرات هیستومورفومتری پیشنهاد می‌شود.

References

- Nanda R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. 1st ed. St.louis: Elsevier Saunders; 2005. p. 103-8.
- Perinetti G, Paolantonio M, D'Attilio M, D'Archivio D, Tripodi D, Femminella B, et al. Alkaline phosphatase activity in gingival crevicular fluid during human orthodontic tooth movement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(5): 548-56.
- King GJ, Keeling SD, Wronski TJ. Histomorphometric study of alveolar bone turnover in orthodontic tooth movement. Bone 1991; 12(6): 401-9.
- Norton LA, Burstone CJ. The Biology of tooth movement. London: CRC Press; 1989. p. 82-5.
- Lilja E, Lindsjog S, Hammarstrom L. Histochemistry of enzymes associated with tissue degradation incident to orthodontic tooth movement. Am J Orthod 1983; 83(1): 62-75.
- Kvam E. A study of the cell-free zone following experimental tooth movement in the rat. Rep Congr Eur Orthod Soc 1969; 419-34.
- Deporte DA, Cate AR. Fine structural localization of acid and alkaline phosphatase in collagen-containing vesicles of fibroblasts. J Anat 1973; 114(Pt 3): 457-61.
- BURSTONE MS. Histochemical demonstration of acid phosphatase activity in osteoclasts. J Histochem Cytochem 1959; 7(1): 39-41.
- Last KS, Donkin C, Embery G. Glycosaminoglycans in human gingival crevicular fluid during orthodontic movement. Arch Oral Biol 1988; 33(12): 907-12.
- Grieve WG, III, Johnson GK, Moore RN, Reinhardt RA, DuBois LM. Prostaglandin E (PGE) and interleukin-1 beta (IL-1 beta) levels in gingival crevicular fluid during human orthodontic tooth movement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 105(4): 369-74.
- Brooks PJ, Nilforoushan D, Manolson MF, Simmons CA, Gong SG. Molecular markers of early orthodontic tooth movement. Angle Orthod 2009; 79(6): 1108-13.
- Binder TA, Goodson JM, Socransky SS. Gingival fluid levels of acid and alkaline phosphatase. J Periodontal Res 1987; 22(1): 14-9.
- Henry JB. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 19th ed. Philadelphia: Saunders; 1996. p. 23-8.
- Epstein S. Serum and urinary markers of bone remodeling: assessment of bone turnover. Endocr Rev 1988; 9(4): 437-49.
- Kawarizadeh A, Bourauel C, Zhang D, Gotz W, Jager A. Correlation of stress and strain profiles and the distribution of osteoclastic cells induced by orthodontic loading in rat. Eur J Oral Sci 2004; 112(2): 140-7.
- Bonafe-Oliveira L, Faltin RM, Arana-Chavez VE. Ultrastructural and histochemical examination of alveolar bone at the pressure areas of rat molars submitted to continuous orthodontic force. Eur J Oral Sci 2003; 111(5): 410-16.

17. Takimoto K, Deguchi T, Mori M. Histochemical detection of acid and alkaline phosphatases in periodontal tissues after experimental tooth movement. *J Dent Res* 1968; 47(2): 340.
18. Engstrom C, Granstrom G, Thilander B. Effect of orthodontic force on periodontal tissue metabolism. a histologic and biochemical study in normal and hypocalcemic young rats. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1988; 93(6): 486-95.
19. Stoller NH, Karras DC, Johnson LR. Reliability of crevicular fluid measurements taken in the presence of supragingival plaque. *J Periodontol* 1990; 61(11): 670-3.
20. Newman MG, Takei HH, Carranza FA, Klokkevold PR. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Saunders Elsevier; 2006. p. 337-54.
21. Lamster IB, Oshrain RL, Harper DS, Celenti RS, Hovliaras CA, Gordon JM. Enzyme activity in crevicular fluid for detection and prediction of clinical attachment loss in patients with chronic adult periodontitis. Six month results. *J Periodontol* 1988; 59(8): 516-23.
22. Lamster IB, Hartley LJ, Vogel RI. Development of a biochemical profile for gingival crevicular fluid. Methodological considerations and evaluation of collagen-degrading and ground substance-degrading enzyme activity during experimental gingivitis. *J Periodontol* 1985; 56(11 Suppl): 13-21.
23. Keeling SD, King GJ, McCoy EA, Valdez M. Serum and alveolar bone phosphatase changes reflect bone turnover during orthodontic tooth movement. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1993; 103(4): 320-6.
24. Isik F, Sayinsu K, Arun T, Unlucerci Y. Bone marker levels in gingival crevicular fluid during orthodontic intrusive tooth movement: a preliminary study. *J Contemp Dent Pract* 2005; 6(2): 27-35.
25. 1996; 241(2): 167-72.
26. Insoft M, King GJ, Keeling SD. The measurement of acid and alkaline phosphatase in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1996; 109(3): 287-96.
27. King GJ, Latta L, Rutenberg J, Ossi A, Keeling SD. Alveolar bone turnover and tooth movement in male rats after removal of orthodontic appliances. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 1997; 111(3): 266-75.
28. Von Bohl M, Maltha J, Von den HH, Kuijpers-Jagtman AM. Changes in the periodontal ligament after experimental tooth movement using high and low continuous forces in beagle dogs. *Angle Orthod* 2004; 74(1): 16-25.
29. Gu G, Lemery SA, King GJ. Effect of appliance reactivation after decay of initial activation on osteoclasts, tooth movement, and root resorption. *Angle Orthod* 1999; 69(6): 515-22.
30. Hashimoto H. Effect of micro-pulsed electricity on experimental tooth movement. *Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi* 1990; 49(4): 352-61.

Evaluation of specific activity of acid phosphatase in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movements

Alireza Omrani, Manouchehr Mesripoor, Raha Kowsari Isfahan*,
Arash Motaghi

Abstract

Introduction: Analysis of gingival crevicular fluid (GCF) may be a good means of examining the biochemical processes associated with bone turnover. The aim of this study was to evaluate the specific activity of acid phosphatase (ACP) in GCF during canine retraction with sliding technique.

Materials and Methods: In this clinical trial 5 subjects (aged 12–20 years) with bimaxillary dentoalveolar protrusion were selected. After extraction of four first premolars, the sliding technique was used to retract canines in each subject. GCF samples were collected from the distal aspect of each canine by using sterile paper points (#15) at four time intervals: immediately after the appliances were fitted, at the time of initial activation, and 15 and 30 days afterwards. Acid phosphatase and microprotein levels were assayed by means of quantitative colorimetric technique. Tooth movement at each sampling interval was measured. Data was analyzed with non-parametric tests of Freeman, Mann-Whitney, and Pearson's correlation coefficient ($\alpha=0.05$).

Results: After activation of the appliances, average specific activity of acid phosphatase in GCF significantly increased (p value < 0.001). In addition, the specific activity of ACP at sampling intervals showed significant differences (p value < 0.001). No significant relation was noted between changes in specific activity of ACP and tooth movement (p value = 0.215).

Conclusion: It is possible to measure specific activity of acid phosphatase in the GCF during orthodontic tooth movements. It is elevated in the pressure side during orthodontic tooth movement.

Key words: Acid phosphatase, Gingival crevicular fluid, Tooth movement.

Received: 18 Jan, 2011 **Accepted:** 18 Apr, 2011

Address: Postgraduate student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Email: raha_kowsari@yahoo.com

Journal of Isfahan Dental School 2011; 7(2): 121.