

نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده

۱. دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲. دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۳. نویسنده‌ی مسؤول: گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

Email: g_yadegarfar@yahoo.co.uk

علی نوحه خوان^۱

فهیمه سلامی^۲

قاسم یادگارفر^۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۳

تاریخ اصلاح: ۱۳۹۷/۴/۲۰

تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۴

استناد به مقاله: نوحه خوان علی، سلامی فهیمه، یادگارفر قاسم. نقدی بر مقاله‌ی مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. ۱۳۹۷؛ ۳(۱۴): ۳۲۸-۳۲۹.

نتایج مداخله و پیامد را اندازه‌گیری می‌کند و سوگرایی تحلیل‌گر. کورسازی این سه گروه نسبت به گروه‌های تخصیص یافته راه پیشگیری از این تورش هاست است (۲). در این مطالعه از کورسازی بحث نشده است، لذا نتایج مطالعه بالقوه می‌تواند تحت تأثیر این تورش‌ها باشد.

۲- در روش اجرای مقاله، چگونگی جزئیات تعیین حجم نمونه، تصادفی‌سازی و تخصیص نمونه‌ها به هر یک از ۴ گروه دیده نمی‌شود.

۳- در این مقاله برای اندازه‌گیری نشت میکروبی، از مدل نشت میکروبی (Eppendorf) استفاده شده، اما جزئیات و مدل دستگاه و روش اندازه‌گیری نشت میکروبی ارائه نشده است.

۴- در جدول ۱ مشخص نیست مقاطع مختلف کرونال چگونه نشان داده شده‌اند. آیا منظور از کلمه "شماره" در جدول ۱ که بالای مقطع گروه سنی نوشته شده است همان مقاطع مختلف کرونال هستند؟

۵- در قسمت نتایج، مقدار ریزنشت به دست آمده برای هیپوکلریت سدیم بالاتر از آب مقطر گزارش شده است

سردبیر محترم مجله دانشکده دندانپزشک

با سلام، مقاله‌ای با عنوان «مقایسه‌ی اثر چهار شوینده‌ی رایج کانال ریشه، روی ریزنشت باکتریایی کانال‌های ریشه‌ی پر شده» (۱) در مجله‌ی دانشکده دندانپزشکی اصفهان، دوره‌ی ۱۱، شماره‌ی ۲ خرداد و تیر ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.

در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، ۸۴ دندان تک ریشه‌ی انسان، پاک‌سازی شدند. نمونه‌ها در ۴ گروه آزمون $n = 19$ و دو گروه شاهد مثبت و منفی ($n = 4$) تقسیم گردیدند. محققان نتیجه گرفتند، کاهش ریزنشت به دنبال کاربرد هر ۴ شوینده اتفاق افتاد و کاهش در گروه کلرهگزیدین و داکسی‌سیکلین بیشتر بود (۱).

بررسی ۴ نوع ماده‌ی رایج شیستشوی کanal، روش دقیق آزمایشگاهی برای تعیین ریزنشت و استفاده از گروه شاهد مثبت و منفی، از نقاط قوت این مطالعه بودند. ضمن تشکر و تقدیر از نویسنندگان این مقاله، به نظر می‌رسد نکات زیر قابل بحث باشد:

۱- تخصیص نمونه‌ها، سوگرایی مشاهده‌گر (فردی) که

- ۷- اشتباه چاپی در خلاصه‌ی مقاله در قسمت نتیجه‌گیری اصلاح شود.
- ضمن آرزوی موفقیت‌های روزافرون برای آن مجله و محققان محترم در عرصه‌ی علم، منظر چاپ این «نامه به سردبیر» و توضیح نویسنده‌گان ارجمند مقاله در خصوص سؤالات مطرح شده هستیم.
- (نمودار ۱). با خواص هیپوکلریت سدیم نسبت به دیگر شستشو دهنده‌های داخل کanal (۳)، ارائه‌ی تفسیری بر غنای یافته‌ها می‌افزاید.
- ۶- با توجه به تأثیر گیج سوزن برای شستشو در نفوذ مایع شستشو دهنده در کanal ریشه، گیج سوزن مورد استفاده ذکر شود (۴، ۵).

References

1. Jahadi S, Khademi AA, Seyed-Marvasti R, Dehghannejad M. Comparison of the effect of four common irrigants on microbial leakage in obturated root canals. *J Isfahan Dent Sch* 2015; 11(2): 103-9. [In Persian].
2. Sedgwick P. Confounding in randomised controlled trials. *BMJ* 2010; 341: c5403.
3. Mohammadi Z. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. *Int Dent J* 2008; 58(6): 329-41.
4. Abou-Rass M, Piccinino MV. The effectiveness of four clinical irrigation methods on the removal of root canal debris. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1982; 54(3): 323-8.
5. Usman N, Baumgartner JC, Marshall JG. Influence of instrument size on root canal debridement. *J Endod* 2004; 30(2): 110-2.