

طراحی و ساخت نرم افزار Iran CDX برای تشخیص بدخیمی و دیسپلازی در نمونه های سیتولوژی با برس دهان و ارزیابی عملکرد آن

۱. دکترای تخصصی، گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
۲. **نویسنده مسؤول:** گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
Email: arash.mottaghi@gmail.com
۳. گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
۴. دکترای تخصصی، دانشکده متالوژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
۵. گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

سارا عرب لودریچه^۱

آرش متقی^۲

نوشین افشارمقدم^۳

بهزاد صادقیان^۴

مهردی ثمن بوی^۵

چکیده

مقدمه: تشخیص زود هنگام سرطان، به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن، امری حیاتی است. ضایعات پیش سرطانی دهان، پتانسیل تبدیل به SCC (Squamous cell carcinomas) یا سرطان سلول سنگفرشی را دارند و باید بررسی شوند. براش سیتولوژی، یک روش ساده است که نمونه های از ابی تلیوم می دهد. آنالیز کامپیوترا، نقش مهمی در تفسیر نمونه های پاتولوژی دارد.

مواد و روش ها: نرم افزار مورد نظر، توسط گروه مهندسی در شبکه ای عصبی طراحی شد و توسط نمونه های تهیه شده از بیماران، آموزش دید. در مرحله ای بعد، از تعداد ۲۰ بیمار مبتلا به سرطان و ۲۰ فرد سالم، نمونه براش سیتولوژی تهیه شد. از هر لام، ۵۰ تصویر دیجیتال توسط دوربین زیرمیکروسکوپ گرفته شد و وارد نرم افزار گردید. نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار Excel مورد بررسی آماری قرار گرفتند.

یافته ها: نرم افزار مورد مطالعه در کل ۲۰۰۰ تصویر دیجیتال، ۹۱ خطأ داشت. مقایسه نتایج نرم افزار با نتایج اسکالپل بیوپسی بیماران، توسط آزمون فیشر، تفاوت معنی داری نشان نداد ($p = 0.004$).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، نرم افزار طراحی شده، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.

کلید واژه ها: کارسینومای سلول سنگفرشی، شبکه ای عصبی، براش سیتولوژی.

تاریخ بذریش: ۱۳۹۷/۸/۱۴

تاریخ اصلاح: ۱۳۹۷/۷/۲

تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳

استناد به مقاله: عرب لودریچه سارا، متقی آرش، افشارمقدم نوشین، صادقیان بهزاد، ثمن بوی مهدی. طراحی و ساخت نرم افزار Iran CDX برای تشخیص بدخیمی و دیسپلازی در نمونه های سیتولوژی با برس دهان و ارزیابی عملکرد آن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. ۱۳۹۷؛ ۱۴: ۳۴۸-۳۵۸.

مقدمه

در شرایط سیستمیک که باعث تنوعات شکلی در هسته و سیتوپلاسم می‌شوند استفاده کرد. مخاط دهان، منعکس کننده‌ی بسیاری از شرایطی است که در بدن اتفاق می‌افتد (۷). سیتولوژی اکسفولیتیو دهان، یک فرایند ارزان قیمت برای ارزیابی و تشخیص زودهنگام است. این روش، ساده، ایمن و در دسترس می‌باشد (۳).

سیتولوژی دهان، بر اساس مانیتور کردن سلول‌های پوسته پوسته شده از مخاط دهان است که یک روش تشخیصی در اختلالات بدخیمی و پیش‌بدخیمی می‌باشد. به تازگی از سیتولوژی در پیشگویی بیماری‌هایی مثل دیابت و آنمی و مشکلات هورمونی استفاده می‌شود. در روش‌های جدید، نمونه‌های سیتولوژی جهت بررسی محتوای DNA و RNA، شناسایی مارکرهای ایمونوہیستوشیمیایی در سلول‌های تومورال آنالیز می‌شوند (۸). سیتولوژی یک روش ساده و غیر تهاجمی در دسترس و بدون ریسک است که از محدودیت‌های آن حساسیت و اختصاصیت پایین و جواب‌های منفی کاذب است که با پیشرفت روش‌های آزمایشگاهی این مشکلات مرتفع شده است. از این روش برای پیگیری بیمارانی که بیماری آنها تشخیص داده شده است استفاده می‌شود (۲، ۸).

LBC (Liquid-based cytology) روشی است که در آن به جای اینکه یک اسمیر روی لام تهیه کنیم، می‌توان چند لام از سوسپانسیون به دست آمده تهیه کرد. در این روش، کمیت و کیفیت اسمیر تهیه شده افزایش یافته است (۲). در سال ۱۹۹۰ LBC نشان داده شد که مزایایی نسبت به روش سیتولوژی معمول دارد. LBC باعث کاهش مشکلات مرتبط با نمونه‌گیری و آماده‌سازی اسمیر بهتر و کاهش موارد منفی کاذب می‌شود. اما LBC نیازمند تجهیزات و مواد گران است که ممکن است تهیه و تدارک آن برای بیماران در کشورهای فقیر، غیر ممکن باشد. این روش نیازمند فیلتراسیون و سیتوسانتریفیوز و تجهیزات کامپیوتراژی جهت تهیه نمونه‌های لایه‌ای از سلول‌های روی لام می‌باشد (۳).

سرطان دهان، یک مشکل جهانی است که بروز مرگ و میر ناشی از آن افزایش یافته است. این بیماری از شایع‌ترین سرطان‌ها در بسیاری از کشورها می‌باشد که طبق آمار، سالانه ۳۰۰ هزار نفر در جهان دچار آن می‌شوند (۱). با تشخیص زودهنگام سرطان دهان، کیفیت زندگی افراد افزایش می‌یابد که علت آن کاربرد درمان‌هایی با تهاجم کمتر است. بسیاری از سرطان‌های سلول سنگفرشی، از ضایعات پیش‌بدخیمی مثل لکوپلاکیا و اریتروپلاکیا و لیکن‌پلان منشأ می‌گیرد. بنابراین ضایعات دهانی بدون اتیولوژی مشخص، نیاز به ارزیابی برای رد دیسپلازی و کارسینوما دارند. متاسفانه طبق آمار، ۵۰ درصد بیماران به دلیل تشخیص دیر هنگام، دچار متاستاز شده‌اند. پرونگونز بیماران با کارسینومای سلول سنگفرشی با تشخیص زودهنگام بهتر است (۱، ۲). تشخیص زودهنگام ضایعات پیش‌بدخیم و سرطانی به بهبود بقا کمک می‌کند (۳). شواهد محکمی وجود دارد که مشاهده، به تنهایی روش مناسبی برای تشخیص سرطان از ضایعات خوش‌خیم نیست (۴، ۵). استاندارد طلایی در تشخیص ضایعات بدخیم، Scalpel biopsy و بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه است. این یک روش تهاجمی است که مستلزم جراحی می‌باشد و محدودیت‌های حرفة‌ای برای جراح و مشکلات روانی را برای بسیاری از بیماران به همراه دارد (۶). یکی دیگر از محدودیت‌های این روش، تصمیم‌گیری برای انتخاب محل مناسب جهت تهیه نمونه در ضایعات بزرگ است (۲). مدت زمان زیادی است که از این روش جهت شناسایی ضایعات بدخیم و پیش‌بدخیمی در حفره‌ی دهان استفاده می‌شود. امروزه رویکرد جدید مخصوصاً، روش‌هایی ساده‌تر و غیر تهاجمی و بدون درد و در دسترس مثل سیتولوژی و استفاده از محلول تولوییدن بلو و غیره می‌باشد (۱). مخاط دهان به سرعت در حال تکثیر و ریزش است و سلول‌های آن به طور مداوم در حال پوسته شدن هستند. از این سلول‌ها می‌توان به عنوان یک راه تشخیصی

روزها داده‌های تصویر دیجیتال برای آنالیز تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد. Computer Assisted Diagnosis (CAD) به کمک آنالیز کامپیوتری) امروزه نقش مهمی در تفسیر نمونه‌های پاتولوژی دارد. تلاش‌های بسیاری جهت کشف الگوریتم‌های جدید برای طراحی نرم‌افزارهای مناسب جهت پردازش تصاویر میکروسکوپی دیجیتال در تعیین پرونگونز و مرحله‌ی بیماری انجام شده است. بعد از تهیه‌ی یک تصویر دیجیتال از نمونه‌ی آماده شده، ارزیابی دستی نمونه باعث تنوعات تشخیصی می‌شود. برای رفع این مشکل، تکنیک‌های جدید کامپیوتری برای تشخیص بهتر طراحی شده است (۵).

مواد و روش‌ها

این مطالعه شامل دو بخش است: در مرحله‌ی اول این مطالعه، طراحی نرم‌افزار Iran CDX قرار دارد که توسط گروه مهندسی پردازش تصویر در شهرک علمی-تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.

برای انجام این مرحله باید اطلاعات تصویری برای طراحی نرم‌افزار تهیه می‌شد. بنابراین از ۵ بیمار سالم و ۵ بیمار کارسینوم سلول سنگفرشی به روشنی که در مرحله‌ی دوم توضیح داده می‌شود، نمونه‌ی سیتوولوژی به روش LBC تهیه شد. از هر لام، ۱۵۰ تصویر دیجیتال تهیه شد.

Nikon-CORP تصاویر دیجیتال توسط دوربین (Nikon D5000 (JAPAN زیر میکروسکوپ Nikon مدل ECLPSE-E200 تهیه شد و در نمونه‌ها سلول‌های دیسپلاستیک نشانه‌های دیسپلازی برای طراح نرم‌افزار Iran CDX شرح داده شد. این نشانه‌ها شامل موارد زیر است:

- (۱) افزایش نسبت هسته به سیتوپلاسم
- (۲) وجود هستک
- (۳) وجود کروماتین خشن
- (۴) شکل و سایز غیرعادی هسته

روش LBC در ابتدا برای سرطان رحم استفاده می‌شد. این روش مشکلاتی که در روش سنتی وجود داشت را کاهش داد و باعث آماده‌سازی اسمايرها با سلولاتی بالا و یک لایه‌ی نازک و هموژن سلولی شد. این روش کیفیت اسماير تهیه شده را بالا می‌برد (۹).

نیاز به روش‌های آنالیز کامپیوتری جهت افزایش دقت و حساسیت سیتوولوژی احساس می‌شود. ORAL CDX یک روش کمکی کامپیوتری ساخت کشور آمریکا است که برای نمونه‌هایی که با تکنیک بیوسپی با برس تهیه می‌شود، طراحی شده است. این تکنیک دقت تفسیر نمونه را وقتی از ضخامت کامل اپیتلیوم تهیه شود، بالا می‌برد. در آنالیز کامپیوتری با کار بر روی تصویر میکروسکوپی دیجیتال از سلول‌های نمونه از طریق Neural network تخصصی که اساس سیستم پردازش تصویر است برای تشخیص سلول‌های سرطانی و پیش سرطانی از سلول سالم استفاده می‌شود (۷، ۸). روش بیوسپی با کمک آنالیز کامپیوتری، یک روش ساده، ارزان و حساس است. بیوسپی با برس یک نمونه‌ی ترانس اپیتلیال با حضور تمام لایه‌های اپیتلیوم را فراهم می‌کند. این نمونه با کمک برس‌های مخصوص یا مساوک تهیه می‌شود (۱). وسیله‌ای که در این روش استفاده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که با کمترین تروما نمونه را بردارد و در تمام نقاط دهان قابل کاربرد باشد و نمونه را با عمق کافی بردارد تا لایه‌ی بازال را هم شامل شود. زیرا گاهی دیسپلازی محدود به لایه‌ی بازال است (۲).

سیستم‌های تجاری در دسترس برای بیوسپی با برس به کمک آنالیز کامپیوتری مثل ORAL CDX یک فریند تشخیصی با حساسیت بالا و مثبت کاذب پایین برای تشخیص دیسپلازی در مراحل ابتدایی سرطان هاست. این روش، پلی بین معاینه و بیوسپی اسیژنال یا اسیژنال ضایعه است و مشخص می‌کند آیا ضایعه نیاز به بیوسپی دارد یا نه (۴). وقتی کلینیسین از ضایعه، نمونه‌برداری می‌کند، پاتولوژیست بر اساس شکل هسته و سیتوپلاسم، تشخیص می‌گذارد و بافت نرمال را از غیر نرمال تفکیک می‌کند. این

وروودی، پردازش می شود و ورودی پردازش شده به عنوان خروجی فرستاده می شود. این خروجی ورودی نورون های بعدی است.

توابع خطی و S_شکل توابع انتقال پر کاربرد در شبکه های عصبی می باشدند. در این مطالعه از نرم افزار Matlab برای مدل سازی استفاده شد.

در این مطالعه برای پیش بینی اثرات سرطان بر تصاویر (Principal Component Analysis) PCA (تحلیل مؤلفه های اصلی) از یک ساختار Perceptron چند لایه ای پیش خور استفاده شد. این ساختار شامل یک لایه ای ورودی و یک یا چند لایه ای پنهان و یک لایه ای خروجی می باشد. در این مطالعه از یک تابع فعال تائزانت های پر بولیک غیر خطی (Tagsig) به عنوان لایه ای پنهانی و از یک تابع فعال خطی برای لایه ای خروجی استفاده شد.

$$f(n) = \frac{e^n - e^{-n}}{e^n + e^{-n}}$$

همچنین از روش آزمون و خطا برای به دست آوردن تعداد بهینه نورون ها در لایه ای پنهان استفاده کردیم. ورودی ویژگی های استخراج شده از تصاویر می باشد و عدد صفر به معنی ریسک سرطان و عدد یک به معنی عدم ریسک سرطان است.

برای به دست آوردن بهترین مقادیر برای وزن ها و بایاس ها و به حداقل رساندن تابع خطا بین خروجی مدل شده و خروجی واقعی از یک الگوریتم آموزش استفاده شد (۱۳). چون روش استاندارد، معایب زیادی دارد، در این مطالعه از روش لوبرگ-مارکارد برای آموزش شبکه عصبی استفاده شد. روش LM تخمینی از روش نیوتونی می باشد (۱۴).

در این مطالعه بعد از پیدا کردن تعداد بهینه نورون ها در لایه ای پنهانی بهترین ساختار شبکه با کمترین میانگین مربعات خطا و بیشترین ضریب تعیین با استفاده از روش آزمون و خطا در یک چرخه تکرار شونده حاصل شد. بعد از این که شبکه با استفاده از ورودی ها و الگوریتم یادگیری آموزش داده شد، رابطه بین متغیرهای ورودی و

- ۵) پررنگ شدن هسته
- ۶) شکل و سایز غیر عادی سلول
- ۷) افزایش سایز هسته
- ۸) میتوز غیر عادی
- ۹) افزایش تعداد هستک (۱۰).

طراحی نرم افزار با زبان برنامه نویسی پایتون (Python) انجام شد. این زبان برنامه نویسی در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند توسط خودوان روسم (Guido van Rossum) طراحی شد. الگوریتم مربوطه به صورت شبکه عصبی نوشته شد که در زیر آورده شده است.

پردازش تصویر

مدل سازی با شبکه های عصبی مصنوعی

امروزه با پیشرفت کامپیوتر، هوش مصنوعی ابزاری بسیار مهم در فرایند مدل سازی می باشد. شبکه های عصبی مصنوعی که شبیه سازی از شبکه عصبی بیولوژیک هستند، مدل هایی محاسباتی می باشند که می توانند مسائلی را که انسان، کامپیوتر و ماشین حساب های معمولی قادر به حل آنها نیستند را حل کنند.

شبکه های عصبی، شامل اتصالات پیچیده از واحد هایی به نام نورون است که دارای وزن و توابع انتقال و الگوریتم یادگیری می باشند. این شبکه ها بر اساس معماری و توابع انتقال و الگوریتم یادگیری، به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند.

شبکه عصبی یک ورودی و خروجی می گیرد و رابطه ریاضی بین داده های ورودی و خروجی پیدا می کند. حسن شبکه های عصبی به غنی بودن داده های ورودی آن است (۱۱، ۱۲).

ورودی در این شبکه ها به صورت زیر است:

$$n = \sum_j W_{ij} P_j + b_i$$

در این فرمول W_{ij} وزن از عنصر j به i ام می باشد. عدد n سپس به تابع انتقال فرستاده می شود و پس از آن

متوسط ۱۰ حرکت تهیه شد به طوری که نقاط خونریزی دهنده کوچک در محل مورد نظر ایجاد می‌کرد (۱۵).

محل نمونه در گروه سالم از مخاط سالم باکال افراد گرفته شد و در افراد گروه بیمار، از محل ضایعه در مکانی بدون زخم و غشا نکروتیک تهیه شد.

سر مسوак پس از تهیه نمونه از دسته جدا شد و در محلول مخصوص دستگاه سیتولوژی E_Prep (محلول GYN) قرار گرفت و برای لابراتوار فرستاده شد. در لابراتوار نمونه‌ها داخل شیکر مخصوص دستگاه به مدت ۲۰ ثانیه قرار داده می‌شد. بعد از آن، نمونه‌ها به دستگاه E_Prep ساخت کارخانه Celtrazone کره جنوبی منتقل شده و به صورت اتوماتیک نمونه روی لام مخصوص دستگاه منتقل شد. این لام، به دلیل چسبندگی از شسته شدن سلول‌ها جلوگیری می‌کند. در مرحله‌ی بعد، نمونه‌ها توسط الكل اتابول ۹۵ درصد، ثابت شده و توسط رنگ‌آمیزی پاپانیکولا رنگ‌آمیزی شد.

از لام‌های تهیه شده با روش مذکور (E-pre, Nikon-) دوربین (Celtrazone, Korea CORP, Japan) با بزرگنمایی $\times 100$ ، زیر میکروسکوپ Nikon مدل ECLPSE-E200 تصویربرداری گردید و تصاویر به نرم افزار Iran CDX داده شد و نتایج پردازش خود را به صورت سالم و ناسالم اعلام کرد (۱۶).



تصویر ۱. دیجیتال تهیه شده از لام، توسط دوربین میکروسکوپ نوری

خروجی به دست آمد. در این مطالعه برای اینکه بفهمیم مدل صحیح است، از روش پاریشن‌بندی *Kتابی* استفاده کردیم. فرمول شماره‌ی یک خطای MSE را برای تعداد مختلف نورون در لایه‌ی پنهانی نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود با تغییر تعداد نورون‌ها در لایه‌ی پنهانی، خطای تغییر کرده و ۱۱ نورون برای لایه‌ی پنهانی مقدار قابل اعتمادی برای شبکه می‌باشد.

در مرحله‌ی دوم، تعداد ۲۰ بیمار دچار کارسینوم سلول سنگفرشی که قبلًاً توسط اسکالپل بیوپسی تأیید شده‌اند و تعداد ۲۰ بیمار سالم مراجعه کننده به بخش بیماری‌های دهان دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان نمونه‌ی بیوپسی با برس تهیه گردید. از تمام بیماران رضایت‌نامه‌ی کتبی گرفته شد. نمونه‌ها به لابراتوار ارسال شدند و از هر بیمار، یک لام سیتولوژی توسط دستگاه E_prep تهیه شد. تصاویر دیجیتال توسط دوربین زیر میکروسکوپ تهیه شد و توسط نرم افزار Iran CDX نیز به صورت سالم و ناسالم تشخیص گذاشته شد (۱۵).

مرحله‌ی ارزیابی نرم افزار

این مرحله از مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی است که روی ۴۰ بیمار صورت گرفت. شرط ورود به مطالعه برای گروه بیمار (۲۰ بیمار از مراجعه کنندگان به مطب متخصصین مربوطه)، بیماران دچار کارسینوم سلول سنگفرشی بودند که قبلًاً توسط اسکالپل بیوپسی تأیید شده و رضایت‌نامه‌ی کتبی را پر کردند.

برای تهیه بیوپسی با برس، بیمار باید دهان خود را با آب حدود ۳۰ ثانیه می‌شست. وسیله‌ی بیوپسی مسوак نرم کودکان استریل شده توسط اتوکلاو بود. در بیوپسی با برس در دهان از برash‌های مخصوص پاپ‌اسمیر نمی‌توان استفاده کرد چون توانایی کافی در برداشت مخاط دهان را ندارد. نمونه‌ها با فشار یکنواخت با حرکت رفت و برگشت، به طور

فتوگرافی از هر لام، ۵۰ مورد بود. هر فتوگرافی به طور جداگانه وارد نرم افزار شد و نتایج به صورت سالم و ناسالم ثبت گردید. نتایج وارد نرم افزار Excel شد و نتایج به صورت جدول و نمودار ثبت گردید که در ادامه آمده است.

طبق نتایج به دست آمده در گروه بیماران مبتلا به سرطان، تمام نتایج به دست آمده از نرم افزار به صورت ناسالم اعلام شد به این معنی که تمام نمونه‌ها را صحیح تشخیص داده است.

در این صورت از ۲۰ بیمار که از هر بیمار، ۵۰ فتوگرافی از لام مربوطه تهیه شده بود (یعنی ۱۰۰۰ فتوگرافی) هر ۱۰۰ مورد به صورت ناسالم ثبت گردید و نرم افزار ۱۰۰ درصد عکس‌ها را صحیح تشخیص داد.

در گروه شاهد یا همان افراد سالم، نتایج به دست آمده از نرم افزار در ۲۰ فرد که از هر لام ۵۰ فتوگرافی تهیه شده بود (یعنی ۱۰۰۰ فتوگرافی) ۹۱ مورد به صورت ناسالم و ۹۰۹ مورد به صورت سالم ثبت گردید. به این معنا که نرم افزار ۹۰/۹ مورد را صحیح تشخیص داده و در ۹/۱ مورد خطأ داشته است.

با توجه به این که در کل فتوگرافی‌ها یعنی ۲۰۰۰ فتوگرافی، ۹۱ مورد سالم را ناسالم تشخیص داد و سایر نتایج درست بود، پس در کل ۴/۵۵ درصد را خطأ و ۹۵/۴۵ درصد را صحیح تشخیص داده است (جدول ۱).


جدول ۱: نتایج نرم افزار

نرم افزار	نتایج	سرطان	افراد مبتلا به	افراد	کل
True	۱۰۰	۹۰۹	۹۰۹	۱۹۰۹	۲۰۰۰
False	۰	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰۰

همچنین اختصاصیت و حساسیت نرم افزار بر اساس نتایج اعلام شده، در کل فتوگرافی‌ها (۲۰۰۰ مورد) به صورت جدول ۲ محاسبه و حساسیت ۱۰۰ درصد و اختصاصیت ۹۰ درصد اعلام شد.



تصویر ۲. زبان دچار کارسینوم سلول سنکفرشی



تصویر ۳. نرم افزار Iran CDX روی صفحه‌ی کامپیوتر

داده‌ها وارد نرم افزار Excel شد و نمودار و جدول‌های مورد نظر رسم گردید. اختصاصیت و حساسیت و ارزش پیشگویی مثبت و منفی محاسبه گردید و $p\text{ value} = 0/004$ با استفاده از آزمون فیشر محاسبه شد.

یافته‌ها

این مطالعه جهت طراحی و آزمون نرم افزاری که بتواند در تصاویر دیجیتال تهیه شده از لام سیتولوژی، سلول دیسپلاستیک را شناسایی کند انجام گرفت.

تعداد ۴۰ بیمار وارد مطالعه شدند که ۲۰ بیمار مبتلا به سرطان (۱۸ تا ۶۳ سال) با میانگین سنی ۳۹ سال و تعداد ۱۶ مرد و ۴ زن که سرطان دهان آنها قبلًا تأیید شده بود و ۲۰ فرد سالم که از نظر سن و جنس با گروه بیمار کاملاً همخوانی داشتند. از تمام این افراد، براش سیتولوژی (از بیمار مبتلا به سرطان، از موضع بدخیمی و در افراد سالم از مخاط سالم گونه) تهیه شد.

از تمام نمونه‌ها به روش لیکوئید بیس سیتولوژی، لام تهیه گردید و از تمام لام‌ها، فتوگرافی گرفته شد. تعداد

طبق آزمون فیشر دو جامعه‌ی آماری (نتایج خروجی از نرمافزار و نتایج هیستوپاتولوژی (که در روش کار توضیح داده شد) باهم برابر نیستند. حال برای مقایسه‌ی این دو جامعه از تست χ^2 استفاده می‌کنیم. اکنون فرض می‌کنیم معیار پذیرش برای ما همان طور که قبل ذکر شده است، ۹۰ درصد می‌باشد. یعنی خطای پذیرفته شده برای هر بیمار را ۱۰ درصد در نظر می‌گیریم یعنی در ۵۰ فتوگرافی تا ۵ خط قابل قبول است.

حال با محاسبه‌ی p برای دو جامعه (نتایج خروجی از نرمافزار و نتایج اسکالپل بیوپسی) مشاهده می‌کنیم مقدار $p = 0.004$ به این معنی که تفاوت چشمگیری بین دو جامعه‌ی آماری وجود ندارد. چون این مقدار زیر 0.05 یعنی زیر سطح معنی دار است.

تفاوتش بین نتایج واقعی و نتایج خروجی از مدل وجود ندارد و این موضوع نشان از دقت بالای نرمافزار است. در گروه مبتلا به سرطان، نتایج نرمافزار با نتیجه‌ی اسکالپل بیوپسی بیمار تفاوتی نداشت، ولی در گروه سالم، ۹۱ فتوگرافی را نادرست تشخیص داد. به این معنا که خطای نرمافزار در نمونه‌های سرطانی صفر و در نمونه‌های سالم $9/1$ درصد بود. با فرض اینکه بر اساس مفروضات آماری خطای پذیرفته شده، ۱۰ درصد در نظر گرفته شود؛ یعنی ۵ خطای نرمافزار در ۵۰ فتوگرافی قابل چشم پوشی است، نرمافزار در گروه سالم، ۶ بیمار را نتوانست تشخیص دهد در صورتی که در گروه مبتلا به سرطان، تمام بیماران را ناسالم تشخیص داد.

بحث

نرمافزارهای تشخیصی، از اجزای جدایی ناپذیر پزشکی نوین می‌باشند. مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی نرمافزاری می‌پردازد که بتواند سلول سرطانی را در تصاویر دیجیتال تهیه شده از لام‌های برآش سیتولوزی به روش لیکوئید بیس تشخیص دهد. هدف کلی نرمافزار، تشخیص سلول‌های دیسپلاستیک در تصاویر دیجیتالی است که وارد آن می‌شود.

جدول ۲: اختصاصیت و حساسیت در کل تصاویر

Calculate Sensitivity, Specificity, PPV, and NPV

مثبت	
مثبت واقعی	۱۰۰
منفی کاذب	۰
منفی	
مثبت کاذب	۹۱
منفی واقعی	۹۰۹
حساسیت	۱۰۰/۱۰۰ درصد
اختصاصیت	۹۰/۹۰ درصد
ارزش پیشگویی مثبت	۹۱/۶۶ درصد
ارزش پیشگویی منفی	۱۰۰/۱۰۰ درصد

در این مطالعه طبق مفروضات آماری، معیار پذیرش عملکرد، ۹۰ درصد و خطای پذیرفته شده برای نتایج نرمافزار تا ۱۰ درصد قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این فرض در هر لام، از تعداد ۵۰ فتوگرافی تا ۵ مورد نتیجه‌ی غلط اعلام شده از طرف نرمافزار قابل قبول است. نتیجه‌ی غلط یعنی بافت سالم را ناسالم تشخیص دهد (مثبت کاذب) و منفی کاذب یعنی بافت سرطانی را سالم تشخیص دهد. طبق فرض گفته شده (خطای پذیرفته شده تا ۱۰ درصد)، در گروه مبتلا به سرطان در این مطالعه با توجه به نتایج نرمافزار که در هر ۲۰ بیمار تمام نتایج صحیح بود، مشکلی وجود ندارد و هر ۲۰ بیمار با توجه به نتایج نرمافزار، ناسالم تشخیص داده شده‌اند. ولی در گروه افراد سالم از ۲۰ مورد، ۱۴ نتیجه صحیح (True) و ۶ نتیجه‌ی غلط (False) در نظر گرفته شد. بر اساس این مسئله در افراد سالم، تشخیص نرمافزار با مشکل مواجه بوده و در ۳۰ درصد بیماران خطأ دارد. بر اساس نتایج و مفروضات گفته شده، جدول اختصاصیت و حساسیت در ۴۰ بیمار مورد بررسی به صورت زیر است: اختصاصیت، ۷۰ درصد و حساسیت، ۱۰۰ درصد و ارزش پیشگویی مثبت، ۷۶/۹۲ درصد و ارزش پیشگویی منفی، ۱۰۰ درصد برآورد شد.

براش سیتولوژی، یک روش ساده و حساس و ارزان است که نمونه‌ای از تمام ضخامت اپی‌تلیوم می‌دهد (۴). امروزه CAD نقش مهمی در تفسیر نمونه‌های پاتولوژی دارد و الگوریتم‌های جدید در حال آماده‌سازی می‌باشند (۵). با توجه به مطالب ذکر شده، طراحی چنین نرم‌افزارهایی، گام بزرگی در جهت تشخیص زودهنگام سرطان دهان می‌باشد. با توجه به مطالب گفته شده، لیکوئید بیس، خطاهاستیتیلوژی معمول را کاهش داده است و به انجام آنالیزهای کامپیوتراستیت در تفسیر نمونه‌ها کمک می‌نماید.

در این مطالعه بعد از محاسبات آماری، حساسیت، ۱۰۰ درصد و اختصاصیت، ۷۰ درصد به دست آمد که دلیل اختصاصیت پایین‌تر، خطاهاستیت نرم‌افزار در نمونه‌های سالم بود. علت احتمالی این مسئله استفاده از نمونه‌های کاملاً نرمال از بیماران کاملاً نرمال بود که در گروه شاهد به دلیل محدودیت بیماران ارتیروپلاکیا و لکوبلاکیا و کلاً ضایعات پیش‌بدخیم که فاقد دیسپلازی باشند به این صورت انتخاب شد. از طرفی برای آموزش به نرم‌افزار، نیازمند نمونه‌های واقعی نرمال بودیم. در واقعیت و انجام کار بالینی، نمونه‌های بیماران کاملاً سالم بدون هیچ تغییر مخاطی برای آزمایش ارسال نمی‌شوند.

سوبا (۱۶) در سال ۱۹۹۹ از روش ORAL CDX با استفاده از آنالیز کامپیوتراستیت در برash سیتولوژی ۹۴۵ بیمار استفاده کرد. در این مطالعه حساسیت بیوسپی با برس ۹۶ درصد در مقایسه با انسیژنال بیوسپی بود. نتایج منفی کاذب، ۴ درصد اعلام شد. در مطالعه‌ی حاضر، حساسیت بیشتری در مقایسه با مطالعه‌ی سوبا (۱۶) به دست آمد (۱۰۰ درصد). مطالعه‌ی مذکور در بیماران انجام شده است و افراد سالم وارد مطالعه نشدند. در مطالعه‌ی ما در بیماران SCC نرم‌افزار کاملاً جواب داده است و چالش ایجاد شده از طرف تصاویر بافت‌های سالم بود. بنابراین به جای منفی کاذب ما نتایج مثبت کاذب داشتیم که خطا نرم‌افزار در نظر گرفته شد و مقدار آن ۴/۵۵ درصد فرض شد. یعنی

جامعه‌ی مورد مطالعه از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای اصفهان و بیمارستان امین و مطب‌های متخصصان مربوطه که SCC (Squamous cell carcinomas آنها با اسکالپل بیوسپی تشخیص داده شده بود، انتخاب شدند.

از آنجایی که بیماران SCC سریعاً جهت درمان ارجاع داده می‌شوند، تعداد بیماران محدود بود. بنابراین نمونه‌گیری به روش آسان انجام شد.

با توجه به جهانی بودن مشکل سرطان و مرگ و میر بالای ناشی از آن و شیوع بالای آن در بسیاری از کشورها، تشخیص زودهنگام آن امری حیاتی و مهم است. از طرفی ضایعات پیش‌سرطانی دهان که پتانسیل تبدیل به SCC را دارند باید از لحاظ دیسپلازی بررسی شوند (۱، ۲).

از آنجایی که اسکالپل بیوسپی، استاندارد طلائی تشخیص SCC می‌باشد با توجه به مشکلات و محدودیت‌های آن به دنبال روش‌های ساده‌تر با تهاجم کمتر می‌باشیم (۲). سیتولوژی، می‌تواند مشکلات مربوط با نمونه‌برداری را کاهش دهد. از طرفی روش لیکوئید بیس باعث ایجاد اسپیر بهتر و کاهش نتایج منفی کاذب می‌شود (۳). تلاش‌های بسیاری برای افزایش حساسیت و اختصاصیت سیتولوژی و کاهش هزینه‌ها صورت گرفته است که می‌توان در این زمینه به روش‌های کامپیوتراستیت و آنالیز توسط نرم‌افزارهای طراحی شده اشاره کرد. در این زمینه تلاش‌های کمی صورت گرفته است. مخصوصاً مطالعه‌ی مشابهی که در مخاط دهان برای تشخیص سرطان از روش لیکوئید بیس در کنار آنالیز کامپیوتراستیت که مختص آن طراحی شده باشد صورت نگرفته است و ORAL CDX نیز از سیتولوژی به روش Conventional استفاده کرده است.

در این مطالعه، سیتولوژی به روش لیکوئید بیس انجام شده است که خطاهاستیت مربوط به روش Conventional را کاهش داده است و نرم‌افزار را از خطاهاستیت مربوط به روی‌هم افتادن سلول‌ها دور می‌سازد.

چون در اکثر آزمایشات پاراکلینیک، در صورتی که اختصاصیت بالاتری داشته باشیم، حساسیت کمتری ایجاد می شود. البته آنها از آنالیز کامپیوترا کمک نگرفتند و از روش لیکوئید بیس نیز استفاده نکرده بودند. همچنین آنها تعداد بیماران بیشتری را وارد مطالعه کردند و افراد سالم را به عنوان جمعیت شاهد در نظر نگرفتند.

در نمونه گیری گروه بیمار، محدودیت وجود داشت، چون اکثر بیماران SCC سریعاً تحت درمان های جراحی رادیوتراپی و شیمی درمانی قرار می گیرند.

در گروه شاهد که افراد، مخاط داشتند به دلیل ترومای وارد به بافت در موضع نمونه برداری که تا ۲۴ ساعت دچار ناراحتی و درد است، قبل از تهیه نمونه به دلیل ملاحظات اخلاقی، باید برای بیمار توضیح داد که چنین مشکلی وجود دارد که همین امر باعث انصراف تعدادی از بیماران شد.

پیشنهاد می شود برای Train نمودن نرم افزار، نمونه های بیشتر تهیه گردد و فتوگرافی آن به نرم افزار داده شود و نرم افزارهای دیگری با تعداد نمونه های بیشتر و دقیق بالاتر نیز تهیه شود.

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه ای که انجام شد، نرم افزار طراحی شده دارای حساسیت و اختصاصیت بالا می باشد. این نرم افزار توانایی شناسایی سلول دیسپلازیک را در تمام فتوگرافی های بیمار سلطانی دارد. در کل فتوگرافی های تهیه شده از بیماران مبتلا به سلطان و افراد سالم، درصد خطای کمی داشت که نشان دهنده دقت بالای چنین نرم افزاری می باشد.

* این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ثبت ۳۱ UREC23810201932031 بود و کلیه حقوق این طرح برای دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان) محفوظ است.

بافت سالم که ناسالم تشخیص داده است که این مقدار ۹۱ تصویر دیجیتال در میان ۲۰۰۰ تصویر بود.

دلاوریان و همکاران (۱) در سال ۲۰۰۹ روش LBC را برای سیتولوژی مخاط دهان در ۲۵ بیمار مبتلا به SCC و لکوپلاکیا و لیکنپلان که قبلاً بیوپسی شده بودند به کار بردن. حساسیت این روش، ۸۸/۸ درصد و اختصاصیت آن ۱۰۰ درصد گزارش شد. که در مقایسه با نتایج به دست آمده از نرم افزار Iran CDX حساسیت کمتر (۱۰۰ درصد) و اختصاصیت بیشتر (۷۰ درصد) داشته است. البته در نرم افزار ما تعداد افراد مورد مطالعه، ۴۰ مورد بود و نتیجه توسط نرم افزار اعلام می شد که از این جهت این دو مطالعه را نمی توان مقایسه کرد. ولی در هر دو مطالعه از روش لیکوئید بیس و دیسپلازی استفاده شده بود. در مطالعه دلاوریان و همکاران (۱)، ضایعات لیکنپلان و لکوپلاکیا نیز وارد شده بود. البته نمونه های سالم در گروه شاهد وجود نداشت که این موارد از تفاوت های دو مطالعه می باشد.

مهروتا و همکاران (۴) در سال ۲۰۰۸ روش Brush biopsy را با روش انسیژنال بیوپسی در مخاط دهان ۹۴ بیمار مقایسه کردند. ۱۵ درصد بیماران به دلیل نمونه سیتولوژی ناکافی از مطالعه خارج شدند. ۴۵ بیمار دارای ضایعات خوش خیم فقد دیسپلازی (لکوپلاکیا و اریترو پلاکیا و فیروز تحت مخاطی) بودند. ۱۱ بیمار دیسپلازی داشتند و ۲۸ بیمار ضایعات SCC داشتند. در نتایج این مطالعه، ۴ مورد منفی کاذب و ۳ مورد مثبت کاذب وجود داشت. حساسیت روش بیوپسی با برس در این مطالعه ۷۶/۸ درصد و اختصاصیت آن ۹۳/۳ درصد بود که از روش انسیژنال بیوپسی بیشتر بود. در این مطالعه از مسوواک کودکان استفاده شد که از این لحاظ مشابه مطالعه حاضر است. ولی بر این سیتولوژی به روش معمول بود و از لیکوئید بیس استفاده نکردند. در مقایسه با مطالعه می، مهروتا و همکاران (۴)، حساسیت کمتر و اختصاصیت بیشتری را به دست آوردند،

References

1. Delavarian Z, Mohtasham N, Mosannen-Mozafari P, Pakfetrat A, Shakeri MT, Ghafoorian-Maddah R. Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancer. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2010; 15(5): e671-6.
2. Mehrotra R, Gupta A, Singh M, Ibrahim R. Application of cytology and molecular biology in diagnosing premalignant or malignant oral lesions. *Mol Cancer* 2006; 5: 11.
3. Ahmed HG, Edris AM, Mohamed EA, Hussein MO. Value of centrifugated liquid-based cytology by Papanicolaou and May-Grünwald in oral epithelial cells. *Rare Tumors* 2009; 1(1): e12.
4. Mehrotra R, Singh MK, Pandya S, Singh M. The use of an oral brush biopsy without computer-assisted analysis in the evaluation of oral lesions: a study of 94 patients. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008; 106(2): 246-53.
5. Belsare AD, Mushrif MM. Histopathological image analysis using image processing techniques: An overview. *Signal & Image Processing* 2012; 3(4): 23-36.
6. Glick M. *Burket's oral medicine*. Shelton, CT: PMPH-USA; 2015.
7. Pérez-Sayánsm M, Somoza-Martín JM, Barros-Angueira F, Reboiras-López MD, Gándara-Vila P, Gándara Rey JM, et al . Exfoliative cytology for diagnosing oral cancer. *Biotech Histochem* 2010; 85(3): 177-87
8. Kumaresan GD, Jagannathan N. Exfoliative cytology—a predictive diagnostic tool. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences* 2014; 6(5): 1-3.
9. Hegde V, Nambiar S, Yadav N. Efficacy of centrifuged liquid-based cytology over conventional cytology: A comparative study. *J Cancer Res Ther* 2017; 13(6): 951-5.
10. Mehrotra R. *Oral cytology: a concise guide*. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2013.
11. Madaeni SS, Hasankiadeh NT, Kurdish AR, Rahimpour A. Modeling and optimization of membrane fabrication using artificial neural network and genetic algorithm. *Separation and Purification Technology* 2010; 76(1): 33-43.
12. Toktaş I, Ozdemir AT. Artificial neural networks solution to display residual hoop stress field encircling a split-sleeve cold expanded aircraft fastener hole. *Expert Systems with Applications* 2011; 38(1): 553-63.
13. Guo Z, Sha W. Modelling the correlation between processing parameters and properties of maraging steels using artificial neural network. *Computational Materials Science* 2004; 29(1): 12-28.
14. Marquardt DW. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics* 1963; 11(2): 431-41.
15. Remmerbach TW, Pomjanski N, Bauer U, Neumann H. Liquid-based versus conventional cytology of oral brush biopsies: a split-sample pilot study. *Clinical oral investigations* 2017; (10): 2047-9.
16. Sciubba JJ. Improving detection of precancerous and cancerous oral lesions. Computer-assisted analysis of the oral brush biopsy. U.S. Collaborative OralCDx Study Group. *J Am Dent Assoc* 1999; 130(10): 1445-57.

Designing and Development of Iran CDX Software Program for the Diagnosis of Malignancies and Dysplasia in Oral Brush Cytology Samples and Evaluation of Its Performance

Sara Arab Loodaricheh¹

Arash Mottaghi²

Noushin Afshar Moghadam³

Behzad Sadeghian⁴

Mehdi Saman Booy⁵

1. Postgraduate, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2. **Corresponding Author:** Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

Email: arash.mottaghi@gmail.com

3. Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4. Postgraduate, Department of Materials, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

5. Department of Electrical and Computer, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

Abstract

Introduction: Due to high mortality rate and prevalence of cancer, early detection is vital and important. Precancerous oral lesions have the potential to lead to SCC and therefore they should be carefully assessed. Brush cytology is a simple method, which obtains a sample from the epithelium. Computer analyses have an important role in interpretation of pathologic samples.

Materials & Methods: An engineering team designed the software with neural networks, and the algorithm was trained with samples obtained from patients. In the second stage, brush cytology samples were collected from 20 patients with cancer and 20 healthy individuals. From each slide 50 digital images were captured with a camera under a microscope. The images were separately entered into the software program. The results were recorded as healthy and unhealthy. Statistical analyses were performed using Excel program.

Results: The software had 91 errors in a total of 2000 digital images. Comparison of the results provided by the software program and those of the scalpel biopsy of the patients with Fisher's exact test did not reveal any significant differences (p value = 0.004).

Conclusion: Based on the results of this study, the designed software exhibited high specificity and sensitivity.

Key words: Brush cytology, Neural networks, SCC.

Received: 13.6.2018

Revised: 24.9.2018

Accepted: 5.11.2018

How to cite: Arab Loodaricheh S, Mottaghi A, Afshar Moghadam N, Sadeghian B, Saman Booy M. Designing and Development of Iran CDX Software Program for the Diagnosis of Malignancies and Dysplasia in Oral Brush Cytology Samples and Evaluation of Its Performance. J Isfahan Dent Sch 2018; 14(4): 348-358.