

بررسی و تعیین درصد اشريشیا کلی های انتروهموراژیک جدا شده از بیماران مبتلا

به اسهال حاد در مرکز درمانی تبریز

محمد رضا نهائی^۱، محمد اکبری دیباور^۱، جاوید صادقی^۱، سولماز نیکوش^۲

(۱) بخش میکروب شناسی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
(۲) آزمایشگاه میکروب شناسی، مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز
نویسنده رابط: محمد رضا نهائی، بخش میکروب شناسی، دانشکده پزشکی و آزمایشگاه باکتریولوژی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تلفنکس ۰۴۱۱-۳۲۶۴۶۶۱، nahaeimr@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۱۰/۴ تاریخ پذیرش مقاله: ۸۶/۱۰/۲۲

چکیده:

زمینه و اهداف: بیماری های اسهالی در همه گروه های سنی و در تمام مناطق جغرافیایی جهان اتفاق می افتد. عوامل باکتریائی حدود ۲۴٪ از اسهال ها را ایجاد می کنند و بیش از ۷۰٪ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در اثر بیماری های اسهالی است. اسهال ناشی از اشريشیا کلی O157 که از نوع انتروهموراژیک می باشد بیماری نوظهوری است که علاوه بر اسهال، حدود ۲-۷٪ از این بیماران دچار سدروم اورمی همولیتیک (hemolytic uremic syndrome, HUS) یا نارسایی حاد کلیوی می شوند. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی پاتوژن های روده ای اعم از باکتریائی و انگلی با تأکید بیشتر به تعیین فراوانی اشريشیا کلی های انتروهموراژیک، بویژه اشريشیا کلی O157 در مراجعین مبتلا به اسهال در مرکز درمانی تبریز بود.

روش بررسی: تعداد ۱۰۲۰ نمونه مدفع جمع آوری شده از بیماران مبتلا به اسهال حاد که به مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی و کودکان شهر تبریز مراجعه نمودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های مدفع اخذ شده از بیماران با تهیه لام های مرطوب با استفاده از سرم فیزیولوژی و لوگل از نظر وجود لکوسیت، اریتروسیت، تخم، تروفوزوئیت و کیست انگل های رایج بررسی شده و جهت مطالعه باکتریولوژیک از محیط های کشت افتراقی و انتخابی استفاده شد. برای تعیین هویت باکتری های جدا شده از روش های بیوشیمیائی و سرولوژیک استفاده گردید. اشريشیا کلی های جدا شده با آنتی سرم های اختصاصی تعیین تیپ شدند. ایزوله های اشريشیا کلی با روش استاندارد دیسک آگار دیفیوژن در مقابل آنتی بیوتیک های رایج در درمان تعیین حساسیت شدند.

یافته ها: انگل های تک یاخته ای انتاموبا هیستولیتیکا با ۹۱ مورد (۸/۹٪) و ژیاردیا لامبیا با ۵۱ مورد (۵٪) شناسایی شدند. باکتری های بیماریزای روده ای ۶ سویه (۰/۵۸٪) اشريشیا کلی O157، ۱۵ سویه (۱/۴۷٪) اشريشیا کلی O111، ۱۳ سویه (۱/۲۷٪) اشريشیا کلی O26، ۳۵ سویه (۲/۴٪) کمپلیو باکتریزونی، ۱۷۷ سویه (۱۷/۳٪) سالمونلا و ۹۷ سویه (۹/۵٪) شیگلا ایزوله شد. کلیه سویه های اشريشیا کلی انتروهموراژیک جدا شده متعلق به گروه سنی کودکان زیر ۵ سال و از مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز بدست آمدند. بر اساس اطلاعات موجود در پرونده های بیماران و آزمایش های انجام شده در هیچ یک از بیمارانی که اشريشیا کلی انتروهموراژیک ایزوله گردید علایمی از آنمی یا بیماری کلیوی بدست نیامد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشانگر حضور سویه های اشريشیا کلی O157 در کودکان شهر تبریز بوده و برنامه ریزی برای تعیین هویت این دسته از باکتری های مهم پزشکی در آزمایشگاه های روتین توصیه می گردد و نیز لازم است مطالعات گسترشده تر انجام شده و برنامه ریزی لازم جهت ایجاد سیستم های پیشگیری و کنترل در این زمینه انجام گردد.

کلید واژه ها: اشريشیا کلی انتروهموراژیک، اشريشیا کلی O157، اسهال

مقدمه:

بیشتری دارد. این باکتری نیز برای بیماری‌زائی خود به 10^6 باکتری نیاز دارد. بالاخره EHEC که ایجاد کولیت هموراژیک کرده و سپس احتمال بروز سنتدرم اورمی همولیتیک مطرح می شود. توکسین سویه های EHEC همانند شیگا توکسین دارای اثرات وروتوکسیک می باشد. دوز عفونی کنندگی این باکتری پائین بوده و حتی با 100 باکتری نیز موفق در ایجاد بیماری می باشد (۱۰).

ناتوانی اشتباهاتی کلی O157 در تخمیر قند سوربیتول در شناسایی این باکتری بکار گرفته می شود. هم چنین بررسی های آزمایشگاهی دیگر از قبیل روش لاتکس آگلوتیناسیون، ردیابی توکسین باکتری در مدفوع و بالاخره روش های مولکولی مانند PCR قابل انجام است. منبع اصلی این باکتری روده گاو و برخی دیگر از حیوانات می باشد. انتشار باکتری اغلب از طریق گوشت نیم پز گاو و بز گزارش شده است. هم چنین انتقال این باکتری از طریق آب، سبزیجات، ماست و نیز انتقال از شخص به شخص شناسایی شده است (۱۱ و ۱۲).

سابقه بیماری اشتباهاتی اشتباهاتی O157 به سال ۱۹۷۵ بر می گردد که برای اولین بار از نمونه اسهالی یک زن ایزوله شد ولی بیماری باکتری تا سال ۱۹۸۲ زیاد مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۸۲ دو مورد شیوع بزرگ در امریکا اتفاق افتاد (۱۳) و بعد در ژاپن و کانادا انتشار زیادی پیدا کرد (۱۴). اطلاعات محدودی از فراوانی اشتباهاتی کلی O157 وجود دارد، زیرا اغلب آزمایشگاه های تشخیص طبی بصورت روزمره ارگانیسم را کشت یا ردیابی نمی کنند و در مطالعات انجام شده حضور اسپورادیک باکتری نشان داده شده است (۱۳، ۱۵ و ۱۶). اخیراً شیوع عفونت بی سابقه ای از اشتباهاتی کلی O157 در ژاپن، اسکاتلندر و امریکا و با سایر اشتباهاتی EHEC در اروپا و استرالیا اتفاق افتاده است که نیاز به بررسی بیشتر و کنترل این باکتری را نشان می دهد (۱۴).

در آرژانتین سنتدرم اورمی همولیتیک در $7/8$ از هر 100000 کودک زیر ۵ سال گزارش شده است که عمدتاً در کودکان ۶ تا ۳۶ ماهه بوده و پراکنده بیماری در هر دو جنس برابر ولی در فصول گرم سال بیشتر بوده است (۱۴). در استرالیا میزان $2/97$ HUS در هر 100000 نفر از کودکان زیر ۵ سال گزارش شده است (۱۴). از نظر شیوع اشتباهاتی کلی های انتروهموراژیک در دانمارک از 60 مورد عفونت اسپورادیک عمدتاً گروه های O26 و O157 ایزوله شده اند (۱۴). در آلمان گروه های O15, O26, O103, O111, O157 (۱۴ و ۱۷)، در ژاپن اکثراً گروه O157 در بیماران سرپائی گزارش شده است (۱۴). در هلند یک مورد ایدمی در کودکان با سروگروه

اسهال یکی از علل بیماری و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه است. اسهال های باکتریایی که از طریق آب و مواد غذایی آلوده منتقل می شود حدود 30% از اسهال ها را سبب شده و هزینه درمانی بسیار زیادی را تحمل می کند. در ایجاد اسهال عوامل باکتریایی بعد از ویروس ها قرار دارند و بترتیب وفور عبارتند از سالمونلا، کمپیلوباکتر، اشتباهاتی های بیماری (DAggEC, EAggEC, EIEC, ETEC) مختلف (EPEC)، شیگلا و کلستریدیوم، اشتباهاتی های بیماری (O157) روده ای عامل $8-10\%$ از اسهال های کودکان می باشد (۱۰). در ایالات متحده میزان جداسازی اشتباهاتی کلی O157 از سایر پاتوژن های روده ای بویژه از شیگلا بیشتر است. در بعضی از کشورها اشتباهاتی های ایجاد کننده موارد اسهال حاد غیر از اشتباهاتی کلی O157 (non-O157) عمدتاً اشتباهاتی های O111 و O26 بوده اند. اگر چه علت اصلی سنتدرم اورمی همولیتیک اشتباهاتی کلی O157 می باشد (۲)، ولی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) دلالت بیش از 70% از اشتباهاتی های غیر O157 را که در هشت سرو گروه O165, O145, O121, O113, O111, O103, O45, O26 در ایجاد سنتدرم یاد شده اعلام نموده است (۳).

اشتباهاتی کلی ها جزو فلور طبیعی بدن انسان و حیوانات بوده و شامل صدھا سروتیپ می باشند که برخی از سروتیپ ها ایجاد اسهال آبکی می کنند از قبیل EPEC و EAEC و برخی دیگر مانند EHEC ایجاد اسهال خونی می کنند. غالباً سویه های مولد اسهال خونی توکسین شبیه به توکسین شیگلا تولید می کنند که علاوه بر کولیت هموراژیک در $2-7\%$ کودکان و افراد مسن ایجاد سنتدرم اورمی همولیتیک با علایم نارسایی حاد کلیوی و افزایش فشار خون و ترومبوسیتوپنی می کند. سویه های اشتباهاتی کلی O157 بیشتر از سایر سویه ها تولید توکسین می کنند که این توکسین اثرات سمی شدید تری نسبت به توکسین SxtI (۴-۸). عمدتاً چهار دسته از اشتباهاتی های از طریق آب و غذا منتقل می شوند ایجاد اسهال مسافران را کرده و تعداد باکتری مورد نیاز ETEC. برای شروع بیماری 10^8 باکتری است (۹). EIEC ایجاد بیماری شبیه به دیسانتری باسیلی نموده ولی برخلاف شیگلا که با تعداد اندکی باکتری موفق در ایجاد بیماری است، این باکتری برای اعمال پاتوژنیستیه خود حداقل به 10^6 باکتری نیاز دارد. EPEC ایجاد اسهال آبکی کرده و در کودکان کشورهای در حال توسعه شیوع

نوترینت آگار استفاده شد (۲۳). سایر باکتری های بیماریزایی روده ای با استفاده از محیط های کشت افتراقی و تست های بیوشیمیائی مربوطه و نیز آنتی سرم های لازم تعیین هویت شدند. جهت انجام تست حساسیت در برابر آنتی بیوتیک ها از روش استاندارد دیسک آگار دیفیوژن بوئروکربی استفاده شد (۲۴) و دیسک های آنتی بیوتیک مورد آزمایش آمپسی سیلین، سفالکسین، جنتامایسین، سپیروفلوکسازین، سفوتاکسیم، فوسیدیک اسید، نالیدیکسیک اسید، تریمت-پریم سولفامتوکسازول و تتراسایکلین (Mast) بودند. اطلاعات مربوط به بیماران از نظر وجود عالیم آنمی و هر گونه بیماری کلیوی از پرسشنامه تنظیم شده از پرونده بیماران استخراج شد که نتایج آزمایش های هموگلوبین، هماتوکریت و شمارش پلاکت ها در پیشگویی آنمی و نتایج تست های اوره و کراتینین در ارزیابی عملکرد کلیوی مورد توجه قرار گرفت.

یافته ها :

تعداد ۱۰۲۰ مدفوع بیماران مبتلا به اسهال حاد در مدت چهار سال (۱۳۸۵ - ۱۳۸۲) مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف عمله این مطالعه تعیین فراوانی ارگانیسم های سببی اسهال با تأکید بیشتر به اشریشیاکلی های انتروهموراژیک بود. با بررسی لام های مرتبط تهیه شده جهت تجسس انگل ها ۹۱ مورد (٪ ۸/۹) تروفوزوئیت یا کیست انتاموبا هیستولیتیکا و ۵۱ مورد (٪ ۵/۵) تروفوزوئیت یا کیست زیار دیا لامبیا مورد شناسایی قرار گرفت. تعداد ۶ مورد (٪ ۰/۵۸) اشریشیاکلی O157، ۱۵ مورد (٪ ۱/۴۷) اشریشیاکلی O111 و ۱۳ مورد (٪ ۱/۲۷) اشریشیاکلی O26، ۳۵ مورد (٪ ۲/۴) کمپاکلیو-باکتریزونی، ۱۷۷ مورد (٪ ۱۷/۳) گونه های سالمونلا و ۹۷ مورد (٪ ۹/۵) گونه های شیگلا ایزو له شدند (جدول ۱).

کلیه اشریشیاکلی های انتروهموراژیک بدست آمده مربوط به کودکان زیر ۵ سال (با میانگین سنی ۳۰/۶ ماه) و از بیمارستان کودکان تبریز بود. علیرغم استفاده از رشد باکتری های آزمایشی از محیط کشت نوترینت آگار در آزمایش های سرولوژیک جهت تعیین نوع اشریشیاکلی ها، تعداد ۱۳۹ سویه دارای اتوآگلوتیناسیون بودند. در هیچیک از بیمارانی که اشریشیاکلی انتروهموراژیک ایزو له گردید، علائمی از آنمی یا بیماری کلیوی بدست نیامد.

در مجموع از ۲۹/۶٪ از بیماران فقط عوامل بیماریزایی باکتریال، از ۹/۷٪ از بیماران صرفاً عوامل بیماریزایی انگلی، از ۸٪ از بیماران بیش از یک باکتری پاتوژن یا عوامل باکتریائی و انگلی بصورت توان بددست آمد، در حالیکه در ۵۲/۴٪ از بیماران هیچگونه ارگانیسم

O157 گزارش شد که از طریق شنا در آب آلوهه اتفاق افتاده بود (۱۴). شیوع اشریشیاکلی O157 در انگلستان در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ به ترتیب از ۴۹ / ۰ مورد در ۱۰۰۰۰ نفر به ۱/۲۹ مورد در ۱۰۰۰۰ نفر افزایش داشته است (۱۴). در مطالعه ای در امریکا میزان جداسازی اشریشیاکلی انتروهموراژیک، اشریشیاکلی O157، سالمونلا و لیستریامونوسیتوژن در منابع مختلف غذایی بررسی شده است (۱۸ و ۱۹). همچنین حضور اشریشیاکلی H7:H7:O157:O157:H7 از سایر اشریشیاکلی های انتروهموراژیک در محیط مطالعه شده است (۲۰). در امریکا جهت شناخت بهتر ایدمی های ناشی از اشریشیاکلی های انتروهموراژیک ۵ مرکز نظارتی در سال ۱۹۹۵ تأسیس گردید و در سال ۱۹۹۷ مرکز نظارت بر HUS تاسیس شد. از سال ۱۹۸۲ بیش از ۱۰۰ شیوع عفونت با اشریشیاکلی O157 در امریکا گزارش شده و راه های انتقال آن روشن گشته است، بطوریکه ۵۲٪ از موارد از طریق گاو، ۱۶٪ از طریق شخص به شخص، ۱۴٪ از طریق میوه و سبزیجات، ۱۲٪ از طریق آشامیدن آب آلوهه به باکتری و ۵٪ از طریق مصرف غذاهای متفرقه بوده است (۱۴).

اگر چه مطالعات خوبی در مورد شناسایی عوامل سببی اسهال در کودکان ایرانی انجام شده است (۲۱ و ۲۲) ولی مطالعه جامعی در ارتباط با اسهال ناشی از EHEC بویژه در مورد اشریشیاکلی O157 انجام نشده است، لذا این مطالعه جهت دستیابی به اطلاعات اولیه در مورد حضور اشریشیاکلی های انتروهموراژیک عمله، بویژه اشریشیاکلی O157، در بیماران مبتلا به اسهال حاد انجام شد.

مواد و روش ها :

تعداد ۱۰۲۰ نمونه مدفوع بیماران مبتلا به اسهال که به دو مرکز عمله درمانی تبریز (مراکز آموزشی و درمانی امام خمینی و کودکان) مراجعه نمودند، مورد آزمایش لام مرتبط با استفاده از سرم فیزیولوژی و محلول لوگل قرار گرفتند و وجود خون و انگل های روده ای تجسس شد. جهت بررسی باکتری های بیماریزایی روده ای، از مدفوع بیماران فوق در محیط های کشت مکانکی آگار سروولوژیک SS، Campy BAP، اگار و سوربیتول مکانکی آگار کشت شد. کلیه اشریشیاکلی های جدا شده تحت بررسی تست های سروولوژیک با آنتی سرم های Mast Diagnostic قرار گرفتند تا سروتیپ های O157، O111، O26 شناسایی شود. جهت اجتناب از اتوآگلوتیناسیون/ اشریشیاکلی های جدا شده در تست های سروولوژیک از رشد باکتری بر روی محیط کشت

سیلین و ترایمتوپریم بود. حساسیت به سفوتاکسیم و نالیدیکسیک اسید ۵۰٪ و دربرابر فوسیدیک اسید و تراسایکلین ۳۳٪ بدست آمد (جدول ۲).

پاتوژن شناسائی نشد (جدول ۱). نتایج حاصل از تست حساسیت ۶ سویه‌ی اشريشیاکلی O157 در مقابل آنتی بیوتیک‌های تست شده نشانگر حساسیت کلیه ایزوله‌ها در مقابل سیپروفلوکسازین، سفالکسین و جنتامايسین و مقاومت کلیه ایزوله‌ها در برابر آمپی

جدول ۱: پاتوژن‌های روده‌ای در نمونه‌های مدفع بیماران مطالعه شده

درصد	میکروارگانیسم
۳۳/۶۲	باکتری‌ها
۰/۵۸	<i>E.coli</i> O157
۱/۴۷	<i>E.coli</i> O111
۱/۲۷	<i>E.coli</i> O26
۳/۴۳	<i>Campylobacter jejuni</i>
۱۷/۳۵	<i>Salmonella</i> spp.
۹/۵۰	<i>Shigella</i> spp
۱۳/۹۲	انگل‌ها
۸/۹۲	<i>Entamoeba histolytica</i>
۵/۰۰	<i>Giardia lamblia</i>
۲۹/۶۰	فقط باکتری
۹/۷۰	فقط انگل
۸/۰۳	با دو باکتری یا باکتری و انگل
۵۲/۴۵	باکتری یا انگل پاتوژن شناسائی نشد

جدول ۲: الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها در سویه‌های اشريشیاکلی O157 ایزوله شده از کودکان مبتلا به اسهال حاد

سویه‌های اشريشیاکلی O157 ایزوله شده						آنتی بیوتیک
۶	۵	۴	۳	۲	۱	
R	R	R	R	R	R	آمپی سیلین
S	R	R	S	R	R	تراسایکلین
R	R	R	R	R	R	ترایمتوپریم
S	S	S	S	S	S	جنتامايسین
S	S	S	S	S	S	سفالکسین
S	R	R	S	R	S	سفوتاکسیم
S	S	S	S	S	S	سیپروفلوکسازین
R	S	S	R	R	R	فوسیدیک اسید
S	R	R	S	S	R	نالیدیکسیک اسید

R = Resistant ; S=Sensitive

اشریشیاکلی O157 از مدفع شان جداسازی شد در تطابق با عالیم بالینی در بیماران مبتلا به عفونت های ناشی از EHEC می باشد (۳۳ و ۳۴). سن کلیه بیماران مبتلا به عفونت ناشی از اشریشیاکلی O157 کمتر از ۵ سال و اغلب زیر ۳ سال بود (با میانگین سنی ۳۰/۶ ماه) که این یافته با گزارش های قبلی از امریکا تطابق دارد (۳۵). در مطالعه ما موارد شناسایی شده عفونت اشریشیاکلی O157 در فصل تابستان بدست آمد که این امر در مطالعات قبلی نیز گزارش شده و فصل تابستان بدليل گرم بودن هوا و امکان رشد بهتر باکتری بعنوان زمان پر خطر جهت ابتلا به عفونت های ناشی از این باکتری معرفی شده است (۳۶).

در بیماران مبتلا به عفونت اشریشیاکلی O157 و سایر موارد محدود شناسایی شده با اشریشیاکلی O111 و O26 سابقه آنمی یا گرفتاری کلیوی بدست نیامد که با توجه به تعداد کم از موارد مثبت بدست آمده در این منطقه قابل توجیه می باشد. البته در صورت پی گیری بیماران نتایج بهتری عاید می گردد که از اهداف این مطالعه نبود.

علیرغم استفاده از رشد باکتری های آزمایشی از محیط کشت نوترینت آگار در آزمایش های سرولژیک جهت تعیین نوع اشریشیاکلی ها تعداد ۱۳۹ سویه دارای اتوآگلوتیناسیون بودند که تعلق احتمالی آنها را به تیپ EAEC مطرح می سازد (۳۷ و ۳۸). نتایج تست های حساسیت آنتی بیوتیکی نشانگر مقاومت سویه های اشریشیاکلی O157 ایزوله شده در برابر چند آنتی بیوتیک بود (جدول ۲) که در تطابق با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد (۲۸ و ۳۹). احتمالاً دلیل این امر استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در این منطقه و در نتیجه ظهور سویه های با مقاومت چند گانه می باشد. حساسیت کلیه سویه های ایزوله شده در برابر سپرروفلوكسازین، سفالکسین و جنتامايسین و نیز حساسیت نسبی به سفتاکسیم و نالیدیکسیک اسید معرف آنتی بیوتیک های موثر در درمان این باکتری ها بوده و می توانند در رژیم های درمانی مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است جهت قضاوت در مورد الگوی حساسیت و مقاومت این باکتری ها نیاز به مطالعات گستره تر و بر اساس تعداد بیشتری از سویه های اشریشیاکلی O157 می باشد تا وضعیت حساسیت و مقاومت آنها در منطقه با اطمینان بیشتری معرفی گردد. بر اساس نتایج سایر تحقیقات انجام شده، استفاده از آنتی بیوتیک های مختلف در کنترل عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی O157 با افزایش قدرت تولید توکسین باکتری و نیز با بهم زدن فلور طبیعی روده و در نتیجه

بحث:

نتایج این مطالعه نشانگر دخالت عمدی باکتری ها در ایجاد اسهال بود. این یافته در تطابق با نتایج سایر مطالعات انجام شده در ویتنام (۲۵)، ترکیه (۲۶)، نیجریه (۲۷)، امریکا (۱۴) و عراق (۲۸) می باشد و مولید نقش بر جسته پاتوژن های باکتریال در ایجاد اسهال در کشورهای در حال توسعه می باشد. با وجود اینکه پاتوژن های شناخته شده ای در ۴۷/۵۵٪ موارد شناسایی گردید، در بقیه موارد غیر O157، ویریو، برسینیا، پلزیوموناس، ویروس ها و سایر میکروارگانیسم های دخیل در ایجاد اسهال باشد (۲۹).

هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی اشریشیاکلی O157 بود تا سایر میکروارگانیسم های دخیل در اسهال که خود نیازمند فراهم نمودن امکانات تكمیلی مربوطه می باشد و این امر می تواند توجیه گر موارد شناسایی نشده باشد.

بر اساس نتایج مطالعه ما عوامل انگلی دخیل شامل انتاموباهیستولیتیکا و ژیادیا لامبیا بود که در ۹/۷٪ بصورت عامل سببی منفرد شناسایی شدند. این پاتوژن های روده ای در ۵۶ مورد (۵/۴٪) نیز بصورت توان با عوامل پاتوژن باکتریال شناسایی گردیدند. شناسایی ۸/۹٪ انتاموباهیستولیتیکا و ۵٪ از ژیادیا با سایر یافته ها در ایران (۳۰ و ۳۱) در تطابق خوب بوده و نشانگر حضور فعال این انگل ها در ایجاد اسهال در این منطقه از کشور است. در سایر مطالعات نیز نقش انگل ها در ایجاد اسهال بررسی شده است (۳۲).

باکتری هدف این مطالعه (E. coli O157) در ۶ مورد (۰/۵۸٪) جداسازی گردید. در ارتباط با سایر اشریشیاکلی های انتروهموراژیک در ۱۵ مورد (۱/۴٪) و ۱۳ مورد (۱/۲۷٪) به ترتیب اشریشیاکلی O111، O26 ایزوله شد که در مجموع ۲/۳۲٪ از اشریشیاکلی های انتروهموراژیک را شامل گردید و نشانگر دخالت کم این باکتری ها در ایجاد اسهال در منطقه می باشد. در حالیکه سایر پاتوژن های باکتریال از قبیل سالمونلا، شیگلا و کمپایلوباکتر ژرژونی به ترتیب در ۳/۱۷٪، ۹/۵٪ و ۳/۴٪ جداسازی شدند و نقش بمراتب بر جسته تری را نسبت به اشریشیاکلی های انتروهموراژیک نشان دادند.

وجود عالیم بالینی از قبیل درد شکم، استفراغ، عدم وجود تعداد زیاد از لکوسیت در مدفع و تب با درجه پائین در بیمارانیکه

اشريشیاکلی های پاتوژن بویژه *E.coli* O157 مورد تاکید بیشتر است، مشاهده شده است که بصورت اسپورادیک و در میزان پائین است. یافته های این مطالعه در ایران که حضور اشريشیاکلی های انتروهموراژیک را ۲۳٪ و حضور *E.coli* O157 را ۰/۵۸٪ نشان می دهد موید فراوانی کم این باکتری ها بوده و با گزارش های بسیاری از کشور های دیگر همخوانی دارد.

نتایج این مطالعه نشانگر حضور سویه های اشريشیاکلی O157 در کودکان شهر تبریز بوده و برنامه ریزی برای تعیین هویت این دسته از باکتری های مهم پژوهشکی در آزمایشگاه های روتین توصیه می گردد و نیز لازم است مطالعات گسترده تر انجام شده و برنامه ریزی لازم جهت ایجاد سیستم های پیشگیری و کنترل در این زمینه انجام گردد.

تشکر و قدردانی:

این مطالعه طرح تحقیقاتی (بشماره ۹۴-۸۲) بوده واژ حمایت های صمیمانه و ارزشمند مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکر و قدردانی می گردد.

با رشد بیش از حد اشريشیاکلی O157 در ارتباط است و چنین وضعیتی شرایط مستعدی را در بروز عوارض بعدی از قبیل توسعه سندروم اورمی همولیتیک فراهم می سازد (۱۰). نتایج مطالعات انجام شده نشانگر افزایش تولید سم سویه های اشريشیاکلی O157 بدنبال استفاده از تریمتوبیریم - سولفاماتاکسازول در شرایط خارج از بدن می باشد (۴۰ و ۴۱) و با توجه به مقاومت ۶ ایزوله بدست آمده در این مطالعه استفاده از این انتی بیوتیک در موارد عفونت ثابت شده یا مشکوک می تواند باعث آسیب های جدی در بیماران باشد. اخیراً روش های مولکولی جهت شناسایی اشريشیاکلی O157 انجام می شود که می تواند مخصوص جواب های دقیق تر باشد (۴۲).

نتیجه گیری:

در اغلب آزمایشگاه های تشخیص طبی اشريشیاکلی های پاتوژن روده ای بصورت روتین مورد تجسس و شناسائی قرار نمی گیرد و از طرفی بیماران اسهالی بعد از چند روز بهبود می یابند، لذا این باکتریهای مهم پژوهشکی عمدتاً در موارد شیوع اسهال مورد توجه ویژه قرار میگیرند . در موارد غیر اپیدمیک در کشورهایی که تجسس

فهرست مراجع:

1. Mackenzie AMR, Label P, Orrbine E, Johnson P, Mc Laine PN, and The Synsorb Pk study investigators. Sensitivities and specificities of premier *E.coli* O157 and premier EHEC enzyme immunoassays for diagnosis of infection with verotoxin (shiga-like toxin) – producing *Escherichia coli*. *J Clin Microbiol* 1998; 36 (6): 1608 – 1611.
2. Center for Disease Control. *Escherichia coli* O157: H7, 2001. <http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/escherichiacoli-g.htm>(Accessed April 2002).
3. Cheryl AB, Frances WB, Patricia IF, Joy GW and Nancy AS. Escherichia, shigella and Salmonella. In: *Manual of Clinical Microbiology*. Murray PR, Baron EJ,Jorgensen JH, Pfaller MA and Yolken RH(eds). 8th ed. 2003; PP: 654 – 655.
4. مانرو ج : میکروبیولوژی غذایی مدرن . ترجمه مرتضوی سع ، معتمدزادگان ع ، گوهربی اردبیلی الف ، اعلمی م .

9. Juckett G. Prevention and treatment of travelers diarrhea. *Am Fam physician* 1999; 60: 19-36.
10. Combs B. Shiga toxin producing *Escherichia coli* in Australia. Food Safety and Hygiene 2005; <http://www.foodsafetycenter.com.au/fsh/fshbull40.pdf>.
11. Verocytotoxin – producing *E.coli* food poisoning and its prevention [editorial]. *Institute of Food Science & Technology*, <http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin-gesundheit/bericht-36487.html> (Accessed May 2007).
12. Euro surveillance. Surveillance of enterohemorrhagic *E.coli* (EHEC) infections and haemolytic uremic syndrome (HUS) in Europe . Euroround up 1997; 2(12): <http://www.ceses.org/eurosurveillance/v2n12/en17-221.htm>(Accessed May 2002) .
13. Joseph SW, Ingram DT and Kaper JB.The epidemiology, pathogenicity and microbiology of foodborne *Escherichia coli* O157: H7. *Reviews in Medical Microbiology* 2002; 13 (2): 53-62.
14. WHO. Prevention and control of enterohaemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC) infections .Report of a WHO Consultation Geneva, Switzerland, 28 April – 1 May 1997.
15. Slutsker L,Ries AA, Greene KD, Wells JG, Hut wagner L and Griffin PM. *Escherichia coli* O157: H7diarrhea in the United States: Clinical and epidemiologic features. *Ann Intern Med* 1997; 126 (7): 505-513.
16. Vernozy – Rozand C, Ray – Gueniot S, Ragot C, Bavai C, Mazuy C, Montet MP,et al . Prevalence of *Escherichia coli* O157: H7 in industrial minced beef. *Letters in Applied Microbiology* 2002; 35:7-11.
17. Karch H, Janetzki-Mittmann C, Aleksic S, Datz M. Isolation of enterohemorrhagic *Escherichia coli* O157 strains from patients with hemolytic – uremic syndrome by using immunomagnetic separation , DNA – based methods , and direct culture . *J Clin Microbiol* 1996; 34(3): 516-519.
18. Samadpour M, Barbour MW, Nguyen T, Cao TM, Buck F, Depavia GA, et al. Incidence of enterohemorrhagic *Escherichia coli*, *Escherichia coli* O157, *Salmonella* and *Listeria monocytogenes* in retail fresh ground beef, Sprouts and Mushrooms. *Journal of Food Protection* 2006; 69(2): 441 – 443.
19. Calderwood SB. Microbiology, pathogenesis and epidemiology of enterohemorrhagic *Escherichia coli* 2007, <http://patients upto date.com/topic.asp file = gi-infec/ 7523> (Accessed April 2007).
20. Muniesa M, Jofre J, Garcia – Aljaro C and Blanch AR. Occurrence of *Escherichia coli* O 157:H7 and other enterohemorrhagic *Escherichia coli* in the environment. *Environ Sci Technol* 2006; 40(23):7141-7149.
21. Soltan – Dallal MM. Diarrhea caused by enteropathogenic bacteria in children. *Archives of Iranian Medicine* 2001; 4(4): 201-203.
22. Alikhani MY, Mirsalehian A and Aslani MM. Detection of typical and atypical enteropathogenic *Escherichia coli* (EPEC) in Iranian children with and without diarrhea. *J Med Microbiol* 2006; 55: 1159 – 1163.
23. Besser J, Beebe J and Swaminathan B. Investigation of foodborne and waterborne disease outbreaks. In: Manual of Clinical Microbiology Murray PR, Baron EJ, Jorgenson JH, Pfaller MA, Yolken RH (eds). 8th ed. 2003 PP: 162-163.
24. Bauer AW, Kirby WM and sheries JC. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method *Am J Clin Pathol* 1966; 45: 493-496.
25. Nguyen TV,Van PL, Huy CL, Gia KN and Weintroub A. Detection and characterization of diarrheagenic *Escherichia coli* from young children in Hanoi, Vietnam. *J Clin Microbiol* 2005; 43(2): 755 – 760.
26. Hascelik G, Akan OA, Diker S, Baykal M. *Campylobacter* and enterohaemorrhagic *Escherichia coli* (EHEC) Associated gastroenteritis in Turkish children. *J Diarrheal Dis Res* 1991; 9(4): 315-317.
27. Omiogberale AI,Okolie M, Ajieh M. The prevalence of enterohaemorrhagic *Escherichia coli* in children presenting with diarrhea at university of Benin teaching hospital, Benin, Nigeria. *Journal of College of Medicine* 2002, 7(2): 77-80.
28. Shebib ZA, Abdul Ghani ZG and Mahdi L KH. First report of *Escherichia coli* O157 among Iraqi children. Eastern Mediterranean Health Journal 2003;9(1/2): <http://www.emro.who.int/publications/emhj/0901-2/first.htm>(Accessed August 2006).
29. Nguyen TV, Van Ph L, Huy CL, and Weintroub A. Diarrhea caused by rotavirus in children less than 5 years of age in Hanoi, Vietnam. *J Clin Microbiol* 2004; 42(12):5745-5750.

30. Hooshyar H, Rezaian M, Kazemi B, Jeddiani Tehrani M and Solymani -Mohammadi S. The distribution of *Entamoeba histolytica* and *Entamoeba dispar* in northern, central and southern Iran. *Parasitology Research* 2004; 94(2):96-100.
31. Partovi F, Khalili G, Kariminia A, Mahmoudzadeh -Niknam H. Effect of *Giardia lamblia* infection on the cognitive function of school children. *Iranian J Publ Health* 2007 (36)1:73-78.
32. Kucik CJ, Martin GL, Sorter BV. Common intestinal parasites. *American Family Physician* 2004; 69(5):1161-1168.
33. Pai CH. Sporadic cases of hemorrhagic colitis associated with *Escherichia coli* O157:H7. *Annals of Internal Medicine* 1984; 101: 738-742 .
34. MacDonald IA, Gould IM, Curnow J. Epidemiology of infection due to *Escherichia coli* O157: a 3-year prospective study. *Epidemiology and infection* 1996; 116: 279 - 284 .
35. Mead PS, Griffin PM. *Escherichia coli* O157:H7. *Lancet* 1998; 352: 1207-1212.
36. Chapman PA. A 1-year study of *Escherichia coli* O157 in cattle, sheep, pigs and poultry. *Epidemiology and infection* 1997; 119:245-250 .
37. Misawa N and Blaser MJ. Detection and characterization of autoagglutination activity by *Campylobacter jejuni*. *Infect Immun* 2000; 63(11):6168-6175.
38. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. *Medical Microbiology*. 4th ed .St. Louis , Missouri , Mosby.Inc.2002; P:272.
39. Prado VJ. Susceptibilidad in vitro de *Escherichia coli* enterohemorragicas frente 11 antimicrobian. Relacion enter resistencia antibiotica y genotipos toxigenicos. [In Vitro susceptibility of enterohaemorrhagic *E.coli* to 11 antimicrobials. Relationship between antibiotic resistance and toxigenic genotype] *Revista Medica de Chile* 1995; 123:1085-1090.
40. Strockbine NA, Margues LR, Holmes RK and O'Brien AD. Characterization of monoclonal antibodies against shigalike toxin from *Escherichia coli*. *Infection and Immunity* 1985; 50:695-700.
41. Kareh H, Strockbine NA, O'Brien AD. Growth of *Escherichia coli* in the presence of trimethoprim-sulphamethoxazole facilitates detection of shiga like toxin producing strains by colony blot assay. *FEMS Microbiology Letters* 1986; 35:141-145.
42. Steel M, Ziebell K, Zhang Y, Benson A, Konczy P, Johnson R and Gannon V. Identification of *Escherichia coli* O157:H7 genomic regions conserved in strains with a genotype associated with human infection. *Appl Environ Microbiol* 2007; 73(1): 22-31.