

مطالعه روند اسپر ماتوژنر و نقش حفاظتی عنصر روی در بیضه یک سمت بعد از وارد آمدن ضربه بالات به بیضه طرف مقابل موش صحرایی نابالغ نژاد ویستار

دکتر قاسم ساکی^{*}، دکتر کاظم رادان^{**}، دکتر شاهرخ مصطفی رادمند^{***}، ایران رشیدی^{***}، فاخر رحیم^{****}

* دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران.

** استادیار ارتوЛОژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران.

*** استادیار پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران.

**** کارشناس ارشد بیوانفرماتیک، مرکز تحقیقات بالینی آپادانا، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف

در مورد اثر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر عملکرد و ساختمان بیضه طرف مقابل تاکنون گزارشات ضد و نقیضی منتشر شده است. این مطالعه با هدف تعیین عوایق ترومای بلانت یک طرفه بیضه بعد از گذشت یک دوره اسپر ماتوژنر (معادل ۴۰ روز) بر تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی و هم‌چنین ساختمان این سلول‌ها در بیضه سمت مقابل و تعیین اثر عنصر روی بر تغییرات بالا انجام گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی ۳۰ سر موش صحرایی نابالغ نژاد ویستار با سن ۷ هفت‌هه انتخاب و به سه گروه مساوی ($n=10$) تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد بودند که بیضه سمت چپ آن‌ها تحت بیهوشی عمومی مورد جراحی قرار گرفت. در گروه دوم و سوم ترومای بلانت بر بیضه سمت چپ وارد شد که باعث پاره شدن غلاف سفید بیضه گردید. در گروه سوم، بلافارسله پس از ضربه، سولفات روی با دوز ۵۰۰ میلی‌گرم بر کیلو‌گرم به صورت داخل صفاقی تزریق و سپس به مدت ۴۰ روز روی با دوز روزانه واحد ppm (part per million) به صورت خوارکی تجویز شد. پس از این مدت موش‌ها کشته شده و بیضه سمت راست از بدن موش‌ها خارج گردید. پس از انجام مراحل مختلف تهیه لام و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین - آئوزین، تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی و هم‌چنین ساختمان این سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون‌های تکمیلی توکی و دانکن تجزیه و تحلیل شدند و $P<0.05$ سطح معنی‌داری اختلاف‌ها قرار داده شد.

یافته‌ها

اختلاف تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی در سه گروه مورد مطالعه معنی‌دار نبود. ($P>0.05$). تغییرات هیستولوژیک در سلول‌های سرتولی و بینایینی در دو گروه دوم و سوم مشاهده گردید. اثر حمایتی روی بر تعداد و ساختمان سلول‌های ژرم معنی‌دار نبود ($P>0.05$).

نتیجه‌گیری

بر اساس این مطالعه ضربه بالات یک طرفه بیضه بعد از گذشت ۴۰ روز تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی بیضه سمت مقابل را تغییر نمی‌دهد. این تحقیق، مطالعه طولانی‌مدت بافت بیضه بعد از ضربه بالات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به صورت اختصاصی پیشنهاد می‌نماید.

کلید واژه‌ها: ضربه بالات یک طرفه؛ بیضه؛ روی؛ موش صحرایی؛ اسپرماتوژنر.

نویسنده مسئول مکاتبات: دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران.

تلفن: ۰۹۱۶۶۱۸۱۶۸۵ آدرس پست الکترونیکی: ghasemsaki@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۹/۱۲/۸۷

تاریخ دریافت: ۲۵/۹/۸۷

مقدمه

که کمبود روی می‌تواند سبب تأخیر در رشد و بلوغ جنسی و کاهش کارکرد گنادها گردد (۱۴-۱۷). هم‌چنین با تجویز روی آثار تخریبی کادمیوم (۱۸) و فلوراید (۱۹) بر بافت بیضه کاهش می‌یابد. مطالعات نشان داده است، که میزان روی پلاسما در طی سنتز سریع بافت‌ها کم می‌شود و این امر احتمالاً به این دلیل است که برداشت روی از پلاسما سریع‌تر از جذب روده‌ای آن است (۲۰). هدف این مطالعه تعیین عواقب ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه بعد از گذشت یک دوره اسپرماتوژن (معادل ۴۰ روز) بر تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی و هم‌چنین ساختمان این سلول‌ها در بیضه سمت مقابل و تعیین اثر عنصر روی بر تغییرات بالا می‌باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی ۳۰ موش صحرایی نبالغ با سن ۷ هفته از نژاد ویستار با وزن بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ گرم مورد بررسی قرار گرفتند. این حیوانات از مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی خریداری و در مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی گروه علوم تشریح و در شرایط ۱۲ ساعت روشانی و ۱۲ ساعت تاریکی و در دمای ۲۵±۲ درجه نگهداری شدند. تمام اقدامات جراحی توسط دستیار ارولوژی و با بیهوشی عمومی و تحت شرایط استریل انجام گرفت. جهت بیهوشی از تزریق داخل صفاتی کتابین به میزان ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم استفاده گردید. موش‌های صحرایی به طور تصادفی به سه گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه ۱ تحت عنوان شاهد بودند که یک عمل جراحی با برش روی اسکروتوم انجام، بیضه از درون اسکروتوم خارج و سپس مجدداً درون کیسه قرار گرفت. گروه ۲ (گروه تجربی ۱)، در این گروه ابتدا بیضه چپ با یک برش طولی روی اسکروتوم آزاد و سپس غلاف سفید (Tunica Albugina)

ترومای بیضه که یک ارولوژیکی به حساب می‌آید، اغلب در حین فعالیت‌های ورزشی اتفاق می‌افتد. سایر موارد شامل تصادفات با وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع است. از نظر پاتوفیزیولوژی غالباً ترومای به صورت بلانت بوجود می‌آید که این امر باعث فشردنی بیضه روی استخوان شرمگاهی یا شاخ استخوان نشیمنگاهی می‌گردد (۱-۳). ترومای بلانت به صدماتی گفته می‌شود که در نتیجه عملکرد اشیا با انرژی بسیار و سطح گستردگی بیضه و اسکروتوم اتفاق می‌افتد (۴). اثرات درازمدت ترومای بلانت بیضه همواره باعث نگرانی بیمار، خانواده‌ها و پزشک معالج است. با توجه به کاهش قدرت باروری متعاقب ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه، اثرات ترومای یک‌طرفه بیضه روی بیضه طرف مقابل مطرح می‌باشد (۵-۷). آسیب بیضه مقابل همراه با تغییرات بافت بیضه و هم‌چنین تغییرات هورمونی و بیوشیمیایی پس از ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه در برخی مطالعات نشان داده شده است (۹،۸)، گرچه برخی مطالعات این موضوع را تأیید نمی‌کند (۱۰). بعضی از محققان معتقدند که دلیل احتمالی آسیب بیضه طرف مقابل پاسخ اینمی از طریق سلولی و یا آنتی‌بادی و یا دلیل احتمالی دیگر مربوط به اینفلیتراسیون نوتروفیل و ظهور رادیکال‌های آزاد اکسیژن هم‌چون هیدروژن پراکسی یا رادیکال‌های هیدروکسیل می‌باشد (۱۱،۱۲). بر اساس یافته‌های فوق در مورد برخورد با ترومای بلانت بیضه (حفظ یا ارکیکتومی بیضه صدمه دیده) اتفاق نظر وجود ندارد (۸-۱۰). روی یک عنصر حیاتی و اساسی بوده که ارتباط نزدیکی با فعالیت اندوکرینی دارد (۱۳)، و برای فعالیت بیش از ۳۰۰ آنزیم به خصوص RNA پلی‌مراز و DNA پلی‌مراز و سایر متالوآنزیم‌ها (۱۴) سنتز پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها و تقسیم سلولی و هم‌چنین فعالیت تولید مثل، اسپرماتوژن و پایدار ماندن ساختمان کروماتین در هسته سلولی (۱۴) دارای نقش به سزاگی است، به طوری

تحلیل گردید. $P < 0.05$ سطح معنی‌داری اختلاف‌ها قرار داده شد.

یافته‌ها

میانگین تعداد سلول‌های اسپرماتید گرد و دراز در گروه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب برابر با $44/03 \pm 4/14$ ، $43/00 \pm 2/32$ و $41/01 \pm 0/2$ عدد بود. اختلاف در تعداد سلول‌های اسپرماتیدی در دو گروه ۱ و ۲، ۲ و ۳ و ۱ و ۳ معنی‌دار نبود. مطالعه میکروسکوپی انجام شده تغییر پاتولوژیک در ساختمان این سلول‌ها را تأیید نکرد. میانگین تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی در گروه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب برابر با $55/63 \pm 4/14$ ، $55/51 \pm 2/32$ و $53/31 \pm 2/32$ عدد بود. گرچه به نظر می‌رسید که تعداد سلول‌های یک بیضه به دلیل ضربه بالانت واردہ به بیضه سمت مقابل کاهش یافته‌اند، اما آنالیز آماری انجام شده نشان داد که اختلاف در تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی در دو گروه ۱ و ۲، ۲ و ۳ و ۱ و ۳ معنی‌دار نیست. مطالعه میکروسکوپی انجام شده تغییر پاتولوژیک در ساختمان این سلول‌ها را تأیید نکرد. میانگین تعداد سلول‌های اسپرماتوسیت اولیه در گروه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب برابر با $49/19 \pm 2/2$ ، $52/23 \pm 4/11$ و $50/13 \pm 9/62$ عدد بود. اختلاف در تعداد سلول‌های اسپرماتوسیت در دو گروه ۱ و ۲، ۲ و ۳ و ۱ و ۳ معنی‌دار نبود. هم‌چنین بررسی‌های میکروسکوپی تغییر پاتولوژیک خاصی را در ساختمان این سلول‌ها نشان نداد. میانگین تعداد سلول‌های لیدیگ در گروه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب برابر با $10/03 \pm 0/09$ ، $10/06 \pm 0/02$ و $9/08 \pm 0/02$ عدد بود که در تعداد سلول‌های لیدیگ در دو گروه ۱ و ۲، ۲ و ۳ و ۱ و ۳ تفاوت معنی‌داری دیده نشد. بررسی‌های میکروسکوپی تغییراتی هم‌چون فشرده شدن هسته و گرانولار شدن سیتوپلاسم را در ساختمان سلول‌های لیدیگ نشان داد. میانگین تعداد سلول‌های سرتولی در گروه‌های ۱ تا ۳ به ترتیب برابر با $9/09 \pm 0/05$ ، $8/01 \pm 0/07$ و $9/05 \pm 0/07$ و

باز و ترومای بلانت توسط یک وزنه ۲۰۰ گرمی استریل که از ارتفاع ۵/۵ سانتی‌متری کوییده می‌شد، ایجاد گردید و با استفاده از ذره‌بین از پاره شدن غلاف سفید اطمینان حاصل شد، سپس این پرده بسته شده و بیضه درون اسکرتومن قرار گرفت. گروه ۳ (گروه تجربی ۲): در این گروه مشابه گروه قبل عمل شد، اما بلافارسله پس از ترومای محلول سولفات روی با دوز ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تجویز و سپس روزانه ppm (part per million) به ۵۰۰ صورت خوراکی که در ۱۸ میلی‌لیتر آب حل شده بود به مدت ۴۰ روز تجویز گردید (۲۱). موش‌ها در حیوانخانه نگهداری شدند و پس از گذشت ۴۰ روز و فرارسیدن بلوغ موش‌ها، موش‌های هر گروه به صورت جداگانه با استفاده از محلول اتر کشته شده و بیضه سمت راست آن‌ها از بدن خارج گردید. بیضه‌های خارج شده بلافارسله در محلول بوئن فیکس شده (۲۲) و مراحل مختلف بافتی توسط دستگاه خودکار آماده‌سازی بافت انجام شد. برش‌هایی به ضخامت ۴-۵ میکرومتر از قسمت‌های بالایی، میانی و پایینی هر بلوک پارافینی تهیه گردید (حدود ۵۰ برش). نمونه‌ها با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-اثوزین رنگ آمیزی شدند. به منظور شمارش اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی مقاطع عرضی رنگ آمیزی شده با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر گروه مورد مطالعه از میان لوله‌های اسپرم‌ساز ۱۲ مقطع عرضی لوله که از نظر شکل ظاهری و قطر مشابه بودند، انتخاب و سلول‌های اسپرماتیدی گرد و دراز، سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت‌های اولیه، سلول‌های لیدیگ و سرتولی شمارش شدند. بعد از این عمل ساختمان سلول‌ها نیز مطالعه گردید. اطلاعات به دست آمده در جدول ثبت اطلاعات نوشته شد. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون‌های Duncan و Tukey و با استفاده از برنامه آماری SPSS Version 15 تجربه و

بعد از گذشت ۴۰ روز در تعداد اسپرماتیدها، اسپرماتوسیت‌ها، سرتولی و سلول‌های لیدیگ بیضه سمت مقابل تغییر معنی داری را نشان نمی‌دهد. نتایج حاصل از این مطالعه تأیید کرد، همان‌طور که Lin و همکارانش گفته‌اند بهتر است بیضه تروما خورده حفظ شود. البته باید به تغییرات پاتولوژیک ایجاد شده در سلول‌های سرتولی و لیدیگ نیز دقت نمود؛ چرا که شاید این تغییرات در درازمدت باعث تغییر در تعداد سلول‌ها و یا تغییرات وسیع دیگری شود. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در مدت زمان‌های طولانی‌تر و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی انجام گیرد، تا بتوان نتیجه دقیق‌تری گرفت. از طرف دیگر مطالعات مختلفی در مورد نقش روی در اسپرماتوژنر انجام شده است. در یک مطالعه که توسط Krishnamurthy و همکاران در مورد نقش محافظتی عنصر روی بر اسپرماتوژنر موش صحرایی صورت گرفت، نشان داد که استفاده از اسپارتات روی می‌تواند سلول‌های اسپرماتوگونی را در برابر مرگ سلولی ناشی از اشعه حفظ کند (۱۴). Onyenmachi و همکارانش نیز نشان دادند که مصرف روی می‌تواند از آسیب بیضه و سمی بودن ناشی از کرومیوم جلوگیری کند (۲۷). هم‌چنین بیان کردند، روی در حفظ سلامتی اسپرم دارای نقش اساسی است و سبب حفظ ساختمان اسپرم و کروماتین، افزایش فعالیت و حرکت رو به جلوی اسپرم‌ها می‌شود و کمبود آن سبب از بین رفتن فعالیت آکروزوم و اختلال در باروری تخمک می‌گردد (۲۸). به دلیل اثرات مفید عنصر روی به تواند می‌رسد که هنگام بروز پروسه ترمیم ضایعات بافتی می‌تواند مؤثر باشد. در برخی مطالعات آمده است که افزایش موضعی سیتوکین‌ها در طی صدمات می‌تواند در بروز اختلال فعالیت بیضوی و ناباروری نقش ایفا کند (۲۹). در بعضی مطالعات نیز گزارش شده، که روی می‌تواند عامل بازدارنده در تشکیل رادیکال‌های آزاد و کاهش دهنده سیتوکین‌های سیتوکسیک پیش‌التهابی مثل TNF- α

عدد بود. اختلاف در تعداد سلول‌های سرتولی در دو گروه ۱ و ۲، ۲ و ۳ و ۳ معنی دار نبود. بررسی‌های میکروسکوپی تغییرات پاتولوژیکی که مقدمه تغییرات آپوپتوزی است، در ساختمان سلول‌های سرتولی نشان داد.

بحث

بیماری‌های یک‌طرفه بیضه مثل بیضه نزول نکرده یا چرخش یافته باعث صدمه به بیضه همان سمت و بیضه مقابله می‌گردد (۲۳) صدمه به بیضه مقابله در چنین شرایطی ناشی از پدیده Sympathetic Orchiopathy است (۲۴). اگرچه مکانیسم دقیق این پدیده کاملاً روش نیست، اما بر اساس تحقیقات، احتمالاً مکانیسم ایمونولوژیک پس از ضربه به سد خونی–بیضوی (Blood Testis Barrier) باعث بروز چنین تغییراتی در بیضه مقابله می‌گردد (۲۵). هم‌چنین در مطالعات تجربی کاهش باروری پس از نهان خایگی یک‌طرفه بیضه نشان داده است (۲۶). با وجود این اثر ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه بر کارکرد بیضه مقابله، به طور کامل مورد اتفاق نظر نیست (۸-۱۰). در بعضی مطالعات ادعا شده است که میزان زیادی از ناباروری به همراه تغییرات هورمونی زیاد در مردان جوان با سابقه ترومای بیضه مشاهده گردیده است (۸). Corman و همکارانش ناباروری را در بیشتر بیمارانی که در آن‌ها بیضه پس از ترومای بلانت حفظ شده بود گزارش کردند (۵). بر عکس Lin و همکارانش گزارش نمودند که حفظ بیضه ترومای خورده در مجموع جهت حفظ عملکرد کلی بیضه مناسب‌تر است تا برداشت آن (۱۰). در مطالعه دیگر Nolten و همکارانش، مشاهده گردید که حدود ۱۷٪ از مردان نابارور در گذشته خود سابقه ترومای بلانت یک‌طرفه بیضه داشته‌اند و در این افراد، میزان هورمون‌های استرادیول و FSH بالاتر از حد نرمال بوده است. هم‌چنین پارامترهای اسپرم نیز غیرطبیعی بودند (۸). در مطالعه حاضر مشخص گردید که ترومای بلانت واردہ به بیضه یک سمت

کرد که شاید عنصر روی در ترمیم بیضه ترومما خورده تأثیر داشته است، بنابراین پیشنهاد می شود در این مورد مطالعه بیشتری صورت گیرد.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان نامه (به شماره ۲۲۶۸) شاهرخ مصطفی رادمرد دستیار ارولوژی بیمارستان گلستان دانشگاه جندی شاپور اهواز است. نگارندگان مقاله مراتب تقدير و تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه به دلیل تأمین مالی این طرح اعلام می دارند.

و IL-6، IFN- γ و افزایش دهنده پاسخ ضد التهابی به واسطه IL-10 باشد (۳۰، ۳۱).

نتیجه گیری

بر اساس این مطالعه ضربه بالاتر یک طرفه بیضه بعد از گذشت ۴۰ روز تعداد اسپرماتیدهای گرد و دراز، سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، سلول های لیدیگ و سرتولی بیضه سمت مقابل را تغییر نمی دهد و تجویز روی بلا فاصله پس از آسیب بیضه به دلیل ترومما در موش صحرایی، نتوانست بر تعداد اسپرماتوگونی ها، اسپرماتیدها، اسپرماتوسیت ها، سرتولی و سلول های لیدیگ در بیضه مقابل تأثیری داشته باشد. البته باید به این نکته دقت

References:

1. Hhendry WF. Testicular, Epididymal and Vassal Injury. BJU 2000;86(3):344-345.
2. Yoshimura K, Okubo K, Ichioka K. Restoration of Spermatogenesis by Orchiopexy 13 Years after Bilateral Traumatic Testicular Dislocation. J Urol 2002;167:649-650.
3. Cass AS, Luxenberg M. Testicular Injuries. Urolo 1991;37(6):528-530.
4. Cass AS. Testicular Trauma. J urol 1983;129(2):299-300.
5. Kukadia AN, Ercole CJ, Gleich P, Hensleigh H, Pryor JL. Testicular Trauma: Potential Impact on Reproductive Function. J Urol 1996;156:1643-1646.
6. Sharma RB, Srinivas M, Mitra DK, Das SN. Tlymphocyte Subsets in the Contralateral Testis after Unilateral Blunt Testicular Trauma in Prepubertal Mice Springcline. Pediatr Surg 1999;15:457-460.
7. Salvis SA, Schol JN, Hewitt CW, Black KS, Campbell RS, Patal M, Zimmerman J, Peak ML, Martin DC. The Effect of Testicular Trauma on Fertility in the Lewis Rat and Comparisons to Isoimmunized Recipients of Syngenic Sperm. J of Urol 1990;143:638-641.
8. Nolten WE, Viosca SP, Korenman SG, Mardi R, Shapiro SS. Association of Elevated

Estradiol with Remote Testicular Trauma in Young Infertile Men. Fertil Steril 1994;62:143-149.

9. Shaul DB, Xie HW, Diaz JF, Mahnovski V, Hardy BE. Surgical Treatment of Testicular Trauma: Effect on Fertility and Testicular Histology. J Pediatr Surg 1997;32:84-87.
10. Lin WW, Kim ED, Quesada ET, Larry I, Lipshultz LI, Coburn M. Unilateral Testicular Injury from External Trauma: Evaluation of Semen Quality and Endocrine Parameters. J of Urol 1998;159:841-843.
11. Sakamoto Y, Matsumoto T, Kumazawa J. Cell Mediated Autoimmune Response to Testis Induced by Bilateral Testicular Injury Can be Suppressed by Cyclosporine. A J Urol 1998;159:1735-1740.
12. Sharma RB, Srinivas M, Mitra DK, Das SN. T-Lymphocyte Subsets in the Contralateral Testis after Unilateral Blunt Testicular Trauma in Pre-Pubertal Mice. Pediatr Surg Int 1999;15:238-239.
13. Kvist U, Bjorndahl L. Zinc Preserves an Inherent Capacity for Human Sperm Chromatin Decondensation. Acta Physiol Scand 1985;124:195-200.
14. Krishnamurthy H, Jagetia GC, Jyothi P. Radioprotective Effect of Zinc Aspartate on

- Mouse Spermatogenesis: A Flow Cytometric Evaluation. *Mutat Res* 1998;401:111-120.
15. Masters DG, HE Fels. Effect of Zinc Supplementation on Reproductive Performance of Grazing Merion Ewes. *Biolo Trace Elem. Res* 1980;7:89.
16. Fournier GR, Macaninch JW. Sonography in the Staging of Testicular Trauma. In: *Traumatic and Reconstructive Urology*. Philadelphia; 1996. p. 727-732.
17. Olivera CEA, Badu CA, Ferreira WM, Lana AMQ. Effect of Dietary Zinc Supplementation on Spermatic Characteristics of Rabbit Breeders. Proceedings of the 8th World Rabbit Congress, September 7-10,2005.
18. Amara S, Hafedh A, Garel C, Pascale G, Thierry D, Ravanat JL, Favier A, Sakley M, Khemis R. Preventive Effect of Zinc Against Cadmium-induced Oxidative Stress in the Rat Testis. *J of Reorod and Develop* 2008;54:129-134.
19. Krasowska A, Wlostowski T, Bonda E. Zinc Protection from Fluoride-Induced Testicular Injury in the Bank Vole. *Toxicol Lett* 2004;147:229-235.
20. Butrimoitz GP, Purdy WC. Resolution of Age-Dependent Reference Intervale: Polynominal Regression Methodology with Applicability to Plasma Zinc Levels in a Childhood Population. *Clin Biochem* 1979;12:33-36.
21. Krishnamurthy H, Jagetia GC, Jyothi P. Radioprotective Effect of Zinc Aspartate on Mouse Spermatogenesis: A Flow Cytometric Evaluation. *Mutat Res* 1998;401:111-120.
22. Cetin B, Ugur O. The Effect of Zinc Therapy on Damage Testis in Pre-Pubertal Rats. *Pediatr Surg Int* 2004;20:444-448.
23. Thomas WE, Cooper MJ, Crane GA. Testicular Exocrine Malformation after Torsion. *Lancet* 1984;2:1357-1360.
24. Wallace DMA, Gunter PA, Landon GV. Sympathetic Orchiopathia-An Experimental and Clinical Study. *Br J Urol* 1982;54:765-768.
25. Sakamoto Y, Matsumoto T, Mizuno Y. Testicular Injury Induces Cell-Mediated Autoimmune Response to Testis. *J Urol* 1995;153:1316-1320.
26. Srinivas M, Agarwala S, Datta Guta S. Fertility and Unilateral Undescended Testis in the Rat Model II. *Pediatr Surg Int* 1998;13:392-395.
27. Onyenmachi J, Afonne OJ, Orisakwe OE, Ekanem IOA, Akumka DD. Zinc Protects Chromium-Induced Testicular Injury in Mice. *Indian Jof Pharmacol* 2002;34:26-31.
28. Al-Bader Aroma AE, Dashti H. Chronic Cadmium Toxicity to Sperm of Heavy Cigarette Smokers: Immunomodulation by Zinc. *Arch Androl* 1999;43:135-140.
29. Bedwal RS, Bahuguna A. Zinc, Cooper and Selenium in Reproduction. *Experiential* 1994;50:626-640.
30. Afanas'ev IB, Suslova TB, Cheremisinia ZP, Abramova NE, Korkina LG. Study of Antioxidant Properties of Metal Aspartates. *Analyst* 1995;120:859-862.
31. Haddad JJ, Land SC, Saade NE, Safieh-Garabedian B. Immunomodulatory Potential of Yhymulin-zn in the Alveolar Epithelium: Amelioration of Endotoxin-Induced Cytokine Release and Partial Amplification of a Cytoprotective IL-10 Sensitive Pathway. *Biochem Biophys Res Commun* 2000;274:500-505.