

بررسی آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از مصرف حشره کش دیازینون در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد)

سیدحسین خزاعی^{۱*}، نعمت‌آ... خراسانی^۲، خلیل طالبی جهرمی^۳، مجید احتشامی^۴

^۱ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

^۲ استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

^۳ استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

^۴ استادیار دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ایران

(تاریخ دریافت: ۸۶/۱۲/۲۰، تاریخ تصویب: ۸۸/۹/۳۰)

چکیده

با توجه به اینکه بیشتر مناطق دشتی استان مازندران تحت کشت فشرده برنج قرار دارد، از آفت‌کش‌ها برای کنترل آفات و افزایش میزان تولید، در مقیاس زیاد استفاده می‌شود. آفت‌کش غالب شالیزارها حشره کش دیازینون می‌باشد که برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج مصرف می‌شود، همچنین به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی در منطقه مورد بررسی، استفاده مردم از آب‌های زیرزمینی و عوارض احتمالی ناشی از آن در مناطق شمالی ایران، در این پژوهش بر روی کیفیت آب‌های زیرزمینی با تاکید بر چاه‌های کم عمق صورت گرفت. در سال ۱۳۸۵ از ۱۰ حلقه چاه کم عمق واقع در هفت روستا در دو فصل تابستان و پاییز نمونه برداری آب انجام شد. از هر حلقه چاه به میزان یک لیتر نمونه برداری شده و در بطری‌های شیشه‌ای تیره به آزمایشگاه منتقل شد. استخراج دیازینون از نمونه‌های آب توسط متیلن کلراید به روش مایع-مایع و خالص‌سازی آنها به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) صورت گرفت. باقی‌مانده موجود در نمونه‌ها به روش فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه‌گیری شد. ستون مورد استفاده C_{18} به ابعاد ۱۵۰×۶ میلی‌متر، فاز متحرک شامل متانل: آب به ترتیب به نسبت ۳۰:۷۰ و سرعت جریان $۱/۲۵۰$ میلی‌لیتر بر دقیقه بود. آشکارسازی در طول موج ۲۲۰ نانومتر با دکتور ماوراء بنفش انجام شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میزان باقی‌مانده دیازینون در آب‌های زیرزمینی منطقه مورد بررسی از $۰/۰۰۲$ تا $۰/۵۷۲$ میکروگرم بر لیتر است. غلظت دیازینون اندازه‌گیری شده در شماری از نمونه‌های آب بالاتر از میزان استاندارد تعیین شده سازمان بهداشت جهانی (WHO) یعنی $۰/۱$ میکروگرم بر لیتر بود.

کلمات کلیدی: آلودگی آب زیرزمینی، آفت‌کش، باقی‌مانده آفت‌کش، دیازینون، محمودآباد، HPLC

مقدمه

از آفت‌کش‌ها و حاصلخیزکننده‌ها قرار گرفته باشد (Bouman et al., 2002). در میان مواد شیمیایی کشاورزی، باقی‌مانده آفت‌کش‌های فسفره به علت تاثیر بر فعالیت کولین استراز (آنزیمی که برای عملکرد شبکه‌های عصبی نیاز می‌باشد) عمده‌ترین خطر را متوجه انسان می‌کنند. با توجه به آمار جهانی بیشترین میزان مرگ و میر به وسیله آفت‌کش‌ها مربوط به سموم فسفره می‌باشد (Riazi et al., 2003).

جدول شماره (۱) میزان توزیع سموم دفع آفات در منطقه مورد بررسی در سال زراعی ۸۵-۸۴ را نشان می‌دهد. با این نگرش، در این بررسی بقایای آفت‌کش دیازینون در آب‌های زیرزمینی منطقه محمودآباد در سال ۸۵ مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی منطقه مورد بررسی

شهرستان محمودآباد با گستره‌ای معادل ۵۱۰ کیلومتر مربع در مرکز استان مازندران واقع شده است که از نظر طول و عرض جغرافیایی در ۲۵ درجه ۱۵ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۳۳ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. شهرستان یادشده از نظر ریخت شناسی در بخش جلگه‌ای استان شکل گرفته و دارای ۹۱ نقطه روستایی می‌باشد. ارتفاع میانگین شهرستان نسبت به سطح دریای مازندران حدود ۲۰ متر و شیب عمومی آن به پیروی از شکل منطقه از جنوب به شمال می‌باشد. از نظر آب و هواشناسی دارای آب و هوای معتدل خزری است که میانگین دمای سالانه آن ۱۷ درجه سانتی‌گراد و ماههای دی و بهمن با ۱/۶- درجه سلسیوس به عنوان سردترین ماههای سال و تیر و مرداد با ۳۹ درجه سلسیوس به عنوان گرمترین ماههای سال گزارش شده‌اند. نوع خاک منطقه سیلته لوم می‌باشد. پوشش گیاهی این شهرستان به دلیل برخورداری از آب و هوای معتدل خزری و فراوانی بارش‌های جوی از تراکم ویژه‌ای برخوردار بوده و همه اراضی شهرستان مستعد کشت برنج و درختان مثمر و غیر مثمر می‌باشد. زندگی مردم این منطقه بیشتر بر پایه اقتصاد کشاورزی استوار است. عمده‌ترین محصول کشاورزی این منطقه ارقام برنج

رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده و زمینه گسترش فعالیت‌های کشاورزی را فراهم آورده است این افزایش تولید دارای عوارض زیست محیطی فراوان از جمله آبیاری بیشتر و مصرف بیشتر آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی بوده که در نتیجه باعث شستشو و جابجایی آنها به لایه‌های مختلف خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود. آب‌های زیرزمینی برای مقاصد مختلفی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند برای مثال آب آشامیدنی بیش از ۹۰ درصد شهرها در سراسر جهان از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود و در حدود ۴۰ درصد نیاز بخش کشاورزی به آب نیز با بهره‌برداری از این منابع تامین می‌شود، بنابراین کیفیت آب زیر زمینی موضوعی قابل تامل است (Erfanmanesh & Afuni, 2002). امروزه در اغلب کشورهای در حال گسترش کاربرد آفت‌کش‌ها و کنترل شیمیایی نقش اصلی در حفظ نباتات ایفا می‌نماید. شکی نیست که بهره‌گیری از آفت‌کش‌ها نقش بسزایی در کنترل آفات گیاهی دارد ولی حتی میزان‌های کم این مواد شیمیایی، پیامدهای زیست محیطی و زیان‌های بهداشتی بسیاری برای انسان در پی خواهند داشت. در نتیجه بهره‌گیری بی‌رویه از آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی علاوه بر آلودگی لایه‌های مختلف خاک، آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز در خطر آلودگی قرار می‌دهد. استان مازندران در شمال ایران از سرسبزترین و حاصلخیزترین مناطق ایران می‌باشد به طوری که سطح زیادی از این مناطق را پوشش گیاهی اعم از جنگل‌ها، کشتزارها، شالیزارها و باغ‌ها پوشانده‌اند. بیشتر مناطق دشتی این قسمت از ایران تحت کشت فشرده برنج می‌باشد و از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها برای افزایش عملکرد و تولید استفاده می‌شود. آفت‌کش غالب این منطقه حشره‌کش دیازینون می‌باشد که برای مبارزه با کرم ساقه‌خوار برنج بکار می‌رود. در بعضی از مناطق روستایی منطقه محمودآباد استان مازندران، اهالی آب مصارف خانگی و نوشیدنی خود را از آبخوان‌های کم عمق این منطقه به دست می‌آورند (Khazaei et al., 2007). کیفیت آب‌های زیرزمینی ممکن است تحت تاثیر استفاده

شده در شهرستان محمودآباد در شش ماه اول سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۲۰۵۵ لیتر و ۶۶۰۰ کیلوگرم بوده است که دانه‌های دیازینون ۲۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار و امولسیون ۱/۵-۱ لیتر در هکتار بوده است (Jihad-e-Agriculture, 2006).

زودرس و میان رس می‌باشد که در حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی زراعی آن را شامل می‌شود. آبیاری کشتزارها با بارش‌های جوی به اضافه آبیاری غرقابی با برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد. میزان آفت‌کش دیازینون که به صورت امولسیون و دانه (گرانول) توزیع

جدول ۱- میزان مصرف آفت‌کش‌ها بنا بر گزارش واحد حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در سال زراعی ۸۵-۸۴

نام محصول	آفت یا بیماری	نام آفت‌کش	میزان سم مصرفی
برنج	کرم ساقه‌خوار	فیپرونیل + کارتاپ + دیازینون ۱۰٪	۴۷۸۰۰ کیلوگرم
	کرم ساقه‌خوار	دیازینون ۶۰٪	۲۰۵۵ لیتر
	کرم سبز برگ‌خوار	کارباریل	۴۹۷۵ کیلوگرم
	علف‌های هرز	تیوبنکارب + بوتاکلر + اکسادیارگیل	۵۳۳۴۵ لیتر
	بلاست برگ	هینوزان	۲۸۷۰ لیتر
	بلاست خوشه	تری سیکلازول + هینوزان + وین	۴۸۱۰ لیتر

منطقه مورد بررسی شد (Mazandaran Regional Water Company, 2006). جدول شماره (۲ و ۳) نشان دهنده اطلاعات شیمیایی خاک و چاه‌های منطقه مورد بررسی می‌باشد. سپس نمونه برداری از منطقه به صورت تصادفی و در دو فصل تابستان و پاییز در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت (شکل ۱).

مواد و روش‌ها

در نخستین سفر اقدام به شناسایی و انتخاب مکان‌هایی که سطح گسترده‌ای از آن زیر کشت برنج می‌باشد، شد. پس از شناسایی محل، ۱۰ حلقه چاه کم عمق به علت احتمال آلودگی، واقع در هفت روستا انتخاب شد. سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات خاک (Jihad-e-Agriculture, 2006) و اطلاعات شیمیایی چاه‌های



شکل ۱- نقشه شهرستان محمودآباد (تهیه شده در محیط ArcGIS). محدوده مورد بررسی و محل‌های نمونه برداری با شکل مثلث نشان داده شده است

شد. سپس فاز آلی جدا شده از روی سولفات سدیم خشک عبور داده شد تا آبگیری شود. پس از آن برای انجام تصفیه و خالص‌سازی از کروماتوگرافی روی صفحه نازک بهره‌گیری شد. شناسایی و تعیین میزان سم به روش کروماتوگرافی فاز معکوس^۵ انجام شد و برای هر نمونه دستکم سه تزریق انجام شد. شرایط کروماتوگرافی شامل فاز متحرک: متانول+آب به ترتیب با نسبت ۷۰:۳۰ بود. ستون مورد استفاده C₁₈ به ابعاد ۶×۱۵۰ میلی‌متر بود. اندازه‌گیری با آشکارساز UV و در طول موج ۲۲۰ نانومتر انجام شد. سرعت جریان فاز متحرک ۱/۲۵۰ میلی‌لیتر در دقیقه تنظیم شد. در این شرایط زمان بازداری دیازینون حدود ۱۳ دقیقه بود.

بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش از دستگاه HPLC برای اندازه‌گیری و تعیین باقی‌مانده دیازینون استفاده شد. منحنی‌های بدست آمده ثبت شد. زمان بازداری منحنی‌های به دست آمده با منحنی استاندارد دیازینون مقایسه شد. سپس میزان باقی‌مانده با اندازه‌گیری سطح زیرمنحنی مربوط به هر نمونه و منحنی استاندارد، محاسبه شد.

تحت شرایط یاد شده، کروماتوگرام مربوط به استاندارد دیازینون و همچنین کروماتوگرام مربوط به نمونه‌ایستگاه اورطشت در شکل (۲) نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود جداسازی اوج (پیک) در حد مطلوبی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده در مورد غلظت سموم در ۱۰ ایستگاه نمونه‌برداری در شهرستان محمودآباد در فصل‌های تابستان و پاییز در جدول شماره (۴) نشان داده شده است. همان‌طور که در این جدول مشخص است غلظت سموم در ایستگاه‌های نمونه‌برداری در دو فصل تابستان و پاییز در محدوده ۰/۰۰۲ تا ۰/۵۷۲ میکروگرم بر لیتر می‌باشد.

که توسط نمایندگی حفاظت محیط زیست آمریکا توصیه شده است (EPA, 1998). تجزیه و اندازه‌گیری باقی‌مانده آفت‌کش مبتنی بر چهار مرحله نمونه برداری، استخراج، تصفیه و خالص‌سازی و تعیین میزان باقی‌مانده می‌باشد که بر پایه روش زوئیگ با تغییراتی چند انجام شد (Zweig, 1969). برای اندازه‌گیری دیازینون نمونه‌های آب در ظروف تیره یک لیتری شیشه‌ای در مجاورت یخ سریعاً به آزمایشگاه سم‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج منتقل شد تا از تجزیه باقی‌مانده سموم موجود در آن جلوگیری شد.

در آغاز برای اندازه‌گیری دقت آزمایش‌ها، آزمایش بازیابی^۱ انجام شد. درصد بازیافت برای میزان ۰/۲ میلی‌گرم در لیتر دیازینون استاندارد ۲۰۰ قسمت در میلیون (پی پی ام) با دو بار تکرار ۸۷ درصد بود. در این آزمایش ۸۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر در قیف جداکننده ریخته شد. سپس ۰/۸ میلی‌لیتر لیتر دیازینون استاندارد ۲۰۰ قسمت در میلیون به آن اضافه شد. سپس برای مدت دو دقیقه قیف با دست به شدت تکان داده شد تا دو فاز آلی ایجاد شود. سپس فاز آلی از روی بستر سدیم سولفات خشک عبور داده شد تا آبگیری شود. پس از آن برای انجام تصفیه و خالص‌سازی^۲ از کروماتوگرافی روی صفحه نازک^۳ (TLC) بهره‌گیری شد. شناسایی و تعیین میزان سم به روش فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا^۴ (HPLC) انجام شد. پس از آزمایش بازیابی استخراج سم از نمونه‌ها با متیلن کلراید به روش مایع-مایع صورت گرفت. استخراج باقی‌مانده از ۸۰۰ میلی‌لیتر نمونه آب در قیف جداکننده با دو بار تکرار صورت گرفت. برای این منظور محلول برای مدت دو دقیقه به شدت تکان داده شد و سپس برای جدا شدن دو فاز مختلف روی گیره قرار گرفت. این عمل با ۱۶۰ میلی‌لیتر دی-کلرومتان در طی دو مرحله صورت گرفت که در طی هر مرحله ۸۰ میلی‌لیتر دی‌کلرومتان برای استخراج بکاربرده

۱- Recovery

۲- clean up

۳- Thin Layer Chromatography


۴- High Performance Liquid Chromatography

جدول ۲- اطلاعات شیمیایی خاک منطقه مورد بررسی (Jihad-e-Agriculture, 2006)

عمق (سانتیمتر)	درصد			درصد ازت کل N%	درصد کربن آلی O.C%	درصد ماده آلی O.M%	pH	هدایت الکتریکی $E_c \times 10^{-3}$ d.s/m	درصد اشباع S.P%	نوع Texture	نام ایستگاه
	Clay	Silt	Sand								
۰-۳۰	۲۰	۶۶	۱۴	۰/۲۷	۲/۴۸	۳/۴	۷/۸۲	۱/۱۵	۹۶/۸	Si.L	ولم
۰-۳۰	۲۶	۵۶	۱۸	۰/۱۴	۱/۳۰	۲/۲	۷/۸۴	۰/۹	۷۰/۷	Si.L	اورطشت
۰-۳۰	۲۴	۴۶	۳۰	۰/۱۱	۰/۹۸	۳/۰	۷/۹۴	۰/۶۵	۵۹/۳	Si.C.L	فرامده
۰-۳۰	۱۳	۷۰	۱۷	۰/۱۳	۱/۱۶	۲/۰	۷/۸۴	۱/۳۳	۵۶/۳	Si.L	تازه‌آباد
۰-۳۰	۱۶	۵۸	۲۶	۰/۰۸	۰/۷۱	۱/۲	۸/۲	۱/۵۶	۶۲/۰	Si.L	کلوسا
۰-۳۰	۲۴	۵۲	۲۴	۰/۱۶	۱/۴۶	۲/۵	۸/۰۸	۰/۸	۸۳/۳	Si.L	زردآب
۰-۳۰	۲۴	۵۱	۲۴	۰/۱۱	۰/۹۸	۱/۷	۸/۱۷	۰/۷	۶۱/۷	Si.L	وازیگ

جدول ۳- اطلاعات شیمیایی آب منطقه مورد بررسی (Mazandaran Regional Water Company, 2006)

Th	HCO ₃	SO ₄	pH	TDS	EC	سطح آب	نوع چاه	نام ایستگاه
۲۹۵	۶/۷	۲/۴	۷/۵۱	۶۳۳	۹۷۲	۱/۵	کم عمق	فرامده
۲۷۰	۵/۹	۰/۷	۷/۱۸	۵۰۱	۷۳۵	۳	کم عمق	اورطشت
۴۱۵	۶/۹	۱/۸	۷/۵۸	۶۲۲	۹۴۶	۲/۵	کم عمق	ولم‌ده
۴۲۵	۷/۹	۱/۴	۷/۳۶	۷۰۸	۱۱۱۱	۲	کم عمق	فرامده
۳۹۰	۷/۳	۱/۵	۷/۶۷	۶۵۱	۱۰۰۳	۱	کم عمق	فرامده
۳۳۵	۵/۸	۱/۷	۷/۶۸	۵۶۶	۸۴۹	۲	کم عمق	تازه‌آباد
۳۴۰	۶/۱	۱/۲	۷/۷	۵۴۰	۸۱۶	۲/۵	کم عمق	زردآب
۴۱۰	۷	۲/۱	۷/۶۷	۶۶۵	۱۰۳۱	۳	کم عمق	معلم‌کلا
۳۵۰	۶/۷	۰/۵	۷/۸۵	۵۴۹	۸۲۰	۱/۵	کم عمق	فرامده
۳۷۰	۸/۱	۱/۱	۷/۳۳	۶۳۱	۹۷۳	۲	کم عمق	کلوسا



شکل ۲- تصویری از کروماتوگرام استاندارد (سمت چپ) و تصویری از کروماتوگرام نمونه (سمت راست)

جدول ۴- نتایج به دست آمده از ایستگاههای نمونه برداری در سال ۱۳۸۵ (مردامه لغایت آذرماه)

ADI mg/kg	میزان استاندارد (EPA) mg/l	میزان سم در نمونه- برداری آذرماه/μg	میزان سم در نمونه- برداری مهرماه/μg	میزان سم در نمونه برداری شهر یورماه/μg	میزان سم در مردادماه/μg	نام شناسایی شده سم	نام ایستگاه
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۰۳۶	-	۰/۴۱۱	-	دیازینون	(۱) اورطشت
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۰۸۵	-	۰/۱۳۶	-	دیازینون	(۲) ولم ده
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۴۲۱	-	۰/۰۰۴	۰/۰۱۹	دیازینون	(۳) فرامده
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۲۳۲	-	۰/۰۰۵	۰/۰۱۷	دیازینون	(۴) فرامده
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۵۷۲	۰/۰۰۵	۰/۰۸۹	۰/۰۴۸	دیازینون	(۵) فرامده
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	-	۰/۰۶۵	۰/۱۰۸	-	دیازینون	(۶) تازه آباد
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۰۸۳	۰/۰۰۲	۰/۱۸۰	-	دیازینون	(۷) زردآب
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۰۲۹	-	۰/۰۸۱	-	دیازینون	(۸) معلم کلا
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	۰/۰۷۳	-	۰/۰۵۸	-	دیازینون	(۹) کلوسا
۰/۰۰۲	9×10^{-6}	-	-	۰/۱۶۱	-	دیازینون	(۱۰) وازیک

پیدا خواهد کرد که حلالیت آفت‌کش مورد نظر و همچنین سطح آب زیرزمینی به نسبت بالا باشد. همچنین این پژوهشگر عنوان داشته است به نظر می‌رسد ضریب جذب سطحی و نیمه عمر بالای دیازینون و نیز جذب آن با شن و سیلت خاک و یا دوام دراز مدت آن در خاک‌های آلی از عوامل ردیابی آن در خاک این منطقه باشد. دیازینون به شدت جذب خاک می‌شود چون K_{OM}^1 دیازینون ۳۳۲ میلی‌گرم بر گرم می‌باشد (Kamrin, 1997) یعنی یک گرم خاک توان نگهداری ۳۳۲ میلی‌گرم دیازینون را دارد و همچنین با توجه به این که میزان ماده آلی خاک منطقه مورد بررسی در دامنه ۱/۲ تا ۴/۳ است (Jihad-e-Agriculture, 2006) و چون آبیاری در منطقه به صورت غرقابی بوده و K_{OW}^2 دیازینون بین ۴۰ تا ۶۰ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد (Kamrin, 1997; Tomlin, 1994) بنابراین جابجایی دیازینون به کمک آبشویی محتمل به نظر می‌رسد.

با تکیه بر پایین بودن نیمه عمر دیازینون (۲ تا ۴ هفته) (Kamrin, 1997) انتظار می‌رود که این آفت‌کش پس از مدت کوتاهی در محیط تجزیه شود ولی با توجه به نتایج آزمایشگاهی در ماههای مختلف از سال، چنین چیزی دیده نشد و ۶ تا ۷ ماه پس از سم‌پاشی هنوز باقی‌مانده این سم در نمونه‌های آب دارای ذرات معلق خاک دیده می‌شود که بنابه بررسی‌های ینگ و ویلیامز (۲۰۰۰) و ویلاروسا (۱۹۹۴) جذب آفت‌کش‌ها توسط رسوبات و مواد معلق در محیط‌های آبی می‌تواند نقش مهمی در پایداری آنها و جلوگیری از تجزیه شدن در آب داشته باشد و نبود رسوبات باعث تجزیه شتابان آفت‌کش‌ها در محیط‌های آبی می‌شود. که این موضوع در مورد نمونه‌های برداشت در این بررسی نیز وجود داشت و همه نمونه‌های برداشت شده از چاه‌ها به همراه رسوبات و مواد کلئیدی معلق بوده که بنابه بررسی‌های ینگ و ویلیامز (۲۰۰۰) و ویلاروسا (۱۹۹۴) حضور دراز مدت دیازینون در نمونه‌ها را موجب شده است.

در این پژوهش هدف این بود که با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی و همچنین نوع کاربرد نهاده‌های کشاورزی احتمال آلودگی پنهان و تدریجی سفره آب‌های زیرزمینی بررسی شود.

با توجه به نتایج آزمایشگاهی میزان باقی‌مانده دیازینون در چاه‌های منطقه دامنه ۰/۰۰۲ تا ۰/۵۷۲ میکروگرم بر لیتر بود که در بعضی از چاه‌های منطقه بیش از حد استاندارد تعریف شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) یعنی ۰/۱ میکروگرم بر لیتر می‌باشد. بامن در سال ۲۰۰۲ گزارش کرد که در فیلیپین میزان باقی‌مانده سم دیازینون در دامنه ۰/۰۹۷ تا ۰/۴۶۰ بوده است (Bouman et al., 2002). بالا بودن میزان باقی‌مانده سم، ناشی از مصرف زیاد این آفت‌کش توسط کشاورزان است. فوشی واکی و همکاران در سال ۱۹۹۱ گزارش کرد در نتیجه حلالیت و کاربرد گسترده از آفت‌کش دیازینون بقایای این آفت‌کش از طریق رواناب وارد آب‌های سطحی می‌شود (Fushiwaki et al., 1991). یزدان شناس و اسماعیلی ساری در سال ۱۳۷۶ نیز آلودگی بیش از حد مجاز آب بندرکیاشهر به سموم فسفره مانند دیازینون را ناشی از این امر دانسته اند (Yazdanshenas & Esmaeel Sari, 1997). از جمله عوامل دیگر افزایش بیش از حد مجاز دیازینون در آب‌های زیرزمینی می‌توان به آبیاری زیاد، بالابودن حلالیت دیازینون در آب و همچنین نوع خاک (Shir Afroos, 2006) و بالابودن میزان مواد آلی (Dabiri, 2000) خاک‌های منطقه مورد بررسی اشاره نمود که می‌تواند باعث حضور دراز مدت و در نتیجه نفوذپذیری دیازینون به اعماق خاک و تاثیر بر کیفیت آب زیرزمینی شود که در جدول (۲) نشان داده شده است. شیرافروس در بررسی خود در دشت قزوین باقی‌مانده دیازینون و پاراکوات را در خاک یک کشتزار ذرت به غلظت های ۲/۸۷ و ۲/۱۳ میکروگرم در لیتر ردیابی کرد ولی اثری از این آفت‌کش‌ها در آب‌های زیرزمینی یافت نشد که علت آن را به پایین بودن سطح سفره آب‌های زیرزمینی منطقه مورد بررسی مربوط دانست (Shir Afroos, 2006). در این پژوهش بیان شده است مشکل آفت‌کش‌ها زمانی نمود

۱- به عنوان شاخص میزان جذب یک آفت‌کش به خاک می‌باشد.

۲- به عنوان شاخص میزان حلالیت یک آفت‌کش در آب می‌باشد.

آب‌های زیرزمینی منطقه شده است (Jihad-e-Agriculture, 2006).

از جمله عوامل دیگری که می‌تواند باعث پایداری دیازینون شود پایین بودن دمای محیط و pH خنثی آب می‌باشد (Larocorte et al., 1995). دیازینون در pH های اسیدی و قلیائی تندتر تجزیه می‌شود (2006 Talebi). در pH های اسیدی در مدت ۱۲ ساعت و در شرایط خنثی شش ماه طول می‌کشد تا نیمی از دیازینون تجزیه شود (Kamrin, 1997). نتایج اندازه‌گیری pH آب‌های زیرزمینی منطقه مورد بررسی، اسیدیته خنثی را نشان می‌داد. این نتایج با گفته‌های کامرین (۱۹۹۷) که بیان نموده است که دیازینون در شرایط خنثی مدت زیادی باقی می‌ماند و همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش شایقی و سلسله (۱۳۷۹) که تا ماه پنجم پس از مصرف دیازینون، باقی‌مانده در نمونه‌های آب مشاهده نمودند، همخوانی دارد. شایقی و سلسله شرایط محیطی، خواص فیزیکی و شیمیایی حشره‌کش مصرفی، زمان (ماه و فصل) مصرف آفت‌کش، دما و pH آب، بارش‌های جوی و میزان آنها را در ارتباط با باقی‌مانده حشره‌کش‌ها در آب مرتبط می‌دانند (Shayeghi & selseleh, 2000). در شماری از بررسی‌ها که بر روی تجزیه دیازینون انجام شده نشان داده که این آفت‌کش یکی از آفت‌کش‌های ارگانوفسفره‌ای است که دوام بیشتری دارد (Frank et al., 1991).

(Ying & 2000; Villarosa et al., 1994). همچنین طالبی (۱۹۹۸) غلظت بالایی از باقی‌مانده دیازینون در رسوبات تالاب انزلی در آبان ماه ردیابی نمود که علت این موضوع را به کار بردن دیازینون به صورت دانه (گرانول) در شالیزارها در خرداد ماه و جذب سطحی آن به مواد معلق موجود در رواناب شالیزارها و انتقال آن به رودخانه‌های منتهی به تالاب و در نهایت تالاب دانسته است (Talebi, 1998). همچنین این پژوهشگر در پژوهش خود روی باقی‌مانده دیازینون در آب رودخانه هندوخال مشاهده کرد که غلظت باقی‌مانده این حشره‌کش در آب رودخانه تابعی از زمان کاربرد دیازینون در شالیزار می‌باشد. فاصله زمانی طولانی بین کاربرد حشره‌کش در کشتزارها و نمونه‌برداری از آب منجر به ردیابی غلظت‌های کمتر دیازینون شده است. این پژوهشگر همچنین کاهش غلظت این سم در طی فصل تابستان را آبکافت (هیدرولیز)، تبخیر، فتولیز و دمای بالا (بیشتر از ۲۵ درجه سلسیوس) عنوان نموده است (Talebi, 1998) که با یافته‌های این پژوهش در مرداد ماه همسویی دارد. علت افزایش مجدد باقی‌مانده دیازینون در این بررسی در فصل پاییز می‌تواند مربوط به کاربرد مجدد این آفت‌کش به صورت امولسیون برای وارویش (Ratoon) شالیزار باشد که به همراه آبیاری و بارندگی باعث افزایش دوباره میزان باقی‌مانده دیازینون در

منابع

- 1- Bouman, B. A. Castaneda. M. and Bhuiyan. A.R. 2002. Nitrate and Pesticide Contamination of Groundwater under Rice-based Cropping System: past and current evidence from the Philippines, Agriculture, Ecosystem and Environment. Vol. 92. 15 pp.
- 2- Dabiri, M. 2000. Environmental Pollution (Air, Water, Soil, Sound), Etehad Press, Tehran, 399 pp.
- 3- EPA. 1998. Guidance for Prospective Ground-Water Monitoring Studies. OPP-U.S.
- 4- Erfanmanesh, m. & M. Afuni, 2002. Environmental pollution Water, Soil and Air, First Ed., Arkan Press, Esfahan, 318 pp.
- 5- Frank, R. Braun. H. E. Chapman. N. and Burchat. C. 1991. Degradation of Parent Compounds of Nine Organophosphorus Insecticides in Ontario surface and Ground Waters under controlled conditions. Bull Environ Contam Toxicol. Vol. 47. 6 pp.

- 6- Fushiwaki, Y. Hamamura.T. Hasegava. A. and Urano. K. 1991. Environment Pollution by Pesticide from Golf Courses in Kanagawa Prefecture. Japan J Toxicol Environ Hlth. Vol. 39. 6 pp.
- 7- Jihad-e-Agriculture Mahmoud Abad area, 2006. Summary of plant protection unit operation of Mazandaran province.
- 8- Kamrin, M. A. 1997. Pesticide Profiles Toxicity, Environmental Impact and Fate, Lewis Publishers.
- 9- Khazaei, S.H. 2007. Talebi & Khorasani. Investigation of diazinon pesticide residues in groundwater of Mahmoud Abad area of Mazandaran province. The First National Conference on World Environment Day, Tehran, University of Tehran: 88. Iran.
- 10- Larocorte, S. Lariges. S. B. Garrigues. P. and Barselo. D. 1995. Degradation of Organophosphorus Pesticide and their Transformation Product in Estuarine Waters. Environ Sci Technol. Vol. 29. 8 pp.
- 11- Mazandaran Regional Water Company. 2006. Information of groundwater quality of Mahmoud Abad area.
- 12- Riazi, Z. 2003. Yadegarian & Mrovvati. The determination of the amount residues of organophosphorus in the product of apple and it's complications in humans. The third National conference of biological materials used in the development and optimum use of fertilizer and toxin in agriculture, Karaj, The Ministry of Jihad-e-Agriculture: 734. Iran.
- 13- Shayeghi, M. 2000. Selseleh. Study and determination of the phosphorus insecticides residues in Mazandaran rivers. The 4th National Symposium of Environmental Health, Yazd, Shahid Sadughi University of Medical Sciences: 75-80. Iran.
- 14- Shir Afroos, A. 2006. Study of soil and water contamination because of using the agrochemical pesticides by FTIR (Case Study: Esmael Abad area in the West Qazvin). The national conference of the management of irrigation and draining networks, University of Shahid Chamran. Ahwaz: 1465-1473. Iran.
- 15- Talebi Jahromi, Kh. 2006. Pesticides Toxicology, First Ed., University of Tehran Press, Tehran, 492 pp.
- 16- Talebi, KH. 1998. Diazinon Residues in the Basins of Anzali Lagoon, Iran. Bull Environ Contam Toxicol. 61:477-483.
- 17- Tomlin, C. 1994. The Study Manual Incorporating the Agrochemical Handbook, Crop Protection Publication.
- 18- Villarosa, L. Mc Cormic. M. J. Carpender. P.D. Marriott P.J. and Russell I.M. 1994. Effect of Activated Sludge Microparticles on Pesticide Partitioning Behaviour. Environ Sci Technol. Vol. 28. 5 pp.
- 19- Yazdanshenas, s. and Smaeli Sari. A. 1997. Study of agricultural pesticides residues in the water. Water and Environment Journal. Vol. 24. 7 pp.
- 20- Ying, G.G. and Williams. B. 2000. Laboratory Study on the Interaction between Herbicides and Sediments in Water System, Environment Pollution. Vol. 107. 6 pp.
- 21- Zweig, G. and Devine. J. M. 1969. Determination of Organophosphorus Pesticide in Water. Residue Rev. Vol. 26. 4 pp.