

بررسی حساسیت زیستمحیطی اکوسیستم‌های موجود در نوار ساحلی استان هرمزگان

مریم یعقوبزاده^۱، افشین دانه کار^{۲*}، بهمن جباریان امیری^۳، سهراب اشرفی^۴

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۲. دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۳، ۴. استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱/۱۹ – تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۶/۳۰)

چکیده

مناطق ساحلی به سبب موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی، تنوع زیستی و اکوسیستم‌های وابسته و تأثیرپذیری تؤام از خشکی و دریا، مناطقی حساس و شکننده محسوب می‌شوند. عملکردهای بوم‌شناختی این مناطق سبب استقرار طیف متنوعی از توسعه و بهره‌برداری انسانی در این نواحی شده است. اهمیت اکوسیستم ساحلی، این مناطق را شایسته اقدامات حفاظتی بیشتری قرار داده است. بهدلیل غنای مناطق حساس در استان هرمزگان، در این پژوهش اقدام به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسیستم‌های سواحل استان هرمزگان با کاربرد معیارهای تجمعی شده از ۲۲ مرجع داخلی و خارجی شده است. برای ارزیابی حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی هرمزگان از ۶ معیار و ۲۹ شاخص استفاده شد. بررسی معیارها و تعیین ضریب اهمیت شاخص‌های به کاررفته در آن‌ها نشان داد شاخص انحرافی و بکربودن بیشترین اهمیت و وابستگی صنعتی کمترین اهمیت را در تعیین اکوسیستم‌های حساس ایفا می‌کنند. همچنین به منظور تعیین اهمیت و اولویت‌بندی اکوسیستم‌های حساس در محدوده مطالعه شده براساس معیارهای یادشده ۱۰ اکوسیستم (۵) اکوسیستم در ناحیه ساحلی و ۵ اکوسیستم در ناحیه کرانه) بررسی شد. نتایج نشان داد، جنگلهای مانگرو در ناحیه کرانه و مناطق تحت حفاظت در ناحیه ساحلی بیشترین حساسیت را دارند. بهنه‌بندی حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی نشان داد، بیشترین وسعت حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی در درجه حساسیت خیلی کم و بخش عمده‌ای از ناحیه ساحلی را شامل می‌شود. کمترین وسعت حساسیت نیز در درجه حساسیت زیاد و در بخش‌هایی از شهرستان بندرلنگه قرار گرفته است. درجه حساسیت خیلی زیاد با وسعت ۹۶/۶ درصد از وسعت منطقه مطالعه شده در بخش عمده‌ای از جنوب غربی شهرستان بندرلنگه که منطبق بر منطقه حفاظت شده سراج و در بخش‌هایی از جنوب غربی این شهرستان که شامل بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده حرا است، قرار دارد. این طبقه همچنین بخش عمده‌ای از حرای بندرعباس، سیریک و جاسک را نیز دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌گان: اکوسیستم‌های ساحلی، حساسیت زیستمحیطی، مناطق حساس ساحلی، هرمزگان.

فراغت برای مردم کشور و سایر کشورهای منطقه در کنار استفاده پایدار از سایر قابلیت‌ها و مزیت‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی، در جهت تأمین نیازهای ملی و توسعه صادرات عمل می‌کنند (Lotfi *et al.*, 2011). تلاش برای برقراری توازن میان ساختار و عملکرد بوم‌شناختی سواحل و توسعه فعالیت‌های انسانی موضوعی است که در چارچوب مدیریت محیط‌زیستی مناطق ساحلی کشور مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین اهداف برنامه مدیریت محیط‌زیستی مناطق ساحلی کشور در «رویکرد حفاظتی» شامل حفاظت از محیط‌زیست منطقه ساحلی در بخش خشکی و دریا، حمایت از تنوع زیستی در منطقه ساحلی، کاهش یا جلوگیری از آводگی در ساحل، استفاده از منابع ساحلی در حد توان اکولوژیک سرزمین است (PMO, 2009).

بهره‌گیری گوناگون انسان از محیط‌های دریایی و اقیانوسی، اهمیت شناسایی هرچه بیشتر این محیط‌ها را نشان می‌دهد. این موضوع برای کشور ما نیز که در همسایگی دریایی عمان و خلیج‌فارس قرار گرفته، مصدق‌آمد دارد (Servati, 2002). منطقه دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان به‌دلیل شرایط خاص جغرافیایی، حساسیت‌های زیست‌محیطی و نقش کلیدی آن در حمل و نقل بین‌المللی دریایی همواره بهمنزله یکی از مناطق استراتژیک و حساس در مجتمع بین‌المللی مطرح بوده است (Parhizi, 2007). از دیدگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، منطقه حساس دریایی گستره‌ای از پنهانه دریا یا خط ساحلی است که به‌سبب اهمیت اکولوژیک، اقتصادی-اجتماعی و آموزشی یا دلایل علمی در مقابل شرایط طبیعی یا اقدامات انسانی به‌خصوص فعالیت‌های دریانوری آسیب‌پذیر است و به حمایت ویژه نیاز دارد (Danehkar, 2003). بر این اساس کلیه مناطق همچون، جنگلهای حراء، بسترها جلبکی و علفی، آبسنگ‌های مرجانی، محل زادآوری آبزیان، مصب‌ها، دلتای رودخانه‌ها و محل لانه‌گزینی لاکپشت‌های دریایی و پرندگان آبزی و کنارآبزی در سواحل در زمرة مناطق حساس ساحلی و دریایی جای می‌گیرند (Danehkar *et al.*, 2005) ۴۰ هزار فرونده کشتی اقیانوس‌پیما (که حدود ۱۷ هزار

۱. مقدمه

مناطق ساحلی اراضی‌ای هستند که از دو سو تحت تأثیر اکولوژی دریا و خشکی قرار دارند. این مناطق زیستگاه‌ها و آبزیان حساس، منابع معدنی و تفرجگاهی در خور توجهی دارند و پشتوانه بسیار مهمی برای فعالیت‌های معيشی، شیلات و صنایع حمل و نقل به شمار می‌آیند (Madjnoonian & Mirabzadeh, 2003). مناطق ساحلی به‌سبب موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های طبیعی، تنوع زیستی و اکوسیستم‌های وابسته و تأثیرپذیری توازن از خشکی و دریا، مناطقی حساس و شکننده محسوب می‌شوند و نسبت به تغییرات محیطی و فعالیت‌های انسانی آسیب‌پذیر و شکننده هستند. با این حال عملکردهای بوم‌شناختی مناطق ساحلی سبب استقرار طیف متنوعی از توسعه و بهره‌برداری انسانی در این نواحی شده است و بی‌توجهی به پایداری ساختار و فرایندهای طبیعی مناطق ساحلی تضمینی بر پایداری تولیدات انسانی نخواهد بود (PMO, 2009). اهمیت مناطق ساحلی صرفاً به ارزش‌ها و فواید اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه موضوعات سیاسی و امنیتی و حساسیت‌های زیست‌محیطی به‌ویژه از منطقه فرامرزی نیز از جمله مواردی است که به جنبه‌های در خور توجه این مناطق می‌افزاید. به رغم اهمیت بالای مناطق ساحلی، قرن پیشتم شاهد روند فزاینده تخریب سواحل و سیر قهقهای منابع طبیعی آن و نیز کاهش چشمگیر تنوع زیستی در آن بوده است (Kebriayi, 2005). مناطق ساحلی کشور، مناطقی توسعه‌یافته هستند که بهمنزله پل ارتباطی و تعاملی با سایر کشورهای جهان، تسهیل کننده روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشورند و ضمن کمک به ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای، استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای کشور، استفاده پایدار از منابع، قابلیت‌ها و حفظ محیط‌زیست، امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین و در مجموع، بهمنزله نمادی از توسعه‌یافته‌گی کشور، عمل می‌کنند. در این راستا، سواحل کشور بهمنزله الگویی برای استفاده مناسب از توان‌های محیطی، حفظ و ارتقای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی، قابلیت‌های گردشگری و گذران اوقات

۲. مواد و روش‌ها

۱۰. سابقه پژوهش

با توجه به اهمیت مناطق حساس ساحلی، این موضوع نخستین بار توسط کمیته حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان دریانوردی و در واکنش به قطعنامه بین‌المللی ایمنی تانکرها و جلوگیری از آلودگی (۱۹۷۸) مطرح شد و از سال ۱۹۸۶ این کمیته برنامه شناسایی و معرفی مناطق حساس دریایی را در دستور کار خود قرار داد (Sharifpour *et al.*, 2005). هدف این برنامه شناسایی مناطق اکولوژیک در سواحل آب‌های آزاد بود که در برابر فعالیت‌های انسانی حساس و آسیب‌پذیر هستند و نیاز به حفاظت ویژه دارند. این موضوع علاوه بر کنگره کاراکاس (۱۹۹۲) در کنفرانس سران زمین در ریو (۱۹۹۲) مجددًا تأکید شد و در ماده ۱۳ از فصل ۱۷ دستور کار ۲۱ در بخش حفاظت محیط‌زیست دریایی در مقابل عملیات کشتیرانی، به صراحت مسئله شناسایی مناطق حساس دریایی مطرح و همچنین تأکید شد دولتها متعهد به شناسایی، حمایت و نگهداری از اکوسمیستم‌های دریایی خود هستند و باید در شکل‌گیری مناطق حفاظت‌شده دریایی تسریع کنند (Madjnoonian, 2000). مفهوم مناطق حساس دریایی در آب‌های جنوبی ایران اولین بار از طریق سازمان منطقه‌ای حفاظت محیط‌زیست دریایی در سال ۱۹۸۸ مطرح شده است. راپمی در یکی از اسناد خود درباره کاربرد مواد پخش‌کننده نفت، مناطقی را به منزله مناطق حساس در این منطقه دریایی معرفی کرده است. این مناطق برخی از زیستگاه‌های شناخته‌شده بالهمیت اکولوژیک اقتصادی را نیز شامل می‌شوند. در سال ۱۹۷۳، به هنگام تصویب کنوانسیون مارپل منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان به دلیل محدودیت شدید در جابه‌جایی و تعویض آب، شرایط اکولوژیک ارزشمند و تردد تعداد زیاد کشته در آن، به منزله یکی از معده مناطق ویژه دریایی آب‌های زمین که نیازمند اجرای مقررات ویژه جلوگیری از تخلیه مواد زائد برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی است، تعیین شد. در آن زمان، به رغم تصویب مقررات ویژه برای منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان، اجرای این مقررات موكول به الحق همه کشورهای منطقه به کنوانسیون مارپل و ایجاد

فروند آن‌ها نفت خام منطقه را به سراسر جهان منتقل می‌کنند) و فعالیت‌های گستردۀ استخراج منابع نفتی از بستر دریا، سازمان بین‌المللی دریانوردی بنا به تقاضای دولت‌های ساحلی، توافق کرده است که مقررات ویژه‌ای به منظور پیشگیری از آلودگی در منطقه دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان به اجرا گذاشته شود تا اجرای آن اقدامی مؤثر در حفظ محیط Akhavan, (2010). متأسفانه کشورهای منطقه خلیج‌فارس، پروتکل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی برای حفظ ۵۰۰ کنوانسیون در رابطه مستقیم و غیرمستقیم با مبحث محیط‌زیست در دنیا وجود دارد که این کنوانسیون‌های بین‌المللی متأسفانه با هم ناهماهنگ هستند و هر کدام موضوعی خاص را دنبال می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران با تدوین و ارائه آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی متکی بر اهداف مشترک کشورهای منطقه و تلاش در جهت معرفی و امضای این موافقت‌نامه‌ها، حفظ محیط‌زیست دریایی برای منطقه خلیج‌فارس می‌تواند بستر مناسبی را برای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت رعایت اصول زیست‌محیطی دریایی به وجود آورد و ضمن تثبیت جایگاه محوری خود به الگوی منطقه‌ای تبدیل شود (Lotfi *et al.*, 2011).

به دلیل غنای مناطق حساس در استان هرمزگان، در این پژوهش اقدام به مطالعه و تعیین حساسیت اکوسمیستم‌های سواحل استان هرمزگان با کاربرد معیارهای تجمعی شده از ۲۲ مرجع داخلی و خارجی شده است. هر گونه برنامه‌ریزی در منطقه ساحلی نیازمند آگاهی کامل و همه‌جانبه از محیط ساحلی است، هدف این پژوهش شناخت و بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسمیستم‌های موجود در نوار ساحلی استان هرمزگان به منظور دستیابی به نوعی تفکر یکپارچه برای برنامه‌ریزی است. با توجه به اینکه در این پژوهش روش جدیدی برای تعیین حساسیت زیست‌محیطی اکوسمیستم‌های ساحلی ارائه شده بدیهی است نتایج این پژوهش راهنمایی برای مدیران اجرایی در زمینه حفظ و مدیریت نواحی ساحلی خواهد بود.

استانی تأیید شد. Danehkar و همکاران (2005) سواحل استان هرمزگان را بررسی کردند. در این بررسی برای تعیین حساسیت زیستمحیطی مناطق ساحلی استان هرمزگان از معیارهای تدوین شده برای تعیین مناطق تحت حفاظت و حساس ساحلی- دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست (Danehkar & Madjnoonian, 2004) استفاده شد. محدوده مطالعه شده، شامل کرانه ساحلی استان از آبهای هم عمق ۲۰- متر تا مرز دهستان‌های ساحلی بود. مطابق نتایج حاصله و با توجه به اطلاعات موجود تقریباً تمامی نوار ساحلی استان هرمزگان از نظر ارزش حفاظتی حائز ویژگی ممتازی نیست، به جز منطقه حفاظت‌شده حرا که در ردیف نواحی با حساسیت متوسط قرار گرفت. دیگر بخش‌های ساحلی استان (سرزمین‌اصلی) در ردیف مناطق با حساسیت کم ارزیابی شد (Danehkar et al., 2005).

شناسایی مناطق حساس ساحلی-دریایی با استفاده از معیارهای سازمان بین‌المللی دریانوردی و اداره اقیانوسی و هواشناسی آمریکا^۱، بسیاری از استان‌های ساحلی حساسیت‌سنجی شد. Davar (2007) با استفاده از این روش سواحل استان سیستان و بلوچستان، Akhavan (۲۰۱۰) سواحل غربی استان هرمزگان، Habibi (2010) سواحل شرقی استان هرمزگان، Sharifipour و همکاران (2005) سواحل استان بوشهر و Razmjo (2010) سواحل استان مازندران را حساسیت‌سنجی کردند.

Sharifipour و همکارانش در سال ۲۰۰۹ در پژوهشی با عنوان «ارزیابی حساسیت زیستمحیطی سواحل شمالی خلیج‌فارس» با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز را به انجام رساندند. در این پژوهش طرح ریزی مدل نوینی بهمنظور گزینش مناطق تحت حفاظت در نوار ساحلی با استفاده از ArcGIS روش تحلیل سلسله‌مراتبی و با کمک نرمافزار ۲۹۹۴ انجام شد. در کل محدوده مطالعه شده، ۲۷۰۱ کیلومترمربع از منطقه با حساسیت خیلی زیاد، ۴۲۱۲۴ کیلومترمربع با حساسیت زیاد، ۲۹۰۵۶ کیلومترمربع با حساسیت متوسط و ۲۹۰۰ کیلومترمربع با حساسیت کم ارزیابی شد (Sharifipour et al., 2009).

تسهیلات دریافت مواد زائد از کشتی‌ها به میزان کافی در بنادر شد. کمیته حفظ محیط‌زیست دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در پنجماه و ششمین نشست خود در سیزدهم ژوئیه ۲۰۰۷، منطقه دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان را به منزله منطقه ویژه دریایی اعلام و مطابق مفاد ماده ۱.۶.۳۸ ضمیمه اول و ماده b.4.5 آنچه پنجم مارپل، الزامات منطقه ویژه از تاریخ اول آگوست ۲۰۰۸ مطابق با ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ لازم الاجرا شد (Akhavan, 2010).

شناسایی مناطق حساس دریایی در ایران در سال ۱۳۷۳ در سازمان حفاظت محیط‌زیست شروع شد (Danehkar & Madjnoonian, 2004). از آغاز این اقدام تا سال ۱۳۷۷ بسیاری از مناطق حساس دریایی کشور به‌ویژه در کرانه‌های جنوبی، در دو گروه منابع حساس فیزیکی و زیستی به‌طور مقدماتی شناسایی شد (Danehkar, 2003). از اواخر پاییز ۱۳۸۰ گروه کاری مناطق حساس دریایی کشور در سازمان حفاظت محیط‌زیست شروع به کار کرد و در نخستین اقدام پیش‌نویس برنامه کار شناسایی و حفاظت مناطق حساس دریایی تهیه شد. این اقدام که تا سال ۱۳۸۱ تداوم یافت سبب شد، برای نخستین بار تعریفی جامع و ملی از مناطق حساس دریایی کشور ارائه و معیارهای اولیه شناسایی این مناطق با توجه به تجربیات جهانی و الزامات ملی در قالب یک برنامه تهیه و به اجرا گذاشته شود (Department of the Environment, 2003). Danehkar و Madjnoonian در سال ۲۰۰۴ با توجه به تجربیات جهانی به‌ویژه معیارهای ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی^۲ (IMO) (2001) برای شناسایی مناطق حساس دریایی، معیارهای IUCN (۱۹۹۹) برای شناسایی مناطق حفاظت‌شده ساحلی-دریایی و همچنین معیارهای Clark (1984) و معیارهای Salm و Price (1995) برای انتخاب مناطق حفاظت‌شده ساحلی-دریایی، معیارهایی را مشتمل بر ۱۵ معیار اصلی و ۳۱ معیار فرعی تدوین و معرفی کردند. معیارهای فوق برای مناطق ساحلی شمال ارزیابی شد و کارایی و ثمربخشی آن با توجه به مناطق تحت حفاظت موجود و همچنین امکان کاربرد آن‌ها توسط کارشناسان

2. National Oceanic and Atmospheric Administration

1. International Maritime Organization

زیبایی‌شناختی، طبیعی‌بودن، بکربودن، تنوع ساختاری، یکپارچگی فیزیکی و وسعت)، پرندگان، پستانداران، خزندگان و آبزیان (شامل ۳ شاخص تنوع، جمعیت و درجه حفاظتی)، میراث فرهنگی- تاریخی، اهمیت پژوهشی، اهمیت آموزشی، اهمیت پایشی، وابستگی صنعتی، وابستگی تولید زیستی، وابستگی صیادی، وابستگی گردشگری، وابستگی زیرساختی و سکونتگاه‌ها بود. پس از تعیین معیارها، ضریب اهمیت آن‌ها با هدف استانداردسازی معیارها برای امکان مقایسه آن‌ها انجام شد. به همین منظور از تجزیه و تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد و معیارها براساس درجه اهمیت اولویت‌بندی شدند. مقایسه زوجی معیارهای یادشده با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice11 و با رعایت ضریب ناسازگاری کمتر از ۰/۱ صورت گرفت.

۲.۲.۲ بررسی اکوسیستم‌های ساحلی و تعیین ضریب حساسیت این مناطق

شناسایی و تعیین اکوسیستم‌های منطقه ساحلی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات موجود در پژوهش‌های انجام شده در بخش ساحل جنوبی کشور و به پشتونه مصوبه هیئت وزیران (در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۸) با عنوان «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» و تعریف مناطق حساس ساحلی- دریایی توسط این مصوبه صورت گرفت. بر این اساس اکوسیستم‌های بررسی شده شامل جنگل‌های مانگرو، آبسنگ‌های مرجانی، علفزارهای دریایی، پنهانه‌های جلبکی، زیستگاه‌های کرانه‌ای و شاخابهای واقع در ناحیه کرانه و جنگل‌های جلگه‌ای، علفزارهای جلگه‌ای، تالاب‌ها، زیستگاه‌ها و مناطق واقع در ناحیه ساحل می‌شود (جدول ۱). پس از شناسایی اکوسیستم‌های شناختی شده برای تعیین ضریب اهمیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی استفاده شد. اکوسیستم‌های شناختی شده به منزله گزینه‌هایی که براساس معیارها درجه اهمیت و اولویت پیدا می‌کنند، در نرم‌افزار Expert Choice11 با رعایت ضریب ناسازگاری کمتر از ۰/۱ از طریق تحلیل سلسله‌مراتبی، دارای ضریب وزنی شد. به این ترتیب تعیین ضریب اهمیت و اولویت‌بندی اکوسیستم‌های نوار ساحلی با توجه به معیارهای شناختی شده، از طریق

۲.۲. محدوده مطالعه شده

محدوده مطالعه شده در این بررسی، دربرگیرنده ۱۵۸۰ کیلومتر خط ساحلی استان هرمزگان در تماس با دریای عمان و خلیج فارس است. بر این اساس، این محدوده با توجه به آخرین یافته‌های طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور^۱ بخشی از ساحل دربرگیرنده خشکی مجاور دریا به عرض متوسط ۶ کیلومتر است که براساس معیارهای مختلف همچون خطوط هم‌ارتفاع، جاده‌های ساحلی، مرز دهستان‌های ساحلی، محدوده مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست، تعیین حدود و نقشه‌سازی شد. این محدوده همچنین دربرگیرنده ناحیه کرانه‌ای است که تحت اثر نوسان آب دریا قرار دارد. مرز دریایی محدوده مطالعه شده منطبق بر خط هم‌عمق ۱۵- متر، منطبق بر ناحیه رسوب‌گذاری موازی با ساحل تعیین شده است (PMO, 2010).

۳.۲ روش بررسی

روش استفاده شده در این مطالعه شامل ۱. شناسایی و تعیین ضریب اهمیت معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی، ۲. بررسی اکوسیستم‌های موجود در منطقه ساحلی و تعیین ضریب اهمیت آن‌ها، ۳. تعیین ضریب حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی (حاصل ضرب ضریب اهمیت اکوسیستم‌ها و ضریب اهمیت معیارها)، ۴. نقشه‌سازی اکوسیستم‌های حساس و پنهانه‌بندی حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی که به ترتیب معرفی می‌شود.

۳.۲.۱ روش شناسایی و تعیین ضریب اهمیت معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی

به منظور شناسایی معیارهای لازم برای تعیین مناطق حساس ساحلی ۲۲ مرجع داخلی و خارجی بررسی شد. پس از مطالعه و استخراج معیارهای به کاررفته در این پژوهش‌ها، با تجمیع معیارها ۶ معیار اصلی و ۱۵ زیرمعیار برای شناسایی و پنهانه‌بندی مناطق حساس ساحلی شناسایی شد. ۶ معیار اصلی شامل: معیار زیستگاه، معیار گونه، معیار اهمیت فرهنگی، معیار اهمیت علمی، معیار اهمیت اقتصادی و معیار اهمیت اجتماعی بود. معیارهای فرعی دربرگیرنده زیستگاه‌های مهم (شامل شاخص‌های: انحصاری‌بودن،


1. Integrated Coastal Zone Management

نقشه‌سازی اکوسیستم‌های شناسایی شده و پنهان‌بندی مناطق حساس در محیط ArcGIS انجام شد.

تحلیل سلسله مراتبی انجام شد (شکل ۱). ضریب حساسیت اکوسیستم‌ها از حاصل ضرب ضریب اهمیت معیارها در ضریب اهمیت اکوسیستم‌ها تعیین شد. سپس

جدول 1. اکوسیستم‌های موجود در منطقه ساحلی

منطقه ساحلی	یگان‌های اکوسیستمی
ناحیه کرانه	جنگل‌های مانگرو
ناحیه ساحل	آبسنگ‌های مرجانی
ناحیه کرانه	پهنه‌های جلبکی
ناحیه ساحل	علفزارهای دریایی
ناحیه ساحل	زیستگاه‌های کرانه‌ای
ناحیه ساحل	شاخابه‌ها
ناحیه ساحل	جنگل‌های جلگه‌ای
ناحیه ساحل	علفزارهای جلگه‌ای
ناحیه ساحل	تالاب‌ها
ناحیه ساحل	زیستگاه حیات وحش
ناحیه ساحل	مناطق تحت حفاظت



شکل ۱. تحلیل سلسله مراتبی تعیین ضریب اهمیت و اولویت‌بندی اکوسیستم‌های موجود در منطقه ساحلی

است (Danehkar, 1998) تمام مناطق کم‌شیب سنگی به‌منزله مناطقی که جلبک‌ها حضور دارند بررسی شد. به‌منظور تعیین لایه مربوط به پهنه‌های جلبکی از لایه رقومی ارتفاع منطقه در مقیاس ۱:۲۵.۰۰۰ و لایه مربوط به جنس کرانه سنگی صخره‌ای از مطالعه صورت گرفته توسط سازمان بنادر و دریانوردی در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (2010) در مقیاس ۱:۲۵.۰۰۰ استفاده شد. لایه علفزارهای دریایی از اطلاعات مربوط به یروزه ارزیابی خسارت ناشی، از

۴.۳.۲. روش نقشه‌سازی، تلفیق و پهنگندی حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی

برای تعیین حساسیت اکوسیستم‌های نوار ساحلی استان هرمزگان لایه مربوط به جنگل‌های حرا از گزارش مربوط به سند ملی جنگل‌های مانگو ایران (Nature and Resource Sustainability Consulting Engineers, 2013) با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ استفاده شد. با توجه به اینکه عمده‌ترین زیستگاه‌های جلبکی در نواحی سنگ، صخه‌ای، و در حوزه‌های بن، حز، و مدي،

استفاده شد. لایه مربوط به جنگلهای جلگه‌ای و علفزارهای جلگه‌ای از سازمان جنگلهای و مراتع کشور در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و لایه تالابها و مناطق تحت حفاظت از طرح کالبدی جنوب کشور (Center of Planning and Architecture Studies, 2008) در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ استخراج شد. با توجه به اینکه جزایر استان هرمزگان در این مطالعه بررسی نشد و بهدلیل وجودنداشتن آبسنگ مرجانی در محدوده مطالعه شده، این اکوسیستم در مطالعه مناطق حساس استان هرمزگان نیز مورد توجه قرار نگرفت. پس از تهیه لایه‌های مورد نظر، هر لایه با یک کد حرفی مشخص شد و ماتریس همپوشانی اکوسیستم‌های منطقه ساحلی رسم و تجمیع فصل مشترک ضریب اکوسیستم‌های ساحل و کرانه در محیط ArcGIS انجام شد (جدول ۲).

سپس نقشهٔ نهایی با توجه به ضریب اهمیت اکوسیستم‌های مطالعه شده (جدول ۴) در ۵ طبقه شامل حساسیت خیلی زیاد، حساسیت زیاد، حساسیت متوسط، حساسیت کم و حساسیت خیلی کم طبقه‌بندی و تهیه شد. براساس طبقات یادشده پهنه‌بندی حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی هرمزگان به انجام رسید.

آلینده‌های نفتی و فلزات سنگین ناشی از جنگ خلیج فارس بر رویشگاه‌های علف دریایی کرانه‌های جنوبی ایران (UNCC, 2003) در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ تهیه شد. زیستگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی، مکان‌های تخم‌گذاری لاکپشت‌های دریایی و زیستگاه پستانداران دریایی برای زیستگاه‌های کرانه‌ای بررسی شد. اطلاعات مربوط به زیستگاه پرندگان آبزی و کنارآبزی از گزارش نهایی سرشماری زمستانه پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی در نه استان کشور (Department of the Environment, 2006) محل‌های تخم‌گذاری لاکپشت‌های دریایی از اطلاعات مربوط به بررسی پراکنش لاکپشت‌های دریایی شمال خلیج فارس و دریای عمان (Saidpour, 2004) و زیستگاه پستانداران دریایی و لایه مربوط به زیستگاه‌های حیات وحش برای پستانداران براساس اطلاعات موجود در اطلس پستانداران ایران (Karami *et al.*, in press) جمع‌آوری و نقشهٔ مربوط به آن‌ها در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه شد. لایه مربوط به شاخابه‌ها از مطالعه انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوری در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (2010) در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰

جدول ۲. ماتریس همپوشانی اکوسیستم‌های منطقه ساحلی در استان هرمزگان


اکوسیستم‌ها												
علفزارهای جلگه‌ای	جنگلهای جلگه‌ای	علفزارهای دریایی	مناطق تحت حفاظت	علفزارهای دریایی	تالابها	پهنه‌های جلبکی	زیستگاه‌های حیات	وحش	زیستگاه‌های کرانه	جنگلهای جلگه‌ای	شاخابه‌ها	علفزارهای جلگه‌ای
G	I	F	O	H	A	W	S	P	M	کد حرفی		
-	MI	-	MO	-	-	-	-	-	-	M	جنگلهای مانگرو	
PG	PI	PF	-	PH	-	PW	-	-	-	P	مناطق تحت حفاظت	
-	-	-	SO	-	SA	-	-	-	-	S	علفزارهای دریایی	
WG	WI	WF	-	WH	-	-	-	-	-	W	تالابها	
AG	-	-	-	AH	-	-	-	-	-	A	پهنه‌های جلبکی	
HG	HI	HF	AO	-	-	-	-	-	-	H	زیستگاه‌های حیات	
-	OI	-	-	-	-	-	-	-	-	O	وحش	
-	FI	-	-	-	-	-	-	-	-	F	زیستگاه‌های کرانه	
IG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	جنگلهای جلگه‌ای	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G	شاخابه‌ها	

۶/۹۶ درصد از وسعت منطقه مطالعه شده در بخش عمدت ای از جنوب غربی شهرستان بندرلنگه که منطبق بر گستره منطقه حفاظت شده سراج و در نواحی جنوب غربی این شهرستان قرار دارد که شامل بخش هایی از منطقه حفاظت شده حرا است. این طبقه همچنین بخش عمدت ای از حرای بندرعباس، سیریک و جاسک را نیز دربرمی گیرد. درجه حساسیت زیاد با وسعت ۱۱۵۹۸ کیلومترمربع از منطقه مطالعه شده در بخش هایی از شهرستان بندرلنگه واقع شده است. درجه حساسیت متوسط با وسعت ۱۸/۴۲ کمتر از کل منطقه در بخش عمدت ای از شهرستان بندرلنگه که تا حدودی منطبق بر علفزارهای دریایی در ناحیه کرانه و زیستگاه حیات وحش در ناحیه ساحلی است قرار دارد. این طبقه همچنین بخش هایی از شهرستان پارسیان و سیریک را نیز دربرمی گیرد. همچنین با توجه به این جدول اگر مناطقی وجود داشته باشند که تنها شامل یک کد حرفی F, I یا G باشند در طبقه حساسیت خیلی کم و مناطقی تنها با کد حرفی H و O در طبقه حساسیت کم قرار می گیرند. در طبقه متوسط کدهای یک حرفی (W) (A,P,S,W) و دو حرفی (AG, FI, IG) قرار دارند. با توجه به اینکه جنگلهای حرا، مناطق حفاظت شده و تالاب ها از حساسیت بالایی برخوردارند، وجود آن ها به تنهایی در هر منطقه سبب قرار گرفتن آن منطقه در طبقه حساسیت خیلی زیاد می شود و هر ترکیبی از اکوسیستم های مذکور با سایر اکوسیستم ها در هر منطقه حساسیت خیلی زیاد آن منطقه را در برخواهد داشت.


۳. نتایج

پس از مطالعه و استخراج معیارهای به کاررفته در پژوهش ها و مراجع بررسی شده، معیار زیستگاه با ضریب ۰/۸۲۲ بیشترین اهمیت و معیار اهمیت اجتماعی با ضریب ۰/۱۱ کمترین اهمیت را برای پهنه بندی زیستگاه های حساس هرمزگان کسب کرد (شکل ۱). تعیین ضریب اهمیت شاخص های به کاررفته در آن ها نشان داد، شاخص انحصاری بودن و بکر بودن به ترتیب با ضریب ۰/۲۹۴ و ۰/۲۱۲ بیشترین اهمیت و وابستگی صنعتی با ضریب ۰/۰۰۱ کمترین اهمیت را در تعیین ساختارهای حساس ایفا می کند (شکل ۲). ضریب ناسازگاری حاصل از تحلیل سلسه مراتبی برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص ها ۰/۰۴ بود که نشان دهنده قابل قبول بودن قضاوت یادشده است.


نتایج مقایسه زوجی واحدهای اکوسیستمی منطقه ساحلی مطابق شکل ۲ با ضریب ناسازگاری ۰/۰۴ نشان داد، جنگلهای مانگرو با ضریب ۰/۱۶۴ دارای بیشترین حساسیت و علفزارهای جلگه ای با ضریب ۰/۰۴۲ نسبت به سایر اکوسیستم های نوار ساحلی دارای ضریب حساسیت کمتری هستند. با توجه به جدول ۴ معلوم شد براساس وسعت اکوسیستم های حساس، ۴۵ درصد اکوسیستم ها در درجه حساسیت خیلی کم و به طور عمدت در ناحیه ساحلی قرار گرفته است. کمترین وسعت حساسیت نیز در درجه حساسیت زیاد و عمده ای در ناحیه ساحلی واقع شده است (حدود ۰/۱۸ درصد در ناحیه ساحلی و حدود ۰/۰۹ درصد در ناحیه کرانه ای). درجه حساسیت خیلی زیاد با وسعت



شکل ۲. اولویت ضریب اهمیت معیارهای تعیین مناطق حساس ساحلی



شکل ۳. اولویت ضرایب اهمیت شاخص‌های تعیین مناطق حساس ساحلی



شكل ٤: ضریب اهمیت و حساسیت اکوسیستم‌های منطقه ساحلی

جدول ۳. نتایج حاصل از تجمعی فصل مشترک اکوسیستم‌های منطقه ساحلی،

کوسمیسیستم‌ها											
کد حرفی	عنصرهای جلگه‌ای	شاخه‌ها	جنگلهای جلگه‌ای	زیستگاه‌هایی کرانه	زیستگاه‌هایی بیان	وحش	پنهنه‌های بلکی	تلااب	عنصرهای دریایی	مناطق تحت حفاظت	جنگلهای مانگرو
M	۰/۰۴۲	۰/۰۵۲	۰/۰۵۶	۰/۰۷۱	۰/۰۷۲	-	۰/۰۹۱	۰/۰۹۹	۰/۱۰۸	۰/۱۱۲	۰/۱۶۴ ضریب
P	-	۰/۲۱۶	-	۰/۲۳۵	-	-	-	-	-	-	۰/۱۶۴ جنگلهای مانگرو
S	۰/۱۵۴	۰/۱۶۴	۰/۱۶۸	-	۰/۱۸۴	-	۰/۲۱۱	-	-	-	۰/۱۱۲ مناطق تحت حفاظت
W	-	-	-	۰/۱۷۹	-	۰/۱۹۹	-	-	-	-	۰/۱۰۸ علفزارهای دریایی
A	۰/۱۴۱	۰/۱۵۱	۰/۱۵۵	-	۰/۱۷۱	-	-	-	-	-	۰/۰۹۹ تلااب‌ها
H	۰/۱۳۳	-	-	-	۰/۱۶۳	-	-	-	-	-	۰/۰۹۱ پنهنه‌های جلبکی
O	-	۰/۱۱۴	۰/۱۲۴	۰/۱۲۸	۰/۱۴۳	-	-	-	-	-	۰/۰۷۲ زیستگاه‌های حیات وحش
F	-	-	۰/۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۷۱ زیستگاه‌های کرانه
I	-	-	-	۰/۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۰/۰۵۶ جنگلهای جلگه‌ای
G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۴۲ علفزارهای جلگه‌ای
-	G	I	F	O	H	A	W	S	P	M	کد حرفی

جدول ۴. تعیین طبقات حساسیت اکوسیستم‌های موجود در منطقه ساحلی

دامنه عددی	درجه حساسیت	طبقه	درجه حساسیت	منابع زیستی	کد حرفی منابع زیستی حساس
>/۱۴۰	۰/۱۳۹-۰/۱۱۶	۰/۱۱۵-۰/۰۹۱	۰/۰۹۰-۰/۰۶۷	۰/۰۶۶-۰/۰۴۲	
خیلی زیاد ۵	زیاد ۴	متوسط ۳	کم ۲	خیلی کم ۱	
-	-	مناطق تحت حفاظت	زیستگاه‌های حیات وحش	علفزارهای جلگه‌ای، جنگل‌های جلگه‌ای	ساحل
جنگل مانگرو M,PW,PH,PF, PI,PG, SO,SA, AH,AO	آبسنگ‌های مرجانی	پهنه‌های علفزارهای دریایی	زیستگاه‌های کرانه‌ای	شاخابه‌ها	کرانه
سایر ترکیبات M ، سایر ترکیبات P ، سایر ترکیبات W	OI	P,S,W,A, AG, FI, IG	H,O	F,I,G	
۷۴۷۰۱	۱۱۵۹۸	۱۹۷۵۸۹	۷۰۵۵۱	۴۸۹۹۱۱	وسعت حساسیت هر طبقه (کیلومترمربع)
۶/۹۶	۱/۰۸	۱۸/۴۲	۶/۵۸	۴۵/۶۶	وسعت حساسیت در منطقه ساحلی (درصد)
۶۹۸۹۳	۱۰۴۲۵	۴۵۸۱۶	۳۷۳۷۸	۴۸۸۴۲۷	وسعت حساسیت در ناحیه ساحلی (کیلومترمربع)
۹۳/۵۶	۸۹/۸۸	۲۳/۱۹	۵۲/۹۸	۹۹/۷۰	وسعت هر طبقه حساسیت در ناحیه ساحلی (درصد)
۴۸۰۸	۱۱۷۰	۱۵۱۷۲۷	۳۳۱۶۹	۱۴۱۴	وسعت حساسیت در ناحیه کرانه (کیلومترمربع)
۶/۴۴	۱۰/۰۹	۷۶/۷۹	۴۷/۰۲	۰/۳	وسعت حساسیت در ناحیه کرانه (درصد)

جدول ۵. طبقه‌بندی اکوسیستم‌های منطقه ساحلی

منطقه ساحلی	واحدهای ساختاری منطقه ساحلی	وسعت (کیلومترمربع)	درصد از کل منطقه ساحلی
	علفزارهای جلگه‌ای	۴۲۶۳۱۱	۴۱/۱۰
ناحیه ساحلی	جنگل‌های جلگه‌ای	۱۷۹۸۶۸	۱۷/۳۴
	مناطق تحت حفاظت	۶۹۸۴۵	۶/۷۳
	تالاب‌ها	۵۷۲۰	۰/۵۵
ناحیه کرانه‌ای	زیستگاه‌های حیات وحش	۱۶۱۶۹۹	۱۵/۵۹
	جنگل‌های مانگرو	۴۸۰۵	۰/۴۹
	پهنه‌های جلگه‌ای	۲۱۷	۰/۰۲
	علفزارهای دریایی	۱۵۱۷۱۹	۱۵/۶۵
	شاخابه‌ها	۲۹۸۱	۰/۳۱
	زیستگاه‌های کرانه	۳۴۷۰۵	۳/۵۸

شناسایی مناطق حساس زیستی هرمزگان، مناطق تالابی و خورهای استان هرمزگان خصوصاً خور مصب‌های شور و شیرین، میدانی و سایه خوش و آذینی به لحاظ وجود ویژگی‌های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین اهمیت را پیدا کردند. Sharifipour و همکارانش (2009) نیز در پژوهشی با عنوان «ارزیابی حساسیت زیستمحیطی سواحل شمالی خلیج فارس» با توجه به ارزش‌های حفاظتی و کانون‌های آلوده‌ساز در کل محدوده مطالعه شده، ۲۹۹۴ کیلومترمربع از منطقه را با حساسیت خیلی زیاد، ۲۷۰۱ کیلومترمربع با حساسیت متوسط و ۲۹۰۰۵۶ کیلومترمربع با حساسیت کم ارزیابی کردند. با توجه به نتایج این مطالعه ۴۸۹۹۱۱ کیلومترمربع از کل محدوده بررسی شده دارای حساسیت خیلی کم، ۱۹۷۵۸۹ کیلومترمربع دارای حساسیت کم، ۱۹۷۵۸۹ کیلومترمربع دارای حساسیت متوسط، ۱۱۵۹۸ کیلومترمربع دارای حساسیت زیاد و ۷۴۷۰۱ کیلومترمربع دارای حساسیت خیلی زیاد بود. نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در این نوار ساحلی نشان می‌دهد، مناطق جزر و مدی با بسترها گلی، خورها، مصب‌ها و خلیج‌های کوچک بر روی اراضی دانه‌ریز و گلی در محیط‌های آرام و کم‌تلاطم که محل مناسبی برای رشد و پراکنش جنگل‌های مانگرو و مکان مناسبی برای جانوران خشکی زی و آبزی و زیستگاه موقتی تخم‌گذاری و تغذیه و پرورش محسوب شود به منزله حساس‌ترین زیستگاه‌های شناخته شده در نوار ساحلی استان محسوب می‌شوند.


خورها و مصب‌های استان به منزله زیستگاه حد واسط اکوسیستم رودخانه‌ای و دریایی بستر مناسبی برای پرورش و فعالیت تولید مثلی بسیاری از آبزیان دریایی است. خورها از رویشگاه‌های مهم جنگل‌های مانگرو محسوب می‌شوند و همچنین محل تغذیه و گذران پرنده‌گان متنوع آبزی و کنارآبزی هستند و از این حیث بسیار بالاهمیت و ارزشمند هستند. پهنه‌های گلی جزر و مدی بیشترین نقش و سهم را در تولید اولیه محیط‌زیست دریایی و سواحل ایفا می‌کنند و از جمعیت بالای کفزیان برخوردارند و حمایت‌کننده زنجیره غذایی دریا هستند و شرایط مساعد تغذیه و

۴. بحث و نتیجه‌گیری

مطابق نتایج حاصل با توجه به اطلاعات موجود تقریباً بخش عمده‌ای از نوار ساحلی استان هرمزگان دارای حساسیت خیلی کم تشخیص داده شد. وجود نواحی خیلی حساس در مناطقی به چشم می‌خورد که جنگل‌های حرا، مناطق تحت حفاظت سازمان، نواحی تالابی و زیستگاه‌های حیات وحش وجود دارند. در این مطالعه نیز بیشترین حساسیت مربوط به بخش‌هایی از شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، جاسک و بندرلنگه بود که جنگل‌های حرا و مناطق تحت حفاظت دارند. همچنین بخش‌هایی از شهرستان میناب به سبب قرارگیری در منطقه حفاظت‌شده تیاب و میناب، وجود زیستگاه‌های تالابی و زیستگاه‌های حیات وحش حساسیت زیاد و خیلی زیاد دارد. بخش‌هایی دارای حساسیت متوسط در مناطقی از شهرستان بندرلنگه در مجاورت منطقه حفاظت‌شده سراج و بخش‌های عمدۀ از علفزارهای دریایی واقع در این شهرستان شامل می‌شود. دیگر بخش‌های ساحلی استان در ردیف مناطق با حساسیت کم و خیلی کم ارزیابی شد. نتایج این بررسی با نتایج حاصل از مطالعه Danehkar و همکاران (2005) که به منظور پنهان‌بندی حساسیت زیستمحیطی سواحل استان هرمزگان با استفاده از معیارهای تدوین شده برای تعیین مناطق تحت حفاظت و حساس ساحلی-دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست (Danehkar & Majnonian, 2004) و Danehkar انجام شده بود مقایسه شد. نتایج Danehkar و همکاران (2005) نشان می‌داد که تقریباً تمامی نوار ساحلی استان هرمزگان از نظر ارزش حفاظت‌شده حرا ویژگی ممتازی نیست به جز منطقه حفاظت‌شده حرا که در ردیف نواحی با حساسیت متوسط قرار دارد. سایر بخش‌های استان نیز مناطقی با حساسیت کم هستند. با وجود اینکه در این مطالعه بخش‌های زیادی از نوار ساحلی دارای حساسیت کم و خیلی کم تشخیص داده شد ولی مناطق حفاظت‌شده حرا که به دلیل ویژگی‌های زیستگاهی و خدمات اکوسیستمی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد، در ردیف اکوسیستم‌های با حساسیت زیاد قرار گرفت. همچنین در مطالعه انجام شده توسط Habibi (2010) برای

این مناطق شامل ۱ اثر طبیعی ملی، ۲ پناهگاه حیات وحش و ۱۳ منطقه حفاظت شده هستند، که درمجموع، ۲۹۰۶۴ کیلومترمربع از سطح کل استان را به خود اختصاص داده‌اند. درمجموع، مناطق چهارگانه استان هرمزگان حدود ۶ درصد از سطح کل استان است. همچنین وجود تالاب‌های دلتای رود گز و رود حرا، دلتای رود شور، شیرین و میناب، تنگه خوران (Department of the Environment, 2013) به‌دلیل تنوع زیستی بالا و اهمیت آن‌ها از نظر فرهنگی به‌منزله میراثی جهانی و در عین حال شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای این اکوسیستم‌ها این نوار ساحلی را شایسته اقدامات حفاظتی بیشتری قرار می‌دهد. هر چند مناطقی که در زمرة نواحی با حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار دارند، وسعت کمی را به خود اختصاص داده و بخش وسیعی از نوار ساحلی استان هرمزگان دارای حساسیت کم و خیلی کم است ولی وجود خورها، مصب‌ها، تالاب‌ها، جنگلهای مانگرو، سواحل ماسه‌ای و سنگی-صخره‌ای که زیستگاه و پناهگاه حیات وحش منطقه محسوب می‌شوند ضرورت حفاظت از این مناطق و برنامه‌ریزی برای استفاده منطقی انسان از این نواحی را نشان می‌دهد.

زیست پرنده‌گان مهاجر و بومی کنارآبری را فراهم می‌کنند. برخورداری از آب و هوای گرم و مرطوب نیز استان هرمزگان را به منزله خاستگاه زمستان گذرانی پرنده‌گان مهاجر به‌ویژه پرنده‌گان آبری و کنارآبری تبدیل کرده است. زیستگاه‌های گلی نسبت به آلاینده‌ها به خصوص آلودگی‌های نفتی بسیار حساس بوده و با توجه به شرایط جزر و مدى و جریانات آبی، بیشتر در معرض تأثیرات آلودگی آبی هستند (PMO, 2010). سواحل ماسه‌ای به صورت باریکه‌هایی با عرض کم در بخش‌هایی از سواحل خلیج فارس و دریای عمان در نوار ساحلی استان وجود دارند. سواحل شنی و ماسه‌ای با داشتن شبیه ملایم و دانه‌بندی مناسب و دوربودن از فعالیت‌ها و تعارضات انسانی، جایگاه مناسب لانه‌سازی و تخم‌گذاری لاکپشت‌های دریایی هستند. بسترها ساحلی ماسه‌ای در بسیاری از حاشیه‌های سواحل استان در معرض دگرگونی و پیامدهای منفی ناشی از فعالیت‌های انسانی و محیطی است. توسعه صنایع، کارخانجات، کان کنی، برداشت شن و ماسه در سواحل، از جمله عوامل تخریب سواحل ماسه‌ای به شمار می‌رود. استان هرمزگان با ۷۰۶۹ کیلومترمربع وسعت، دارای ۱۶ منطقه تحت حفاظت از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست است.



شکل ۵. مناطق حساس زیستی نوار ساحلی استان هرمزگان

REFERENCES

1. Akhavan, H., 2010. Determine of Sensitivity of Hormozgan Province West Shoeline by ESI with Aim of Pollution management. M.Sc thesis. Management of Environment group. Islamic Azad University, Bandar-Abbas Branch, 193p. (in Persian)
2. Center of Planning and Architecture Studies, 2008. Physical design of the South Coast region. Environmental Studies. Department of Housing and Urban Development. (in Persian)
3. Danehkar, A., 1998. Sea Sensitive Areas in IRAN. Mohitzist 24, 28-38. (in Persian)
4. Danehkar, A., 2003. Identification and Selection Criteria for Sea Sensitive Area in Iran. Bandarodarya 101 and 102, 8-12. (in Persian)
5. Danehkar, A., Madjnoonian, H., 2004. Proposed Criteria for the Assessment of Coastal-Marine Areas in order to Determination Coastal-Marine Protected Area, Case Study: Protected Area in Caspian sea. Mohitshenasi 35, 9-32. (in Persian)
6. Danehkar, A., Varaste, R., Fahimi, F., Mahmoudi, B., Pormohammadi, M., 2005. Zoning and Determination Degree of Hormozgan Province Coastal Environmental Sensitivity. Department of Environmental Protection of Hormozgan. Hormozgan University, Tehran. (in Persian)
7. Davar, L., 2007. Comparison of Effectiveness of NOAA and IMO Methods for Identification of Environmentally Sensitive Areas of Sistan and Baluchestan Shoreline. M.Sc thesis. Environmental Science-land use Planning and Assessment group. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 204p. (in Persian)
8. Department of the Environment (IRAN), 2003. Committee Minutes of Sea sensitive Areas, Marine Environment Bureau, Tehran. (in Persian)
9. Department of the Environment, 2006. The final report of the census of waterfowl and migratory birds winter along the water in nine provinces. (in Persian)
10. Department of the Environment, 2013. Office of Habitat and Areas. (in Persian)
11. Habibi, S., 2010. Comprehension of IMO&NOAA Methods for Determination of Hormozgan Province Coastal Environmental Sensitivity with SWOT Matrix. M.Sc thesis. Management of Environment group. Islamic Azad University, Bandar-Abbas Branch, 200p. (in Persian)
12. IMO/MEPC 46/23. 2001. Guidelines for the identification and design nation of particularly sensitive sea areas. ANNEX 6, Jan.
13. IUCN/WCPA. 1999. Guidelines for Marine Protected Areas. Edited & cordinated by Graeme Kelleher.
14. Karami, M., Ghadirian, T., feyzollahi, K., In press. Atlas of Mammals in IRAN. (in Persian)
15. Kebriayi, A., 2005. Studies of Integrated Coastal Zone Management. Available <http://www.shilat.com/persian/page-view.asp>. (in Persian)
16. Lotfi, H., Baghai, H., Mousavi, R., khayambashi, S., 2011. Environment Persian Gulf and Protection of it. Joghrafiyay ensani 1, 1-9. (in Persian)
17. Madjnoonian, H., 2000. Protected Area in Iran: Principles and Policies Protection of the Parks and Area. Environmental Protection Agency Press, Tehran, 742p. (in Persian)
18. Madjnoonian, H., Mirabzadeh, P., 2003. Protected Coastal-Marine Areas. Environmental Protection Agency Press, Tehran, 406p. (in Persian)
19. Management and Planning Organization, Office of Planning, Environmental and Sustainable Development, 2005. 66p. (in Persian)
20. Nature and Resource Sustainability Consulting Engineers, 2013. National document of mangrove forests.Forest, Rangeland and Watershaed Country. (in Persian)
21. Parhizi, A., 2007. The First Step to Protect the Environment in the Persian Gulf and Oman Sea: Established Special Marine Area. Payam-e-darya 163, 28-29. (in Persian)
22. Ports and Maritime Organization (PMO). 2010. Studies of Integrated Coastal Zone Management Plan. Summary of Outcome Studies. Department of Engineering of Port and Coastal: 47p. (in Persian)
23. Ports and Maritime Organization (PMO). 2009. Studies of Integrated Coastal Zone Management Plan. Summary of Outcome Studies. Department of Engineering of Port and Coastal: 217p. (in Persian)

24. Razmjo, S., 2010. Identification and Zoning sensitive Areas in Mazandaran by using ESI Indicator. M.Sc thesis. Environment Assessment group. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Ahvaz. (in Persian)
25. Saidpour, S., 2004. Distribution of Sea Turtles Northern Persian Gulf and Oman Sea. Pajouhesh & Sazandegi 63, 41-46. (in Persian)
26. Salm, R.V., Clark, J.R., 1984. Marine and Coastal Protected Areas: A guide for planners and managers. IUCN, Gland, Switzerland.
27. Salm, R.V., Price, A., 1995. Selection of Marine Protected Areas: Principles of Techniques for Management. Edited by Susan Gubby. Chapman and Hall, London.
28. Servati, M., 2002. Natural Geography 's Sea and Coasts. Tehran: Samt press, 264p. (in Persian)
29. Sharifipour, R., Danehkar, A., Nouri, J., 2005. Assessment of Physical sensitivity in Coastal Boushehr Province by using Environmental Sensitivity Index. Olome mohiti 7, 45-51. (in Persian)
30. Sharifipour, R., Danehkar, A., Nouri, J., 2009. Assessment the Environmental sensitivity of Northern Coast of Persian Gulf According to Association of Contaminated Protective Mechanism. Mohitshenasi 48, 89-102. (in Persian)
31. United National Compensation Commission (UNCC), 2003. The Progress Report for: Post and Pre-war Status of Heavy Metals and Petroleum Hydrocarbons in Seagrasses Areas of Surface and Core Sediments in the Persian Gulf (Iranian side). (in Persian)