

اثر جایگاه ژنی $TGF\beta_3$ بر ارزش‌های اصلاحی و فنتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران

بابک عنایتی^{*} و قدرت‌اله رحیمی^۲

(E-mail: bkenayati@gmail.com)

تاریخ وصول مقاله: ۹۰/۳/۲۰، تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۱۲/۱۳

چکیده

ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا به عنوان ژن مؤثر و مهم در فرآیند رشد و تمایز سلولی شناخته شده است. به منظور بررسی چندشکلی ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا-۳ ($TGF\beta_3$) از ۱۶۰ قطعه مرغ مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به طور تصادفی خونگیری شد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته و تکثیر یک قطعه به طول ۲۹۵ جفت باز (بخشی از ایترنون^۴، کل اگزون^۵ و بخش کوچکی از ایترنون^۵) با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. قطعه تکثیر شده بعد از هضم به کمک آنزیم *BsiYI* دو آلل + و به ترتیب با فراوانی ۰/۰۳۷ و ۰/۰۳۶ را آشکار نمود. فراوانی ژنتیپ‌های "+/+"، "+/-" و "-/-" به ترتیب ۰/۰۶۴۵، ۰/۰۲۷۸۴ و ۰/۰۵۶۹ بروآورد شدند. آنالیز آماری نتایج به دست آمده نشان داد که وجود یک آلل + در ژنتیپ می‌تواند میانگین صفات وزن بدن در سنین یک‌روزگی و هشت هفتگی را به صورت معنی‌داری در مقایسه با ژنتیپ -/- افزایش دهد که نشان‌دهنده نقش تأثیرگذار آلل + در افزایش ارزش فنتیپی وزن بدن در جوجه‌ها می‌باشد ($P<0/05$). در پایان می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که نشانگر مورد مطالعه به همراه دیگر فرم‌های آللی ثبت شده در جایگاه ژنی $TGF\beta_3$ می‌تواند در درک هر چه بهتر کترول ژنتیکی نرخ رشد در جوجه‌ها مفید باشد.

کلمات کلیدی: ارزش ژنتیپی، ژن β_3 , $TGF\beta_3$, چندشکلی، وزن بدن، مرغ بومی مازندران

۱ - دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، ساری - ایران (نویسنده مسئول مکاتبات^{*})

۲ - استاد، گروه علوم دام و آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران

مقدمه

میواستاتین عضو جدیدی از خانواده بزرگ فاکتور مؤثر بر رشد بتا است که به صورت اختصاصی در ماهیچه اسکلتی بیان شده و به عنوان تنظیم‌کننده رشد در این بافت عمل می‌کند (۶). هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چندشکلی آللی در قسمتی از بخش انتهای ایترون^۲، کل اگزون^۳ و بخش کوچکی از ایترون^۴ ژن جایگاه فاکتور مؤثر بر رشد بتا-۳ و رابطه ژنتیکی حاصل از چندشکلی این ژن با داده‌های فنوتیپی و ارزش‌های اصلاحی صفات مرتبط با وزن بدن در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی استان مازندران بود.

مواد و روشها

نمونه‌برداری و انجام واکنش PCR

تعداد ۱۶۰ نمونه خون از مرغ‌های ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به طور تصادفی تهیه و DNA از ۵۰ میکرولیتر خون تام به روش نمکی بهینه یافته استخراج شد. مقدار و کیفیت DNA استخراج شده به ترتیب به وسیله روش‌های اسپکتروفتومتری و ژل الکتروفورز تعیین گردید. تکثیر قطعات مورد نظر در جایگاه TGF β_3 توسط آغازگر اختصاصی و با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) انجام گرفت (جدول ۱).

غایظت مواد مورد استفاده در PCR و نیز دما و زمان‌های مورد استفاده در سیکل حرارتی برای هر یک از جایگاه‌ها در جدول‌های (۲) و (۳) ارائه شد. پس از انجام واکنش PCR، محصولات آن به کمک ژل آگارز ۰/۸ درصد به مدت ۲۵ دقیقه با ولتاژ ۸۵ الکتروفورز شد. سپس با اتیدیوم بروماید رنگ‌آمیزی و به کمک اشعه ماوراء بنفش باندها مشاهده و برای مقایسه قطعات تکثیر شده و اندازه‌گیری طول آنها از نشانگر ۵۰ جفت باز (SMO371 کمپانی فرمتو) استفاده شد.

علی‌رغم این‌که توارث صفات کمی تحت تأثیر تعداد زیادی ژن قرار دارد، اما ژن‌های اصلی^۱ نیز در تغییرات فنوتیپی یک صفت نقش دارند. شناسایی ژن‌های اصلی و چگونگی ارتباط آنها با صفات تولیدی برای پیش‌بینی ارزش اصلاحی حیوانات و کاهش خطا در انتخاب مؤثر می‌باشد. آثار بیولوژیکی فاکتور مؤثر بر رشد بتا (TGF β) شامل تاثیر روی تمایز، تکثیر و رشد سلولی، تشکیل ماتریکس خارج سلولی و عملکرد اینمنی است (۱۳). زیر خانواده فاکتور بتا یکی از مهمترین ژن‌های مؤثر در صفات رشد و سازگاری می‌باشد (۱). ژن‌های خانواده بزرگ در تولید پروتئین‌هایی نقش دارند که انتقال دهنده پیام از یک سلول به سلول دیگر می‌باشند و نقش آن‌ها در رشد و سازگاری سلول‌ها مهم است (۱۱). خانواده TGF β دارای چهار ژن به نام‌های TGF β_1 , TGF β_2 , TGF β_3 و TGF β_4 می‌باشد (۲ و ۳). ژن TGF β_3 طیور روی کروموزوم شماره پنج قرار دارد (۵). فعالیت‌های بیولوژیکی اشکال مختلف TGF β در طیور تقریباً مشابه پستانداران گزارش شده است (۴). ژن‌های TGF β بر رشد و تمایز انواع مختلفی از سلول‌ها و نیز در ساخت ماهیچه، غضروف، استخوان، خون، چربی و سلول‌های پوششی نقش دارند (۱ و ۱۴). تعدادی از محققین رابطه ژن‌های TGF β با جایگاه صفات کمی سازوکارهای پاسخ اینمنی در مرغ‌ها را بررسی کرده و مشخص نموده‌اند که این ژن یا ژن‌های پیوسته به آن در ارتباط با پاسخ اینمنی می‌باشند. نتایج این تحقیقات نشان داد که SNP^۵‌های موجود در جایگاه TGF β ممکن است در انتخاب براساس نشانگر برای تولید آنتی‌بادی مفید باشند (۱۶). بررسی چندشکلی تک نوکلئوتیدی روی ژن مایواستاتین در لاین‌های مختلف مرغ نشان می‌داد که

1 - Major gene

2 - Single Nucleotide Polymorphism

جدول ۱ - توالی آغازگرهای مورد استفاده

منبع	توالی (۳'-۵')	نام جایگاه
v	TCAGGGCAGGTAGAGGGTGT GCCACTGGCAGGATTCTCAC	TGF β ₃

جدول ۲ - درجه حرارت و زمان در واکنش PCR

زمان (ثانیه)	دما (°C)	مراحل	ژن
۶۰	۹۴	واسرشته‌سازی	
۶۰	۵۸	اتصال	TGF β ₃
۶۰	۷۲	بسط	

جدول ۳ - غلظت مواد مورد استفاده در واکنش PCR

جزای واکنش	غلظت نهایی
بافر PCR	۱X
MgCl ₂	۰/۰۰ میلی مولار
dNTP	۰/۰۰ میلی مولار
پرایمر رفت	۰/۰۵ میکرو مولار
پرایمر برگشت	۰/۰۵ میکرو مولار
DNA الگو	۵۰ نانوگرم
آنزیم تک پلیمراز	۱ واحد
ddH ₂ O	تا حجم ۲۵ میکرولیتر
حجم کل	۲۵ میکرولیتر

آنزیم برش دهنده *BsiYI* ۲/۵ میکرولیتر بافر واکنش آنزیمی (۱۰X) و تا ۸/۸ میکرولیتر میکرولیتر آب دیونیزه استفاده شد.

برای هضم آنزیمی محصولات حاصل از واکنش PCR از شش تا هشت میکرولیتر محصول PCR ۰/۰۰ میکرولیتر

بدن در زمان بلوغ جنسی^۱ می‌باشد. بردارهای b_1 تا b_4 حاوی اثرات ثابت ناپیوسته سال - نوبت جوجه‌کشی و اثر جنس و اثر ثابت پیوسته سن بلوغ جنسی و بردارهای a_1 تا a_4 حاوی اثرات تصادفی ژنتیکی (ارزش اصلاحی) صفات BW_1 ، BW_8 ، BW_{12} و BWM و بردار m_1 تا m_4 حاوی بردار اثرات مادری صفات BW_1 ، BW_8 ، BW_{12} و BWM می‌باشد. اثرات مادری به دلیل تأثیر مواد مغذی و اندازه تخم بر وزن تولد است که متأثر از شرایط بدنه مرغ مادر می‌باشد.

تعیین اثر ژنتیک

برای تعیین رابطه بین ژنتیک‌های حاصل با داده‌های فنوتیپی از رویه GLM نرم‌افزار SAS (نسخه ۹/۱) و از تابع شماره دو برای سه صفت وزن یکروزگی، وزن هشت هفتگی و ۱۲ هفتگی و از تابع زیذ برای صفت وزن در زمان بلوغ جنسی استفاده شد (۱۲):

$$y_{ijkl} = \mu + g_i + h_j + s_k + \epsilon_{ijkl} \quad (2)$$

در این رابطه، y_{ijkl} مقدار فنوتیپی صفت مورد بررسی، μ میانگین کل، g_i اثر ژنتیک‌های $TGF\beta_3$ ، h_j اثر نوبت جوجه‌کشی، s_k اثر جنس و ϵ_{ijkl} اثر تصادفی باقی‌مانده می‌باشد.

$$y_{ijkl} = \mu + g_i + h_j + s_k + b(x_{ijk} - xb) + \epsilon_{ijkl} \quad (3)$$

در این رابطه، y_{ijkl} مقدار فنوتیپی صفت مورد بررسی، μ میانگین کل، g_i اثر ژنتیک‌های $TGF\beta_3$ ، h_j اثر نوبت جوجه‌کشی، s_k اثر جنس، ϵ_{ijkl} اثر تصادفی باقی‌مانده، b ضریب رگرسیون سن بلوغ جنسی بر صفت وزن بدنه در زمان بلوغ، x_{ijk} سن بلوغ جنسی و xb میانگین تصحیح شده صفت سن بلوغ جنسی می‌باشد.

^۱ - سن مرغ در زمان تولید اولین تخم که در این گله دارای میانگین ۱۵۹ روزگی می‌باشد.

محصولات PCR بعد از هضم آنزیمی روی ژل آگارز ۲/۵ درصد الکتروفورز و آلل‌ها به کمک رنگ‌آمیزی با اتدیوم بروماید، شناسایی شدند. با شناسایی آلل‌ها، ژنتیک پ هر یک از نمونه‌ها تعیین و فراوانی ژنی و ژنتیکی با نرم‌افزار POPGEN نسخه ۱/۳۱ برآورد شد (۱۵).

پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی

برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی نمونه‌های مورد مطالعه از اطلاعات شجره‌ای و رکوردهای سال ۱۳۷۵ به بعد مرغ‌های بومی مرکز اصلاح نژاد مرغ استان مازندران استفاده شد. فایل داده‌ها دارای حدود ۴۰۰۰۰ رکورد، مربوط به نه نسل و چهار نوبت جوجه‌کشی در هر نسل بود. برآورده ارزش اصلاحی به صورت چندصفتی و با کمک مدل شماره سه نرم‌افزار DFREML، (دارای اثرات افزایشی و اثرات مادری) انجام شد (۹). برای پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی صفات وزن بدنه در یک روزگی (BW_1)، هشت هفتگی (BW_8) و ۱۲ هفتگی (BW_{12}) از تابع شماره ۱ استفاده شد. چون سن بلوغ جنسی می‌تواند بر صفت وزن بدنه در زمان بلوغ جنسی (BWM) مؤثر باشد، عامل سن بلوغ جنسی به عنوان یک اثر تصادفی برای پیش‌بینی ارزش اصلاحی صفت وزن بدنه در زمان بلوغ جنسی در نظر گرفته شد:

$$y_i = X_i b_i + Z_{1i} a_i + Z_{2i} m_i + e_i \quad (1)$$

در این رابطه، y_i بردار مشاهدات i امین صفت، b_i بردار اثر عوامل ثابت بر مشاهدات i امین صفت، a_i بردار ارزش اصلاحی، m_i بردار اثرات مادری، e_i بردار اثر باقیمانده مؤثر بر مشاهدات i امین صفت، X_i ماتریس ضرایب مربوط به بردار b ، Z_{1i} ماتریس ضرایب مربوط به بردار a ، Z_{2i} ماتریس ضرایب مربوط به بردار m بوده و $i = 1, 2, \dots, 40000$ به ترتیب، وزن بدنه در سن یکروزگی، هشت‌هفتگی، ۱۲ هفتگی و وزن

نتائج و بحث


توالی تشخیص برای آنزیم *BsiYI* یا *BseLI* به صورت CNNNNNN↓NNGG است. این آنزیم دارای چندین جایگاه برش روی محصول PCR بود که درنتیجه هضم آنزیمی، سه قطعه ۱۴۵، ۷۵ و ۱۲۵ نوکلئوتیدی رویت شد. عدم تطابق قطعات تکثیر شده و هضم شده به دلیل عدم مشاهده قطعه ۲۰ جفت بازی و عدم امکان تفکیک دو قطعه ۷۵ جفت بازی بود. در اثر هضم محصول PCR با آنزیم فوق، سه ژنوتیپ روی ژل آگارز مشاهده شد که فراوانی افراد دارای دو قطعه ۲۰ و ۷۵ جفت باز نسبت به دیگر افراد کمتر بود (شکل ۱).

برای تعیین رابطه بین ژنوتیپ‌های حاصل از ژن TGF β ₃ با ارزش اصلاحی صفات مورد بررسی از تابع زیر استفاده شد:

$$y_i = \mu + g_i + e_i \quad (\dagger)$$

در این مدل، y_i ارزش اصلاحی صفت مورد بررسی، μ_i میانگین کل، e_i اثر زن $TGF\beta_3$ و g_i اثر تصادفی باقی‌مانده می‌باشد.

تفاوت بین میانگین‌ها با روش حداقل مربعات میانگین و آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد بررسی قرار گرفت.



شکل ۱ - ژنوتیپ‌های الگوی قطعات هضم شده ژن $TGF\beta_3$ ، در مرغان بومی مازندران

(در ژنو تیپ +/+ قطعه ۲۹۵ جفت بازی به قطعات ۱۴۵، ۷۵ و ۷۵ جفت باز تقسیم شد. در ژنو تیپ -/- قطعه ۲۹۵ جفت بازی به قطعات ۱۲۵، ۷۵ و ۷۵ جفت باز تقسیم شد. در ژنو تیپ +/- قطعه ۲۹۵ جفت بازی به قطعات ۱۴۵، ۱۲۵، ۷۵، ۷۵، ۷۵ و ۷۵ جفت باز تقسیم شد.)

هتروزیگوستی یکی از شاخص‌های میزان تنوع ژنتیکی در یک جمعیت می‌باشد. میزان هتروزیگوستی برای جایگاه $TGF\beta_3$ در این گله ۰/۲۸۲۱ برآورد شد که عدم ارتباط ژنتیکی گله با سایر گله‌ها می‌تواند سبب کاهش هتروزیگوستی در این جایگاه باشد (جدول ۴).

پس از آنکه محصولات PCR به وسیله آنزیم‌های
برش‌دهنده، برش داده شد مطابق با الگوی مشاهده شده
فراروانی‌های ژنی و ژنتوتیپی برآورد گردید (جدول ۳). آزمون
مربع کای نشان داد جایگاه ژن $TGF\beta_3$ در جمعیت مورد
مطالعه در حال تعادل است ($P<0.01$). میزان

جدول ۴ - فراوانی ژنی و ژنتیپی حاصل از هضم آنزیمی ژن $TGF\beta_3$ در مرغان بومی مازندران هموزیگوستی (Ho)، هتروزیگوستی (He)، فراوانی مشاهده شده (O) و فراوانی مورد انتظار (e) جایگاه مورد بررسی

آller		ژنتیپ			
+	-	+/-	+/+	-/-	
۰/۸۰۳۷	۰/۱۹۶۱	۰/۶۶۴۵	۰/۲۷۸۴	۰/۰۵۶۹	فراوانی برآورده شده
Ho(o)	Ho(e)	He(o)	He(e)		جایگاه ژنی
۰/۳۱۹۵	۰/۲۸۲۱	۰/۶۸۰۵	۰/۷۱۷۹		

می باشد، به طوری که تغییر در ژنتیپ و یا وجود برخی از آلل‌ها در افراد می‌تواند بر ارزش‌های فنتیپی صفات مذکور تأثیر معنی‌دار داشته باشد (جدول ۶).

نتایج حاصل از آنالیز واریانس و مقایسات میانگین با استفاده از توابع ارائه شده در جداول‌های (۵) و (۶) آمده است. نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی‌دار بین تغییرات ژنتیپ‌ها بین افراد و تغییرات رکوردهای تصحیح شده صفات

جدول ۵ - آنالیز واریانس صفات مختلف مورد بررسی در گله

P-value		صفات
ارزش‌های اصلاحی	ارزش‌های فنتیپی	
۰/۴۸ ^{ns}	۰/۰۴*	وزن بدن در یک‌روزگی
۰/۷۷ ^{ns}	۰/۰۵*	وزن بدن در هشت‌هفتگی
۰/۱۵ ^{ns}	۰/۶۰ ^{ns}	وزن بدن در ۱۲ هفتگی
۰/۰۵ ^{ns}	۱/۲۱ ^{ns}	وزن بدن در زمان بلوغ

جدول ۶ - میانگین مربعات اشتباہ معیار و مقایسات میانگین ژنتیپ‌های مختلف ژن مرتبه با صفت

ژنتیپ				صفات
-/-	+/+	-/+		صفات
$35/4 \pm 1/07^b$	$38/2 \pm 0/32^a$	$38/4 \pm 0/55^a$	وزن بدن در یک روزگی (گرم)	
$449 \pm 32/33^b$	$50/2 \pm 1/0/19^a$	$534 \pm 18/74^a$	وزن بدن در هشت‌هفتگی (گرم)	

هفتگی، عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین ژنوتیپ‌های +/+ و +/- را نشان داد، اما میانگین این صفت در افراد دارای ژنوتیپ‌های +/+ و +/- بیشتر از میانگین افراد دارای ژنوتیپ‌های -/- بود ($P < 0.05$). این اختلاف می‌تواند ناشی از متفاوت بودن نژاد مرغ‌ها باشد. در هر دو صفت وزن بدن در یک روزگی و هشت هفتگی افراد هتروزیگوت دارای میانگین بالاتری بودند، البته اختلاف معنی‌داری با میانگین افراد +/+ نداشتند. این نتیجه نشان می‌دهد که افراد هتروزیگوت دارای شایستگی بیشتری می‌باشند. به هر حال نشانگر مورد مطالعه به همراه دیگر فرم‌های آللی ثبت شده در جایگاه ژنی TGF β_3 می‌تواند در درک هرچه بهتر کنترل ژنتیکی نرخ رشد در جوجه‌ها مفید باشد. درنتیجه تحقیقات بیشتر برای آشکارسازی هرچه بهتر نقش تداخل فرم‌های مختلف آللی در این جایگاه نشانگری ضروری است.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از آقایان سید ضیاءالدین میرحسینی و عبدالاحد شادرپور و محمد علی روحی (مسئول آزمایشگاه ژنتیک دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)، محمدرضا کوهی (مسئول مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان مازندران) و بنیامین دلیرصفت (مسئول محترم آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی دانشکده پردیس صومعه‌سراب) قدردانی می‌گردد.

References

- Burt DW and Law AS (1994) Evolution of the transforming growth factor-beta superfamily. Program Growth Factor Research. 5: 99-118.
- Burt DW and Paton IR (1992) Evolutionary origins of the transforming growth factor-beta gene family. DNA Cell Biological. 11: 497-510.
- Burt DW, Paton IR and Dey BR (1991) Comparative analysis of human and chicken transforming growth factor-beta 2 and -beta3 promoters. Endocrinol. 7: 175-83.

افزایش و یا کاهش اثر آلل‌های ژن‌های کاندید بر نرخ ارزش اصلاحی صفات در گزارشات مختلفی آمده است (۱۰). اختلاف بین ارزش‌های اصلاحی افراد در یک صفت می‌تواند ناشی از عمل جهش روی ژن‌های مؤثر بر صفت مورد نظر باشد (۸). رابطه بین اثر ژنوتیپ‌ها و ارزش‌های اصلاحی صفات مورد بررسی در تحقیق حاضر معنی‌دار نبود. این نتیجه را می‌توان به دلیل عدم وجود جهش‌های مؤثر در نواحی بررسی شده از ژن، عدم توانایی آنزیم هروزیگوت در شناسایی محل جهش و یا عدم تأثیر ژن کاندید بر صفات مورد بررسی دانست.

در مطالعات قبلی معنی‌دار بودن رابطه چندشکلی ژن TGF β_3 و صفت وزن بدن در چهار و هشت هفتگی گزارش شده است، به‌طوری‌که مقایسه میانگین وزن بدن در دو و چهار هفتگی نشان داد که وزن افراد دارای ژنوتیپ +/+ بیشتر هتروزیگوت در مقایسه با افراد دارای ژنوتیپ +/- با میانگین‌های دو ژنوتیپ +/- و +/+ معنی‌دار نبود (۷). در تحقیق فوق مشخص شد تفاوت وزن شش و هشت هفتگی افراد دارای ژنوتیپ -/- و -/- معنی‌دار نبود، اما میانگین وزن بدن آن‌ها بیشتر از افراد دارای ژنوتیپ +/+ بود (۷). در تحقیق حاضر، نیز رابطه وزن بدن در هشت هفتگی و یک روزگی با ژنوتیپ -/- های حاصل معنی‌دار بود (جدول ۶). در تحقیق حاضر، در مقایسه اثر بین ژنوتیپ‌های حاصل از ژن فاکتور مؤثر بر رشد بتا-۳ بر صفات وزن بدن در یک روزگی و هشت

- 4 . Congburn LA, Burnside J and Scanes CG (2000) Sturkie Avian Physiology. 5th Ed. Physiology of growth and development., Academic Press. 656 p.
- 5 . Groenen MA, Cheng HH, Bumstead H, Benkel BF, Briles WE, Burke T, Burt DW, Crittenden LB, Dodgson J, Hillel J, Lamont S, Ponce de leon A, Soller M, Takahashi H and Vignal A (2000) A consensus linkage map of the chicken genome. *Genome Research.* 10: 137-147.
- 6 . Gu ZL, Zhang HF, Zhu DH and Li H (2002) Single nucleotide polymorphism analisis of chicken myostatin gene in different chicken lines. *Yi Chuan Xue bao.* 29: 599-606.
- 7 . Li H, Deeb N, Zhou H, Michell AD, Ashwell CM and Lamont SJ (2003) Chicken quantitative trait loci for growth and body composition associated with transforming growth for- β 3 genes. *Poultry Science.* 82: 347-356.
- 8 . Madeja Z, Adamowicz T, Chmurzynska A, Jankowski T, Melonek J, Switonski M and Strabel T (2004) Effect of leptin gene polymorphisms on breeding value for milk production traits. *Dairy Science.* 87: 3925-3927.
- 9 . Meyer K (2000) DF REML version 3.0 program to estimate variance components by restricted maximum likelihood using derivative-free algorithm. Users note Animal genetics and breeding unit. University of New England, Armidable, NSW, Australia. 84 p.
- 10 . Olenski K, Kaminski S, Szyda J and Cieslinska A (2010) Polymorphism of the beta-casein gene and its associations with breeding value for production traits of Holstein-Frisian bulls. *Livestock Science.* 131: 137-140.
- 11 . Piek E, Heldin CH and Dijke PT (1999) Specificity diversity, and regulation in TGF β superfamily signaling. *FASEB.* 13: 2105-2124.
- 12 . SAS Institute Inc. (2006) SAS/STAT. Users guide. Version 9.1.
- 13 . Snaders EJ and Wride MA (1997) Roles for growth and differentiation factors in avian embryonic development. *Poultry Science.* 76: 111-117.
- 14 . Wall NA and Hogan BL (1994) TGF-beta genes in development. *Current Opinion in Genetics & Development.* 4: 517-522.
- 15 . Yeh FC and Yang R (1999) POPGEN Version 1.31program to Population genetic analysis. Quick user guide. University of Alberta, Center for International Forestry Research. 28 p.
- 16 . Zhou H and Lamont SJ (2003) Association of transforming growth factor beta genes with quantitative trait loci for antibody response kinetics in hens. *Animal Genetic.* 34: 275-82.

Effect of TGF β_3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls

B. Enayati ^{1*} and G. Rahimi ²

(E-mail: bkenayati@gmail.com)

Abstract

The transforming growth factor β (TGF β) subfamily is one of the most important groups of genes that are involved in development of growth and cell differentiation. In order to detect polymorphism in TGF β_3 loci, blood samples were collected randomly from 160 breeder hens of Mazandaran native fowls breeding station. DNA was extracted using modified salting out method and a DNA fragment of 295 bp from TGF β_3 loci was amplified (part of intron 3, exon 4 and small part of intron 4) using a specific primer pairs. The digested amplified fragment with *BsiYI* enzyme revealed two + and - alleles with the frequency of 0.8037 and 0.1961, respectively. The frequencies of "+/+", "+/−" and "−/−" genotypes were estimated at 0.6645, 0.2784 and 0.0569, respectively in studied population. The statistical analysis showed that the existence of one + allele in the genotypes significantly ($P \leq 0.05$) increased the means of body weight at one day and eight week of age in comparison with "−/−" genotype which indicates the importance of this allele in body weight gain in chickens. It can be concluded that the studied marker site, together with the other documented variants in TGF β_3 locus, can be very useful to obtain a better understanding of the genetic control of growth rate in chickens.

Keywords: Body weight, Mazandaran native fowls, Phenotypic value, Polymorphism, TGF β_3 gene

1 - Graduated M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of agriculture, University of Mazandaran, Sari – Iran

(Corresponding Author*)

2 - Professor, Department of Animal Science, Faculty of Animal Sciences and Fishery, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari - Iran