



بزرگی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

صفحه‌های ۷۷-۱۰۱

ارزیابی برخی از ژنتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

عرفان سپهوند^۱، علی مؤمن پور^{۲*}، علی ایمانی^۳، محمود قاسم‌نژاد^۴

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باگبانی، دانشگاه گیلان و کارشناس آموزشی و پژوهشی گروه علوم باگبانی، دانشگاه تهران
۲. دانشجوی دکتری، گروه علوم باگبانی، دانشگاه گیلان
۳. دانشیار بخش تحقیقات باگبانی، مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
۴. دانشیار گروه علوم باگبانی، دانشگاه گیلان

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۲/۹/۱۱

تاریخ وصول مقاله: ۹۲/۳/۱۳

چکیده

این آزمایش، به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زیبایی درخت و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و مغز و همبستگی بین آنها در ۸۰ ژنتیپ بادام انجام شد. صفات کیفی در این آزمایش براساس توصیف‌نامه بادام اندازه‌گیری و به آنها کد داده شد. نتایج نشان داد که ژنتیپ‌ها از نظر وزن میوه، خشک‌میوه و مغز و نسبت مغز به خشک‌میوه با یکدیگر دارای اختلاف معنی‌داری بودند. ژنتیپ شماره ۱۶۹ به عنوان ژنتیپ بسیار دیرگل تشخیص داده شد. وزن میوه با پوست سبز، خشک‌میوه و مغز در ژنتیپ شماره ۱۶۹ به ترتیب ۱۲/۵۰، ۴/۷۵ و ۱/۲۸ گرم بود. خشک‌میوه و مغز این ژنتیپ از لحاظ کیفی دارای شرایط مطلوبی بود. مغز این ژنتیپ، شیرین، دارای چروک‌گی و کرک کم بود که این صفات از نظر بازارپسندی و تجاری بسیار مهم هستند. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که اندازه و وزن میوه دارای پوست سبز، اندازه و وزن خشک‌میوه، اندازه و وزن مغز به صورت دو طرفه با همدیگر در سطح ۱ درصد همبستگی معنی‌دار مثبتی داشتند. همچنین، طعم مغز نیز با میزان کرک، چین و چروک و شدت رنگ مغز همبستگی منفی معنی‌داری نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه کلاستر براساس تمام صفات اندازه‌گیری شده، ارقام را در فاصله اقلیدسی ۲۵، به ۲ گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدسی از ۲۵ به ۵ ژنتیپ‌ها در ۸ گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسترها اصلی در این تحقیق، صفاتی همچون ارتفاع، قدرت رشد رویشی و عادت رشد درختان، اندازه میوه سبز، خشک‌میوه و مغز، میزان نرمی و سختی پوست چوبی خشک‌میوه بودند.

کلیدواژه‌ها: بادام، صفات کمی، صفات کیفی، همبستگی و تجزیه کلاستر

۱. مقدمه

تمام صفات کمی و کیفی میوه دارای اختلاف معنی‌داری با یکدیگر بودند. ژنوتیپ ۴-۱۲-k و رقم شاهروд ۸ دارای بزرگ‌ترین طول، عرض، ضخامت، وزن و اندازه خشک‌میوه و بیشترین ضخامت پوست چوبی خشک‌میوه، طول، عرض، وزن و اندازه مغز را داشتند [۸]. بعضی از محققان وجود همبستگی میان صفات میوه در بادام را بررسی کرده‌اند [۱۵، ۲۲]. بین درصد مغز با پوسته سخت چوبی همبستگی مثبتی وجود دارد، بدین معنی که در بادام‌هایی با پوست سخت، درصد مغز حدود ۱۵ تا ۳۵ درصد و در بادام‌های پوست کاغذی ۳۵ تا ۶۵ درصد است [۱۲، ۲۷]. یکنواخت‌نبودن شکل مغز بادام، چروک داشتن و دوقلویی مغز از ویژگی‌های نامطلوب مغز بادام هستند [۱۲]. در تحقیقی به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل و خودسازگار حاصل از تلاقی توно و شاهرود ۱۲، برخی از خصوصیات رویشی و زایشی بررسی و همبستگی بین صفات مورد نظر مشخص شد. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که وزن مغز با وزن خشک‌میوه و وزن میوه دارای پوست سبز در سطح ۱ درصد دارای همبستگی معنی‌دار مثبتی بود. همچنین، نسبت وزن مغز به وزن خشک‌میوه با میزان شکاف در پوست چوبی خشک‌میوه و میزان نرمی پوست چوبی خشک‌میوه رابطه مثبت معنی‌داری داشت. طعم مغز نیز با درصد مغزهای سالم، نسبت وزن مغز به پوست چوبی، درصد مغزهای پوک، شدت رنگ مغز، زبر یا صاف‌بودن سطح مغز در سطوح ۱ درصد و ۵ درصد دارای همبستگی مثبت معنی‌داری بود [۹]. موسوی و همکاران، در سال ۱۳۸۹، همبستگی بین برخی صفات میوه را در ۵۵ ژنوتیپ و رقم بادام بررسی و گزارش کردند که همبستگی مثبت معنی‌داری بین اندازه خشک‌میوه و طول مغز و همبستگی منفی معنی‌داری بین

بادام (*Prunus dulcis*) به عنوان یک محصول خشکباری اهمیت ویژه‌ای دارد و در مناطقی با آب و هوای مدیترانه‌ای کشت می‌شود. از نظر تولید بادام، کشور ایران در رتبه سوم جهان بعد از امریکا، اسپانیا قرار دارد. استان چهارمحال و بختیاری در کشت آبی و خراسان رضوی در کشت دیم مقام نخست را به خود اختصاص داده‌اند [۴]. تنوع زیاد محصول تولیدی، نبود رقم مناسب با اقلیم منطقه، سرمای دیررس بهاره، تنفس آبی در باغ‌ها و مدیریت ضعیف باغداری از مشکلات تولید بادام در ایران است [۲۶]. خطر سرمای دیررس بهاره در مناطق معتدل، همواره تهدیدی جدی محسوب می‌شود، به همین دلیل دیرگل بودن یکی از صفات مهم در برنامه بهزیادی بادام است. همچنین، تراکم گل‌دهی، میزان عملکرد، زمان رسیدن میوه، نداشتن مغزهای دوقلو، درصد مغز و صفات کیفی میوه که بهبود آن‌ها از نظر اقتصادی حائز اهمیت هستند، از معیارهای شناسایی انتخاب رقم‌های برتر در بادام هستند [۱۲، ۲۱، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۳۰]. پژوهش‌های مختلفی درباره معرفی ژنوتیپ‌های برتر در برخی از مناطق ایران انجام شده است که می‌توان به شناسایی ژنوتیپ‌های بادام مناطق مختلف استان تهران [۱۰]، استان مرکزی و منطقه کاشمر در خراسان [۶] و بادام‌های منطقه میانه [۱۱] اشاره کرد. در برنامه‌های اصلاحی بادام، ابتدا باید شناختی از روابط میان صفات و همبستگی آن‌ها داشت. همبستگی معنی‌دار میان صفات به انتخاب صفات مهم به صورت غیرمستقیم کمک می‌کند و این امر موجب تسهیل و سرعت گرفتن برنامه‌های اصلاحی می‌شود [۱۸]. موسوی و همکاران، در سال ۱۳۸۹، خصوصیات کمی و کیفی میوه در ۵۵ ژنوتیپ و رقم بادام را بررسی و گزارش کردند که ژنوتیپ‌ها و ارقام بررسی شده از نظر

بهزایی کشاورزی

را به وجود می‌آورند. چنین فنوتیپ‌هایی قابل توارث هستند و اغلب می‌توانند به نتاج نیز انتقال یابند. ارقام نون پاریل، میشن و نه پلاس اولترا را می‌توان به راحتی با این روش مشخص کرد. رقم تونو ساختار درختی متمایزی را از خود نشان می‌دهد، به طوری که این رفتار در نتاج آن نامطلوب است [۲۰]. ارقام مارکونا، کریستو مورتو و پریمورسکی به عنوان ارقامی توصیف شده‌اند که نتایج مطلوب به وجود می‌آورند [۲۰]. یکی از بهترین راه‌کارهای طبقه‌بندی ژرم‌پلاسم و تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی بین افراد، با استفاده از روش آماری چندمتغیره است. از بین این روش‌ها، تجزیه کلاستر و تجزیه به عامل‌های اصلی (PCA) بیشتر از بقیه کاربرد دارند. در تجزیه کلاستر، افراد یک کلاستر از نظر صفات مورد بررسی شباهت‌های زیادی دارند و افرادی که در کلاسترها جدأگانه قرار می‌گیرند، از نظر صفات، ناهمگن‌ترند. روش تجزیه عامل‌ها روش آماری چندمتغیره‌ای است که می‌تواند تعداد صفات مورد ارزیابی را در گروه‌های مؤثر قرار دهد. از روش آماری چندمتغیره شامل تجزیه کلاستر و تجزیه به عامل‌ها برای تفکیک و گروه‌بندی در بادام [۱۳، ۱۵، ۲۵]، در زردآلو [۱۱]، آبالو [۱۹]، آثار [۲۸]، انگور [۱۶] استفاده کرده‌اند. دی گورجیو و پولیگانو، در سال ۲۰۰۱، تنوع ۸۸ رقم بادام در جنوب ایتالیا را از لحاظ ۲۰ صفت درخت، خشک‌میوه و مغز بررسی کردند. تجزیه کلاستر، این ارقام را در ۷ گروه قرار داد که فاکتورهای مهم در تشکیل کلاسترها، درصد دوقلویی و بعد از آن صفاتی مثل ضخامت خشک‌میوه و مغز، شکل میوه و مغز و اندازه خشک‌میوه و درصد مغز بودند [۱۴]. با ارزیابی ۵۲ رقم بادام در جنوب ایتالیا از نظر خصوصیاتی نظیر عملکرد مغز، درصد مغز، دوقلویی، وزن خشک‌میوه و مغز، چربی کل و میزان آلفا -

رنگ مغز با میزان چین و چروک مغز وجود داشت [۸]. همبستگی صفات در ۷۲ ژنوتیپ بادام بررسی و گزارش شد که وزن خشک‌میوه با وزن مغز و میزان سختی پوست چوبی خشک‌میوه در سطح ۱ درصد دارای همبستگی مثبت معنی‌داری بود [۶]. در تحقیقی به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های برتر بادام در منطقه بروجرد برخی از صفات میوه بررسی و همبستگی بین صفات مورد نظر مشخص شد. براساس نتایج، وزن مغز با طول، عرض و ضخامت میوه و همچنین، با طول، عرض و ضخامت مغز همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد داشت [۷]. در تحقیقی صفات طول، عرض، ضخامت، وزن و ضخامت دیواره درون‌بر هسته و همچنین، طول، عرض، ضخامت و وزن مغز در تعدادی از ژنوتیپ‌های میوه درشت، میوه متوسط و میوه ریز بررسی شد و نشان داد که طول، عرض، ضخامت و وزن درون‌بر، همچنین، طول، عرض و ضخامت مغز در سطح احتمال ۱ درصد بر وزن مغز تأثیر مثبتی داشتند [۳]. با توجه به مطالب بیان‌شده، اهمیت همبستگی میان صفات برای این است که امکان پی‌بردن به وضعیت صفاتی که اندازه‌گیری آن‌ها مشکل است، از طریق همبستگی آن‌ها با صفاتی که اندازه‌گیری آن‌ها آسان‌تر است را می‌دهد. همچنین، از طریق همبستگی بین صفات می‌توان به وضعیت صفاتی که برای پی‌بردن به آن‌ها نیاز به زمان طولانی‌تری است و گیاه باید حتماً وارد مرحله باروری شود، از روی صفات رویشی به آن‌ها پی‌برد [۳۲]. درختان از لحاظ اندازه، شکل، قدرت رشد، الگوی شاخه‌دهی، رشد و عادت باردهی، متفاوت هستند و برای ارقام خاص الگوهای اختصاصی را می‌توان تشخیص داد [۲۰]. ترکیبی از تمام صفات فوق الذکر همراه با صفات مهم مربوط به شاخ و برگ درخت، فتوتیپ اختصاصی درخت

بهزایی کشاورزی

تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۲ (رقم شاهروز ۱۲) تا ۱۳۹۰/۱/۱۸ (رقم شاهروز ۱۲) نان پاریل) بودند، به عنوان ژنوتیپ‌های دیرگل تا خیلی دیرگل معروفی شدند. ژنوتیپ‌ها با توجه به شدت سختی و نرمی پوست چوبی خشک میوه بر اساس توصیف‌نامه گولکان در گروه‌های مختلف قرار گرفتند [۱۷] (جدول ۱). ژنوتیپ‌ها با توجه به شدت رنگ پوست چوبی خشک میوه و مغز (روشن، متوسط و تیره) در گروه‌های مختلف قرار گرفتند (جدول ۱). به منظور اندازه‌گیری تراکم گل روی هر شاخه، گل‌های موجود روی شاخه‌های یک‌ساله از ابتدای آن تا ۲۰ سانتی‌متری یادداشت شدند و با استفاده از توصیف‌نامه گولکان کددھی انجام شد [۱۷]. همچنین، برای اندازه‌گیری میزان جوانه‌های دوقلو و میزان دوگلی به ترتیب تعداد کل جوانه‌ها و گل‌ها و تعداد جوانه‌های دوتایی و گل‌های دوتایی روی شاخه‌های یک‌ساله از ابتدای آن تا ۲۰ سانتی‌متری یادداشت شدند و با استفاده از توصیف‌نامه گولکان کددھی انجام شد [۱۷]. همچنین، صفات کمی اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل وزن میوه سبز، وزن خشک میوه، وزن مغز، نسبت وزن خشک میوه به میوه سبز، نسبت وزن مغز به خشک میوه و نسبت وزن مغز به میوه سبز در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۲ تکرار با استفاده از نرم‌افزار SAS. تجزیه و ژنوتیپ‌ها از نظر این صفات با آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند، برای هر ژنوتیپ از روی هر درخت ۳ نمونه به صورت تصادفی از ۴ جهت جغرافیایی درخت برداشت شد [۲۹]. به منظور انجام همبستگی بین صفات کمی و کیفی مورد نظر، به صفات کیفی کد داده شد [۱۷]. همبستگی و تجزیه کلاستر با نرم‌افزار SPSS انجام شد و همبستگی در سطوح ۵ درصد و ۱ درصد بین برخی صفات به دست آمد. صفات اندازه‌گیری شده، نحوه کددھی و توضیحات مربوط به هر کد در جدول ۱ آمده است.

توکوفول مشخص شد که صفات مربوط به آلفا توکوفول در بین ارقام بیشترین ضریب تغییرات را نشان داد و به عنوان فاکتوری مهم در طبقه‌بندی داخل گروه‌ها (کلاسترها) به کار رفت که شباهت زیادی داشتند. دو قلویی و درصد مغز، ضریب تنوع بالای را نشان دادند؛ ولی وزن مغز، کمترین تنوع را نشان داد [۱۵]. این پژوهش با هدف شناسایی ژنوتیپ‌های دیرگل که دارای ویژگی‌های کمی و کیفی خوبی از لحاظ خشک میوه و مغز هستند و همچنین، پی‌بردن به همبستگی میان صفات و گروه‌بندی آن‌ها در ژنوتیپ‌های مختلف بادام انجام شد.

۲. مواد و روش‌ها

به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های بادام با صفات برتر، دیرگل و سازگار با اقلیم منطقه کرج ۸۰ ژنوتیپ موجود در ایستگاه تحقیقات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج با استفاده از توصیف‌نامه بادام (گولکان، ۱۹۸۵) در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ارزیابی شد [۱۷]. صفات کیفی اندازه‌گیری شده در این آزمایش برای هر ژنوتیپ در جدول ۱ ارائه شده‌اند. به منظور تقسیم‌بندی ژنوتیپ‌ها از نظر زمان گل‌دهی، براساس زمان شروع گل‌دهی ارقام تجاری منطقه انجام شد. بر این اساس ژنوتیپ‌هایی که تاریخ گل‌دهی آن‌ها بین تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ و ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ (رقم سفید) تا ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ (رقم مامایی) بودند، به عنوان خیلی زودگل تا زودگل معرفی شدند. ژنوتیپ‌هایی که آغاز گل‌دهی آن‌ها بین تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳۰ (رقم مامایی) تا ۱۳۹۰/۱/۶ (رقم آذر) بودند، به عنوان ژنوتیپ‌های زودگل تا میان‌گل معرفی شدند. ژنوتیپ‌هایی که آغاز گل‌دهی آن‌ها بین تاریخ ۱۳۹۰/۱/۶ (رقم آذر) تا ۱۳۹۰/۱/۱۲ (رقم شاهروز ۱۲) بودند، به عنوان ژنوتیپ‌های میان‌گل تا دیرگل معرفی شدند و ژنوتیپ‌هایی که آغاز گل‌دهی آن‌ها بین تاریخ

مکالمہ زراعی

دورة ١٥٥ ■ شماره ٣ ■ يابيـن ١٣٩٢

www.SID.ir

八

جدول ۱ نمونه کددهم و توپیچات مربوط به مرکز ترای صفات روشنی و زانشی درخت و کمی و کثیف میوو با توجه به توپیچت نامه (گوکان، ۱۹۸۵)

ردیف	نام	توضیح	صفات	عملت	اختصاری
کد ۹	دارای شکاف پیشتر از ۲	دارای شکاف کم (کمتر از ۲)	واحد و سیله	کد ۱	کد ۳
۱	وزن میوه با پیوست سبز	وزن میوه با پیوست سبز	FW	گرم	گرم
۲	وزن خشک میوه	وزن خشک میوه	NW	گرم	گرم
۳	وزن معز	وزن معز	KW	گرم	گرم
۴	نسبت وزن خشک میوه به میوه سبز	نسبت وزن خشک میوه به میوه سبز	NW/FW	گرم	گرم
۵	نسبت وزن معز به خشک میوه	نسبت وزن معز به خشک میوه	KW/NW	گرم	گرم
۶	نسبت وزن معز به میوه با پیوست سبز	نسبت وزن معز به میوه با پیوست سبز	KW/FW	گرم	گرم
۷	تراکم میوه	تراکم میوه	DF	-	-
۸	اندازه میوه سبز	اندازه میوه سبز	FS	-	-
۹	شكل میوه سبز	شكل میوه سبز	FSH	-	-
۱۰	گرگ دار بودن میوه سبز	گرگ دار بودن میوه سبز	FPU	-	-
۱۱	میزان کرک روی معز	میزان کرک روی معز	KPU	-	-
۱۲	میزان چین و چیزوک معز	میزان چین و چیزوک معز	SK	-	-
۱۳	طعم معز	طعم معز	KT	-	-
۱۴	شکل نوک خشک میوه	شکل نوک خشک میوه	NSTH	-	-
۱۵	تفوش رود پیوست چوری خشک میوه	تفوش رود پیوست چوری خشک میوه	MOS	-	-
۱۶	و جد شکاف در پیوست چوری	و جد شکاف در پیوست چوری	SOS	-	-
۱۷	خشک میوه	خشک میوه	-	-	-
۱۸	نحوه چاشاندن پیوست سبز	نحوه چاشاندن پیوست سبز	SR	-	-
۱۹	شکل خشک میوه	شکل خشک میوه	NSH	-	-
۲۰	اندازه نوک میوه	اندازه نوک میوه	NS	-	-
	میزان سختی و نرمی پیوست چوری	میزان سختی و نرمی پیوست چوری	SH	-	-
	خشک سخت	خشک سخت			

ارزیابی برخی از ژنتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

عرفان سپهوند و همکاران

ادامه جدول ۱. نحوه کددهی و توضیحات مربوط به هر کد برای صفات روشی و زبانی درخت و کمی و گفته میو با توجه به توصیف نامه (گوکان، ۱۹۸۵)

ردیف	روش اندازه‌گیری	کد ۹	کد ۷	کد ۵	کد ۳	کد ۱	کد ۰	روشن	بینایین (متودها)	بینایین	تیره	خیلی بزرگ	
۲۱	شدت رنگ پوست بیوست چوبی							-	SCI				
۲۲	خشک‌میوه							-	KSI				
۲۳	اندازه مغز							-	KCI				
۲۴	شدت رنگ مغز							-	CV				
۲۵	حجم کل تاج							-	TH				
۲۶	ارتفاع تقیی درخت							-	TV				
۲۷	قدرت رشدی درخت							-	TH				
۲۸	عادت رشدی درخت							-	TB				
۲۹	عادت شاخه‌دهی							-	FD				
۳۰	زراکم برگ							-	AB				
۳۱	میزان آنتوساین در شاخه یک‌ساله							-	BD				
۳۲	ضخامت شاخه یک‌ساله							-	WC				
۳۳	زراکم برگ							-	LR				
۳۴	بریدگی حاشیه برگ							-	FD				
۳۵	ترماکم کل							-	DFB				
۳۶	وجود دو گل در چوانه							-	FST				
۳۷	زمان شروع گلدهی							-	NP				
۳۸	رنگ گلبرگ‌ها							-	CP				
۳۹	تماد مادرگی							-	LFB				
۴۰	محل جوانه گل درودی درخت							-	SSTA				

بِزَرْاعِي كشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

۳. نتایج و بحث

می‌شود. در بادام نیز همانند سایر گونه‌های هسته‌دار، انگیزش جوانه گل به صورت جانبی و روی اسپور و شاخه‌های قوی سال جاری انجام می‌شود. صرف نظر از تمایل باردهی ارقام، عموماً نسبت گل‌ها روی اسپورها با افزایش سن و کاهش قدرت درخت افزایش می‌یابد [۲]. طبق نتایج به دست آمده (جدول ۲)، ژنوتیپ‌ها از لحاظ میزان دو گلی‌بودن جوانه‌ها در گروههای بدون جوانه‌های دو گلی، کم، متوسط و زیاد قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های شماره ۱۴۸، ۱۵۷، ۱۶۶، ۱۷۳، ۱۸۲، ۱۸۸ و ۱۹۴ و ۲۵۱ بالاترین میزان دو گلی‌بودن جوانه‌ها را به خود اختصاص دادند. هرچه میزان دو گلی‌بودن جوانه‌ها بالاتر باشد، باعث افزایش میزان باردهی درخت می‌شود و این مزیتی برای این ژنوتیپ‌ها محسوب می‌شود.

صفات کیفی مربوط به میوه در ژنوتیپ‌های بررسی شده در جدول ۳ نشان داده شده است. از نظر تراکم میوه، ژنوتیپ‌ها در ۵ گروه خیلی کم، کم، متوسط و خیلی زیاد قرار گرفتند. ۱۰ ژنوتیپ (۱۲۵، ۱۲۷، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۹۰، ۱۹۲) از نظر این صفت در گروه خیلی زیاد قرار گرفتند که مزیتی برای این ژنوتیپ‌ها نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها محسوب می‌شود. وجود تراکم بالای میوه باعث افزایش عملکرد هر تک درخت و در کل افزایش میزان عملکرد در هکتار می‌شود که از نظر اقتصادی بسیار مهم است. از نظر نحوه جداشدن پوست سبز از میوه در ۴۸ ژنوتیپ، پوست سبز به راحتی از میوه جدا می‌شد، در ۳۳ ژنوتیپ قسمتی از پوست سبز به همراه میوه باقی می‌ماند و در ۱۹ ژنوتیپ تمام پوست سبز به همراه میوه باقی می‌ماند. جداشدن آسان پوست سبز از میوه برای ژنوتیپ‌هایی که دارای این صفت هستند، مزیت محسوب می‌شود و کار پوست کنند با دست را آسان می‌کند (جدول ۳).

در جدول ۲ صفات کیفی رویشی و زایشی اندازه‌گیری شده آورده شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، براساس زمان گل‌دهی ارقام تجاری منطقه به هریک از ژنوتیپ‌ها کد داده شد. زمان اولین شروع گل‌دهی در ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ و آخرین زمان شروع گل‌دهی در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۰ بود که به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های شماره ۱۵۰ و ۱۶۹ بود. در این منطقه گل‌دهی از تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ شروع شد که مربوط به رقم سفید و آخرین زمان شروع گل‌دهی، در این منطقه ۱۳۹۰/۱/۱۸ بود که مربوط به رقم تاریخ نان پاریل بود. همان‌طور که گفته شد تقسیم‌بندی ژنوتیپ‌ها براساس زمان شروع گل‌دهی ارقام تجاری انجام شد. با توجه به تاریخ گل‌دهی رقم شاهد (تاریخ نان پاریل) ژنوتیپ شماره ۱۶۹ که تاریخ گل‌دهی آن‌ها ۲ روز دیرتر از رقم خیلی دیرگل تاریخ نان پاریل بود، به عنوان ژنوتیپ بینهایت دیرگل در این جمعیت شناخته شد. به طور کلی می‌توان گفت که اکثر ژنوتیپ‌های بررسی شده از نظر زمان شروع گل‌دهی در دو گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار می‌گیرند. خطر سرمای دیررس بهاره یکی از مشکلات مهم در مناطق معتدل است و همواره تهدیدی جدی محسوب می‌شود و مهم‌ترین راه مبارزه با این تهدید از طریق اصلاح، به منظور دیرگلی، است [۱۸].

همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، از نظر محل قرارگیری جوانه‌های گل روی درخت، به ترتیب در ۱۱، ۱۸ و ۷۱ ژنوتیپ جوانه‌های گل آن‌ها روی شاخه‌های یک‌ساله، روی اسپورها (سیخک‌ها) و روی شاخه یک‌ساله و اسپورها (تیپ مختلط) قرار داشتند (جدول ۲). وجود جوانه‌های گل روی اسپورها باعث افزایش عملکرد

جدول ۲. وضعیت صفات رویشی و زایشی در ژنتیپ‌های بادام مورد بررسی

زنوتیپ	حجم کل تاج	درخت	رشد	قدرت درخت	عادت رشدی	عادت شاخه‌دهی	ضخامت شاخه	رنگ شاخه	رنگ گلبرگ‌ها	زمان شروع گل‌دهی	دو گل در جوانه	تراکم گل	محل گل روى درخت	وضعیت کلاله	نسبت به بسماں
۱۲۱	۷	۷	۷	۷	۵	۷	۰	۵	۱	۵	۰	۵	۹	۳	۳
۱۲۲	۹	۷	۷	۷	۵	۹	۰	۵	۳	۵	۰	۵	۵	۵	۳
۱۲۳	۹	۷	۷	۷	۵	۹	۰	۵	۱	۳	۰	۵	۵	۵	۵
۱۲۴	۹	۷	۷	۷	۵	۹	۰	۵	۳	۷	۰	۵	۵	۵	۵
۱۲۵	۳	۳	۳	۳	۳	۷	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۲۶	۷	۷	۷	۷	۳	۵	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۲۷	۷	۷	۷	۷	۳	۵	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۲۸	۵	۵	۵	۵	۱	۷	۰	۵	۳	۷	۰	۷	۷	۵	۵
۱۲۹	۵	۳	۳	۳	۳	۵	۰	۵	۵	۷	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۰	۵	۹	۳	۳	۳	۱	۰	۵	۳	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۱	۷	۷	۷	۷	۳	۱	۰	۵	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۲	۷	۷	۷	۷	۵	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۳	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۴	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۵	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۶	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۷	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۸	۵	۹	۱	۱	۳	۵	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۳۹	۵	۹	۱	۱	۳	۵	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۰	۷	۷	۷	۷	۳	۳	۰	۵	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۱	۹	۹	۳	۳	۳	۳	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۲	۹	۹	۳	۳	۳	۳	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۳	۹	۹	۳	۳	۳	۳	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۴	۹	۹	۵	۵	۵	۳	۰	۹	۵	۵	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۵	۹	۹	۱	۱	۳	۵	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۶	۹	۹	۱	۱	۳	۵	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۷	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۸	۹	۹	۷	۳	۳	۳	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۴۹	۹	۹	۳	۳	۳	۵	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۰	۹	۹	۱	۱	۳	۵	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۱	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۲	۹	۹	۵	۵	۵	۳	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۳	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۴	۹	۹	۷	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۵	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۶	۹	۹	۱	۱	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۷	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۸	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۵۹	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۰	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۱	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۲	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۳	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۳	۳	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۴	۹	۹	۵	۵	۵	۳	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۵	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۶	۹	۹	۷	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۷	۹	۹	۵	۵	۵	۳	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۸	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۶۹	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۷۰	۹	۹	۵	۵	۵	۳	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۷۱	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۷۲	۹	۹	۳	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵
۱۷۳	۹	۹	۷	۳	۳	۷	۰	۹	۱	۱	۰	۷	۷	۵	۵

ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

زنوتویپ	حجم	کل تاج	قدرت رشد درخت	عادت رشدی درخت	عادت شاخه دهی	ضخامت شاخه یکساله	رنگ شاخه سال جاری	رنگ گلبرگ‌ها	زمان شروع گل‌دهی	دو گل در گونه	وجود گل	محل جوانه‌های گل روی درخت	وضعیت کلاله بساک	
۱۷۴	۱	۱	۳	۳	۵	۵	۳	۳	۳	۱	۳	۵	۳	۳
۱۷۷	۱	۱	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۰	۵	۷	۷	۵
۱۸۲	۱	۲	۷	۷	۵	۳	۷	۷	۷	۰	۵	۷	۷	۷
۱۸۳	۱	۱	۳	۵	۵	۱	۵	۷	۹	۵	۵	۷	۷	۷
۱۸۴	۱	۵	۷	۵	۵	۱	۵	۷	۹	۵	۵	۷	۷	۷
۱۸۶	۱	۵	۹	۵	۵	۵	۵	۷	۷	۳	۷	۷	۷	۷
۱۸۷	۱	۵	۹	۳	۵	۵	۵	۷	۷	۰	۷	۷	۷	۷
۱۸۹	۱	۳	۹	۳	۳	۳	۳	۳	۹	۰	۷	۹	۹	۹
۱۹۰	۱	۵	۹	۳	۵	۱	۳	۵	۹	۰	۷	۹	۹	۹
۱۹۱	۱	۳	۹	۳	۳	۵	۵	۵	۵	۳	۳	۳	۳	۱۹۱
۱۹۲	۱	۳	۹	۳	۳	۵	۵	۵	۷	۰	۷	۷	۷	۱۹۲
۱۹۳	۱	۵	۷	۳	۵	۵	۷	۷	۵	۰	۷	۷	۷	۱۹۳
۱۹۴	۱	۳	۱	۷	۵	۳	۷	۷	۷	۰	۵	۵	۵	۱۹۴
۱۹۵	۱	۳	۹	۵	۵	۳	۷	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۱۹۵
۱۹۶	۱	۱	۹	۳	۵	۱	۵	۵	۵	۰	۷	۷	۷	۱۹۶
۱۹۷	۱	۵	۹	۳	۵	۳	۵	۵	۷	۰	۷	۷	۷	۱۹۷
۱۹۹	۱	۱	۵	۳	۵	۳	۷	۷	۷	۰	۷	۷	۷	۱۹۹
۲۰۰	۱	۱	۹	۱	۳	۱	۵	۵	۹	۹	۹	۷	۹	۲۰۰
۲۰۴	۱	۱	۰	۱	۳	۱	۵	۷	۷	۰	۷	۷	۷	۲۰۴
۲۰۵	۱	۱	۰	۳	۳	۳	۳	۷	۷	۰	۷	۷	۷	۲۰۵
۲۰۷	۱	۱	۹	۵	۵	۱	۵	۵	۷	۰	۷	۷	۷	۲۰۷
۲۱۱	۱	۰	۹	۵	۵	۰	۳	۵	۵	۰	۷	۵	۵	۲۱۱
۲۱۹	۱	۳	۹	۵	۳	۳	۳	۳	۵	۰	۷	۵	۵	۲۱۹
۲۲۰	۱	۵	۷	۳	۵	۱	۵	۵	۷	۰	۷	۵	۳	۲۲۰
۲۲۲	۱	۵	۷	۳	۵	۳	۷	۷	۵	۰	۷	۷	۷	۲۲۲
۲۲۳	۱	۵	۹	۳	۵	۰	۳	۵	۵	۰	۷	۵	۵	۲۲۳
۲۲۴	۱	۵	۵	۱	۳	۱	۵	۳	۷	۰	۷	۳	۳	۲۲۴
۲۲۵	۱	۵	۷	۱	۳	۱	۵	۵	۷	۰	۷	۷	۷	۲۲۵
۲۲۶	۱	۵	۹	۵	۵	۱	۷	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۲۲۶
۲۲۷	۱	۵	۹	۵	۳	۳	۵	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۲۲۷
۲۲۹	۱	۰	۹	۳	۳	۳	۵	۵	۷	۰	۷	۵	۵	۲۲۹
۲۳۱	۱	۰	۹	۳	۳	۳	۷	۷	۵	۰	۷	۷	۷	۲۳۱
۲۳۲	۱	۰	۷	۳	۳	۳	۵	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۲۳۲
۲۳۸	۱	۰	۷	۳	۵	۳	۵	۷	۷	۰	۷	۵	۳	۲۳۸
۲۴۰	۱	۵	۷	۱	۵	۳	۵	۵	۵	۰	۷	۵	۳	۲۴۰
۲۴۳	۱	۵	۳	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۰	۷	۳	۱	۲۴۳
۲۴۴	۱	۵	۹	۱	۷	۱	۷	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۲۴۴
۲۴۵	۱	۵	۷	۱	۳	۵	۷	۵	۵	۰	۷	۵	۳	۲۴۵
۲۵۲	۱	۹	۳	۵	۳	۵	۵	۷	۷	۰	۷	۵	۷	۲۵۲
۲۵۳	۱	۹	۳	۵	۵	۵	۵	۷	۷	۰	۷	۵	۵	۲۵۳
۲۶۱	۱	۵	۷	۱	۳	۱	۵	۵	۵	۰	۷	۵	۳	۲۶۱
۲۷۰	۱	۵	۷	۳	۵	۵	۵	۵	۵	۰	۷	۵	۵	۲۷۰

بزرگ‌کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

www.SID.ir

جدول ۳. وضعیت صفات کیفی میوه و مغز در ژنتیک‌های بادام مورد بررسی

ارزیابی برخی از ژنتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

آدامه جدول ۲ و ضعیت صفات کیفی میوه و مغزد رُنْتَنْبَه‌ای بادام مورد بررسی	زیستگاه	۱۸۷
	گیوه	۱۸۶
	ترکم	۱۸۹
	اندازه	۱۹۰
	میوه	۱۹۱
	سیزه	۱۹۲
	شکل	۱۹۳
	میوه	۱۹۴
	کوک داری	۱۹۵
	میوه سیزه	۱۹۶
	جلد	۱۹۷
	نحوه	۱۹۸
	چلشیدن	۱۹۹
	نحوه	۲۰۰
	اندازه	۲۰۱
	نیشک میوه	۲۰۲
	شکل	۲۰۳
	نیشک میوه	۲۰۴
	وجود شماق	۲۰۵
	نیشک نیزی	۲۰۶
	تفوش روزی	۲۰۷
	نیشک میوه	۲۰۸
	میزان سختی و	۲۰۹
	نمایه پوست	۲۱۰
	نیشک میوه	۲۱۱
	چلچلی	۲۱۲
	نیشک میوه	۲۱۳
	شدت رنگ	۲۱۴
	پوست پوست	۲۱۵
	نیشک میوه	۲۱۶
	اندازه	۲۱۷
	غیر	۲۱۸
	طعم	۲۱۹
	غیر	۲۲۰
	غیر	۲۲۱
	روز میزد	۲۲۲
	رنگ	۲۲۳
	غیر	۲۲۴
	رنگ	۲۲۵
	غیر	۲۲۶
	رنگ	۲۲۷
	غیر	۲۲۸
	رنگ	۲۲۹
	غیر	۲۳۰
	رنگ	۲۳۱
	غیر	۲۳۲
	رنگ	۲۳۳
	غیر	۲۳۴
	رنگ	۲۳۵
	غیر	۲۳۶
	رنگ	۲۳۷
	غیر	۲۳۸
	رنگ	۲۳۹
	غیر	۲۴۰
	رنگ	۲۴۱
	غیر	۲۴۲
	رنگ	۲۴۳
	غیر	۲۴۴
	رنگ	۲۴۵
	غیر	۲۴۶
	رنگ	۲۴۷

بزرگی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

بررسی از نظر طعم مغز در ۳ گروه شیرین و متوسط و تلخ قرار گرفتند. ۲۰ ژنوتیپ با طعم مغز تلخ مشاهده شد. همان‌طور که از جدول (۴) مشاهده می‌شود، اثر ژنوتیپ روی تمام صفات کمی اندازه‌گیری شده در سطح ۱ درصد معنی دار شد. طبق نتایج به دست آمده (جدول ۵)، بیشترین وزن میوه دارای پوست سبز را ژنوتیپ شماره ۱۵۱ با میزان ۲۳/۸۱ گرم دارا بود که در این صفت با بقیه ژنوتیپ‌ها دارای اختلاف معنی دار بود. کمترین وزن میوه با پوست سبز را ژنوتیپ‌های شماره ۲۲۲ و ۲۲۷ دارا بودند که این وزن کمتر در این ژنوتیپ‌ها نشان‌دهنده کوچک‌بودن ابعاد میوه با پوست سبز در این ژنوتیپ است. بیشترین مقدار وزن خشک‌میوه را ژنوتیپ‌های شماره ۱۵۱ با میزان ۹/۲۳ گرم دارا بودند. کمترین میزان وزن خشک‌میوه را ژنوتیپ شماره ۲۲۷ با میزان ۰/۸۱ گرم دارا بود. این ژنوتیپ کمترین وزن میوه با پوست سبز را نیز به خود اختصاص داده بود. بیشترین وزن مغز را نیز ژنوتیپ شماره ۱۵۱ به خود اختصاص داد. وزن مغز این ژنوتیپ به طور میانگین ۲/۲۶ گرم بود. این ژنوتیپ بیشترین وزن میوه با پوست سبز و بیشترین وزن خشک‌میوه را نیز دارا بود. کمترین وزن مغز را ژنوتیپ‌های شماره ۲۲۲ و ۲۲۷ به خود اختصاص دادند. این دو ژنوتیپ کمترین وزن میوه با پوست سبز و وزن خشک‌میوه را نیز به خود اختصاص داده بودند. نسبت وزن خشک‌میوه به میوه با پوست سبز در سطح ۱ درصد معنی دار شد.

همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، ژنوتیپ‌های بررسی شده دارای اندازه‌های متفاوتی از لحاظ اندازه میوه، خشک‌میوه و مغز بودند و از لحاظ این ۳ صفت در ۵ گروه خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ قرار گرفتند. برخی از ژنوتیپ‌ها دارای میوه بزرگی بودند؛ ولی خشک‌میوه کوچکی داشتند که نشان می‌دهد این ژنوتیپ‌ها، دارای پوست سبز کلفت و ضخیمی هستند. ژنوتیپ‌هایی که دارای مغز بزرگ و کشیده هستند نسبت به ژنوتیپ‌هایی دیگر از نظر این صفت برتری دارند. از نظر شدت رنگ خشک‌میوه (دیواره آندوکارپ) و شدت رنگ مغز، ژنوتیپ‌ها در ۴ گروه خیلی روشن، روشن، متوسط (بین روشن و تیره) و تیره قرار گرفتند. ژنوتیپ‌هایی با رنگ خشک‌میوه و مغز روشن نسبت به ژنوتیپ‌هایی که دارای رنگ خشک‌میوه و مغز متوسط و یا تیره بودند از نظر بازارپسندی برتری دارند.

همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، از نظر میزان سختی و نرمی پوست چوبی خشک‌میوه، ژنوتیپ‌ها در گروه‌های مختلف قرار گرفتند. در ژنوتیپ‌هایی در بررسی شده، ۱۸ ژنوتیپ دارای پوست از نوع کاغذی و ۳۱ ژنوتیپ دارای پوست از نوع نازک و نرم بودند. داشتن پوست کاغذی به دلیل راحتی شکستن پوست چوبی و دسترسی آسان به مغز یک حسن محسوب می‌شود. طعم مغز یکی از صفات بسیار مهم در مورد میوه بادام است که از نظر خوراکی بسیار حائز اهمیت است. ژنوتیپ‌های مورد

جدول ۴. تجزیه واریانس صفات کمی زایشی اندازه‌گیری شده در ژنوتیپ‌های مورد بررسی

متابع تغییرات	درجه آزادی	وزن میوه دارای پوست سبز (گرم)	وزن خشک‌میوه (گرم)	وزن مغز (گرم)	نسبت وزن مغز به خشک‌میوه	نسبت وزن مغز به میوه	میانگین مربعات MS	
							نسبت وزن خشک‌میوه به میوه	نسبت وزن خشک‌میوه به میوه
ژنوتیپ	۷۹	۷۰/۶۴**	۹/۶۶**	۰/۵۶**	۰/۱۳**	۰/۰۰۵**	۰/۰۵**	۰/۰۵**
خطا	۴۰۰	۱/۰۱	۰/۱۱	۰/۰۱	۰/۰۰۶	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
ضریب تغییرات	-	۱۱/۳۰	۱۲/۱۲	۱۰/۶۲	۱۷/۳۵	۱۶/۳۵	۱۴/۰۲	۱۴/۰۲

**: معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد

بزرگی کشاورزی

ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

جدول ۵. وضعیت میوه و دانه در ژنوتیپ‌های موردنظر

نسبت وزن مغز به میوه	نسبت وزن خشک میوه (٪)	وزن خشک میوه (گرم)	وزن مغز (گرم)	نسبت وزن مغز به میوه با پوست میوه (%)
/۱۰۰ ayvnx	/۹۹ vwxxy	/۱۰۰ orqstpu	/۱۰۰ tpilmocsnr	/۱۰۰ ef
•/۱۰۰ qijpmknhol	•/۹۷ nijjokpqsm	•/۹۸ vrqstpu	•/۹۸ xyz	•/۹۸ gesf
•/۱۰۰ pqrstuuv	•/۹۶ yz	•/۹۸ vrqstpu	•/۹۸ xyz	•/۹۸ gzhf
•/۱۰۰ qrstuv	•/۹۵ niljokpqm	•/۹۳ cddeb	•/۹۴ sepr	•/۹۵ xyz
•/۱۰۰ ejifmknhl	•/۹۴ uvwx	•/۹۸ vrqswipu	•/۹۸ tpumodsnr	•/۹۸ qrtusxwp
•/۱۰۰ uwxw	•/۹۴ wxy	•/۹۸ orqsmpn	•/۹۸ stu	•/۹۸ jk
•/۹۵ wxy	•/۹۸ stuvw	•/۹۸ ojlmknhn	•/۹۸ kmnhij	•/۹۸ ef
•/۱۰۰ ejifmknhol	•/۹۸ stuvw	•/۹۸ jllkmnn	•/۹۸ kmnhij	•/۹۸ qrmnop
•/۱۰۰ uwvx	•/۹۸ niljokhm	•/۹۸ ab	•/۹۸ khlminj	•/۹۸ gzhf
•/۱۰۰ cab	•/۹۸ ab	•/۹۸ xyw	•/۹۸ tpumodsnr	•/۹۸ wxy
•/۱۰۰ qrstuv	•/۹۸ xyz	•/۹۸ stuvw	•/۹۸ xyz	•/۹۸ ihj
•/۱۰۰ cfdb	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ geidehf	•/۹۸ c	•/۹۸ qrmnop
•/۱۰۰ qrstuv	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ cab	•/۹۸ de	•/۹۸ imno
•/۱۰۰ ab	•/۹۸ wxy	•/۹۸ ejilkhf	•/۹۸ xyz	•/۹۸ qrtusop
•/۱۰۰ ejpmknrol	•/۹۸ niljokhm	•/۹۸ niljokmhf	•/۹۸ stu	•/۹۸ wxy
•/۱۰۰ vqstpmnwrolu	•/۹۸ niljokpqm	•/۹۸ geidehf	•/۹۸ kmnhij	•/۹۸ qrtusxwp
•/۱۰۰ qspmnkrol	•/۹۸ gedef	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ xyz	•/۹۸ xyz
•/۹۹ wxy	•/۹۸ niljkhm	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpusxvr	•/۹۸ tpusxvr
•/۱۰۰ cfdb	•/۹۸ qrstuvw	•/۹۸ geidehf	•/۹۸ tpumodsnr	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ geidehf	•/۹۸ nruolvqpsmt	•/۹۸ ejilkmnf	•/۹۸ stu	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ z	•/۹۸ z	•/۹۸ vrsipu	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ wxy	•/۹۸ yz	•/۹۸ ejilkehf	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ tuvwxx	•/۹۸ tuvwxx	•/۹۸ tuvwxx	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ qrstuvw	•/۹۸ qrstuvw	•/۹۸ ordhmpn	•/۹۸ hig	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ ejifmknhl	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ vrsipu	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۹۸ yz	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ ejilkehf	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ stuvw	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ ojlmkn	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ cadb	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ ejifmknhl	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ yczwaxb	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ pqrstuuv	•/۹۸ tuvw	•/۹۸ vrsipu	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ ejifmknhl	•/۹۸ ab	•/۹۸ orqstpn	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ ejpmknrol	•/۹۸ cd	•/۹۸ xyz	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ qrstuv	•/۹۸ geidehf	•/۹۸ xyz	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr
•/۱۰۰ ejifmknhol	•/۹۸ tuvwxx	•/۹۸ tuvwxx	•/۹۸ xyz	•/۹۸ tpumodsnr

میانگین‌هایی که در هر سنتون و برای هر صفت دارای سرفو مشاهده می‌شوند، براساس آزمون دانکر در مصطفی احتساب اردصدا اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند.

بزرگی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

عرفان سپهوند و همکاران

ادامه جدول ۵. وضعیت میوه و دانه در زنگنه‌های موردنیزه (۷) نسبت وزن مغز به خشک میوه (%) نسبت وزن مغز به خشک میوه (%) وزن میوه با پوست سبز (گرم) وزن خشک میوه (گرم)

شماره زنگنه	وزن میوه با پوست سبز (گرم)	وزن خشک میوه (گرم)	نسبت وزن مغز به خشک میوه (%)	نسبت وزن مغز به میوه با پوست سبز (%)	وزن میوه (%)	وزن میوه با پوست سبز (گرم)	وزن خشک میوه (گرم)	نسبت وزن مغز به خشک میوه (%)	وزن میوه (%)
۱۰۱. qrstuv	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ ghf	۰.۷۴۳ uvwx	۰.۷۴۳ xy	۰.۷۴۳ yz	۰.۷۴۳ gef	۰.۷۴۳ nmop	۰.۷۴۳ qnmop	۰.۷۴۳
۱۰۲. uvwx	۰.۷۴۳ njokphm	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ rstuww	۰.۷۴۳ ab	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ qrtuvsxw	۰.۷۴۳ hmo	۰.۷۴۳ tuvsxw	۰.۷۴۳
۱۰۳. gjjmpmkhol	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ kplmoqnj	۰.۷۴۳ z	۰.۷۴۳ qrstuvw	۰.۷۴۳ kplmoqnj	۰.۷۴۳ vwxw	۰.۷۴۳ jk	۰.۷۴۳ qrtuvsxw	۰.۷۴۳
۱۰۴. rstuww	۰.۷۴۳ cab	۰.۷۴۳ fg	۰.۷۴۳ geidehf	۰.۷۴۳ cab	۰.۷۴۳ fg	۰.۷۴۳ nmopq	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳
۱۰۵. a	۰.۷۴۳ njokphm	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ z	۰.۷۴۳ njokphm	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ nmop	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ jki	۰.۷۴۳
۱۰۶. stuww	۰.۷۴۳ cab	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ geidehf	۰.۷۴۳ ojlkkmhn	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ vwxw	۰.۷۴۳
۱۰۷. gcfdb	۰.۷۴۳ nrjokpqsm	۰.۷۴۳ soqpr	۰.۷۴۳ z	۰.۷۴۳ ojlkkmhn	۰.۷۴۳ kplmoqnj	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ vwxw	۰.۷۴۳
۱۰۸. vqstpwmnrou	۰.۷۴۳ edb	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ yz	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ qrtusop	۰.۷۴۳
۱۰۹. vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ vwx	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vwx	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۰. gcfdb	۰.۷۴۳ edb	۰.۷۴۳ kplmoqnj	۰.۷۴۳ yz	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ uvwx	۰.۷۴۳
۱۱۱. gjjmpmkhol	۰.۷۴۳ njokphm	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ stu	۰.۷۴۳ stu	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۲. gjjmpmkhol	۰.۷۴۳ opqrstuv	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ yz	۰.۷۴۳ opqrstuv	۰.۷۴۳ opqrstuv	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ qrtusop	۰.۷۴۳
۱۱۳. pqrstuv	۰.۷۴۳ gdehf	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ gdehf	۰.۷۴۳ gdehf	۰.۷۴۳ b	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳
۱۱۴. vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsnr	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۵. qijpmknol	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۶. gifdhe	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۷. vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۸. qstpmknrol	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۱۹. cadbe	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۰. opqrstuv	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۱. gifkhe	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۲. stuww	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۳. gjjmpmkhol	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۴. qrstuv	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ vqstpwmnrolu	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۵. uvwx	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ xyz	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳
۱۲۶. gjifjkhl	۰.۷۴۳ gdebf	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ wxy	۰.۷۴۳ gdebf	۰.۷۴۳ gdebf	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tpmoqsmt	۰.۷۴۳ tuvwx	۰.۷۴۳

بزرگی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

ارزیابی برخی از ژنتیپ‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

شماره ژنتیپ	وزن میوه با پوست سبز (گرم)	وزن خشک میوه (گرم)	نسبت وزن خشک میوه به میوه با پوست سبز (%)	نسبت وزن مغز (گرم)	ادمه جدول ۵. وضعیت میوه و دانه در ژنتیپ‌های مورد بررسی
۲۲۵	۱۴۳۵ d	۲۹۵ kmnl	۷۸۰ wvxy	۱۴۱ yz	۰/۸۰ wvxy
۲۲۶	۱۴۳۵ wxy	۱۱۳ kpimoqsnr	۰/۸۰ z	۰/۸۰ z	۰/۸۰ kpimoqsnr
۲۲۷	۱۴۳۵ z	۰/۸۰ str	۰/۸۰ vwx	۰/۸۰ str	۰/۸۰ str
۲۲۸	۱۴۳۵ qrtuvsxw	۱۴۲ xyw	۰/۸۰ tpmoqsnr	۰/۸۰ tpmoqsnr	۰/۸۰ tpmoqsnr
۲۲۹	۱۴۳۵ lmnk	۱۴۲ stu	۰/۸۰ wxy	۰/۸۰ wxy	۰/۸۰ wxy
۲۳۰	۱۴۳۵ yzz	۱۴۲ nmol	۰/۸۰ uvwx	۰/۸۰ uvwx	۰/۸۰ uvwx
۲۳۱	۱۴۳۵ lmnk	۱۴۲ fe	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۲	۱۴۳۵ stu	۱۴۲ svu	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۳	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ vwx	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۴	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۵	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۶	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۷	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۸	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۳۹	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۰	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۱	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۲	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۳	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۴	۱۴۳۵ ghi	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۵	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۶	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۷	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۸	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۴۹	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۰	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۱	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۲	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۳	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۴	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz
۲۵۵	۱۴۳۵ qrtusop	۱۴۲ kmnl	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz	۰/۸۰ xyz

میانگین هر چهار که در سرتون و برای هر صفت دارای حروف مشابه هستند، براساس آزمون دانکن در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.

بزرگی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

عرفان سپهوند و همکاران

جدول ۶- نتایج همبستگی بین صفات روشنی و زیانشی و کمی و کافی میوه در ۸۰ زنوتیپ موردنظر سو

بزرگی کشاورزی

١٤٩٢ شماره ٣ یاپن ١٥

ارزیابی برخی از ژنتیک‌های بادام در شرایط اقلیمی کرج

آدابه جدول ۶. همبستگی بین صفات روشی و زایشی و کمی و گنجینه میوه در ۸ ژنوبه مورد بررسی

	SCI	KSI	KCI	CV	TH	TV	TB	FD	AB	BD	WC	LR	FD	DFB	FST	NP	CP	LFB	SSTA
SCI	1																		
KSI	-0.223*																		
KCI	0.219*	-0.199																	
CV	-0.18	0.19	-0.12																
TH	-0.14	0.14	-0.104	-0.19															
TV	0.104	0.145	0.128	-0.18															
TH	0.117	-0.144	0.124	0.158**															
TB	-0.14	0.124*	0.104	0.188**															
FD	-0.115	0.118	0.1136	0.142**															
AB	0.113	0.111	0.116	0.151															
BD	-0.123	0.118	0.115	0.111	-0.133														
WC	0.118	0.113	0.118	0.184	-0.169														
LR	0.118	-0.118**	0.122	0.183	-0.181														
FD	-0.146	0.118	-0.117	0.113**	0.139**														
DFB	-0.247*	-0.138	0.108	0.115	0.117														
FST	0.111	-0.138	0.116	0.165	-0.171														
NP	0.111	0.114	0.114	0.145	0.118														
CP	-0.111	-0.108	-0.125	0.117	-0.117														
LFB	-0.115	0.115	0.113	0.114	-0.115														
SSTA	-0.129	0.116	0.113	0.110	-0.122														

*: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵% و اورصد.

داد که حجم کل تاج درخت با ارتفاع تقریبی درخت (۰/۶۹۳)، عادت شاخه‌دهی، قدرت رشدی درخت (۰/۷۰۹)، تراکم برگ و تراکم گل در سطح ۱ درصد و با تراکم میوه‌دهی در سطح ۵ درصد دارای همبستگی مثبت بود. این ارتباط نشان داد که هر چقدر تاج درخت بزرگ‌تر باشد، ارتفاع آن بیشتر و میزان شاخه‌دهی آن نیز متراکم‌تر و قدرت رشدی درخت نیز بیشتر است. همچنین، درختانی با تاج بزرگ‌تر دارای تراکم گل و برگ و میوه‌دهی بیشتری نیز هستند.

نتایج، همبستگی مثبت معنی‌داری را بین عادت شاخه‌دهی با وزن میوه، وزن خشک‌میوه، وزن مغز، تراکم میوه، اندازه میوه سبز، اندازه خشک‌میوه، اندازه مغز، تراکم برگ و تراکم گل‌دهی نشان داد. این نتایج حاکی از آن است که ژنوتیپ‌هایی که دارای عادت رشدی از نوع گستردگی و تیپ شاخه‌دهی از نوع بازتر بودند، تراکم برگ و گل بالاتری داشتند. همچنین، اندازه میوه سبز، اندازه خشک‌میوه، اندازه مغز، وزن میوه، وزن خشک‌میوه، وزن مغز نیز در این ژنوتیپ‌ها بیشتر است. در توجیه ارتباط عادت شاخه‌دهی با موارد گفته شده می‌توان بیان کرد، در ژنوتیپ‌هایی که دارای تاج گستردگی هستند، ورود نور به داخل تاج بهتر و عمل فتوسنتز نیز بیشتر انجام می‌شود و در نتیجه کارایی و توانایی باردهی درخت و همچنین، کیفیت باردهی آن افزایش می‌یابد. زمان شروع گل‌دهی با وزن و اندازه میوه با پوست سبز، وزن و اندازه خشک‌میوه همبستگی منفی معنی‌دار داشت و با میزان شکاف در پوست سبز میوه و میزان نرمی پوست چوبی خشک‌میوه همبستگی مثبت معنی‌داری را نشان داد. این نتایج نشان می‌دهد که ژنوتیپ‌هایی که زمان شروع گل‌دهی آن‌ها زودتر بوده است، اندازه میوه با پوست سبز و خشک‌میوه بزرگ‌تر و وزن میوه با پوست سبز، وزن خشک‌میوه، میزان شکاف در پوست سبز میوه و میزان نرمی پوست

بیشترین نسبت وزن خشک‌میوه به میوه با پوست سبز را ژنوتیپ شماره ۲۰۰ داشت که در این صفت با ژنوتیپ‌های شماره ۱۳۸، ۱۶۸ و ۱۷۴ اختلاف معنی‌داری نداشت. این نسبت بیان‌کننده میزان پوست سبز روی میوه است، به طوری که هر چقدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان پوست تشکیل‌دهنده روی میوه کمتر است. نسبت وزن مغز به چوب و نسبت وزن مغز به میوه با پوست سبز در بین ژنوتیپ‌های مختلف اختلاف معنی‌داری را با هم‌دیگر نشان دادند. بیشترین نسبت مغز به خشک‌میوه را ژنوتیپ‌های شماره ۱۳۶، ۱۸۲، ۱۸۴ و ۲۲۶ و کمترین نسبت میزان مغز به خشک‌میوه مربوط به ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۵، ۱۳۷، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۷۲، ۲۰۰، ۲۲۳ و ۲۴۳ بود. این نسبت بیان‌کننده میزان چوب خشک‌میوه است، به طوری که هر چقدر این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان چوب خشک‌میوه کمتر است. همان‌طور که گفته شد ژنوتیپ شماره ۱۵۱ بیشترین وزن میوه با پوست سبز و خشک‌میوه و مغز را به خود اختصاص داده بود. نسبت وزن مغز به وزن خشک‌میوه در این ژنوتیپ ۰/۲۴ است که نشان‌دهنده وجود پوست چوبی محکم و ضخیم در این ژنوتیپ است. این نتایج با نتایج سایر محققان مطابقت داشت [۸، ۳]. موسوی و همکاران، در سال ۱۳۸۹، خصوصیات کمی و کیفی میوه در ۵۵ ژنوتیپ و رقم بادام را بررسی و گزارش کردند که ژنوتیپ‌ها و ارقام بررسی شده از نظر تمام صفات کمی و کیفی میوه دارای اختلاف معنی‌داری با یکدیگر بودند. ژنوتیپ ۴-۱۲-۴ و رقم شاهروд ۸ دارای بزرگ‌ترین طول، عرض، ضخامت، وزن و اندازه خشک‌میوه و بیشترین ضخامت پوست چوبی خشک‌میوه، طول، عرض، وزن و اندازه مغز را داشتند [۸].

نتایج حاصل از همبستگی بین برخی از صفات اندازه‌گیری شده در ژنوتیپ‌های بررسی شده در جدول ۶ آورده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان

به راعی کشاورزی

دوره ۱۵ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۲

و وزن خشک‌میوه، اندازه و وزن مغز به صورت دو طرفه با همدیگر در سطح ۱ درصد دارای همبستگی معنی‌دار مثبتی بودند، به‌طوری که افزایش یا کاهش هر یک از این صفات به ترتیب باعث افزایش و یا کاهش صفت دیگری می‌شود. این نتایج با نتایج سایر محققان مطابقت داشت [۹، ۷، ۳]. زمان شروع گل‌دهی با وزن (۰/۲۷۵) و اندازه میوه با پوست سبز (۰/۲۸۰)، وزن و اندازه خشک‌میوه (۰/۲۷۵) و (۰/۲۶۴) دارای همبستگی منفی معنی‌دار و با میزان شکاف در پوست سبز میوه (۰/۲۹۹) و میزان نرمی پوست چوبی خشک‌میوه (۰/۲۸۷) همبستگی مثبت معنی‌داری را نشان داد. این نتایج نشان می‌دهد، ژنوتیپ‌هایی که زمان شروع گل‌دهی آن‌ها زودتر بوده است، اندازه میوه با پوست سبز و خشک‌میوه بزرگ‌تر و وزن میوه با پوست سبز، وزن خشک‌میوه، میزان شکاف در پوست سبز میوه و میزان نرمی پوست خشک‌میوه آن‌ها بیشتر است. روابط حاصله از این تحقیق نشان داد، طعم مغز با میزان کرک، چین و چروک و شدت رنگ مغز همبستگی منفی معنی‌داری دارد. هر چقدر میزان کرک، چین و چروک‌های روی مغز کمتر و رنگ مغز روشن‌تر باشد، طعم مغز شیرین‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود. این نتایج با نتایج موسوی و همکاران مطابقت داشت. موسوی و همکاران، در سال ۱۳۸۹، همبستگی بین برخی صفات میوه را در ۵۵ ژنوتیپ و رقم بادام بررسی و گزارش کردند که همبستگی منفی معنی‌داری بین رنگ مغز با میزان چین و چروک مغز وجود داشت. وجود همبستگی معنی‌دار میان صفات به امر انتخاب صفات مهم به صورت غیرمستقیم کمک می‌کند و این امر باعث تسهیل و تسريع برنامه‌های به‌نژادی می‌شد [۱۸]. اهمیت همبستگی میان صفات از این جهت است که امکان پی‌بردن به وضعیت صفاتی که اندازه‌گیری آن‌ها مشکل است، از طریق همبستگی آن‌ها با صفاتی که اندازه‌گیری آن‌ها آسان‌تر است را می‌دهد.

خشک‌میوه آن‌ها بیشتر است (جدول ۶). اندازه و وزن میوه دارای پوست سبز، اندازه و وزن خشک‌میوه، اندازه و وزن مغز به صورت دو طرفه با همدیگر در سطح ۱ درصد دارای همبستگی معنی‌دار مثبتی بودند، به‌طوری که افزایش یا کاهش هر یک از این صفات به ترتیب باعث افزایش و یا کاهش صفت دیگری می‌شود. وزن خشک‌میوه، اندازه خشک‌میوه، میزان شکاف در پوست چوبی خشک‌میوه و میزان نرمی پوست خشک‌میوه همبستگی منفی معنی‌داری را با یکدیگر نشان دادند. این رابطه بیان کرد، ژنوتیپ‌هایی که دارای اندازه خشک‌میوه بزرگ‌تر و وزن خشک‌میوه بیشتری هستند، میزان شکاف در پوست چوبی خشک‌میوه آن‌ها نیز کمتر است و دارای پوست خشک‌میوه سخت‌تر و محکم‌تری هستند. همچنین، نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد، میوه‌هایی که پوست سبزشان در زمان مناسب برداشت بیشتر شکاف خورده بود، میزان شکاف در پوست چوبی خشک‌میوه آن‌ها نیز بیشتر بود و پوست خشک‌میوه آن‌ها استحکام کمتری داشت (جدول ۶).

شدت رنگ پوست چوبی خشک‌میوه با شدت رنگ مغز (۰/۲۷۰) و میزان چین و چروک آن (۰/۲۳۰) در سطح ۵ درصد همبستگی مثبتی را نشان دادند، به‌طوری که هر چقدر رنگ پوست چوبی خشک‌میوه تیره‌تر باشد، رنگ مغز تیره‌تر و میزان چین و چروک آن نیز بیشتر است. میزان کرک روی مغز با میزان چین و چروک مغز (۰/۶۰۴) و شدت رنگ مغز (۰/۵۰۷) در سطح ۱ درصد همبستگی مثبتی را نشان داد، به‌طوری که مغز‌هایی با میزان کرک بیشتر دارای چین و چروک بیشتر و رنگ تیره‌تری بودند. طعم مغز با میزان کرک، چین و چروک و شدت رنگ مغز همبستگی منفی معنی‌داری را نشان داد. هر چقدر میزان کرک و چین و چروک‌های روی مغز کمتر و رنگ مغز روشن‌تر باشد، طعم مغز شیرین‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود. در این تحقیق اندازه و وزن میوه دارای پوست سبز، اندازه

قرار گرفتند. این ژنوتیپ‌ها دارای ارتفاع خیلی کم و قدرت رشدی ضعیف بودند. میزان تراکم شکوفه‌دهی در آن‌ها خیلی کم بود و از نظر زمان گل‌دهی در دو گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار گرفتند.

گروه سوم

در این گروه ۷ ژنوتیپ قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های این گروه دارای قدرت رشدی زیاد، تاج بزرگ و ارتفاع بلند بودند. شکل میوه سبز در ژنوتیپ‌های این گروه از نوع بیضوی بود و خشک میوه‌هایی با اندازه کوچک تا متوسط داشتند. میزان چروک‌کیدگی مغز آن‌ها کم تا متوسط بود.

گروه چهارم

در این گروه ۱۲ ژنوتیپ قرار گرفتند که با کاهش فاصله به ۲ زیر گروه اصلی تقسیم شدند که در زیر گروه اول ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۵، ۱۲۷ و ۲۳۲ و در زیر گروه دوم ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۳، ۱۴۷، ۱۶۴، ۱۸۶، ۱۷۷، ۱۶۴، ۱۹۷، ۲۴۴ قرار گرفتند. ویژگی اصلی که باعث تمایز ژنوتیپ‌های این گروه از سایر گروه‌ها شد، طعم مغز آن‌ها بود. ژنوتیپ‌های زیر گروه اول همگی دارای طعم تلخ بودند و در زیر گروه دوم، ژنوتیپ‌های شماره ۱۴۷، ۱۶۴، ۱۷۷، دارای طعم تلخ و ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۳، ۱۹۷، ۲۴۴ دارای طعم بینابین (بین شیرین و تلخ) بودند.

گروه پنجم

در این گروه ۱۱ ژنوتیپ قرار گرفتند که با کاهش فاصله به دو زیر گروه اصلی تقسیم می‌شدند که در زیر گروه اول ژنوتیپ‌های ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۴۳ و ۲۴۵ و در زیر گروه دوم ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۴، ۱۵۳، ۱۶۵، ۱۶۶ و ۱۸۹ و ۲۱۹ قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های این گروه دارای قدرت رشدی متوسط تا زیاد بودند و دارای عادت رشدی از نوع گستردگی خیلی گستردگی داشتند. همچنین، تراکم گل‌دهی در ژنوتیپ‌های این گروه زیاد تا خیلی زیاد بود و از نظر

همچنین، از طریق همبستگی بین صفات می‌توان به وضعیت صفاتی که برای پی‌بردن به آن‌ها نیاز به زمان طولانی‌تری است و گیاه باید حتماً وارد مرحله باروری شود، از روی صفات رویشی به آن‌ها پی‌برد [۳۲].

در این تحقیق، تجزیه کلاستر براساس تمام صفات اندازه‌گیری شده به روش وارد انجام شد (شکل ۱). در فاصله ۲۵ ژنوتیپ‌ها به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند که از عوامل مهم تفکیک ژنوتیپ‌ها در این فاصله از یکدیگر صفاتی همچون میزان تراکم برگ، زمان شروع گل‌دهی، اندازه خشک‌میوه، میزان شکاف در پوست چوبی هسته، میزان نرمی پوست چوبی خشک‌میوه بودند. با کاهش فاصله روی مقیاس کلاستر از ۲۵ به ۵ به ۸ گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند.

گروه اول

در این گروه ۱۵ ژنوتیپ قرار گرفتند که با کاهش فاصله به ۲ زیر گروه اصلی تقسیم شدند که در زیر گروه اول ژنوتیپ‌های شماره ۱۲۱، ۱۳۷، ۱۴۱، ۱۵۲، ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۹۹ و ۲۰۰ و در زیر گروه دوم ژنوتیپ‌های شماره ۱۳۸، ۱۶۸، ۱۸۳، ۲۰۷، ۲۲۳ و ۲۲۹ قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های زیر گروه اول دارای قدرت رشد زیاد و ارتفاع متوسط تا زیاد بودند. همچنین، دارای شاخه‌های متراکم تا خیلی متراکم بودند. ژنوتیپ‌های این زیر گروه دارای میوه‌های بزرگ با کرک فراوان بودند و پوست سبز میوه به راحتی از خشک‌میوه جدا می‌شد. همچنین، این ژنوتیپ‌ها دارای خشک‌میوه‌ای متوسط تا بزرگ و مغزهایی با اندازه متوسط بودند. ژنوتیپ‌های زیر گروه دوم نیز خشک‌میوه‌هایی با اندازه متوسط تا بزرگ بودند و زمان آغاز گل‌دهی آن‌ها همانند ژنوتیپ‌های زیر گروه اول در دو گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار می‌گرفت.

گروه دوم

در این گروه ۳ ژنوتیپ با شماره‌های ۱۷۴، ۱۹۱ و ۲۴۳

گروه هشتم

در این گروه ۱۸ ژنتیپ قرار گرفتند. ژنتیپ‌های این گروه شامل همان ژنتیپ‌هایی می‌شدند که در فاصله ۲۵ از دیگر ژنتیپ‌ها جدا شده بودند. از ویژگی‌های اصلی ژنتیپ‌هایی که در این گروه قرار گرفته بودند این بود که از نظر زمان شروع گل‌دهی در گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار می‌گرفتند. همچنین، ژنتیپ‌های این گروه دارای خشک میوه‌هایی با اندازه کوچک تا متوسط با پوست نازک و نرم و یا پوست کاغذی بودند و میزان شکاف در پوست کاغذی آن‌ها بیش از ۲ میلی‌متر بود. یکی از بهترین راه‌کارهای طبقه‌بندی ژرم‌پلاسم و تجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی بین افراد، با استفاده از روش آماری چندمتغیره است. از بین این روش‌ها، تجزیه کلاستر و تجزیه به عامل‌های اصلی (PCA) بیشتر از بقیه کاربرد دارند [۱۳، ۱۴، ۱۵]. در تجزیه کلاستر، افراد یک کلاستر از نظر صفات مورد بررسی دارای شباهت‌های زیادند و افرادی که در کلاسترها جدآگانه قرار می‌گیرند، از نظر صفات، ناهمگن‌ترند. از روش آماری چندمتغیره شامل تجزیه کلاستر و تجزیه به عامل‌ها برای تفکیک و گروه‌بندی در بادام [۱۳، ۱۵، ۲۵]، زردالو [۱۱]، آبلالو [۱۹]، انار [۲۸] و انگور [۱۶] استفاده کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

هدف این تحقیق، یافتن ژنتیپ‌های دیرگل با کمیت و کیفیت خوب خشک‌میوه و مغز بود. براساس نتایج به دست آمده ژنتیپ شماره ۱۶۹ به عنوان ژنتیپ خیلی دیرگل تشخیص داده شد. زمان گل‌دهی این ژنتیپ با ۲ روز دیرتر از رقم خیلی دیرگل تاری نان پاریل (۱۳۹۰/۱/۱۸) بود. وزن میوه با پوست سبز، خشک‌میوه و مغز در ژنتیپ شماره ۱۶۹ به ترتیب ۱۲/۵۰، ۴/۷۵ و ۱/۲۸ گرم بود. خشک‌میوه و مغز این ژنتیپ از لحاظ کیفی

زمان شروع گل‌دهی در دو گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار می‌گرفتند. زیر گروه اول دارای خشک میوه‌هایی با اندازه کوچک تا متوسط بودند، اما زیر گروه دوم دارای خشک میوه‌هایی با اندازه متوسط تا بزرگ و مغزی با اندازه متوسط بودند.


گروه ششم

در این گروه ۱۱ ژنتیپ قرار گرفتند که با کاهش فاصله به ۳ زیر گروه اصلی تقسیم می‌شدند که در زیر گروه اول ژنتیپ‌های ۱۶۳، ۱۹۴ و ۲۶۱ و در زیر گروه دوم ژنتیپ‌های شماره ۱۴۶، ۱۵۹ و ۲۲۵ و در زیر گروه سوم ژنتیپ‌های ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۳۸، ۲۵۳ و ۲۷۰ قرار گرفتند. ژنتیپ‌های این گروه همگی دارای میوه‌هایی با اندازه بزرگ و کرک فراوان بودند. ژنتیپ‌های زیر گروه اول دارای خشک میوه‌های بزرگ با پوست نازک و نرم بودند. همچنین، این ژنتیپ‌های دارای مغز بزرگ و کشیده بودند. ژنتیپ‌های زیر گروه دوم دارای خشک میوه‌هایی با اندازه متوسط بودند و پوست نازک و نرم داشتند. همچنین، ژنتیپ‌های این زیر گروه دارای مغزی با اندازه متوسط بودند.

گروه هفتم

در این گروه ۳ ژنتیپ با شماره‌های ۱۴۹، ۱۵۱ و ۱۵۷ جای گرفتند. ژنتیپ‌هایی که در این گروه جای گرفتند دارای درختانی بزرگ و بلند، با قدرت رشدی زیاد و شاخه‌دهی به صورت خیلی متراکم بودند. همچنین، این ژنتیپ‌های دارای تراکم شکوفه‌دهی خیلی زیادی بودند و از نظر زمان شروع گل‌دهی نیز در دو گروه زودگل تا میان‌گل و میان‌گل تا دیرگل قرار می‌گرفتند. این ژنتیپ‌ها دارای میوه سبز خیلی بزرگ و بیضوی شکل، خشک میوه‌های خیلی بزرگ و کشیده و مغز خیلی بزرگ تا بزرگ بودند.

ژنوتیپ‌هایی که در این تحقیق مشخص شدند، از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی میوه وضعیت مطلوب‌تری دارند، در سال‌های بعدی نیز ارزیابی شوند.



شکل ۱. گروه‌بندی ۸۰ ژنوتیپ بادام مورد بررسی براساس تمام صفات اندازه‌گیری شده به روش Ward

دارای شرایط مطلوبی بود. رنگ خشک‌میوه و مغز این ژنوتیپ روشن و پوست چوبی خشک‌میوه آن از نوع نازک و نرم بود. مغز این ژنوتیپ، شیرین، دارای چروک‌کیدگی و کرک کم بود که این صفات از نظر بازارپسندی و تجاری بسیار مهم هستند.

ژنوتیپ شماره ۱۵۱ نیز از لحاظ صفات کیفی مغز دارای شرایط مطلوبی بود. این ژنوتیپ بیشترین میزان وزن میوه، خشک‌میوه و مغز را به خود اختصاص داده بود. وزن میوه با پوست سیز، خشک‌میوه و مغز در این ژنوتیپ، به ترتیب $۹/۵۳$ ، $۲۳/۸۱$ و $۲/۲۶$ گرم بود. رنگ خشک‌میوه و مغز این ژنوتیپ روشن بود. مغز این ژنوتیپ شیرین، دارای چروک‌کیدگی و کرک کم بود. همچنین، تاریخ گل‌دهی این ژنوتیپ $۱۳۹۰/۱/۶$ بود. علاوه بر این دو ژنوتیپ، ژنوتیپ‌های شماره ۱۵۷، ۱۹۴ و ۲۵۳ نیز از لحاظ صفات کمی و کیفی میوه دارای شرایط مطلوبی بودند (جدول ۳). همچنین، این ۳ ژنوتیپ نیز مانند ژنوتیپ شماره ۱۵۱ از لحاظ زمان شروع گل‌دهی در گروه ژنوتیپ‌های میان گل تا دیرگل قرار می‌گیرند (جدول ۲). بر این اساس، ژنوتیپ دیرگل شماره ۱۶۹ برای کاشت در مناطقی با خطر سرمای دیرس بهاره و ژنوتیپ‌های شماره ۱۵۱، ۱۹۴ و ۲۵۳ برای کاشت در مناطقی مناسب هستند که خطر سرمای دیرس بهاره چندان قابل توجه نیست. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه کلاسستر براساس تمام صفات اندازه‌گیری شده، ارقام را در فاصله اقلیدسی $2\text{--}25$ به ۲ گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدسی از 25 به 5 ژنوتیپ‌ها در ۸ گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسسترها اصلی در این تحقیق، صفاتی همچون ارتفاع، قدرت رشدی و عادت شاخه‌دهی درختان، اندازه میوه سبز، خشک‌میوه و مغز، میزان نرمی و سختی پوست چوبی هسته بودند. در پایان، پیشنهاد می‌شود از آنجایی که زمان شروع گل‌دهی تحت شرایط اقلیمی است،

به راعی کشاورزی

منابع

۹. مؤمن پور، ع؛ عبادی، ع؛ ایمانی، ع؛ (۱۳۹۰). «بررسی خصوصیات رویشی و زایشی و همبستگی بین آن‌ها در نتاج حاصل از تلاقي دو رقم بادام به نام‌های توتو و شاهرود ۱۲». *مجله علوم باغبانی*. ۲، ۲۵، ص. ۲۱۸-۲۳۳.
۱۰. وزوایی، ع؛ (۱۳۶۴). «ارزیابی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ‌های بادام منطقه استان تهران و مرکزی به منظور انتخاب ژنوتیپ‌های برتر بادام». *دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد*.
11. Asma B. M., Kan T. and Birhanli O (2007). Characterization of promising apricot (*Prunus armenica L.*) genetic resources in Malatya, Turkey. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 54, 205-212.
12. Bal Y.S (2001). Fruit Growing. Department of Horticulture, Punjab Agricultural University, Ludhiana. 425 p.
13. Chalak L., Chehade A. and Kadri A (2007). Morphological characterization of cultivated almonds in Lebanon. *Fruits*, 62, 177-186.
14. De Giorgio D. and Polignano G.B (2001). Evaluating the biodiversity of almond cultivars from germplasm collection field in Southern Italy. *Sustaining the Global Farm*, 56, 305-311.
15. De Giorgio D., Leo L., Zacheo G. and Lamascese N (2007). Evaluation of 52 almond (*Prunus amygdalus* Batsch) cultivars from the Apulia region in Southern Italy. *Journal of Horticultural Science & Biotechnology*, 82, 541-546.
1. ایمانی، ع؛ (۱۳۸۱). *بیولوژی گل دهی میوه‌های مناطق معتدل (ترجمه)*. انتشارات سینا، صفحه ۳۴۹-۳۳۰.
۲. ایمانی، ع؛ (۱۳۷۶). «بررسی اثر برخی از ویژگی‌های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی روی میزان عملکرد ژنوتیپ‌های انتخاب شده بادام». *دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، پایان‌نامه دکتری*.
۳. بهمنی، ع؛ *فیضی اصل*، م؛ *مطلوبی آذر*، ع؛ (۱۳۸۷). «بررسی ارتباط بین ویژگی‌های مختلف خشک‌میوه در بادام و تأثیر آن‌ها بر وزن مفر از طریق تجزیه غلیت». *مجله علوم و فنون باغبانی ایران*. ۹، ۴، ص. ۳۰۷-۳۱۴.
۴. رادمهر، ع؛ (۱۳۹۰). *آمارنامه جهاد کشاورزی*. جلد دوم، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ۴۴۹ صفحه.
۵. رسولی، م؛ *فتاحی مقدم*، م؛ *زمانی، ذ*؛ ایمانی، ع؛ عبادی، ع؛ (۱۳۹۱). «بررسی تنوع ژنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی». *مجله علوم باغبانی ایران*. ۴۳، ۴، ص. ۳۵۷-۳۷۰.
۶. شکوهیان، ع؛ *صانعی شریعت‌پناهی*، م؛ *منیعی*، ع؛ (۱۳۷۴). «شناسایی ارقام دیرگل بادام در شهرستان کاشمر». *پایان‌نامه کارشناسی ارشد*، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
۷. کاوند، م؛ *ارزانی، ک*؛ ایمانی، ع؛ (۱۳۸۷). «گزینش ژنوتیپ‌های برتر بادام در منطقه بروجرد». *مجله به نژادی نهال و بذر*. ۱، ۳، ص. ۳۸۵-۳۹۹.
۸. موسوی قهفرخی، س، *فتاحی مقدم*، م؛ *زمانی، ذ*؛ ایمانی، ع؛ (۱۳۸۹). «ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام». *مجله علوم باغبانی ایران*. ۴۱، ۲، ص. ۱۱۹-۱۳۱.

16. Fatahi R., Ebadi A., Vezvaei A., Zamani Z. and Ghanadha, M. R (2004). Relationship among quantitative and qualitative characters in 90 grapevine (*Vitis vinifera*) cultivars. *Acta Horticulturae*, 640, 275-282.
17. Gülcen R (1985). Descriptor list for almond (*Prunus amygdalus*). (Revised Ed.). International Board for Plant Genetic Resources, Rome, Italy.
18. Hansche P.E. Beres W. and Forde, H.I (1972). Estimation of quantitative genetic of walnut and their implications for cultivar improvement. *Journal of the American Society for Horticultural Sciences*. 97, 279–285.
19. Karl W., Hilig A. and Lezzoni, F (1998). Multivariate analysis of sour cherry germplasm collection. *Journal of the American Society for Horticultural Science*. 113, 928- 934.
20. Kester D. E. and Gradziel, T. M (1996). Almonds. In: Janick, J. and J.N.Moore (Eds.), *Fruit Breeding*. Vol. III. (pp.1-97.), John Wiley and Sons, Inc., New York, USA.
21. Kester D.E (1965). Inheritance of time of bloom in certain progenies of almond. *Journal of the American Society for Horticultural Science*. 87, 214–221.
22. Kester D.E and Griggs W.H (1959). Fruit setting in the almond: the effect of cross pollinating various percentages of flowers. *Journal of American Society for Horticultural Science*. 74, 214–219.
23. Kester D.E., and Asay R.N (1975). Almonds. In: Janick y, J., Moore, J.N. (Eds.), *Advances in Fruit Breeding*. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, pp. 387–419.
24. Kester, D. E. P. Hansche E. Beres, and Asay, R. N (1977). Variance components and heritability of nut and kernel traits in almond. *Journal of the American Society for Horticultural Science*. 102: 264-266.
25. Lansari A., Iezzoni F. and Kester D.E (1994). Morphological variation within collections of Moroccan almond clones and Mediterranean and North American cultivars. *Euphytica*, 78, 27-41.
26. Rahemi M (2002). The development of almond orchards in Iran. *Acta Horticulture*. 591: 177-179.
27. Sanchez-Pérez R. Ortega E. Duval H. Martinez-Gomez P. and Dicenta F (2007). Inheritance and relationships of important agronomic traits. *Euphytica* 155, 381–391.
28. Sarkhosh A., Zamani Z., Fatahi Moghadam M. R., Ebadi A., Saie A., Tabatabaei S.Z. and Akrami M.R (2006). Study of relationships of quantitative and qualitative characteristics of some pomegranate genotypes. *Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 8(4), 147-160.
29. SAS Institute(2000). *SAS/STAT User's Guide*. SAS Institute, Cary, NC, USA.

30. Socias I Company R. Felipe A.J. and Gomez Aparisi, J (1999). A major gene for flowering time in almond. *Plant Breeding.* 118, 443-448.
31. Spiegel-Roy P. and Kochba, J (1981). Inheritance of nut and kernel traits in almond. *Euphytica* 30, 161-174.
32. Vargas F.J. and Romero M.A (2001). Blooming time in almond progenies. *Options Mediterran.* 56, 29-34.

Archive of SID