



به زراعی کشاورزی

دوره ۱۶ ■ شماره ۲ ■ تابستان ۱۳۹۳
صفحه‌های ۳۵۳-۳۶۸

بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید

اسماعیل رضایی چیانه^{۱*}، اروج ولیزادگان^۲، مهدی تاج‌بخش^۳، عادل دباغ محمدی نسب^۴ و وحید ریماز^۵

۱. استادیار گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میان‌دوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
۲. استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
۳. استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
۴. دانشیار گروه اکوفیزیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
۵. کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳

تاریخ وصول مقاله: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

چکیده

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی واقع در شهرستان نقده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص لوبیا، کشت خالص شوید، کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید و کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا) بود. تیمارهای آزمایش از طریق روش جایگزینی اعمال شد. بیشترین عملکرد دانه (۱۶۳۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی لوبیا (۳۵۹۳ کیلوگرم در هکتار) از تیمار کشت مخلوط ردیفی و کمترین مقادیر عملکرد دانه (۴۱۴ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۸۷۰ کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت به دست آمد. نتایج در مورد گیاه شوید نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (۳۴۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی شوید (۱۹۲۶ کیلوگرم در هکتار) به تیمار کشت خالص و کمترین مقادیر عملکرد دانه (۱۵۳ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۶۳۰ کیلوگرم در هکتار) به تیمار کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید اختصاص داشت. درصد اسانس و عملکرد اسانس در کشت مخلوط ردیفی بیشتر از سایر تیمارها به دست آمد. بیشترین مقدار نسبت برابری زمین از الگوی کشت مخلوط ردیفی (۱/۹) و کمترین مقدار آن (۰/۸) از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت حاصل شد. بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا و بیشترین جمعیت شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها: اسانس، شاخص شانون، کشاورزی پایدار، گیاه دارویی، نسبت برابری زمین.

۱. مقدمه

سلامت محصولات تولیدشده در سیستم‌های مختلف از نظر وجود بقایای سموم و مواد شیمیایی و تأثیر آنها بر سلامت انسان و محیط زیست، توجهات ویژه‌ای را به روش‌های تولید و نهاده‌های به‌کاررفته در امر تولید معطوف داشته است و ضرورت ایجاد تغییر در نظام‌های زراعی رایج را توجیه می‌کند [۲۱]. بنابراین، بهره‌گیری از اصول اکولوژیک مانند کشت مخلوط در تولید این گیاهان ضروری است. کشت مخلوط به کشت دو یا تعداد بیشتری محصولات زراعی گفته می‌شود که با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی کشت می‌شوند، به نحوی که از لحاظ زراعی با یکدیگر اثر متقابل داشته باشند [۱۵، ۳۶]. این سیستم در بسیاری از نقاط دنیا به دلیل برخی از مزیت‌های نسبی آن مانند استفاده کارآمد از منابع محیطی، تبادل مواد غذایی، افزایش توانایی رقابتی در کنترل علف‌های هرز، کاهش عوامل بیماری‌زا و آفات، بهبود حاصلخیزی خاک از طریق تثبیت نیتروژن حاصل از جزء بقولات، افزایش کمیت و کیفیت محصول و نیز برخی امتیازات دیگر کشت می‌شود [۱۹، ۳۶، ۳۸].

تا حدودی بیشتر نتایج منتشرشده در زمینه کشت مخلوط که با برتری عملکرد همراه شده، مخلوط بقولات با غیربقولات بوده است [۲۷]. در مطالعه کشت مخلوط نواری و ردیفی ریحان و لوبیا مشخص شد که بیشترین عملکرد دانه لوبیا از کشت خالص به دست آمد، ولی اختلاف عملکرد دانه بین کشت مخلوط ردیفی و کشت خالص لوبیا معنادار نبود. بیشترین نسبت برابری زمین^۱ (۱/۳۶) نیز از کشت ردیفی به دست آمد. همچنین، عملکرد اسانس ریحان در کشت خالص و کشت مخلوط چهار ردیف ریحان + دو ردیف لوبیا بیشتر از همه تیمارها بود، اما از نظر درصد اسانس بین تیمارها اختلاف معناداری

مشاهده نشد [۱۰]. نتایج تحقیقات انجام گرفته در کشت مخلوط ذرت و لوبیا نشان داد که در کشت یک ردیف ذرت + دو ردیف لوبیا و کشت یک ردیف ذرت + یک ردیف لوبیا، عملکرد دانه ذرت به ترتیب ۶۱ و ۵۱ درصد افزایش یافت [۲۸]. تحقیقات در زمینه کشت مخلوط ذرت با باقلا و کشت مخلوط ذرت با ارزن دم‌روباهی نشان داد کلیه تیمارهای کشت مخلوط نسبت برابری زمین بالاتری را نسبت به کشت خالص دو گیاه داشتند که نشان‌دهنده مزیت کشت مخلوط نسبت به کشت خالص است [۸، ۳۰].

چرخه زندگی حشرات در سیستم کشت مخلوط تغییر یافته و جمعیت آفات در شرایط مخلوط به دلیل وجود گونه‌های همراه کاهش می‌یابد [۱۷]. از جمله دلایل تغییر جمعیت حشرات در الگوهای کشت مخلوط، کاهش ساکن شدن حشرات و تداخل در تخمگذاری آنها است [۲۳]. میزان حمله شب‌پره در کشت مخلوط ذرت و لوبیا در مقایسه با تک‌کشتی ذرت کمتر است [۲۰]. در بررسی کشت مخلوط رازیانه با خردل گزارش شده که جمعیت شته به‌طور معناداری کاهش یافت [۳۱]. در بررسی دیگری جمعیت زنجیره برگ‌خوار و سرخرطومی برگ‌خوار به ترتیب ۲۶ و ۴۵ درصد در کشت مخلوط کمتر از کشت خالص ذرت و لوبیا بوده است [۱۶].

باتوجه به اطلاعات محدود و نتایج انتشاریافته در مورد کشت مخلوط لوبیا و شوید، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کشت مخلوط لوبیا و شوید به لحاظ ویژگی‌های زراعی و ارزیابی تنوع و انبوهی جمعیت آفات گیاهان مذکور و شکارگرهای آنها بود.

۲. مواد و روش‌ها

آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی واقع در شهرستان

1. Land Equivalent Ratio

نقده با طول جغرافیایی ۴۵ و ۲۵ و عرض جغرافیایی ۳۶ و ۵۷ و ارتفاع ۱۳۰۷ متر از سطح آب‌های آزاد اجرا شد. میانگین‌های متوسط دما و بارندگی سالیانه در طی یک دوره ده‌ساله به ترتیب ۱۲/۴۰ درجه سانتی‌گراد و ۳۲۳ میلی‌متر گزارش شده است. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول ۱ آورده شده است.

آزمایش به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و شش تیمار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص لوبیا، کشت خالص شوید، کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید و کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا) بود. در کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت، فضای هر بوته شوید معادل ۱۰۰۰ سانتی‌متر و فضای هر بوته لوبیا ۴۰۰ سانتی‌متر در کشت خالص بود. از این رو برای ایجاد کشت مخلوط روی ردیف با نسبت ۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا به ازای حذف هر بوته شوید در روی ردیف کاشت ۲/۵ بوته لوبیا یا به عبارت دیگر به ازای حذف هر دو بوته شوید پنج بوته لوبیا جایگزین شد. تیمارهای آزمایش از طریق روش جایگزینی اعمال شد. بذر مورد استفاده شوید از توده محلی نقده^۱ و بذر لوبیا از رقم ایستاده درخشان^۲ بود.

فاصله بین ردیف ۴۰ سانتی‌متر برای هر دو گونه در نظر گرفته شد. بذر شوید به فاصله ۲۵ سانتی‌متر و بذر لوبیا به فاصله ۱۰ سانتی‌متر روی ردیف‌ها با عمق ۲-۴ سانتی‌متر، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ به صورت جوی و پشته، همزمان کشت شدند. همچنین در یک بلوک فاصله کرت‌ها از هم چهار متر و فاصله بین دو بلوک پنج متر در نظر گرفته شد تا در مطالعه جمعیت حشرات کرت‌های مجاور روی هم تداخل نداشته باشند. بذر لوبیا قبل از

کاشت با باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم^۱ آغشته شد. عملیات وجین علف‌های هرز به طور مرتب به صورت دستی و هنگام لزوم انجام گرفت و آبیاری برحسب شرایط اقلیمی منطقه و به طور متوسط هر هفته یک‌بار به طریقه آبیاری جوی و پشته انجام گرفت. براساس آزمون خاک، کود سوپرفسفات تریپل به مقدار ۱۵۰ کیلوگرم تماماً قبل از کاشت و کود اوره به مقدار ۵۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان کود آغازین برای لوبیا و به مقدار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به صورت سرک (در دو مرحله قبل از کاشت و مرحله ساقه رفتن) به ردیف‌های شوید اضافه شد. به علت زیاد بودن مقدار پتاسیم قابل جذب، از کود پتاسیم استفاده نشد.

به منظور جمع‌آوری و برآورد انبوهی جمعیت و تنوع گونه‌های حشرات در تیمارهای مختلف کشت خالص و مخلوط دو گونه لوبیا و شوید، نمونه برداری ۴۵ روز پس از کاشت تا رسیدگی دانه‌ها با استفاده از تور حشره‌گیری (برای بررسی تنوع حشرات بالدار بالای سطح خاک) و قرار دادن تله‌های گودالی در خاک (به منظور بررسی تنوع حشرات بدون بال و متحرک و سایه‌پسند بر سطح خاک) که شامل ظروف پلاستیکی یک‌بار مصرف به قطر ۱۵ و ارتفاع ۱۲ سانتی‌متر بودند، استفاده شد. به منظور جلوگیری از خورده شدن نمونه‌ها توسط یکدیگر یا مورچه‌ها، در کف تله‌ها مقداری حشره‌کش کارباریل ریخته شد. تله‌ها پس از نصب، هر ده روز یک بار و تا زمان برداشت محصول بازدید شدند. حشرات به دام افتاده در تله‌ها پس از حذف مواد زاید و نمونه‌های غیرهدف جدا شدند. سپس با قید تاریخ و مشخصات تیمار مربوطه، نمونه‌ها تفکیک و تعدادی از آنها در الکل ۷۰ درصد نگهداری شدند و به منظور شناسایی نمونه‌ها با استفاده از منابع معتبر به آزمایشگاه منتقل شدند.

برای تعیین تنوع حشرات از شاخص شانون طبق

1. *Rhizobium leguminosarum*

معادله ۱ استفاده شد [۲۱]:

$$H' = -\sum ni/N \times \ln ni/N \quad (1)$$

در این رابطه، ni : تعداد افراد گونه؛ i : ام؛ N : تعداد کل افراد است. هر اندازه مقدار عددی H' بیشتر باشد، نشان‌دهنده تنوع گونه‌ای بیشتر است.

در پایان فصل رشد، برای هر دو گیاه لوبیا و شوید به‌منظور محاسبه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی با شرایط حذف حاشیه از هر طرف استفاده شد. برای تعیین عملکرد بیولوژیکی، پس از جدا کردن بذور لوبیا و شوید، نمونه‌ها در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد تا ثابت ماندن وزن خشک درون آن قرار گرفتند و سپس همراه بذور وزن شدند.

برای ارزیابی کشت مخلوط لوبیا و شوید در مقایسه با کشت خالص از شاخص نسبت برابری زمین^۱ (براساس عملکرد دانه) براساس معادله ۲ استفاده شد [۳۶]:

$$LER = \frac{Y_1}{B_1} + \frac{Y_2}{D_2} \quad (2)$$

در این معادله، Y_1 و Y_2 به ترتیب عملکرد گونه‌های لوبیا و شوید در کشت مخلوط؛ و B_1 و D_2 نیز عملکرد گونه‌های لوبیا و شوید در کشت خالص است.

استخراج اسانس شوید به‌روش تقطیر با آب و به وسیله دستگاه کلونجر انجام گرفت. بدین منظور، ۳۰ گرم نمونه بذری از هر کرت وزن شد و پس از آسیاب شدن مختصر در ۳۰۰ میلی‌لیتر آب در داخل دستگاه کلونجر به مدت سه ساعت جوشانده شد تا اسانس آن استخراج شود. سپس درصد اسانس به‌روش وزنی و عملکرد اسانس براساس عملکرد دانه \times درصد اسانس محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار SPSS 16 و مقایسه میانگین‌ها براساس آزمون چنددامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام گرفت.

۳. نتایج و بحث

۳.۱. عملکرد دانه و بیولوژیکی شوید

اثر الگوی کشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شوید در سطح احتمال ۱ درصد معنادار بود ($P \leq 0.01$). الگوی‌های کشت مخلوط با کشت خالص آن تفاوت معناداری داشتند، به‌طوری‌که بیشترین عملکرد دانه (۳۴۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۱۹۲۶ کیلوگرم در هکتار) از تیمار کشت خالص به‌دست آمد (شکل ۱). در بین الگوهای کشت مخلوط، بیشترین عملکرد دانه (۲۲۷ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۱۵۵۶ کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط ردیفی (۱:۱) و کمترین مقادیر عملکرد دانه (۱۵۳ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۶۳۰ کیلوگرم در هکتار) از کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید حاصل شد (شکل ۱). با توجه به تراکم بیشتر شوید خالص در واحد سطح عملکرد بالاتر آن طبیعی بود. همچنین در بین الگوهای مختلف کشت مخلوط، الگوی کشت ردیفی به سود دو گیاه زراعی بود. به‌نظر می‌رسد که در الگوی کشت مخلوط ردیفی شاید به‌دلیل آرایش کانوبی مناسب برای جذب نور و کاهش فشار رقابتی درون‌گونه‌ای در نهایت به افزایش عملکرد در این شرایط، در مقایسه با سایر الگوهای مخلوط منجر شده است [۱۴]. اگر اجزای تشکیل‌دهنده کشت مخلوط، در صورت انتخاب آرایش کاشت و تراکم مناسب در نحوه استفاده از منابع محیطی متفاوت عمل کنند، از این منابع به‌طور مؤثرتری استفاده خواهد شد و در نتیجه در چنین حالتی عملکرد افزایش می‌یابد [۳۵، ۳۸].

از طرف دیگر، نتایج سایر تحقیقات نشان می‌دهد که در کشت مخلوط سنتز متابولیت‌های ثانویه، از جمله اسانس افزایش می‌یابد و در این حالت امکان جذب حشرات گرده‌افشان زیادتر شده و تعداد گل‌های تلقیح‌شده

1. Land Equivalent Ratio


بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید

عملکرد گندم ۱۰-۲۵ درصد در کشت مخلوط به سبب رقابت برای جذب نور و نیتروژن در مرحله رویشی و آب در مرحله پر شدن دانه کاهش یافت [۳۵]. در مطالعه دیگری در کشت مخلوط نواری پنبه و گندم معلوم شد که با افزایش عرض نوارها عملکرد هر دو گونه به طور معناداری کاهش یافت که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد [۳۹].

افزایش می‌یابد و تولید دانه بیشتر خواهد شد. شاید یکی از دلایل دیگر بالا بودن عملکرد دانه شوید در کشت ردیفی را می‌توان به این مسئله نسبت داد [۲۴، ۲۶]. در تصدیق این موضوع، محققان در تحقیقات خود نشان دادند که هرچه از سمت کشت مخلوط ردیفی به سمت کشت مخلوط نواری سوق داده شود، عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی به تدریج کاهش می‌یابد [۶، ۱۴]. در بررسی کشت مخلوط نواری شبدر سفید و گندم نشان داده شد که

جدول ۱. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شده در این آزمایش

بافت خاک	شن (%)	سیلت (%)	رس (%)	اسیدیته	هدایت الکتریکی $EC \times 10^3$ (dS/m)	نیتروژن کل (%)	درصد مواد آلی	فسفر قابل جذب (ppm)	پتاسیم قابل جذب (ppm)
لومی	۳۵	۴۰	۲۵	۷/۷	۰/۸۳	۰/۱۴	۱/۴۸	۱۰/۵	۴۰۷



شکل ۱. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شوید

A: کشت خالص شوید، B: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، C: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، D: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، E: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید

(میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند.)


و کمترین مقدار آن (۲/۱۳ درصد) از تیمار کشت خالص حاصل شد. نتایج نشان داد سایر الگوهای کشت مخلوط نیز به جز کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید سبب افزایش معنادار درصد اسانس شوید نسبت به تیمار کشت خالص شدند (شکل ۲).

در مقایسه میانگین‌ها بالاترین عملکرد اسانس مربوط به کشت مخلوط ردیفی با میانگین ۸/۵۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید با میانگین ۳/۳۷ کیلوگرم در هکتار بود (شکل ۲). عملکرد اسانس برابندی از عملکرد دانه و درصد اسانس دانه است. بنابراین زیاد بودن عملکرد اسانس در کشت مخلوط ردیفی به دلیل زیاد بودن عملکرد دانه و درصد اسانس در این تیمار است.

در بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاو زبان اروپایی و لوبیا مشخص شد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گاو زبان اروپایی از کشت خالص و کمترین مقدار آنها از الگوی چهار ردیف لوبیا و گاو زبان (۴:۴) به دست آمد [۱۲]. نتایج پژوهش دیگری نشان داد که در کشت مخلوط ارزن دانه‌ای با لوبیا چشم‌بلبلی، عملکرد دانه ارزن در کشت خالص بیشتر از مخلوط است [۱۱]. محققان دیگری نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند [۸].

۲.۳. درصد و عملکرد اسانس

درصد و عملکرد اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف الگوی کشت قرار گرفتند ($P \leq 0.01$)، به طوری که بیشترین درصد اسانس (۳/۱ درصد) از تیمار کشت مخلوط ردیفی



شکل ۲. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر درصد اسانس و عملکرد اسانس شوید

A: کشت خالص شوید، B: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، C: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، D: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، E: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید

(میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند.)

کشت خالص تفاوت معناداری را نشان نداد، اما موقعی که به تیمارهای کشت مخلوط کود سبز اضافه شد، به دلیل افزایش غلظت نیتروژن و دسترسی نعنای به این عنصر غذایی مقدار اسانس نعنای به طور معناداری افزایش یافت [۳۲]. در کشت مخلوط مرزه با شبدر ایرانی، درصد اسانس مرزه بین تیمار کشت خالص و تیمارهای کشت مخلوط اختلاف معناداری را نشان نداد، اما عملکرد اسانس در تیمار کشت خالص به طور معناداری بیشتر از تیمارهای کشت مخلوط به دست آمد [۳]. نتایج سایر محققان نیز با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد [۷].

۳.۳. عملکرد دانه و بیولوژیکی لوبیا

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوی کشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی لوبیا در سطح احتمال ۱ درصد معنادار بود ($P \leq 0/01$). بیشترین عملکرد دانه (۱۶۳۰ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (۳۵۹۳ کیلوگرم در هکتار) به تیمار کشت مخلوط ردیفی و کمترین مقادیر عملکرد دانه (۴۱۴ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی لوبیا (۸۷۰ کیلوگرم در هکتار) به کشت مخلوط روی ردیف های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا) اختصاص داشت (شکل ۳). کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید دارای رتبه دوم از نظر تولید عملکرد در واحد سطح بود که نشان می دهد در کشت نواری تعداد ردیف اصلی ترین موضوع در افزایش عملکرد در واحد سطح بود و با توجه به تعداد ردیف بیشتر لوبیا در کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید در واحد سطح عملکرد بالاتر آن طبیعی بود. البته از نظر آماری اختلاف معناداری بین تیمار نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید با کشت خالص مشاهده نشد (شکل ۳).


در تیمار کشت خالص شاید افزایش رقابت

از آنجا که اسانس ها جزئی از متابولیت های ثانویه گیاهی هستند و مقدار آنها به شدت به مقدار متابولیت های اولیه گیاهی (کربوهیدرات ها، پروتئین ها، کلروفیل ها و غیره) بستگی دارد، هر عاملی که سبب افزایش فتوسنتز گیاهی شود می تواند متابولیت های ثانویه گیاهی از جمله اسانس ها را افزایش دهد [۳۲، ۲۴]. در کشت مخلوط لگوم ها با غیر لگوم ها، فشار رقابتی بین دو گونه بر سر جذب نیتروژن کاهش می یابد، زیرا لگوم ها بیشتر نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق تثبیت بیولوژیکی فراهم می آورد و گونه مجاور بیشتر از نیتروژن معدنی خاک استفاده می کند. در نتیجه کارایی مصرف عناصر غذایی مانند نیتروژن افزایش و به دنبال آن رشد و فتوسنتز گیاهی بهبود می یابد [۳۸]. از آنجا که نیتروژن یکی از عناصر غذایی مؤثر بر میزان فعالیت آنزیم های فتوسنتزی و در نتیجه مقدار اسانس گیاهان است، هر عاملی که سبب افزایش جذب نیتروژن گردد، در نهایت به افزایش اسانس گیاه منجر خواهد شد.

در بررسی کشت مخلوط بابونه و همیشه بهار مشخص شد که بیشترین مقدار اسانس در نسبت های کمتر از ۵۰:۵۰ حاصل شده است [۲]. با مطالعه کشت مخلوط نواری و ردیفی ریحان و لوبیا مشاهده شد که بیشترین عملکرد اسانس ریحان از کشت خالص به دست آمد. اما از نظر درصد اسانس بین تیمارها اختلاف معناداری مشاهده نشد [۱۰]. با بررسی کشت مخلوط سویا و نعنای بر عملکرد کیفیت اسانس نعنای گزارش شده است که عملکرد کمی و کیفی نعنای در کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود [۲۶]. محققان دیگری [۲۹] در کشت مخلوط شمعدانی عطری و نعنای دریافتند که عملکرد اسانس نعنای با افزایش عرض نوار از ۶۰ به ۱۲۰ سانتی متر به طور معناداری کاهش یافت، اما عملکرد اسانس شمعدانی عطری تحت تأثیر عرض نوار قرار نگرفت. بنابه گزارشی در کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و نعنای، تولید اسانس در کشت مخلوط با

مطلوبی را برای بوته‌های لوبیا در دستیابی به شرایط و منابع محیطی فراهم کرده است. پایین بودن عملکرد لوبیا نیز در تیمار کشت مخلوط بر روی ردیف‌های کاشت را می‌توان به افزایش رقابت بین‌گونه‌ای شوید با لوبیا روی ردیف‌های کاشت و کاهش فضای زیستی نسبت داد که سبب کاهش جذب نور و رشد و فتوسنتز لوبیا شده و به دنبال آن عملکرد آن را کاهش داده است. بنابراین گیاهان مورد استفاده در کشت مخلوط اگر براساس الگوی مناسب کشت انتخاب نشوند، عملکرد کاهش می‌یابد [۳۶]. نتایج آزمایش کشت مخلوط کنجد و نخود نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی هر دو گونه در کشت ردیفی بالاتر از سایر روش‌های کاشت بود. محققان علت آن را به آرایش فضایی مناسب‌تر و استفاده بهینه گیاهان از منابع طبیعی در این نوع کشت نسبت داده‌اند [۱]. محققان نتایج مشابهی را مبنی بر افزایش عملکرد دانه لوبیا در کشت مخلوط ردیفی گزارش کرده‌اند [۱۰].

درون‌گونه‌ای و از طرفی، حضور فراوان آفات متعدد سبب کاهش عملکرد لوبیا در کشت خالص شد. اما در تیمار کشت مخلوط ردیفی به دلیل تأثیرات تکمیل و تسهیل‌کنندگی بهتر گونه‌ها، افزایش جذب و مصرف فیزیولوژیکی منابع همچنین افزایش شکارگرهای طبیعی که سبب کاهش جمعیت آفات شد، عملکرد بالاتری را نسبت به سایر تیمارها تولید کرد [۱۴، ۳۶، ۳۸]. یک برگ یا کانوپی حتی در تراکم‌های مطلوب در کشت خالص نمی‌تواند به طور کامل از نور موجود استفاده کند [۳۶]. در واقع در زراعت‌های تک‌کشتی همواره مقادیری از تشعشع فتوسنتزی به دلیل وجود فضاهای خالی در کانوپی تلف می‌شود [۵]. مقدار این تلفات در زراعت‌های مخلوط به دلیل پوشش بیشتر سطح خاک کاهش می‌یابد و در نتیجه میزان جذب تشعشع کل به نسبت تک‌کشتی بیشتر می‌شود. همین مسئله به تنهایی می‌تواند عملکرد را افزایش دهد [۴۰]. به نظر می‌رسد آرایش کشت مخلوط ردیفی شرایط



شکل ۳. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی لوبیا

A: کشت خالص لوبیا، B: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، C: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، D: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، E: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید
(میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند.)


۳.۴. نسبت برابری زمین جزئی

نسبت برابری زمین جزئی لوبیا و شوید بین الگوهای مختلف کشت نشان داد که نسبت برابری زمین جزئی لوبیا نسبت به شوید بیشتر بود. بیشترین LER جزئی لوبیا (۱/۰۸) و شوید (۰/۸۲) از تیمار کشت مخلوط ردیفی و کمترین مقدار LER جزئی لوبیا (۰/۳) و شوید (۰/۵) از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد لوبیا + ۵۰ درصد شوید) به دست آمد (شکل ۴). با توجه به اینکه هر دو گونه در تیمار کشت مخلوط ردیفی از عملکرد بیشتری برخوردار بودند، به همین سبب توانسته بودند به LER بالا برسند. LER جزئی لوبیا در تمامی تیمارها بیشتر از شوید بود که می‌توان نتیجه گرفت لوبیا از کشت مخلوط با شوید اثر مثبت دریافت کرده است. در بررسی کشت مخلوط زیره سبز و نخود مشخص شد که LER جزئی زیره سبز بیشتر از نخود بود [۹]. در کشت مخلوط کنجد و شاهدانه نشان داده شد که در تیمارهای مختلف کشت مخلوط، LER جزئی شاهدانه بیشتر از کنجد بوده و از کشت مخلوط با کنجد اثر مثبت پذیرفته بود [۱۳]. در کشت مخلوط نواری لوبیا و گاوزبان مشخص شد که مقدار

نسبت برابری زمین جزئی هر دو گونه با افزایش عرض نوار به دلیل رقابت برون‌گونه‌ای کاهش یافت [۱۲].


۳.۵. نسبت برابری زمین کل

نتایج نشان داد که در تمامی تیمارهای مخلوط به جز تیمار کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، نسبت برابری زمین (LER) بیشتر از یک بود که این نشان از برتری عملکرد اقتصادی در کشت مخلوط آن تیمارها نسبت به کشت خالص آنها داشت. بیشترین مقدار LER (۱/۹) از الگوی کشت مخلوط ردیفی حاصل شد که بیانگر سودمندی زراعی ۹۰ درصدی کشت مخلوط نسبت به کشت‌های خالص این دو محصول نسبت به یکدیگر است که نشان می‌دهد کارایی بیشتر استفاده از زمین در سیستم کشت مخلوط است. کمترین مقدار LER (۰/۸) از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا) به دست آمد که ۲۰ درصد کاهش نسبت به تیمارهای خالص نشان داد. بنابراین، در این تیمار کشت خالص نسبت به کشت مخلوط برتری داشت.



شکل ۴. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر نسبت برابری زمین جزئی

A: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، B: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، C: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، D: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید (میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند.)



شکل ۵. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر نسبت برابری زمین کل

A: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، B: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، C: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، D: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید (میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند).

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بین آنها، تثبیت و جذب نیتروژن، کاهش فشار رقابتی بین دو گونه و کاهش رشد و زیست توده علف‌های هرز نسبت داد که موجب افزایش کارایی استفاده از زمین (LER) می‌شوند [۲۲، ۳۶، ۳۸]. در بررسی کشت مخلوط ذرت و باقلا، مقدار LER در تمام تیمارهای مخلوط بیشتر از یک به دست آمد که نشان‌دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص است [۳۰]. در کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله نیز نتایج مشابهی گزارش شده است [۷]. کشت مخلوط ردیفی لوبیا با گاو زبان سبب افزایش نسبت برابری زمین شد، به طوری که بیشترین مقدار (۱/۵۵) در عرض نوار ۲:۲ مشاهده شد [۱۲]. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد که بیشتر تیمارهای کشت مخلوط ریحان و لوبیا بر کشت خالص آنها برتری دارد و کشت مخلوط ردیفی بیشترین نسبت برابری زمین (۱/۴۳) را به خود اختصاص داد [۱۰].

مقدار LER در کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید (۱/۴۱) بیشتر از کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید (۱/۲۳) بود، اما از نظر آماری اختلاف معناداری بین این دو تیمار وجود نداشت (شکل ۵). در بررسی حاضر، مقادیر LER کشت مخلوط نواری کمتر از کشت ردیفی و بیشتر از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد لوبیا + ۵۰ درصد شوید) بود. در کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت به دلیل زیاد شدن اثر رقابت بین گونه‌ای و درون‌گونه‌ای شدید دو گونه سبب کاهش LER در این تیمار شد. در حالت کلی، در این آزمایش مشاهده شد که در الگوی کشت مخلوط ردیفی این عوامل در کل به سود دو گیاه زراعی بود. کشت مخلوط زمانی سودمند است که عملکرد دانه مخلوط، بیشتر از محصول تک‌کشتی باشد. اضافه عملکرد به دست آمده از کشت مخلوط را می‌توان به استفاده بهتر از منابع موجود توسط دو گونه، اختلافات

سبز (۵/۶۰ - ۲۳/۷۵ درصد) در الگوی کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت مشاهده شد (جدول ۴). در آزمایش حاضر کشت مخلوط موجب افزایش جمعیت دشمنان طبیعی و کاهش جمعیت آفات در مقایسه با کشت خالص شد.

توافق عمومی بر این است که تنوع گونه‌ها در سیستم کشت مخلوط بیشتر مشکلات ناشی از آفات را کاهش می‌دهد که ممکن است به دلیل افزایش جمعیت شکارگرها و پارازیت‌ها، سیستم منابع غذایی متعدد و کافی در زمان‌های متفاوت در طی فصل رشد برای دشمنان طبیعی، کاهش جمعیت یا تکثیر آفات، وجود مواد شیمیایی بازدارنده، سردرگمی آفات در پیدا کردن میزبان، تغییر در شرایط میکروکلیماتیکی کانوپی و حضور گیاه غیرمیزبان در این سیستم باشد. همچنین ترکیبات آروماتیک بعضی گیاهان به خصوص گیاهان دارویی می‌تواند رفتار حشرات را تغییر دهد. چراکه بعضی از این ترکیبات جذب‌کننده و برخی دفع‌کننده حشرات هستند [۴، ۱۷، ۳۶]. کشت مخلوط از طریق کاهش تراکم گیاه میزبان و علف‌های هرز، تغییر کیفیت میزبان از طریق تأثیرات متقابل گیاه-گیاه و افزایش جمعیت دشمنان طبیعی می‌تواند سبب کاهش جمعیت آفات شود [۱۸، ۲۵]. در همین راستا برخی محققان معتقدند که کشت مخلوط با افزایش جمعیت دشمنان طبیعی موجب کاهش جمعیت حشرات آفت می‌شود (جدول ۴). دلیل آن کاهش نوسان جمعیت دشمنان طبیعی در کشت مخلوط به علت کاهش تنوع گونه‌های شکارگر و گیاه میزبان و همچنین ایجاد پناهگاهی برای شکار است [۱۷]. با بررسی اثر کشت مخلوط رازیانه با خردل گزارش شده که در کشت مخلوط جمعیت شته به‌طور معناداری کمتر از کشت خالص بود [۳۱]. در بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا مشخص شد که بیشترین جمعیت

۳.۶. اثر کشت مخلوط لوبیا و شوید بر تراکم نسبی و تنوع حشرات


براساس نتیجه به دست آمده، یازده گونه حشره در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید مشاهده شد (جدول ۴). مهم‌ترین گونه‌های حشرات زیان‌آور شامل شته سبز هلو^۱، شته جالیز^۲، تریپس^۳، سوسک گرده‌خوار^۴، سن بذرخوار^۵ و مگس سفید^۶ بود. علاوه بر آفات مذکور، پنج گونه حشره مفید (شکارگرهای طبیعی) در ارتباط با حشرات زیان‌آور جمع‌آوری و شناسایی شد که شامل بالتوری سبز^۷، کفشدوزک هفت نقطه‌ای^۸، مگس سیرفید^۹، زنبور پارازیتوئید^{۱۰} و سوسک شکارگر^{۱۱} بودند (جدول ۴). کمترین شاخص شانون (۰/۸۷) از کشت خالص لوبیا و بیشترین مقدار آن از کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد لوبیا + ۵۰ درصد شوید) (۰/۹۲) بر روی ردیف کاشت به دست آمد (شکل ۶). از نظر آماری اختلاف معناداری بین الگوهای مختلف کشت مخلوط با کشت خالص شوید از نظر شاخص شانون مشاهده نشد. به نظر می‌رسد که در کشت مخلوط، حضور شوید از طریق جذب حشرات گرده‌افشان و دشمنان طبیعی سبب افزایش تنوع حشرات شده و افزایش شکارگرهای طبیعی نیز موجب کاهش جمعیت شته و سایر آفات شده است.

در بین الگوهای مختلف کشت بیشترین دامنه تراکم نسبی را شته سبز (۴/۷۸ - ۳۲/۴۱ درصد) در بین حشرات زیان‌آور در کشت خالص لوبیا به خود اختصاص داد و بیشترین دامنه تراکم نسبی برای شکارگر طبیعی بالتوری

1. Myzuspersicae sulzer
2. Aphis gossypii
3. Thrips tabaci
4. Oxythyrea cinctella
5. Nysius cymoides
6. Trialeurodes vaporarium
7. Chrysoperla carnea
8. Coccinella septempunctata
9. Paragus compeditus
10. Trichogramma sp.
11. Carabus sp.

در بررسی حاضر، شایان ذکر است که کشت مخلوط لوبیا و شوید سبب جذب حشرات مفید و گرده‌افشان به‌خصوص زنبور عسل^۱ نیز شد که حضور آنها در اکوسیستم‌های زراعی اهمیت زیادی دارد. از آنجا که شوید گیاهی دگرگرده‌افشان است و برای تولید بذر به حشرات گرده‌افشان نیاز دارد، در صورت فعالیت زنبورهای گرده‌افشان در مزارع شوید به دلیل سنتز متابولیت‌های ثانویه، از جمله اسانس ممکن است با امکان جذب حشرات گرده‌افشان و افزایش تعداد گل‌های تلقیح‌شده، تولید دانه نیز بیشتر شود.

شکارگرهای طبیعی در کشت مخلوط دو ردیف لوبیا + دو ردیف گاوزبان و بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا به‌دست آمد [۱۲]. همچنین نتایج تحقیق دیگری نشان داد که جمعیت آفات در کشت مخلوط به دلیل دشمنان طبیعی کاهش می‌یابد [۳۴] که با نتیجه آزمایش حاضر مطابقت دارد. نتایج آزمایش دیگری در کشت مخلوط گندم و کلزا نشان داد که جمعیت آفات به‌خصوص شته‌ها در کشت مخلوط به‌طور معناداری کاهش یافت. آنان علت کاهش جمعیت شته‌ها را به افزایش جمعیت شکارگرهای طبیعی و مقاومت گندم در برابر شته‌ها نسبت دادند، زیرا گندم میزبان اصلی شته‌ها محسوب نمی‌شود و شته‌ها در پیدا کردن میزبان اصلی خود (کلزا) دچار سردرگمی می‌شوند [۳۷].



شکل ۶. اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید بر شاخص شانون جمعیت حشرات

A: کشت خالص لوبیا، B: کشت خالص شوید، C: کشت مخلوط روی ردیف‌های کاشت (۵۰ درصد شوید + ۵۰ درصد لوبیا)، D: کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف لوبیا + یک ردیف شوید)، E: کشت مخلوط نواری دو ردیف لوبیا + چهار ردیف شوید، F: کشت مخلوط نواری چهار ردیف لوبیا + دو ردیف شوید (میانگین‌های دارای حروف مشترک اختلاف معناداری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند).

1. Apis melliferaL

بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید

جدول ۴. تراکم نسبی گونه‌های حشرات در الگوهای مختلف کشت مخلوط لوبیا و شوید

الگوهای مختلف کشت							گونه‌های حشرات
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	تیره	
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	تیره	گونه‌های حشرات
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	تیره	گونه‌های حشرات
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	تیره	گونه‌های حشرات
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	تیره	گونه‌های حشرات
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Aphididae	شته سبز
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Aphididae	شته جالیز
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Thripidae	تریپس
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Scarabaeidae	سوسک گرده‌خوار
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Lygaeidae	سن بذر خوار
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Aleyrodidae	مگس سفید
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Chrysopidae	بالتوری سبز
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Coccinellidae	کفشدوزک هفت نقطه‌ای
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Syrphidae	مگس سیرفید
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Trichogrammatidae	زنبور پارازیتوئید
کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت مخلوط	کشت خالص	کشت خالص لوبیا	Carabidae	سوسک شکارگر

۴. نتیجه گیری

طرفی افزایش تنوع گونه‌ای می‌تواند در جذب حشرات مفید نقش مؤثرتری داشته باشد که این عامل خود در عملکرد نهایی گیاه بی‌تأثیر نیست. همچنین کشت مخلوط از طریق افزایش شکارگرهای طبیعی سبب کاهش جمعیت آفات شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کشت مخلوط یکی از راهکارهای مناسب برای دسترسی به عملکرد مطلوب با حداقل مصرف یا بدون مصرف نهاده‌های خارجی است که در بلندمدت به کاهش یا عدم وابستگی سیستم‌های زراعی به نهاده‌های شیمیایی آنها منجر می‌شود.

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که عملکرد لوبیا و شوید تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار گرفت. با تغییر الگوی کشت مخلوط ردیفی به سمت کشت مخلوط نواری به دلیل کاهش تأثیرات تسهیل و تکمیل‌کنندگی دو گونه، عملکرد هر دو گونه و LER کاهش یافت. طی تحقیق حاضر اسانس شوید در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص افزایش یافت. از طرفی حشرات مفید بیشتری جذب سیستم کشت مخلوط شدند که نشان داد اسانس شوید و از

منابع

۱. پورامیر ف، کوچکی ع، نصیری محلاتی م و قربانی ر (۱۳۸۹) ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنگد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی. پژوهش‌های زراعی ایران. ۸(۵): ۷۴۷-۷۵۷.
۲. جهان م (۱۳۸۴) بررسی جنبه‌های اکولوژیکی کشت مخلوط بابونه و گل همیشه‌بهار. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت.
۳. حسن‌زاده اول ف، کوچکی ع، خزاعی ح ر و نصیری محلاتی م (۱۳۸۹) اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه در کشت مخلوط. پژوهش‌های زراعی ایران. ۸(۶): ۹۲۰-۹۲۹.
۴. حسن‌زاده قورت تپه ع و صالح‌زاده ح (۱۳۸۹) تنوع زیستی در اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد ارومیه، ارومیه. ۲۶۶ ص.
۵. رضایی چیانه ا، دباغ محمدی نسب ع، شکبیا م ر، قاسمی گل‌عذانی ک و اهری‌زاد س (۱۳۸۹) بررسی دریافت نور و برخی ویژگی‌های کانوپی در کشت‌های خالص و مخلوط ذرت و باقلا. بوم‌شناسی کشاورزی. ۳(۲): ۴۳۷-۴۴۷.
۶. رضوان‌بیدختی ش (۱۳۸۳) مقایسه ترکیب‌های مختلف کشت در مخلوط ذرت و لوبیا. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت.
۷. رضوانی‌مقدم پ و مرادی ر (۱۳۹۱) بررسی تاریخ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیله. علوم گیاهان زراعی. ۴۳(۲): ۲۱۷-۲۳۰.
۸. شایگان م، مظاهری د، رحیمیان مشهدی ح و پیغمبری س ع (۱۳۸۷) اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ارزن دم‌روباهی بر عملکرد دانه آنها و کنترل علف‌های هرز. علوم زراعی ایران. ۱۰(۱): ۳۱-۴۶.
۹. عباسی‌علی کمر ر، حجازی ا، اکبری غ ع، کافی م و زند ا (۱۳۸۵) بررسی اثر تراکم‌های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علف‌های هرز. پژوهش‌های زراعی ایران. ۴(۱): ۸۳-۹۵.
۱۰. علی‌زاده، کوچکی ع ر و نصیری محلاتی م (۱۳۸۹) بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط. بوم‌شناسی کشاورزی. ۳(۲): ۳۸۳-۳۹۷.
۱۱. قنبری ا، نصیری‌پور م و توسلی ا (۱۳۸۹) بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی کشت مخلوط ارزن دانه-ای لوبیا چشم بلبلی. بوم‌شناسی کشاورزی. ۴(۲): ۵۵۶-۵۶۴.
۱۲. کوچکی ع، شباهنگ ج، خرم دل س و غفوری ا (۱۳۹۱) بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا. بوم‌شناسی کشاورزی. ۲(۱): ۱-۱۱.
۱۳. کوچکی ع، نصیری محلاتی م، خرم دل س، انورخواه س، ثابت تیموری م و سنجانی س (۱۳۸۹) مطالعه شاخص‌های رشد شاهدانه و کنگد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی. بوم‌شناسی کشاورزی. ۲(۱): ۲۷-۳۶.
۱۴. کوچکی ع، نصیری محلاتی م، فیضی ح، امیرمرادی ش و مندی ف (۱۳۸۹) اثر کشت مخلوط نواری ذرت و لوبیا بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز. بوم‌شناسی کشاورزی. ۲(۲): ۲۲۵-۲۳۵.

26. Maffei M and Mucciarelli A (2003) Essential oil yield in peppermint/soybean strip intercropping. *Field Crops Research*. 84: 229-240.
27. Morris RA and Garrity DP (1993) Resource capture and utilization in intercropping: *Water Field Crops Research*. 34: 303-317.
28. Odhiambo GD and Ariga ES (2001) Effect of intercropping maize and beans on Striga incidence and grain yield. Seventh Eastern and Southern Africa Regional Maize Conference. Pp. 183-186
29. Rajsawara RBR (2002) Biomass yield, essential oil yield and essential oil composition of rose-scented geranium (*Pelargonium species*) as influenced by row Spacing and intercropping with cornmint (*Mentha arvensis* L.f. piperascens Malin. ex Holmes). *Industrial Crops and Products*. 16: 133-144.
30. Rezaeichianeh E, Dabbagh Mohammadi Nassab A, Shakiba MR, Ghassemi-Golezani K and Aharizad S (2011) Intercropping of maize (*Zea mays* L.) and faba bean (*Vicia faba* L.) at different plant population densities. *African Journal of Agricultural Research*. 7: 1786-1793.
31. Singh D and Kothari SK (1997) Intercropping effects on mustard aphid (*Lipaphis erysimi* Kaltenbach.) populations. *Crop Science*. 37: 1263-1264.
32. Singh M, Singh A, Singh RS, Tripathi AK, Singh D and Patra D (2010) Cowpea (*Vigna unguiculata* L. Walp.) as a green manure to improve the productivity of a menthol mint (*Mentha arvensis* L.) intercropping system. *Industrial Crops and Products*. 31: 289-293.
33. Speight MR (1983) The potential of ecosystem management for pest control. *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 10: 183-193.
۱۵. مظاهری د (۱۳۷۳) زراعت مخلوط. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۲۶۲ ص.
۱۶. مظاهری د و آقا علیخانی م (۱۳۷۷). بوم‌شناسی گیاهان گرمسیری. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ۵۰۶ ص.
17. Bukovinszky T, Van Lenteren JC and Vet LEM (2005) Functioning of Natural Enemies in Mixed Cropping Systems. *Encyclopedia of Pest Management*. www.Informaworld.com.
18. Finck MR and Karpenstein-Machan M (2002) Intercropping for Pest Management. *Encyclopedia of Pest Management*. www.Informaworld.com.
19. Francis CA (1989) Biological efficiencies in multiple cropping systems. *Advances in Agronomy*. 42: 1-41.
20. Francis CA, Flor CA and Pragner M (1978) Effects of bean associated on yields and yields components of maize. *Crop Sciences*. 18: 760-764.
21. Gliessman SR (1997) *Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture*, Arbor Press, 357 p.
22. Haugaardnielsen H, Ambus P and Jensen ES (2001) Inter-specific competition, N-use and interference with weed in pea – barley intercropping. *Field Crops Research*. 70: 101-109.
23. Hooks GRR and Johnson MW (2003) Impact of agricultural diversification on the insect community of cruciferous crops. *Crop Protection*. 22: 223-238.
24. Hornok L (1980) Effect of nutrition supply on yield of dill (*Anethum graveolens* L.) and its essential oil content. *Acta Horticulture*. 96: 337.
25. Johnsoton SA, Springer JK and Lewis GD (1979) *Fusarium moniliforme* as a cause of stem and crown rot of asparagus and its association with asparagus decline. *Phytopathology*. 69: 778-780.

34. Srinivasa Rao M, Rama Rao CA, Srinivasc K, Pratibha SM, Vidya Sekhar G, Sree Vani G and Venkateswarlu B (2012) Intercropping for management of insect pests of castor, *Ricinus communis*, in the semi-arid tropics of India. *Insect Science*. 12: 1-14.
35. Thorsted MD, Olesen JE and Weiner S (2006) Width of clover strips and wheat rows influence grain yield in winter wheat/white clover intercropping. *Field Crops Research*. 95: 280-290.
36. Vandermeer JH (1989) *The Ecology of Intercropping*, Cambridge, University Press, 297 p.
37. Wang W, Liu Y, Chen J, Xianglong J, Zhou H and Wang G (2009) Impact of intercropping aphid-resistant wheat cultivars with oilseed rape on wheat aphid (*Sitobion avenae*) and its natural enemies. *Acta Ecologica Sinica* 29: 186-191.
38. Willey RW (1990) Resource use in intercropping system. *Agriculture Water Management*. 17: 215-231.
39. Zhang L, Van der WW, Zhang S, Li B and Spiertz JHJ (2007) Growth, yield and quality of wheat and cotton in relay strip intercropping systems. *Field Crops Research*. 103: 178-188.
40. Zhang L, Van der WW, Bastiaans L, Zhang S, Li B and Spiertz JHJ (2008) Light interception and utilization in relay intercrops of wheat and cotton. *Field Crops Research*. 107: 29-42.