



پژوهشی کشاورزی

دوره ۱۶ ■ شماره ۳ ■ پاییز ۱۳۹۳

صفحه‌های ۶۶۳-۶۷۴

مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌بریده

عبدالحسین رضایی‌نژاد^{۱*}، احمد اسماعیلی^۲

۱. استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
۲. استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

تاریخ وصول مقاله: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵

چکیده

در این پژوهش، ویژگی‌های پس از برداشت هشت رقم رز شاخه‌بریده ('النتاین', 'کینگ‌پراید', 'پریمادونا', 'بلک‌باکارا', 'ویکتوری', 'پاپاگایو', 'رویال‌باکارا' و 'یلو‌آیلند') در پاییز ۱۳۸۷ در اتفاقی با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۵۰ درصد و شدت نور ۱۰ میکرومول بر مترمربع در ثانیه مطالعه شد. نتایج حاکی از تفاوت بسیار معنادار در همه ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی اندازه‌گیری شده بین ارقام مورد مطالعه بود. 'کینگ‌پراید' با ۱۷/۷ روز بیشترین و 'پاپاگایو' با ۹/۴ روز کمترین عمر گل را نشان داد. بعد از 'کینگ‌پراید' ارقام 'رویال‌باکارا', 'یلو‌آیلند' و 'بلک‌باکارا' عمر بالایی داشتند. 'یلو‌آیلند' و 'کینگ‌پراید' بیشترین و 'پاپاگایو' کمترین قطر دمگل را داشتند. سریع‌ترین کاهش وزن تر در 'پاپاگایو' و کمترین کاهش در 'کینگ‌پراید' و 'یلو‌آیلند' اتفاق افتاد. همچنین، 'کینگ‌پراید' بیشترین جذب آب و 'پاپاگایو' بیشترین تعرق را نشان دادند. در 'ویکتوری' کمترین جذب آب و تعرق مشاهده شد اما بیشتر گل‌های آن به طور کامل باز نشد. همچنین، 'کینگ‌پراید' و 'پاپاگایو' به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تراکم روزنه بودند. به طور کلی، ارقامی که دارای قطر گل، قطر دمگل، وزن تر نسبی، میزان جذب آب و تراکم روزنه‌ای بالاتری بودند، عمر گل جایی بیشتری داشتند. در نهایت، ارقام 'کینگ‌پراید', 'رویال‌باکارا' و 'یلو‌آیلند' بهترین ارقام از نظر عمر گل جایی و ویژگی‌های پس از برداشت معرفی شد.

کلیدواژه‌ها: تراکم روزنها، تعرق، سرعت بازشدن گل، عمر گل جایی، وزن تر نسبی.

نتایج این پژوهش‌ها نتیجه‌گیری شد که ارقام با عمر گل جایی بالاتر آب کمتری از دست می‌دهند (۱۲) و تراکم روزنهمای کمتری دارند (۱۳). در این راستا، گروهی از پژوهشگران گزارش کردند که ارقام مختلف رز نسبت به پرورش در رطوبت بالای گلخانه عکس‌العمل متفاوتی از نظر عمر گل جایی نشان می‌دهند (۴). در این پژوهش مشخص شد که عمر گل جایی و تراکم روزنهمای رقم "پروفیتا" نسبت به "فریسکو"^۳ در رطوبت بالای گلخانه بیشتر است و عکس‌العمل روزنهمای این رقم به محرك‌های بسته‌شدن روزن‌ههای نظیر تنفس خشکی یا کاربرد برون‌زای هورمون اسید آبسیزیک بیشتر از رقم حساس "فریسکو"^۴ است (۴).

در مقایسه هشت رقم رز گزارش شد که عمر گل جایی آن‌ها با هم متفاوت است و رقم "پرتی و من"^۵ بالاترین و "بریدال‌پینک"^۶ کمترین عمر گل جایی را داشت (۸). گروهی دیگر از پژوهشگران علت بیشتر بودن عمر گل بریده رز رقم "دلایلا"^۷ نسبت به رقم "سونیا"^۸ را بالاتر بودن میزان کربوهیدرات‌های محلول موجود در گلبرگ‌های آن دانستند (۷). همچنین گزارش کردند که رقم "دلایلا"^۷ نسبت به سونیا حساسیت پیش‌تری به اتیلن دارد (۷). در مقایسه پنج رقم رز مینیاتور نشان داده شد که رقم "وانیلا"^۸ بهترین ویژگی‌های پس از برداشت را داشت و علت آن به کم بودن میزان اتیلن، همچنین کم بودن عکس‌العمل این رقم به خاصیت اتوکاتالیزوری اتیلن نسبت داده شد (۱۴).

در پژوهشی گزارش شد که ارقام مختلف آهار عمر گل جایی متفاوتی دارند و در شرایطی که قطر آوندهای چوبی کمتر باشد، جذب آب بهتر صورت می‌گیرد و عمر

۱. مقدمه

گل بریده رز (ورد) یکی از مهم‌ترین گل‌های شاخه‌بریده در ایران و جهان است که تولید آن در شهرهای مختلف ایران رو به افزایش است. کاهش کیفیت گل‌های بریده از زمان برداشت تا رسیدن به بازارهای گل یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تولیدکنندگان گل‌های بریده با آن رویه‌رویند (۲، ۱۰). عوامل متعددی عمر پس از برداشت گل‌های بریده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوامل به دو دسته عوامل قبل از برداشت و بعد از برداشت تقسیم می‌شوند (۱، ۲، ۱۰). نوع رقم، وضعیت آبیاری و تغذیه، شرایط آب‌وهوای نظیر دما، رطوبت هوا و شدت نور در حین رشد از مهم‌ترین عوامل قبل از برداشت‌اند (۷، ۹، ۱۲، ۱۹). دما و رطوبت انبار، غلظت گاز اتیلن در انبار و در بافت‌های گل و میزان آلدگی سطحی یا سیستم آوندی به میکروارگانیسم‌ها در شاخه‌های بریده از عوامل پس از برداشت محسوب می‌شود (۱۰، ۳، ۵).

آنچه باعث کاهش کیفیت و عمر گل‌های بریده می‌شود عمدهاً شامل عدم تعادل بین جذب آب از طریق آوندهای چوبی و از دست رفتن آب از طریق روزنهمای هوای (تعرق) است (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹). در این میان، ارقام مختلف گل بریده واکنش‌های متفاوتی به حفظ کیفیت و ایجاد تعادل بین جذب و دفع آب نشان می‌دهند که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت و عمر گل جایی این ارقام می‌شود. در مقایسه چهارده رقم رز با هم آشکار شد که کیفیت و عمر گل بریده آن‌ها در شرایط رشدی یکسان با هم متفاوت است (۱۲). در پژوهشی دیگر با مقایسه شش رقم رز گزارش شد که ویژگی‌های پس از برداشت آن‌ها با هم متفاوت است و ارقام "پروفیتا"^۱ و "کولیندا"^۲ به ترتیب بالاترین و کمترین عمر گل جایی را داشت (۱۳). براساس

- 3. Frisco
- 4. Pretty Woman
- 5. Bridal Pink
- 6. Delilah
- 7. Sonia
- 8. Vanilla

- 1. Prophylta
- 2. Colinda

بزرگ‌باشوارزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انتقال یافت. در آزمایشگاه، ابتدا چند سانتی‌متر پایین شاخه‌ها در داخل ظرف آب قطع شد تا هوای مکیده شده به داخل آوندهای چوبی تا حد امکان حذف شود. سپس، برگ‌های پایین شاخه‌ها حذف و فقط سه برگ بالایی نگه داشته شد. شاخه‌ها پس از توزین درون ارلن‌مایرهای مجزای ۵۰۰ میلی‌لیتری حاوی محلول ساکاراز ۱ درصد و ۲۰ میکرولیتر در لیتر هیپوکلریت سدیم قرار گرفتند.

اتاق اندازه‌گیری دمای 20 ± 1 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 50 ± 5 درصد، و شدت نور 10 میلی‌مول بر مترمربع در ثانیه (با لامپ‌های مهتابی پارس) داشت. طی آزمایش وزن تر نسبی شاخه‌بریده، میزان جذب آب و میزان از دست رفتن آب (از طریق تعرق) به روش وزنی اندازه‌گیری شد. برای این کار وزن شاخه‌بریده، وزن محلول و وزن کل (وزن شاخه‌بریده + وزن محلول) به صورت روزانه اندازه‌گیری و براساس روابط زیر ویژگی‌های مورد نظر محاسبه شد.

(۱) $100 \times (FW_t / FW_0) =$ وزن تر نسبی (%)
در این رابطه، FW_t وزن شاخه‌بریده (g) در روزهای صفر، یک، دو و ... و FW_0 وزن شاخه‌بریده (g) در روز صفر است.

(۲)

$(ml/d/gFW_0) =$ میزان جذب آب
در این رابطه، S_t وزن محلول (g) در روزهای صفر، یک، دو و ...، S_{t-1} وزن محلول (g) در روز قبل و FW_0 وزن شاخه‌بریده (g) در روز صفر است.

(۳) $(TW_{t-1} - TW_t) / FW_0 =$ میزان تعرق (%)
در این رابطه، TW_t وزن کل (g) در روزهای صفر، یک، دو و ..., TW_{t-1} وزن کل (g) در روز قبل و FW_0 وزن شاخه‌بریده (g) در روز صفر است.

همچنین، قطر گل و قطر دمگل با کولیس و عمر گل

گل بریده بیشتر می‌شود (۱۹). گروهی از پژوهشگران ۴۷ رقم 'لیزیانتوس' را با هم مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که رقم 'آلیس‌وایت'^۱ با ۳۱ روز بیشترین عمر گل و رقم 'کاتالینایلو'^۲ با ده روز کمترین عمر گل را داراست (۶). همچنین، در مقایسه چهار رقم رز نشان داده شد که در ارقام با قطر دمگل بالاتر و تعادل آبی بهتر عمر گل بریده بیشتر است (۱۱). لذا، مطالعه و مقایسه بین ارقام مختلف از نظر ویژگی‌های مؤثر در افزایش عمر گل بریده ضمن مشخص کردن ارقام برتر از نظر کیفیت و عمر گل جایی، به منظور افزایش عمر گل‌های بریده و حفظ کیفیت آن‌ها اطلاعات فیزیولوژیکی مهمی ارائه می‌دهد.

۲. مواد و روش‌ها

در این پژوهش، هشت رقم رز به نام‌های 'والتاين'^۳، 'کینگ‌پراید'^۴، 'پریمادونا'^۵، 'بلک‌باقارا'^۶، 'ویکتوری'^۷، 'پاپاگایو'^۸، 'رویال‌باقارا'^۹ و 'یلوایلند'^{۱۰} از شرکت تعاضی تولید رز گلخانه‌ای رنگینه‌گل خرم‌آباد تهیه شد. این ارقام در پاییز ۱۳۸۷ از پایه‌های هلندی سه‌ساله‌ای برداشت شد که در شرایط یکسان در دمای 20 ± 2 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 70 ± 5 درصد در مخلوطی خاکی با بافت شنی رسی هوموسدار و اسیدیتة $6/5$ پرورش یافته بودند. در این پژوهش دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، ابتدا تمام ارقام هنگام صبح با چاقوی تیز ضدغوفونی شده از گلخانه برداشت شد و بلافضله درون سطل حاوی آب قرار گرفت و با پلاستیک پوشانده شد و به آزمایشگاه

1. Alice White
2. Catalina Yellow
3. Valentine
4. King Pride
5. Prima Donna
6. Black Baccara
7. Victory
8. Papagayo
9. Royal Baccara
10. Yellow Island


۳. نتایج و بحث

عمر گل جایی (طول عمر گل‌های بریده)

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر عمر گل جایی تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم 'کینگ پراید' با ۱۷/۷ روز بالاترین عمر گل و رقم 'پاپاگایو' با ۹/۴ روز حداقل عمر گل را داشت (شکل ۱). بعد از 'کینگ پراید'، ارقام 'بلک باکارا'، 'یلوایلندر' و 'رویال باکارا' عمر بالایی نشان دادند و ارقام 'التاین'، 'ویکتوری' و 'پریمادونا' در دسته سوم قرار گرفت.

قطر دمگل

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر قطر دمگل تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم 'یلوایلندر' با ۰/۷۴ سانتی متر بالاترین و رقم 'پاپاگایو' با ۰/۴۲ سانتی متر کمترین قطر دمگل را داشت (شکل ۲). رقم 'کینگ پراید' از نظر قطر دمگل با 'یلوایلندر' تفاوت معناداری نداشت. از طرفی، در رقم 'پاپاگایو' کمترین قطر دمگل، همچنین کمترین عمر گل مشاهده شد. بنابراین، بیشتر بودن قطر دمگل در افزایش عمر گل بریده مؤثر است.



شکل ۱. مقایسه میانگین عمر گل جایی در ارقام مختلف گل بریده رز.
میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.


بریده به روش مشاهده‌ای ثبت شد. پایان عمر گل بریده رز از زمان قرار گرفتن در ارلن تا زمان پژمرده شدن دو ردیف بیرونی گلبرگ و یا ظهور خمیدگی گردن گل^۱ در نظر گرفته شد. آزمایش براساس طرح بلوك‌های کامل تصادفی با پنج تکرار صورت گرفت و در هر تکرار دو شاخه از هر رقم استفاده شد.

در آزمایش دوم، مقایسه‌ای بین ارقام از نظر ویژگی‌های روزنامه‌ای انجام شد. برگچه انتهایی برگ چهارم که از روی شاخه‌ها در گل‌های بریده استفاده شده در آزمایش اول حذف شده بود برای اندازه‌گیری ویژگی‌های روزنامه‌ای ارقام استفاده شد؛ به این صورت که از اپیدرم تحتانی برگچه انتهایی برگ چهارم هر رقم به روش کپی‌برداری با استفاده از لک ناخن اسلامیدهای میکروسکوپی تهیه و با استفاده از روش عکسبرداری میکروسکوپی با بزرگنمایی‌های ۱۰ و ۴۰ همچنین با استفاده از نرم‌افزار ایمیج تولز^۲ تراکم روزنامه‌ای و اندازه سلول‌های روزنامه (طول و عرض سلول‌های محافظه روزنامه) اندازه‌گیری و محاسبه شد (۱۵).


این آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی با ده تکرار انجام شد و برای اندازه‌گیری طول و عرض سلول‌های روزنامه حداقل ده روزنامه به‌طور تصادفی از هر اسلامید مربوط به اپیدرم یک برگ عکس‌برداری شد و میانگین اندازه آن‌ها اندازه روزنامه در آن تکرار در نظر گرفته شد. برای اندازه‌گیری تراکم روزنامه نیز از هر اسلامید دو عکس به‌طور تصادفی تهیه و میانگین آن‌ها تراکم روزنامه در آن تکرار در نظر گرفته شد.

در نهایت داده‌های حاصل از آزمایش‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری *MSTAT C* و *Prism 4* و *Excel* آنالیز شده و از آزمون چنددامنه‌ای دانکن برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. نمودارها با نرم‌افزار *Prism 4* رسم شد.

1. Bent neck
2. Image Tools (University of Texas, TX)



شکل ۳. مقایسه میانگین قطر گل در ارقام مختلف گل‌بریده رز.
میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، قادر اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.



شکل ۲. مقایسه میانگین قطر دمگل در ارقام مختلف گل‌بریده رز.
میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، قادر اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.

سرعت بازشدن غنچه گل


براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر سرعت بازشدن غنچه گل تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم ‘پاپاگایو’ با ۲/۶۰۲ میلی‌متر در روز بالاترین و رقم ‘ویکتوری’ با ۰/۸۶۸ میلی‌متر در روز پایین‌ترین سرعت بازشدن غنچه را داشت (شکل ۴). همان‌طور که در رقم ‘پاپاگایو’ در این آزمایش مشاهده شد، بالا بودن سرعت بازشدن غنچه گل ممکن است برای مصرف‌کننده لذت بیشتری ایجاد کند ولی باعث کاهش عمر گل بریده می‌شود. اما مشکل دیگر، کاهش سرعت بازشدن غنچه گل یا حتی بازنشدن غنچه گل است که این حالت در رقم ‘ویکتوری’ در این آزمایش دیده شد. ارقام ‘کینگ پراید’، ‘رویال‌باکارا’ و ‘یلو‌آیلند’ ضمن نشان دادن سرعت متوسط در بازشدن غنچه‌ها، عمر گل بیشتری داشتند.

قطر گل


قطر گل از نظر حداقل قطر گل و سرعت بازشدن غنچه گل قابل بررسی است. براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر قطر گل تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم ‘یلو‌آیلند’ با ۴/۸۷ سانتی‌متر بیشترین قطر گل را داشت و بعد از آن رقم ‘کینگ پراید’ با ۴/۴۸ سانتی‌متر قرار داشت. از نظر آماری، تفاوتی بین این دو رقم وجود نداشت (شکل ۳). رقم‌های ‘ویکتوری’ و ‘بلک‌باکارا’ به ترتیب با ۳/۱ و ۳/۳۵ سانتی‌متر حداقل قطر گل را نشان دادند. کم بودن قطر گل ممکن است به علت کوچک بودن طبیعی گل در یک رقم باشد، هرچند تأثیر فاکتور رشد طی پرورش گل نیز قابل بحث است و به بازنشدن مناسب غنچه گل نسبت داده می‌شود. در این آزمایش مشاهده شد که در رقم ‘بلک‌باکارا’ گل به طور کامل باز شد. گل در این رقم به‌طور طبیعی کوچک است ولی در رقم ‘ویکتوری’ سیاری از غنچه‌های گل کامل باز نمی‌شوند.

بهزایی کشاورزی

حفظ وزن تر در شاخه بریده باعث جلوگیری از پژمردگی گل می شود و عمر گل را افزایش می دهد. همچنین، از نظر روند تغییرات وزن تر با زمان، سریع ترین کاهش در وزن تر در رقم ‘پاگاکایو’ و حداقل کاهش در ارقام ‘کینگ پراید’ و ‘یلوآیلند’ اتفاق افتاد (شکل ۶). ارقام ‘یلوآیلند’ و ‘کینگ پراید’ بیشترین وزن تر نسبی را در طول آزمایش داشتند و رقم ‘پاگاکایو’ با اینکه تا روز پنجم وزن تر نسبی بالایی از خود نشان داد، ولی پس از آن به سرعت کاهش وزن داشت و کمترین وزن تر نسبی را در بین تمامی ارقام به خود اختصاص داد.



شکل ۵ مقایسه میانگین وزن تر نسبی در ارقام مختلف گل بریده رز. میانگین هایی که حداقل یک حرف مشترک داشتند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.




شکل ۴. مقایسه میانگین سرعت بازشدن غنچه گل در ارقام مختلف گل بریده رز.

میانگین هایی که حداقل یک حرف مشترک داشتند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.


وزن تر نسبی شاخه بریده

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر میانگین وزن تر نسبی تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که ارقام ‘یلوآیلند’ و ‘کینگ پراید’ بالاترین میانگین وزن تر نسبی را داشتند و سایر ارقام در گروه بعدی قرار گرفتند (شکل ۵). تغییرات وزن تر یکی از مهم ترین فاکتورهای نشان دهنده کیفیت گل بریده بعد از برداشت است زیرا این فاکتور برایندی از میزان جذب و تعرق در گل بریده است.



شکل ۶ روند تغییرات وزن تر نسبی ارقام مختلف گل بریده رز طی مدت نگهداری. هر عدد نشان دهنده میانگین پنج تکرار ± خطای استاندارد است.

مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌بریده



شکل ۸. مقایسه میانگین از دست رفتن آب (تعرق) در ارقام مختلف گلبریده رز.

میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، قادر اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.

تراکم روزنه‌ای

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر تراکم روزنه‌ای تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم ‘کینگ پراید’ با ۵۷/۷ روزنه در میلی‌متر مربع برگ بالاترین و رقم ‘پاپاگایو’ با ۴۲/۷ روزنه در میلی‌متر مربع برگ کمترین تراکم روزنه‌ای را داشت (شکل ۹). بعد از ‘کینگ پراید’ ارقام ‘رویال‌باکارا’ و ‘بلک‌باکارا’، سپس ‘یلو‌آیلند’ و ‘النتاین’ قرار گرفت.

اندازه سلول‌های محافظ روزنه


بیشترین و ارقام ‘یلو‌آیلند’ و ‘کینگ پراید’ کمترین طول سلول روزنه را داشت (شکل‌های ۱۰ و ۱۱). همچنین، ارقام ‘ویکتوری’، ‘پریمادونا’ و ‘النتاین’ بیشترین و رقم ‘یلو‌آیلند’ کمترین عرض سلول روزنه را نشان داد.

میزان جذب آب

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر میانگین میزان جذب آب طی مدت نگهداری تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم ‘کینگ پراید’ بالاترین میانگین میزان جذب آب را داشت و بعد از آن ارقام ‘بلک‌باکارا’، ‘یلو‌آیلند’ و ‘پاپاگایو’ قرار گرفت (شکل ۷). کمترین میانگین جذب آب در رقم ‘ویکتوری’ مشاهده شد.

میزان تعرق

براساس نتایج تجزیه واریانس، بین ارقام مورد آزمایش از نظر میانگین میزان تعرق طی مدت نگهداری تفاوت معناداری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. همچنین، مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم ‘پاپاگایو’ بالاترین میانگین میزان تعرق را داشت و بعد از آن ارقام ‘کینگ پراید’، ‘بلک‌باکارا’ و ‘یلو‌آیلند’ قرار گرفت (شکل ۸). کمترین میانگین تعرق در رقم ‘ویکتوری’ مشاهده شد.



شکل ۷. مقایسه میانگین میزان جذب آب در ارقام مختلف گلبریده رز.

میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، قادر اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.


نتایج نشان داد عمر شاخه بریده با قطر دمگل، قطر گل، وزن تر نسبی و تراکم روزنها در سطح احتمال ۱ درصد و با میزان جذب آب در سطح احتمال ۵ درصد همبستگی مثبت و معناداری داشت (جدول ۱). همچنین، وزن تر نسبی شاخه بریده با قطر دمگل، قطر گل و میزان جذب آب همبستگی مثبت و معناداری در سطح احتمال ۱ درصد داشت (جدول ۱). این یافته‌ها تأییدی بر یافته‌های تحقیقاتی است که نشان دادند بالاتر بودن قطر دمگل، میزان جذب آب و وزن تر نسبی در افزایش عمر گل بریده مؤثر است (۹، ۸، ۵).

به طورکلی، عمر گل‌های بریده روزهای مورد آزمایش بسیار بالا بود، به طوری که حتی بدترین رقم، دارای عمر متوسط $9\frac{1}{4}$ روز بود. این ویژگی ابتدا به کیفیت بالای گل‌های تولیدی در شرایط آب و هوای فصلی خنک (پاییز) خرمآباد و دوم به شرایط فراهم شده در آزمایشگاه برای نگهداری گل‌های بریده در محلول نگهدارنده مربوط می‌شود.

براساس نتایج موجود، چهار رقم ‘کینگ پراید’، ‘رویال باکارا’، ‘یلو آیلند’ و ‘بلک باکارا’ عمر بالای نشان دادند. بالا بودن عمر گل جایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گل‌های بریده است، هرچند که باید به ویژگی‌هایی نظری رنگ و درشتی گل، همچنین فرهنگ مصرف‌کننده توجه کرد.


در تحقیق دیگری، در مقایسه چهار رقم رز نشان داده شد که عمر گل بریده رقم ‘فرسترد’^۱ و سفیر بسیار طولانی‌تر از ‘ردولوت’^۲ و ‘سونیا’ است. قطر دمگل در ارقام ‘فرسترد’ و ‘سفیر’^۳ که خمیدگی گردن گل نداشتند، بسیار بیشتر از ‘ردولوت’ و ‘سونیا’ بود. رقم ‘ردولوت’ با اینکه جذب آب بالای نشان داد به دلیل تعرق بیشتر دچار تعادل منفی آب شد و عمر گل بریده آن کمتر بود. این رقم همچنین خمیدگی گردن گل زیادی نشان داد (۱۱).

1. First Red
2. Red Velvet
3. Saphir




شکل ۹. مقایسه میانگین تراکم روزنها در ارقام مختلف گل بریده رز.

میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.



شکل ۱۰. مقایسه میانگین طول سلول‌های روزن در ارقام مختلف گل بریده رز.

میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.



شکل ۱۱. مقایسه میانگین عرض سلول‌های روزن در ارقام مختلف گل بریده رز.

میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند، فاقد اختلاف معنادار در سطح ۱ درصدند.

بزرگی کشاورزی

مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت روز شاخه‌بریده

جدول ۱. ضرایب همبستگی ویژگی‌های مورد ارزیابی در هشت رقم رز شاخه بریده

عرض	طول	میزان	میزان	وزن	سرعت	قطر گل	قطر دمگل	عمر گل بریده	عمر گل بریده
تراکم روزنایی	سلول روزنیه	تعریق	جذب	تر نسبی	باشدن غنچه				
								۱/۰۰	عمر گل بریده
							۰/۴۱۷**	قطر دمگل	
						۱/۰۰	۰/۳۸۴*	۰/۴۱۵**	قطر گل
						۱/۰۰	-۰/۷۷۷**	-۰/۱۷۱ ns	سرعت بازشدن غنچه
						۰/۱۰۵ ns	۰/۴۹۷**	۰/۶۴۲**	وزن تر نسبی
						۰/۴۴۳**	۰/۵۶۲**	-۰/۰۱۳ ns	میزان جذب
						۰/۹۷۳ **	-۰/۲۶۸ ns	۰/۶۳۰ **	میزان تعریق
						۰/۰۶۴ ns	-۰/۱۶۷ ns	۰/۳۱۶*	تراکم روزنایی
۱/۰۰	-۰/۱۷۷ ns	-۰/۲۱۴ ns	-۰/۲۱۵ ns	-۰/۳۴۸*	-۰/۰۳۰۵ ns	-۰/۳۷۹*	-۰/۰۹۶ ns	-۰/۱۹۷ ns	سلول روزنیه
۱/۰۰	۰/۴۲۰**	۰/۰۲۹ ns	-۰/۴۰۷**	۰/۳۶۹*	-۰/۲۳۴ ns	-۰/۴۷۴**	-۰/۳۶۴*	-۰/۰۴۹ ns	عرض سلول روزنیه

ns تفاوت معنادار نیست. * و ** بهتر تیپ تفاوت در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد معنادار است.

پرورش داده شده در رطوبت بالای گلخانه نیز تراکم روزنهای بیشتر و عمر پس از برداشت کوتاهتری داشت و این مسئله به دلیل از دست دادن آب بیشتر پس از برداشت بود (۱۸). این در حالی است که در پژوهش دیگری نشان داده شد که گل‌های پرورش یافته در رطوبت بالای گلخانه تراکم روزنهای کمتر دارند اما در عین حال نسبت به گل‌های پرورش یافته در رطوبت متوسط گلخانه عمر پس از برداشت کمتری داشتند (۱۳، ۱۵). دلیل کوتاه بودن عمر پس از برداشت در این گل‌ها نیز از دست دادن آب بیشتر گزارش شد (۱۵).

در پژوهش حاضر، همبستگی مثبت و معناداری بین تراکم روزنهای و عمر گل بریده مشاهده شد، به طوری که در ارقامی نظیر ‘کینگ پراید’، ‘رویال باکارا’ و ‘بلک باکارا’ که عمر گل جایی بیشتری داشتند، تراکم روزنهای بالاتر بود و رقم ‘پاپا گایو’ با کمترین عمر گل، کمترین تراکم روزنهای را نیز داشت (جدول ۳). همچنین، همبستگی معناداری بین عمر گل جایی و طول و عرض سلول‌های روزنهای وجود نداشت (جدول ۳). بعضی ارقام با طول عمر بالا سلول‌های روزنهای درشت‌تر و بعضی سلول‌های روزنهای درشت‌تر

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، رقیعی نظیر، پاپاگایو^۱ که کمترین عمر گل را نشان داد از نظر ویژگی های روابط آبی در وضعیت نامناسبی بوده است. در این رقم جذب آب بالاست ولی به سرعت آب جذب شده را از دست می دهد که منجر به پایین آمدن عمر گل می شود. این موضوع نشان می دهد با وجود تراکم روزنه ای بسیار پایین در این رقم، روزنه ها عکس العمل ضعیفی در برابر تعادل منفی آب نشان می دهنند. همچنین، پایین بودن قطر دمگل در این رقم از موارد مؤثر در کاهش استقامت شاخه بریده و خمیدگی گردن گل است.

رقم "کینگ پراید" بالاترین عمر گل را نشان داد. این رقم جذب آب بالا و تعرق بالایی داشت اما تعادل مناسب آبی در این رقم باعث بالا بودن وزن تر و حفظ وزن تر برای مدت طولانی و در نتیجه عمر گل جایی بیشتر شد. این رقم همچنین دارای قطر دمگل زیادی بود و هیچ‌گونه خمیدگی گردن گل در آن مشاهده نشد. در پژوهشی، علت کوتاهی عمر گل جایی برخی ارقام گل میمون، به بیشتر بودن تراکم روزنهای آنها و از دست رفتن آب بیشتر از طریق این روزنها نسبت داده شد (۱۶). گاهی رز

کوتاه‌تر از بیشتر ارقام مورد آزمایش بود. دلیل این امر جذب آب پایین در این رقم است. در واقع، این رقم کمترین جذب و کمترین تعرق را داشته است. اما ارقامی نظیر 'کینگپراید'، 'بلکباکارا' و 'یلوآیلند' که عمر گل جایی بالاتری داشتند دارای تعرق بیشتری بودند ولی با توجه به جذب آب بالا وزن تر خود را حفظ کردند و پژمرده نشدند. این موضوع نشان می‌دهد که تنها جذب بالاتر یا تعرق کمتر منجر به افزایش عمر گل نخواهد شد و با در نظر گرفتن هر دوی آن‌ها، همچنین تغییرات وزن تر امکان نتیجه‌گیری بهتر فراهم خواهد شد.

در رقم 'ویکتوری' عمر گل ۱۲/۲ روز بود که با ارقام 'اللتاین' و 'پریمادونا' در یک گروه آماری قرارگرفت. این رقم با وجود حفظ وزن تر بالاتر نسبت به ارقام 'رویالباکارا' و 'بلکباکارا'، جذب آب کم و تعرق کمی را نشان داد ولی عمدت‌ترین صفت نامطلوب آن باز نشدن مناسب غنچه‌های گل آن بود.

نتیجه‌گیری

براساس نتایج پژوهش حاضر، ارقامی که دارای قطر گل، قطر دمگل، وزن تر نسبی، میزان جذب آب و تراکم روزنه‌ای بالاتری بودند، عمر گل جایی بیشتری داشتند. با توجه به عمر گل جایی و سایر ویژگی‌های پس از برداشت، می‌توان ارقام 'کینگپراید'، 'رویالباکارا' و 'یلوآیلند' را بهترین ارقام معروفی کرد. ضمن اینکه بدترین ارقام از نظر عمر گل و ویژگی‌های بعد از برداشت ارقام 'پاپاگایو' و 'ویکتوری' بود.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از دانشگاه لرستان و همچنین خانم‌ها کبری سپهوند و مریم میردیریکوند و آقای هادی رضایی نژاد قدردانی می‌شود.

کوچک‌تری داشتند. بنابراین بالاتر بودن تراکم روزنه‌ای و یا اندازه سلول‌های روزنه‌ای عامل کاهش عمر گل نیست، بلکه عملکرد روزنه‌ها و واکنش آن‌ها به فاکتورهای تنش زا از جمله تعادل منفی آب (مانند آنچه در گل‌های شاخه‌بریده رخ می‌دهد) دلیل کاهش تعرق و جلوگیری از پژمردگی گل است (۴، ۱۵).

بعد از رقم کینگپراید ارقام 'رویالباکارا'، 'یلوآیلند' و 'بلکباکارا' عمر بالایی نشان دادند. رقم 'یلوآیلند' رقمی گل درشت است که بیشترین قطر دمگل را داشت و هیچ‌گونه خمیدگی گردن گل در آن مشاهده نشد. این رقم از نظر حفظ وزن تر شبیه به رقم کینگپراید بود ولی کاهش در وزن تر این رقم کمی زودتر از رقم 'کینگپراید' شروع شد. این رقم جذب آب و تعرق بالایی نشان داد، ولی تعادل آب در آن مثبت بود و باعث حفظ وزن تر به شدت طولانی شد. در نتیجه عمر گل جایی آن بالا بود. ارقام 'رویالباکارا' و 'بلکباکارا' عمر گل جایی بالایی داشتند ولی میزان وزن تر آن‌ها نسبت به دو رقم 'کینگپراید' و 'یلوآیلند' بسیار پایین‌تر بود. با این حال روند حفظ وزن تر در این ارقام برای مدت طولانی ادامه داشت. همچنین، در رقم 'بلکباکارا' خمیدگی گردن گل مشاهده شد که می‌توان آن را به کم بودن قطر دمگل نسبت داد. در این رقم به طور طبیعی گل کوچک، اما سرعت باز شدن گل هم پایین بود.

ارقام با عمر گل جایی بالاتر آب کمتری از دست می‌دهند (۱۳). پژوهش حاضر نشان داد رقم 'پاپاگایو' کمترین عمر گل را داشت. همچنین، تعرق بالایی نشان داد که با نتایج آن‌ها مطابقت دارد. این رقم جذب آب بالایی نیز داشت ولی با تعرق بیشتر کاهش وزن شدیدی نشان داد و این موضوع به پژمردگی سریع تر آن نسبت به سایر ارقام می‌انجامد. رقم 'ویکتوری' کمترین تعرق را نشان داد ولی بهترین رقم از نظر عمر گل جایی نبود و عمر آن نسبتاً

بزرگی کشاورزی

منابع

- with glucose, isothiazolinonic germicide, citric acid and aluminum sulphate solution. Japan Agricultural Research Quarterly. 40(3): 263-269.
9. In BC, Motomura S, Inamoto K, Doi M and Mori G (2007) Multivariate analysis of relations between preharvest environmental factors, postharvest morphological and physiological factors and vase life of cut "Asami Red" roses. Journal of Japanese Society for Horticultural Science. 76(1): 66-72.
10. Kader AA (2002) Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California. Davis, 535 p.
11. Lee JS and Kim YA (1997) Changes in bent-neck, neck strength, and water balance according to cultivars and preservative solutions of cut rose flowers. Hortscience. 32: 459 (Abst.).
12. Mortensen LM and Gislerod HR (1999) Influence of air humidity and lighting period on growth, vase life and water relations of 14 rose cultivars. Scientia Horticulturae. 82: 289-298.
13. Mortensen LM and Gislerod HR (2005) Effect of air humidity variation on powdery mildew and keeping quality of cut roses. Scientia Horticulturae. 104: 49-55.
14. Muller R, Stumman BM and Andersen AS (2001) Comparison of postharvest properties of closely related miniature rose cultivars (*Rosa hybrida* L.). Scientia Horticulturae. 91: 325-338.
15. Rezaei Nejad A and van Meeteren U (2005) Stomatal response characteristics of *Tradescantia virginiana* grown at high relative air humidity. Physiologia Plantarum. 125: 324-32.
16. Schroeder KR and Stimart DP (2005) Comparison of stomatal density and postharvest transpiration between long- and short-lived cut
1. عجم گرد ف و شفیعی ع (۱۳۷۴) بررسی اثر تیوسولفات نقره و -۸-هیدروکسی کینولین سیترات و تیمارهای دمایی بر طول عمر گل بریده رز رقم ایلونا. علمی کشاورزی. ۲۸(۱): ۱۹۳-۱۸۳.
2. نواک ژ و رومنیکی ر (۱۳۷۸) انبارداری و جابجایی گل‌های بریده، گیاهان سبز زیستی و گیاهان گلدانی. ترجمه اصغر ابراهیم‌زاده و یوسف سیفی. موسسه نشر اختر. تبریز. ایران. ۲۲۳ ص.
3. Bleeksma HC and van Doorn WG (2003) Embolism in rose stems as a result of vascular occlusion by bacteria. Postharvest Biology and Technology. 29: 334-340.
4. Fanourakis D, Tapia A, Heuvelink E and Carvalho SMP (2009) Differences in the stomatal characteristics of cut roses grown at high relative humidity. Acta Horticulturae. 847: 251-258.
5. Faragher JD, Mayak S, Tirosh T and Halvey AH (1984) Cold storage of rose flowers: effects of cold storage and water loss on opening and vase life of "Mercedes" roses. Scientia Horticulturae. 24: 369-378.
6. Harbaugh BK, Bell M L and Liang R (2000) Evaluation of forty-seven cultivars of lisianthus as cut flowers. HortTechnology. 10: 812-815.
7. Ichimura K, Kishimoto M, Norikoshi R, Kawabata Y and Yamada K (2005) Soluble carbohydrates and variation in vase life of cut rose cultivars "Delilah" and "Sonia". Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 80(3): 280-286.
8. Ichimura K, Taguchi M and Norikoshi R (2006) Extension of the vase life of cut roses by treatment

- flower genotypes of *Antirrhinum majus* L. Journal of the American Society for Horticultural Science. 130(5): 742-746.
17. Torre S and Fjeld T (2001) Water loss and postharvest characteristics of cut roses grown at high or moderate relative air humidity. *Scientia Horticulturae*. 89: 217-226.
18. Torre S, Fjeld T, Gislerod HR and Moe R (2003) Leaf anatomy and stomatal morphology of greenhouse roses grown at moderate or high air humidity. *Journal of the American Society for Horticultural Sciences*. 128: 598-602.
19. Twumasi P, van Iperen W, Woltering EJ, Emons AMC, Schel JHN, Snel JFH, van Meeteren U and van Marwijk D (2003) Effects of water stress during growth on xylem anatomy, xylem functioning and vase life in three *Zinnia elegans* cultivars. *Acta Horticulturae*. 669: 303-311.

Archive of SID