



## واکنش قابلیت حیات بذرهای کلزا به تیمارهای پرایمینگ و شرایط خشک کردن بذرهای پرایم شده

محسن ملک<sup>۱</sup>، فرشید قادری فر<sup>۲\*</sup>، بنیامین ترابی<sup>۳</sup>، حمیدرضا صادقی پور<sup>۳</sup>

۱. دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

۲. دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

۳. دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

### چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر روش‌های خشک کردن (تیمارهای پسابیدگی)، تیمارهای شوک حرارتی و تنش اسمزی بر قابلیت حیات بذرهای پرایم شده ارقام کلزا، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۷-۱۳۹۶ انجام شد. در این مطالعه بذرهای سه رقم کلزا بانام‌های دی‌کا- ایکس پاور، تراپر و هایولا ۵۰، بلافاصله پس از پرایمینگ، در معرض تیمارهای مختلف پسابیدگی، شوک حرارتی و پتانسیل اسمزی قرار گرفتند. سپس به‌منظور بررسی قابلیت حیات بذرهای تیمار شده با روش‌های مختلف پرایمینگ و شرایط مختلف در مرحله خشک کردن بذرهای پرایم شده، در معرض آزمون زوال کنترل شده قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از برازش مدل لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی طی آزمون زوال کنترل شده؛ زمان کاهش جوانه‌زنی بذرها به ۵۰ درصد محاسبه و به‌عنوان معیار مقایسه قابلیت حیات بذرها قرار گرفت. نتایج نشان داد پاسخ ارقام کلزا به تیمارهای مختلف، متفاوت بود. به‌طور کلی تیمارهای شوک حرارتی توانستند در رقم‌های دی‌کا- ایکس پاور و تراپر بسیار مفید واقع شده و منجر به افزایش قابلیت ماندگاری بذرها شوند. در مقابل تیمارهای تنش اسمزی اغلب دارای اثرات منفی بر ماندگاری بذرهای تمامی ارقام داشتند. هم‌چنین پرایمینگ به‌روش اسموپرایمینگ و خشک کردن بذرها به‌روش آرام دارای اثرات منفی بیش‌تری نسبت به هیدروپرایمینگ و خشک کردن سریع بودند.

**کلیدواژه‌ها:** اسموپرایمینگ، انبارداری، روش‌های خشک کردن، زوال کنترل شده، شوک حرارتی، هیدروپرایمینگ.

## Rapeseed Seed Viability Reaction to Priming Treatments and Drying Conditions of Primed Seeds

Mohsen Malek<sup>1</sup>, Farshid Ghaderi-Far<sup>2\*</sup>, Benjamin Torabi<sup>2</sup>, HamidReza Sadeghipour<sup>3</sup>

1. Former M.Sc. Student, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.

2. Associate Professor, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.

3. Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

Received: July 16, 2019

Accepted: September 30, 2019

### Abstract

In order to investigate the effects of drying methods (desiccation treatment), heat shock, and osmotic stress treatments on viability of primed seeds from different rapeseed cultivars, an experiment has been conducted in 2017-2018 at the Seed Research Laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. In this study, seeds of three canola cultivars, i.e., Dk-xpower, Teraper, and Hayola50, all exposed to priming treatments, undergo desiccation, heat shock, and osmotic stress treatments. Thereafter, to investigate the effects of different treatments, the treated seeds have been subjected to controlled deterioration test. Finally, after fitting the three-parameter logistic model to germination percentage during controlled deterioration test, the time for germination decline to 50% has been calculated and used as the criterion to compare seed viability. Results show that the response of rapeseed cultivars to different treatments have been different. Furthermore, priming methods and different treatments in drying phase of primed seeds, display varied effects on seeds' lifespan. In general, heat shock treatments are found efficient in Dk-xpower and Traper cultivars as they increase seeds' lifespan. In contrast, osmotic stress treatments often have had negative effects on seed viability in all canola cultivars. Even, "osmopriming" and subsequent slow drying of primed seeds have had more negative effects than "hydropriming", associated with fast drying methods.

**Keywords:** Controlled deterioration test, drying methods, heat shock, hydropriming, osmopriming, storage.

## ۱. مقدمه

پرایمینگ یکی از تکنیک‌های بهبود رفتارهای جوانه‌زنی و سبز شدن بذر می‌باشد. در طی پرایمینگ بذر تا سطح مشخصی (قبل از خروج ریشه‌چه) آب جذب می‌کنند و سپس تا رطوبت اولیه خود خشک شده و طی این آب‌نوشی، متابولیسم‌های مرتبط با جوانه‌زنی فعال می‌شوند (Farooq et al., 2006; Ibrahim, 2016). هنگامی که بذر مجدداً آب جذب می‌کنند تغییرات فیزیولوژیک مرتبط با جوانه‌زنی دوباره فعال شده و روند جوانه‌زنی سریع‌تر انجام می‌شود (González-Zertuche et al., 2002). از جمله اثرات مثبت پرایمینگ گسترش دامنه دمایی جوانه‌زنی، افزایش درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌زنی و همچنین رفع کمون در برخی گونه‌های خاص و به‌طور کلی افزایش کارایی جوانه‌زنی و سبز شدن بذر می‌باشد (McDonald, 2000; Malek et al., 2019). باین‌حال پرایمینگ غالباً باعث کاهش قابلیت انبارداری بذر می‌شود (Schwember & Bradford, 2005). به‌طوری‌که اثرات منفی پرایمینگ بر قابلیت حیات بذر، عمده‌ترین محدودیت استفاده از این تکنیک است (Gurusinghe et al., 2002; Hussain et al., 2015). کاهش قابلیت ماندگاری بذرهای پرایم‌شده<sup>۱</sup> در گیاهان مختلف توسط پژوهش‌گران گزارش شده است. به‌عنوان مثال در بذرهای گوجه‌فرنگی (Argerich et al., 1989)، کاهو (Schwember & Bradford, 2005; Hill et al., 2007)، ذرت شیرین (Chiu et al., 2002) و برنج (Hussain et al., 2015) پرایمینگ باعث تشدید فرایند زوال و در نهایت کاهش قابلیت حیات بذر می‌شود. از طرفی گزارش‌هایی مبنی بر بهبود ماندگاری بذر توسط پرایمینگ نیز وجود دارد (Dearman et al., 1986; Butler et al., 2009; Malek et al., 2019).

پژوهش‌گران مختلف بررسی و عده‌ای معتقدند، می‌توان با اعمال تیمارهای مختلف و همچنین روش‌های متفاوت خشک کردن بذرهای پرایم‌شده، تأثیر سوء پرایمینگ بر قابلیت انبارداری بذر را تا حد زیادی کاهش داد و از آثار مثبت این تکنیک بهره برد (Bruggink et al., 1999). در پیش‌تیمار پرایمینگ بذر، بذر طی فرایند آب‌نوشی ممکن است با افزایش جذب آب از حدی معین، تحمل به پسابدگی را از دست داده و نسبت به زوال در اثر انبارداری حساس شوند. به‌طور کلی وقتی بذرهای خشک آب جذب می‌کنند تحمل به پسابدگی تا مدتی بدون تغییر باقی می‌ماند و بذر می‌تواند بدون هیچ آسیبی دوباره خشک شوند؛ اما هنگامی که به بذر اجازه داده شود به مدت طولانی‌تری آب جذب کند، تحمل به پسابدگی به تدریج کاهش یافته و خشک کردن منجر به ایجاد اثرات مخرب در ساختار بذر می‌گردد (Powell, 2000). دما و رطوبت نسبی در مرحله خشک کردن بذرهای پرایم‌شده ارتباط مستقیمی با کیفیت بذر دارد و اثرات و مزایای پرایمینگ را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. باین‌حال در اکثر مواقع به نحوه خشک کردن بذرهای پرایم‌شده توجه نمی‌شود. پژوهش‌گران همچنین علت وجود تناقض در خصوص قابلیت ماندگاری بذرهای پرایم‌شده را مرتبط با مکانیسم‌های پسابدگی و خشک کردن بذرهای پرایم‌شده می‌دانند (Parera & Cantliffe, 1994; Sliwiska & Jendrzczak, 2002). بین تحمل به پسابدگی و قابلیت انبارداری بذر، همبستگی مستقیم وجود داشته و از طرفی مکانیسم‌های دخیل در تحمل به پسابدگی، ارتباط مستقیمی با قابلیت ماندگاری بذر دارند (Ellis & Hong, 1994; Ellis & Hong, 2007). تحمل به پسابدگی به عوامل مختلفی چون محتوی ساکارز، برخی الیگو ساکاریدهای خاص، پروتئین‌های محلول و سرعت کاهش رطوبت بستگی دارد

1. Primed seeds

(Bewley et al., 2013).

در مطالعات زوال بذر درک عوامل بنیادی که باعث القای پیری می‌شوند امری مهم است. از مهم‌ترین این مکانیسم‌ها بررسی پراکسیداسیون لیپیدها، تراوایی غشای سلولی و فعالیت آنزیم‌ها می‌باشد. یکی از ساده‌ترین و درعین حال پرکاربردترین راه‌های مطالعه آسیب‌های وارده به غشای سلولی آزمون هدایت الکتریکی است. این آزمون بر پایه نشت الکترولیت‌ها از غشای سلولی استوار بوده و آزمون بسیار ساده، کم‌هزینه و درعین حال دارای دقت و کاربرد زیاد و علاوه بر آن، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های قدرت بذر می‌باشد (Vieira et al., 2002; Balouchi et al., 2014; Gorzin et al., 2015).

هدف از این مطالعه، با توجه به موارد مذکور و همچنین اهمیت آن در فرآوری بذر کلزا، بررسی تأثیر روش‌های خشک کردن بذرهای پرایم شده و همچنین اعمال تیمارهای شوک حرارتی و پتانسیل اسمزی بعد از پرایمینگ بذر بر قابلیت انبارداری بذرهای پرایم شده‌ی ارقام کلزا می‌باشد.

## ۲. مواد و روش‌ها

این مطالعه در سال ۹۷-۱۳۹۶ در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این مطالعه از بذرهای سه رقم کلزا بانام‌های دی‌کا-ایکس پاور<sup>۱</sup>، تراپر<sup>۲</sup> و هایولا<sup>۳</sup> تولیدشده در سال ۱۳۹۶ استفاده شد. بذرهای از مرکز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان تهیه و تا پایان مراحل انجام آزمایش درون ظرف‌های مهروموم شده و در یخچال با دمای  $2 \pm 8$  نگهداری شدند. لازم به ذکر است محموله‌های بذری استفاده شده در ارقام دی‌کا-ایکس پاور، تراپر و هایولا ۵۰ به ترتیب دارای جوانه‌زنی اولیه معادل ۸۹، ۹۸ و ۹۲ درصد

روش‌های متفاوتی برای خشک کردن بذرهای پرایم شده پیشنهاد شده است. از مرسوم‌ترین این روش‌ها، دو روش خشک کردن آرام و سریع است. در روش سریع رطوبت بذرهای پرایم شده به سرعت و طی مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد؛ اما این کاهش رطوبت در روش آرام با سرعت کم‌تری انجام شده و مدت بیشتری طول می‌کشد تا بذرهای پرایم شده به رطوبت اولیه خود برسند (Hay & Probert, 1995). Soeda et al. (2005) گزارش کردند که خشک کردن بذرهای پرایم شده با روش‌های مختلف باعث بیان الگوهای ژنی متفاوت می‌شود که می‌تواند باعث سنتز پروتئین‌های مختلفی گردد. از این رو، نحوه خشک کردن بذرهای پرایم شده در واکنش نسبت به شرایط محیطی نگهداری و به دنبال آن جوانه‌زنی بسیار حائز اهمیت است.

علاوه بر روش‌های مختلف خشک کردن بذرهای پرایم شده، پژوهش‌گران اعمال تیمارهایی قبل از خشک کردن بذرهای پرایم شده را نیز در افزایش قابلیت ماندگاری بذرهای پرایم شده مؤثر می‌دانند که از پرکاربردترین این روش‌ها اعمال شوک حرارتی و تنش اسمزی قبل از کاهش رطوبت بذرهای پرایم شده است (Bruggink et al., 1999). در روش تنش پتانسیل اسمزی، بذرهای پتانسیل اسمزی پایین، مانند پلی اتیلن گلیکول به مدت چند ساعت یا چند روز قرار می‌گیرند و سپس خشک می‌شوند. در شوک حرارتی بذرهای پرایم شده به مدت کوتاهی در دمای بالا قرار می‌گیرند. پژوهش‌گران بیان کردند این عمل باعث بیان ژن‌های مربوط به سنتز پروتئین‌های شوک حرارتی می‌شود که این پروتئین‌ها باعث مقاومت بذر به تنش‌های بعدی از جمله زوال می‌شود (Schipper et al., 2001; Hussain et al., 2015).

1. Dk-xpower  
2. Traper  
3. Hayola50

بودند.

سیلیکاژل منتقل شده (روش سریع) تا به رطوبت اولیه خود برسند. لازم به ذکر است هر دو روش خشک کردن در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد صورت گرفت.

## ۱.۲. اعمال تیمارهای پرایمینگ

به منظور اعمال تیمارهای پرایمینگ، از دو روش هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ استفاده شد. در روش هیدروپرایمینگ بذرهای درون بشر به حالت غوطه‌ور در آب با نسبت ۱ به ۵ (به ازای هر گرم بذر ۵ میلی لیتر آب استفاده شد) به مدت ۱۲ ساعت قرار گرفتند (Jafar et al., 2012). در طی مدت آبنوشی به منظور اکسیژن رسانی و جلوگیری از خسارات ناشی از کمبود اکسیژن، هوادهی با استفاده از پمپ آکوارיום صورت گرفت (Bujalski & Nienow, 1991). هوادهی به صورتی انجام می‌شد که بذرهای در طی آبنوشی به صورت معلق در آب بودند. در روش اسموپرایمینگ از روش ارائه شده توسط Farhoudi et al. (2007) همراه با تغییراتی استفاده شد. در این روش بذرهای کلزا به مدت ۱۶ ساعت در محلول ۱۴ دسی‌زیمنس بر متر ( $dSm^{-1}$ ) کلرید سدیم غوطه‌ور شدند. در این روش نیز هوادهی در طی پرایمینگ صورت گرفت.

## ۳.۲. اعمال تیمارهای شوک حرارتی و پتانسیل اسمزی به بذرهای پرایم شده

در این بخش با توجه به نتایج قسمت قبل تیمارهای کارآمدتر پرایمینگ (هیدروپرایمینگ) و روش خشک کردن (سریع) انتخاب شد و تیمارهای شوک حرارتی و پتانسیل اسمزی بر آنها اعمال شد (تیمارهای این بخش با توجه به روش‌های ارائه شده توسط Bruggink et al. (1999) با کمی تغییرات طراحی و اجرا شد).

به منظور اعمال شوک حرارتی به بذرهای پرایم شده به دو صورت عمل شد:

۱- بذرهای بلافاصله پس از اتمام آبنوشی (پرایمینگ) به لوله‌های فالکن ۱۴ میلی لیتری منتقل شدند و به مدت ۱/۵ و ۳ ساعت در بن‌ماری با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از اتمام این مدت بذرهای توسط روش سریع خشک شدند.

۲- بذرهای پس از اتمام پرایمینگ در ظرف‌های وکیوم توسط توری سیمی روی ۱۵۰ گرم سیلیکا ژل قرار گرفتند و به مدت ۸ ساعت در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد خشک شدند. لازم به ذکر است رطوبت بذرهای طی این مدت به مقدار اولیه خود (۴/۵-۶ درصد) رسید.

به منظور اعمال تیمارهای تنش اسمزی، بذرهای پرایم شده بلافاصله به پتری‌های شیشه‌ای با قطر ۱۴ سانتی‌متر و یک‌لایه حوله کاغذی، حاوی ۱۵ میلی لیتر محلول پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ با پتانسیل‌های ۱/۵- و ۲/۵- مگا پاسکال در دماهای ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد منتقل شدند. پس از گذشت ۷۲ ساعت، بذرهای تیمارهای مختلف توسط آب مقطر شسته شدند و در

## ۲.۲. روش‌های خشک کردن بذرهای پرایم شده (تیمارهای پس‌ایدگی)

پس از اتمام پرایمینگ، بذرهای با دو روش آرام و سریع خشک شدند (Bruggink et al., 1999). در روش سریع، بذرهای در ظرف‌های وکیوم با ابعاد ۱۳×۹×۴ سانتی‌متر با استفاده از توری سیمی روی ۱۵۰ گرم سیلیکاژل قرار گرفتند تا رطوبت بذرهای کاهش یافت و به رطوبت اولیه برسد. در روش آرام ابتدا بذرهای پرایم شده روی توری سیمی در ظرف‌های وکیوم حاوی ۴۰ میلی لیتر محلول اشباع کلرید سدیم (رطوبت نسبی ۷۵ درصد) به مدت ۷۲ ساعت قرار گرفتند. پس از گذشت ۷۲ ساعت، بذرهای خارج شده و به مدت ۸ ساعت به ظرف‌های حاوی

دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به‌روش سریع خشک شدند.

## ۴.۲. آزمون زوال کنترل شده

به‌منظور مقایسه ماندگاری بذرهای تیمارهای مختلف از آزمون زوال کنترل شده<sup>۱</sup> با روش ارائه‌شده توسط Bruggink *et al.* (1999) همراه با تغییراتی انجام شد. در این آزمون پس از اعمال تیمارهای مختلف و هم‌چنین روش‌های خشک‌کردن، بذرهای هر تیمار به‌طور جداگانه توسط توری سیمی درون ظرف‌های وکیوم حاوی ۴۰ میلی‌لیتر محلول اشباع کلرید سدیم قرار گرفتند (مشابه با روش خشک‌کردن آرام) و به‌مدت ۴۸ ساعت به دمای ۵ درجه سانتی‌گراد منتقل شدند. این کار باعث می‌شود رطوبت بذرهای افزایش یافته و به مقدار ۹±۰٫۳ درصد (بر مبنای وزن‌تر) برسد. سپس بذرهای لوله‌های فالکن ۱۴ میلی‌لیتری قرار گرفتند. به‌منظور اطمینان از عدم تبادل رطوبت بذرهای با محیط بیرون درب لوله‌های فالکن توسط چسب پلاستیکی پلمپ شد. سپس لوله‌ها به بن‌ماری با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد منتقل شدند و به‌مدت ۱۰ روز نگهداری و در فواصل مختلف (یک یا دو روز) از تیمارهای مختلف نمونه‌گیری و آزمون‌های جوانه‌زنی و هدایت الکتریکی روی بذرهای انجام شد.

## ۵.۲. آزمون جوانه‌زنی

آزمون جوانه‌زنی در تمامی تیمارهای آزمایش در سه تکرار انجام شد. به این منظور سه تکرار ۲۵ بذری از هر تیمار درون پتری‌دیش‌هایی با قطر ۹ سانتی‌متر و حاوی یک‌لایه حوله کاغذی و ۵ میلی‌لیتر آب مقطر قرار گرفت و به دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد منتقل شد. شمارش بذرهای جوانه‌زده به‌مدت ده روز انجام گرفت و معیار جوانه‌زنی خروج ریشه‌چه به اندازه ۲ میلی‌متر یا بیش‌تر در نظر گرفته شد (Soltani *et al.*, 2001). سپس به داده‌های درصد جوانه‌زنی

در مقابل زمان (دوره زوال) مدل لجستیک سه پارامتره (رابطه ۱) (Ghaderi-Far *et al.*, 2012) برازش داده شد و درنهایت با استفاده از درون‌یابی مدل، زمان کاهش جوانه‌زنی به ۵۰ درصد (p50) محاسبه و به‌عنوان مبنای مقایسه قابلیت انبارداری بذرهای تیمارهای مختلف استفاده شد (Timple & Hay 2018). لازم به ذکر است بالابودن مقدار عددی این پارامتر بیانگر قابلیت ماندگاری بیش‌تر یا به‌عبارتی بالاتر بودن مقاومت به زوال در محموله‌های بذری می‌باشد.

$$Y = \frac{G_{max}}{(1 + (\frac{X}{D_{50}})^b)} \quad (\text{رابطه ۱})$$

در این رابطه: Y درصد جوانه‌زنی، G<sub>max</sub> حداکثر مقدار جوانه‌زنی (درصد)، D<sub>50</sub> مدت‌زمان رسیدن به ۵۰ درصد حداکثر جوانه‌زنی (روز پس از شروع آزمون زوال)، X زمان (روز) و b شیب منحنی می‌باشد.

## ۶.۲. آزمون هدایت الکتریکی

به‌منظور مقایسه تراوایی غشا در روش‌های مختلف پرایمینگ و خشک‌کردن، آزمون هدایت الکتریکی در این تیمارها با سطوح زوال صفر (بدون زوال)، ۳، ۶ و ۹ روز انجام شد. به این منظور ۳ تکرار ۵۰ بذری از هر تیمار وزن شد و به بشر ۵۰۰ میلی‌لیتری حاوی ۲۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر منتقل شد. لازم به ذکر است بشرهای حاوی آب مقطر به‌مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد به‌منظور هم‌دماشدن آب مقطر با محیط قرار گرفتند و پس از این مدت هدایت الکتریکی اولیه آب مقطر توسط دستگاه هدایت‌سنج اندازه‌گیری شد. پس از انتقال بذرهای به بشرهای حاوی آب مقطر در بشرها توسط فویل آلومینیومی پوشانده شد و به‌مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از گذشت ۲۴ ساعت، هدایت الکتریکی توسط دستگاه هدایت‌سنج اندازه‌گیری شد و هدایت الکتریکی بذرهای به‌ازای هر گرم بذر، برحسب میکروزیمنس بر سانتی‌متر بر گرم توسط


1. Controlled deterioration test

پرایم شده قرار گرفت. هم چنین واکنش بذرهای هر رقم متمایز از سایر ارقام بود و برخی تیمارها موجب افزایش ماندگاری بذرها و مقاومت به زوال و از طرفی برخی تیمارها نیز باعث کاهش ماندگاری بذرها شدند. پژوهشگران معتقدند ارقام یا ژنوتیپ‌های یک گونه می‌توانند واکنش‌های متفاوتی نسبت به پیش‌تیمار پرایمینگ نشان دهند و هم چنین الگوی زوال بذر در انبارداری طبیعی و مصنوعی می‌تواند به‌طور قابل توجهی وابسته به ژنوتیپ باشد (Butler et al., 2009; Schwember & Bradford, 2010; Belmont et al., 2018).

رابطه (۲) محاسبه شد (Hampton & Tekrony, 1995).  
 هدایت الکتریکی = هدایت الکتریکی  
 هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتی‌متر)  
 وزن نمونه بذر (گرم)  
 تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SAS 9.0.2 و Sigmaplot 14.0 انجام شد و رسم نمودارها نیز به کمک نرم‌افزار Excel 2016 صورت گرفت.

### ۳. نتایج و بحث

در این مطالعه واکنش قابلیت حیات بذرهای ارقام کلزا، تحت تأثیر تیمارهای پرایمینگ، روش‌های خشک کردن و هم چنین تیمارهای تنش اسمزی و شوک حرارتی بذرهای



شکل ۱. برازش مدل لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی بذرهای رقم دی‌کا- ایکس پاور، طی آزمون زوال کنترل شده تحت روش‌های پرایمینگ و تیمارهای مختلف مرحله خشک کردن بذرهای پرایم شده

قابل توجهی باعث افزایش ماندگاری بذرهای پرایم شده و مقاومت در برابر زوال شد. هم چنین در رقم دی-کا-ایکس پاور، قرارگیری بذرها در پتانسیل ۲/۵- مگاپاسکال در دماهای ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی-گراد تأثیر چندانی بر قابلیت ماندگاری بذرها نداشت و روند جوانه زنی در طول آزمون زوال در این تیمارها اختلاف چندانی با بذرهای شاهد نداشت. درحالی که اعمال تنش در پتانسیل ۱/۵- مگا پاسکال به طور قابل توجهی قابلیت ماندگاری بذرها را کاهش داد (شکل ۱، جدول ۱).

در رقم تراپر تمامی تیمارهای پرایمینگ و روش های خشک کردن باعث کاهش قابلیت ماندگاری بذرها نسبت به بذرهای شاهد شد. روش خشک کردن سریع بذرهای پرایم شده در هر دو روش پرایمینگ باعث افزایش مقاومت به زوال نسبت به روش آرام شد و به طور کلی شدت زوال در تیمار هیدروپرایمینگ- سریع کم تر از سایر تیمارها بود و مقاومت بیش تری نسبت زوال در بذرهای تیمار شده توسط این روش مشاهده شد. تأثیر تیمارهای شوک حرارتی در رقم تراپر بسیار متفاوت بود.


در رقم دی-کا-ایکس پاور، بذرها به شدت تحت تأثیر پرایمینگ و روش های خشک کردن بذرهای پرایم شده قرار گرفته و واکنش های مختلفی نسبت به زوال در بذرهای تیمارهای مختلف مشاهده شد. به طوری که تیمار هیدروپرایمینگ- سریع، باعث افزایش ماندگاری نسبت به بذرهای شاهد شد. این در حالی بود که سایر تیمارهای پرایمینگ و پسابیدگی باعث کاهش ماندگاری بذرها شدند. به طور کلی، بذرهای تیمار شده با روش هیدروپرایمینگ نسبت به اسموپرایمینگ، مقاومت بیشتری در مقابل زوال نشان دادند. هم چنین خشک کردن بذرهای پرایم شده به روش سریع شدت زوال را به طور قابل توجهی نسبت به روش آرام کاهش داد. تأثیر تیمارهای شوک حرارتی در حفظ ماندگاری بذرهای رقم دی-کا-ایکس پاور بسیار قابل توجه بود. شوک حرارتی در دمای ۴۵ درجه سانتی-گراد به مدت ۱/۵ و ۳ ساعت تأثیر چندانی بر کاهش یا افزایش جوانه زنی بذرها نسبت به بذرهای شاهد در طی آزمون زوال نداشت. از طرفی تیمار خشک کردن بذرها در دمای ۴۰ درجه سانتی-گراد به طور

جدول ۱. مقادیر برآورد شده زمان (روز) تا کاهش جوانه زنی به ۵۰ درصد (p50) در روش های پرایمینگ و تیمارهای مختلف مرحله خشک کردن بذرهای پرایم شده ارقام کلزا

رقم	تیمار											
	شاهد (بدون پرایمینگ)	هیدروپرایمینگ- سریع	هیدروپرایمینگ- آرام	اسموپرایمینگ- آرام	اسموپرایمینگ- سریع	خشک کردن در دمای ۴۰ درجه سانتی-گراد	۱/۵ ساعت شوک حرارتی	۳ ساعت شوک حرارتی	پتانسیل اسمزی ۲/۵- دمای ۱۰ درجه سانتی-گراد	پتانسیل اسمزی ۲/۵- دمای ۲۰ درجه سانتی-گراد	پتانسیل اسمزی ۱/۵- دمای ۱۰ درجه سانتی-گراد	پتانسیل اسمزی ۱/۵- دمای ۲۰ درجه سانتی-گراد
دی-کا-ایکس پاور	۴/۱۳	۵/۷۰	۳/۰۶	۲/۲۹	۲/۶۱	۶/۲۴	۳/۴۶	۴/۲۲	۴/۱۷	۴/۳۷	۲/۲۰	۲/۹۰
تراپر	۷/۱۰	۴/۹۹	۳/۱۱	۴/۱۰	۴/۶۱	۷/۶۰	۶/۰۴	۴/۶۵	۴/۱۲	۴/۹۴	۲/۷۰	۲/۸۴
هایولا ۵۰	۱۵/۵۸	۵/۶۰	۴/۴۰	۳/۱۵	۴/۳۳	۷/۱۰	۶/۲۷	۷/۰۶	۴/۱۳	۴/۸۸	۳/۰۵	۳/۰۱

موجب کاهش قابلیت ماندگاری نسبت به بذرهای شاهد شدند. در مقایسه بین تیمارها، تنش اسمزی در پتانسیل  $-2/5$  مگا پاسکال نسبت به پتانسیل  $-1/5$  مگا پاسکال دارای اثرات منفی کمتری درخصوص کاهش ماندگاری بذرها بود. هم‌چنین اعمال تنش در دمای  $20$  درجه سانتی‌گراد نسبت به دمای  $10$  درجه سانتی‌گراد سهم کمتری در کاهش قابلیت ماندگاری بذرها داشت. به‌طورکلی تنش در پتانسیل آب مثبت‌تر و دمای پایین‌تر موجب افزایش حساسیت بذرها نسبت به زوال شد (شکل ۲، جدول ۱).

به‌طوری‌که خشک‌کردن بذرها در دمای  $40$  درجه سانتی‌گراد توانست ماندگاری بذرها را حفظ کرده و از بروز اثرات منفی پرایمینگ یعنی کاهش ماندگاری بذرها، جلوگیری کند؛ اما تیمارهای شوک حرارتی به‌مدت یک و نیم و سه ساعت در دمای  $45$  درجه سانتی‌گراد باعث کاهش ماندگاری بذرها نسبت به بذرهای شاهد شده و در این بین قراردادن بذرها به‌مدت سه ساعت در معرض شوک حرارتی تأثیر بیش‌تری در کاهش ماندگاری بذرها در مقایسه با بذرهای شاهد داشت. از طرفی تمامی تیمارهای پتانسیل اسمزی در بذرهای رقم تراپر،




شکل ۲. برازش مدل لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی بذرهای رقم تراپر، طی آزمون زوال کنترل شده تحت روش‌های پرایمینگ و تیمارهای مختلف مرحله خشک‌کردن بذرهای پرایم شده



و کاهش ماندگاری بذرها شد. تیمارهای شوک حرارتی در این رقم اختلاف چندانی با هم از نظر درصد جوانه زنی طی آزمون زوال نداشتند؛ اما نسبت به تیمارهای پسابیدگی و پتانسیل اسمزی موجب کاهش شدت زوال در بذرهای پرایم شده، شدند. هم چنین، در رقم هایولا ۵۰ بذرهای تیمار شده در پتانسیل های اسمزی موجب کاهش ماندگاری بذرها شدند. در این بین اعمال تنش اسمزی در پتانسیل ۱/۵- مگاپاسکال تأثیر منفی بیشتری بر ماندگاری بذرهای پرایم شده داشتند (شکل ۳، جدول ۱).

در رقم هایولا ۵۰ بذرهای شاهد به مقدار کمی تحت تأثیر آزمون زوال قرار گرفتند. به طوری که جوانه زنی طی دوره ۱۰ روز زوال، تنها به مقدار ۲۵ درصد کاهش یافت در حالی که تیمارهای پرایمینگ و روش های خشک کردن به طور قابل توجهی موجب کاهش ماندگاری بذرها شدند. ماندگاری بذرهای پرایم شده به روش اسموپرایمینگ کاهش بیشتری نسبت به بذرهای تیمار شده به روش هیدروپرایمینگ داشتند. هم چنین خشک کردن بذرها به روش آرام نیز نسبت به روش سریع موجب افزایش زوال



شکل ۳. برازش مدل لجستیک سه پارامتره بر داده های درصد جوانه زنی بذرهای رقم هایولا ۵۰، طی آزمون زوال کنترل شده تحت روش های پرایمینگ و تیمارهای مختلف مرحله خشک کردن بذرهای پرایم شده

شکل‌های (۱)، (۲) و (۳) نشان‌دهنده روند زوال در بذره‌های شاهد و پرایم‌شده ارقام کلزا که تحت تیمارهای مختلف پرایمینگ و هم‌چنین تیمارهای مختلف در مرحله خشک‌کردن بذره‌های پرایم‌شده شامل تیمارهای پسابدگی، شوک حرارتی و پتانسیل اسمزی قرار گرفتند، می‌باشند. زمانیکه بذرها در معرض زوال قرار می‌گیرند، ابتدا سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، این در حالی است که تأثیر زوال بر درصد جوانه‌زنی بذرها چندان نیست. به‌عبارت دیگر در فرایند زوال قبل از کاهش درصد جوانه‌زنی و قابلیت حیات، قدرت بذرها کاهش می‌یابد و سپس با پیشروی زوال ظرفیت جوانه‌زنی تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد. این امر مفهوم آستانه کاهش قابلیت حیات بذر را برای ما آشکار می‌سازد که پس از گذشتن از حد آستانه قابلیت جوانه‌زنی بذرها با شیب زیاد کاهش می‌یابد (Malik & jyoti, 2013)؛ بنابراین ما برای بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر روند زوال در محموله‌های بذری نیازمند پارامترهایی هستیم که بتوانند معیار مقایسه قرار بگیرند. در این مطالعه به‌منظور مقایسه تأثیر تیمارهای مختلف، از زمان تا کاهش جوانه‌زنی بذرها به ۵۰ درصد (p50) استفاده شده است. در جدول (۱) مقدار عددی این پارامتر ارائه شده است. لازم به ذکر است که بیش‌تر بودن مقدار عددی این پارامتر نشان‌دهنده پایین‌تر بودن سرعت زوال و در مقابل ماندگاری بیش‌تر محموله‌های بذری می‌باشد.

بذورهای شاهد و پرایم‌شده ارقام کلزا که تحت تیمارهای مختلف پرایمینگ و هم‌چنین تیمارهای مختلف در مرحله خشک‌کردن بذرها قرار گرفتند، می‌باشند. زمانیکه بذرها در معرض زوال قرار می‌گیرند، ابتدا سرعت جوانه‌زنی تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد. این امر مفهوم آستانه کاهش قابلیت حیات بذر را برای ما آشکار می‌سازد که پس از گذشتن از حد آستانه قابلیت جوانه‌زنی بذرها با شیب زیاد کاهش می‌یابد (Malik & jyoti, 2013)؛ بنابراین ما برای بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر روند زوال در محموله‌های بذری نیازمند پارامترهایی هستیم که بتوانند معیار مقایسه قرار بگیرند. در این مطالعه به‌منظور مقایسه تأثیر تیمارهای مختلف، از زمان تا کاهش جوانه‌زنی بذرها به ۵۰ درصد (p50) استفاده شده است. در جدول (۱) مقدار عددی این پارامتر ارائه شده است. لازم به ذکر است که بیش‌تر بودن مقدار عددی این پارامتر نشان‌دهنده پایین‌تر بودن سرعت زوال و در مقابل ماندگاری بیش‌تر محموله‌های بذری می‌باشد.

به‌طورکلی در رقم دی‌کا- ایکس پاور تیمارهای خشک‌کردن سریع بذرها در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد، هیدروپرایمینگ- سریع، شوک حرارتی به‌مدت ۳ ساعت و قراردادن بذرها در پتانسیل ۲/۵- مگاپاسکال در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، نه‌تنها قابلیت ماندگاری بذرها را کاهش ندادند، بلکه موجب بهبود ماندگاری نسبت به بذره‌های شاهد نیز شدند (شکل ۱- ب، ج، د). در مقابل

سایر تیمارها موجب کاهش ماندگاری بذره‌های این رقم شدند. بیش‌ترین آثار منفی بر ماندگاری بذرها مربوط به تنش اسمزی در پتانسیل ۱/۵- مگاپاسکال، تیمارهای اسموپرایمینگ و تیمار هیدروپرایمینگ- آرام بود (شکل ۱- پ، ت، ث، ذ، ر). در رقم تراپر نیز تیمار خشک‌کردن سریع در دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد باعث بهبود ماندگاری بذرها و مقاومت بیش‌تر در مقابل آزمون زوال نسبت به بذره‌های شاهد شد (شکل ۲- ج)؛ اما سایر تیمارها باعث کاهش ماندگاری بذرها شدند. بیش‌ترین اثرات منفی مربوط به تنش اسمزی در پتانسیل ۱/۵- مگاپاسکال و هم‌چنین تیمارهای هیدروپرایمینگ- آرام و اسموپرایمینگ- آرام بود (شکل ۲- پ، ت). از طرفی تیمارهای شوک حرارتی، هیدروپرایمینگ- سریع و تنش اسمزی ۲/۵- مگا پاسکال در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد دارای اثرات منفی کم‌تری نسبت به سایر تیمارها بودند. در رقم هایولا ۵۰ برخلاف دو رقم دیگر تمام تیمارها به‌طور قابل‌توجهی باعث کاهش ماندگاری بذرها شدند. در بذره‌های این رقم کم‌ترین اثر منفی مربوط به تیمارهای شوک حرارتی و بیش‌ترین اثرات منفی مربوط به تیمارهای تنش اسمزی، تیمارهای اسموپرایمینگ و تیمار هیدروپرایمینگ- آرام بود.

درمجموع تیمارهای شوک حرارتی باعث بهبود ماندگاری بذره‌های پرایم‌شده شدند. در مقابل تیمارهای تنش اسمزی به‌خصوص اعمال تنش در دمای پایین (۱۰ درجه سانتی‌گراد) و پتانسیل آب ۱/۵- مگاپاسکال اثرات سوء بیش‌تری بر ماندگاری بذرها پرایم‌شده داشتند. هم‌چنین در مقایسه تیمارهای پرایمینگ و روش‌های خشک‌کردن، پرایمینگ به‌روش هیدروپرایمینگ و خشک‌کردن سریع بذره‌های پرایم‌شده دارای برتری نسبی در حفظ ماندگاری بذرها پرایم‌شده بودند (جدول ۱).

بذره‌های پرایم‌شده در دو مرحله با تنش مواجه می‌شوند

خشک کردن بذرهای پرایم شده در دمای بالا می تواند کارایی انبارداری بذرها و مقاومت به شرایط تنش را افزایش دهد. همچنین دما و رطوبت نسبی در مرحله کاهش رطوبت بذرهای پرایم شده، می تواند کیفیت بذر و به دنبال آن مزایای پرایمینگ را به شدت تحت تأثیر قرار دهد (Copeland & McDonald, 2001).

Soeda *et al.* (2005) بیان کردند الگوی بیان ژن در بذرهای پرایم شده که با روش های مختلف خشک می شوند بسیار متفاوت است. نام بردگان بیان کردند پس از خشک کردن بذرهای پرایم شده به روش آرام، ژن های حفاظت از DNA و تحمل به تنش بیان می گردد. به طوری که پژوهشگران گزارش کردند هنگامی که بذرها پس از پرایمینگ در دمای بالا قرار می گیرند و رطوبت خود را به سرعت از دست می دهند، باعث سنتز پروتئین های شوک حرارتی می شود که این پروتئین ها می توانند در ایجاد یک مکانیسم محافظتی در مقابل زوال بذر نقش داشته و در نهایت می تواند موجب بهبود ماندگاری بذرهای پرایم شده شود (Bruggink *et al.*, 1999; Schipper *et al.*, 2001; Gurusinge *et al.*, 2002).

Debaene-Gill *et al.* (1994) علت تأثیر مثبت خشک کردن بذرها در دمای بالا را این گونه بیان کردند که کاهش رطوبت در دمای بالا به حفظ یکپارچگی غشای سلولی کمک می کند که این امر مانع از بین رفتن ساختارهای سلول و حفظ انسجام ساختاری در شرایط مواجهه با تنش می گردد. در مقابل، کاهش رطوبت بذرها در دمای پایین ممکن است باعث آسیب و افزایش تراوایی غشاهای سلولی شود و قرارگیری بذرهای پرایم شده در دمای پایین به علت ادامه متابولیسم سلولی و امکان رشد ریشه چه می تواند باعث از بین رفتن تحمل به پسابیدگی در جنین و به دنبال آن بروز اثرات منفی به ویژه کاهش ماندگاری بذرها شود (Demir *et al.*, 2005). هنگامی که

که یکی در مرحله آب نوشی و دیگری در مرحله خشک شدن یا پسابیدگی پس از آب نوشی صورت می گیرد (Ventura *et al.*, 2012). صدمات ناشی از جذب آب، تولید گونه های اکسیژن فعال، تنش ناشی از کمبود اکسیژن و تنش ناشی از جذب نمک ها از جمله تنش هایی است که در هنگام آب نوشی و طی پرایمینگ صورت می گیرد (Hardegree & Emmerich, 1994; Chen & Arora, 2013; Ibrahim, 2016). دومین مرحله ای که بذرها در طی پرایمینگ با تنش مواجه می شوند، در مرحله خشک شدن بذرها پس از آب نوشی است. برای خشک کردن بذرها پس از اعمال تیمار پرایمینگ ممکن است از روش سریع و یا روش آرام استفاده شود و روش خشک کردن بذرها پس از پرایمینگ می تواند بر قابلیت جوانه زنی، قدرت و طول عمر بذر اثرگذار باشند (Copeland & McDonald, 2001; Bewley *et al.*, 2013). تأثیر روش خشک کردن بذر بر قدرت و یا طول عمر بذر به نوع بذر بستگی دارد. عموماً، قدرت و طول عمر بذرهایی که پس از پرایمینگ به وسیله روش های آهسته خشک می شوند بیش تر است (Schwember & Bradford, 2005; Demir, 2005). اما شواهدی نیز مبنی بر کارایی بیش تر روش های سریع وجود دارد (Parera & Cantliffe, 1994).

Powell (2000) علت اصلی کاهش ماندگاری بذرهای پرایم شده را پیشروی به سوی حالتی که بذرها تحمل به پسابیدگی را از دست می دهند بیان کرد. نام برده نشان داد ماندگاری بذرهای پرایم شده می تواند به شدت تحت تأثیر شرایط پس از اعمال پرایمینگ قرار بگیرد. به طوری که اعمال تیمارهایی از قبیل شوک حرارتی و تنش اسمزی خفیف می تواند تا حدی از بروز اثرات منفی پرایمینگ بر ماندگاری بذرها جلوگیری کند. همچنین در مطالعه ای (Gurusinge *et al.*, 2002) بیان کردند

بیش از حد متابولیسم جوانه زنی در بذرهای پرایم شده با کاهش تحمل به پسابیدگی در بذرهای ارتباط مستقیم دارد، خشک کردن بذرها به روش آرام ممکن است باعث تخریب ساختارهای غشای سلولی شوند که این آسیب در سلول‌های جنینی به خصوص در محور جنینی بسیار شدیدتر از سایر بافت‌ها است. در مقابل روش سریع خشک کردن باعث حفظ ساختار غشاها می‌شود و می‌تواند به ماندگاری بذر در شرایط تنش کمک کند (Bewley *et al.*, 2013; Timple & Hay, 2018).

با بررسی روند هدایت الکتریکی بذرهای طی آزمون زوال کنترل شده مشخص شد با افزایش دوره زوال در تمامی ارقام کلزا، هدایت الکتریکی در بذرهای شاهد و تیمار شده با روش‌های مختلف پرایمینگ (هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ) و هم‌چنین روش‌های مختلف خشک کردن (آرام و سریع)، هدایت الکتریکی بذرهای افزایش یافت (شکل ۴).

در رقم دی‌کا- ایکس پاور اندازه‌گیری هدایت الکتریکی بذرهای نشان داد پرایمینگ بذر با روش هیدروپرایمینگ باعث کاهش هدایت الکتریکی بذرهای نسبت به بذرهای شاهد شد (قبل از آزمون زوال) که در این بین تأثیر روش خشک کردن سریع بذرهای پرایم شده بیش‌تر بود. در مقابل تیمار اسموپرایمینگ باعث افزایش هدایت الکتریکی بذر نسبت به تیمار شاهد شد. در تمامی تیمارهای طی آزمون زوال هدایت الکتریکی بذرهای به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. اختلاف هدایت الکتریکی بذرهای بین تیمارهای مختلف با پیشروی آزمون زوال افزایش یافت. هم‌چنین هدایت الکتریکی در بذرهای تیمار هیدروپرایمینگ- سریع در طی آزمون زوال کم‌تر از بذرهای شاهد بود درحالی‌که هدایت الکتریکی بذر در سایر تیمارها بیش‌تر از بذرهای شاهد بود (شکل ۴- الف).

در رقم تراپر مقایسه هدایت الکتریکی بذرهای قبل از

رشد ریشه‌چه ادامه یافته و سپس بذر خشک شود آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بذر وارد می‌گردد چراکه نوک ریشه‌چه نخستین بافتی است که در هنگام خشک شدن بذرهای آب‌نوشی شده آسیب می‌بیند (Koster & Leopold, 1998). به‌طور کلی سنتز پروتئین‌های LEA، ساکارز، الیگوساکاریدها و ابسیزیک اسید از جمله مکانیسم‌هایی هستند که با تحمل به پسابیدگی در بذرهای ارتباط تنگاتنگی داشته و بهبود در سنتز این مواد، افزایش ماندگاری بذرهای را سبب می‌شود (Bewley *et al.*, 2013).


همان‌طور که بیان شد در مطالعه حاضر، ازدست دادن رطوبت در دمای بالا (۴۰ درجه سانتی‌گراد) باعث بهبود ماندگاری بذرهای شد (شکل‌های ۱- ج، ۲- ج و ۳- ج). از طرفی نیز اعمال تنش پتانسیل اسمزی در دمای پایین، دارای اثرات مخرب بیش‌تری نسبت به اعمال تنش در دمای بالاتر و هم‌چنین سایر تیمارها بود (شکل‌های ۱، ۲ و ۳؛ جدول ۱). نتایج مطالعات انجام شده در موارد مشابه بر روی بذرهای ذرت و فلفل حاکی از آن بود که زمانی‌که بذرهای پرایم شده ذرت در دمای بالا قرار می‌گیرند قدرت بذر و سبز شدن گیاهچه‌ها نسبت به زمانی که بذرهای در دمای پایین خشک می‌شوند، بهبود می‌یابد (Demir *et al.*, 1994). هم‌چنین (Parera & Cantliffe, 2005) با بیان این‌که دفع آب در دمای بالا می‌تواند باعث حفظ و بهبود بسیاری از معیارهای کیفیت بذر شود؛ نشان دادند اثرات مثبت پرایمینگ زمانی که بذرهای در دمای بالا خشک شدند بیش‌تر از سایر شرایط خشک کردن بذرهای پرایم شده فلفل بود.

محتوی رطوبت بذرهای پرایم شده در روش آرام خشک کردن بذرهای پرایم شده نسبت به روش سریع، در مدت‌زمان طولانی‌تری کاهش می‌یابد (داده‌ها ارائه نشد). از این رو، بالاتر بودن محتوی رطوبت بذرهای به معنی ادامه مسیر متابولیسم جوانه زنی می‌باشد. از آنجایی پیشروی

دو روش خشک کردن به ترتیب باعث کاهش و افزایش هدایت الکتریکی بذرهای تیمار هیدروپرایمینگ-آرام تأثیر معنی داری بر هدایت الکتریکی بذرهای نداشت. در طی آزمون زوال تمامی تیمارها موجب افزایش هدایت الکتریکی بذرهای نسبت به بذرهای شاهد به خصوص در روز نهم آزمون زوال شدند که در این بین پرایمینگ بذر به روش اسموپرایمینگ نسبت به هیدروپرایمینگ هدایت الکتریکی بذرهای، به مقدار بیش تری افزایش داد. در روش اسموپرایمینگ بین روش های خشک کردن تفاوت معنی داری از لحاظ هدایت الکتریکی بذرهای طی آزمون زوال وجود نداشت. در حالی که خشک کردن بذرهای به روش آرام در مقایسه با روش سریع در بذرهای پرایمینگ شده با روش هیدروپرایمینگ موجب افزایش هدایت الکتریکی بذرهای شد (شکل ۴-ج).

آزمون زوال نشان داد تیمار هیدروپرایمینگ-سریع موجب کاهش هدایت الکتریکی بذرهای شد، در حالی که تیمار هیدروپرایمینگ-آرام تأثیر معنی داری بر هدایت الکتریکی بذرهای نداشت. از طرفی تیمارهای اسموپرایمینگ-آرام و اسموپرایمینگ-سریع موجب افزایش هدایت الکتریکی بذرهای (قبل از آزمون زوال) شد. با شروع و افزایش دوره زوال، هدایت الکتریکی بذرهای در تمامی تیمارها به شدت افزایش یافت. در مقایسه بین تیمارهای مختلف طی آزمون زوال تمامی تیمارهای پرایمینگ و روش های خشک کردن بذرهای پرایم شده باعث افزایش هدایت الکتریکی بذرهای شدند (شکل ۴-ب).

در رقم هایولا ۵۰، هدایت الکتریکی بذرهای قبل از آزمون زوال الگویی مشابه با رقم تراپر نشان داد و تیمارهای هیدروپرایمینگ-سریع و اسموپرایمینگ با هر



شکل ۴. هدایت الکتریکی بذرهای ارقام کلزا طی آزمون زوال کنترل شده. a, b, c, d و e به ترتیب نشان دهنده تیمارهای شاهد، هیدروپرایمینگ-آرام، هیدروپرایمینگ-سریع، اسموپرایمینگ-آرام و اسموپرایمینگ-سریع می باشد.

هرچه سرعت کاهش رطوبت بذرهای بیشتر باشد می‌تواند موجب بهبود ماندگاری بذرهای شود و همچنین قراردادن بذرهای در دمای بالا می‌تواند علاوه بر حفظ ماندگاری بذرهای موجب بهبود در طول عمر بذرهای نیز گردد. بنابراین پرایمینگ همیشه باعث کاهش طول عمر بذرهای نبوده و با کنترل شرایط پرایمینگ و همچنین شرایط بذرهای پس از پرایمینگ می‌توان از آثار مثبت این تکنیک به صورت کارآمد استفاده کرد.

#### ۵. تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

#### ۶. منابع

- Abdolahi, M., Andelibi, B., Zangani, E., Shekari, F. & Jamaati-e-Somarin, S. (2012). Effect of accelerated aging and priming on seed germination of rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 3, 499-508.
- Alivand, R., Tavakkol Afshari, R. & Sharifzadeh, F. (2013). Investigation of rapeseed (*Brassica napus*) seed germination and forecasting of seed deterioration under different storage conditions. *Iranian Journal of Field Crop Science*, 44, 69-83. (in Persian)
- Argerich, C. A., Bradford, K. J. & Tarquis, A. M. (1989). The effects of priming and ageing on resistance to deterioration of tomato seeds. *Journal of Experimental Botany*, 40(5), 593-598. DOI: 10.1093/jxb/40.5.593.
- Belmont, J., Sánchez-Coronado, M. E., Osuna-Fernández, H.R., Orozco-Segovia, A. & Pisanty, I. (2018). Priming effects on seed germination of two perennial herb species in a disturbed lava field in central Mexico. *Seed Science Research*, 28(1), 63-71. DOI: 10.1017/S0960258518000016.
- Bewley, J.D., Bradford, K.J., Hilhorst, H.W.M. & Nonagaki, H. (2013). *Seeds: physiology of development, germination and dormancy*, 3th Edition. Springer. New York Heidelberg Dordrecht London, Switzerland. 392pp.
- Bruggink, G., Ooms, J. & Van der Toorn, P. (1999). Induction of longevity in primed seeds. *Seed Science Research*, 9(1), 49-53.

افزایش نشت الکترولیت‌ها طی زوال طبیعی و مصنوعی در بذرهای کلزا توسط پژوهش‌گران بیان شده است (Abdolahi et al., 2012; Alivand et al., 2013). هدایت الکتریکی در دوره‌های پایانی زوال در بذرهای پرایم‌شده بیشتر از بذرهای بدون پرایمینگ (شاهد) بود. همچنین در مقایسه بذرهای پرایم‌شده، روش آرام خشک‌کردن بذرهای باعث افزایش نشت الکترولیت‌ها شد. همان‌طورکه پیش‌تر نیز بیان شد افزایش زمان آب‌نوشی و همچنین افزایش زمان خشک‌کردن باعث از بین رفتن ساختار غشاهای می‌شود. از بین رفتن ساختار غشای سلولی به معنی از دست دادن خاصیت نفوذپذیری انتخابی بذرهای و به دنبال آن نشت مواد به خارج از سلول، تسریع فرایند پیری در بذر و نهایتاً مرگ بذرهای می‌باشد (Debaene-Gill et al., 1994; Schipper et al., 2001; Bewley et al., 2013).

#### ۴. نتیجه‌گیری

آثار پرایمینگ بسته به رقم، شیوه انجام پرایمینگ و تیمارهای مختلف در مرحله خشک‌کردن بذرهای پرایم‌شده بسیار متفاوت بود. به‌طورکلی در بذرهای هر سه رقم کلزای مورد مطالعه، پرایمینگ به‌روش هیدروپرایمینگ آثار منفی کم‌تری بر قابلیت ماندگاری بذرهای نسبت به اسموپرایمینگ داشت. در خصوص روش‌های خشک‌کردن بذرهای پرایم‌شده نیز خشک‌کردن بذرهای در مدت‌زمان کوتاه‌تر (روش سریع) در بهبود آثار منفی پرایمینگ می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تیمارهای شوک حرارتی نیز می‌تواند در القای ماندگاری به بذرهای پرایم‌شده کارآمد واقع شوند مشروط به این‌که به روش و مدت اعمال شوک حرارتی توجه شود. قراردادن بلافاصله بذرهای پرایم‌شده در معرض پتانسیل‌های اسمزی غالباً موجب تشدید آثار منفی پرایمینگ شد و طول عمر بذرهای را کاهش داد. به‌عبارت بهتر از نتایج این مطالعه می‌توان استنباط کرد در خصوص پرایمینگ بذرهای کلزا،

- Bujalski, W. & Nienow, A. (1991). Large-scale osmotic priming of onion seeds: a comparison of different strategies for oxygenation. *Scientia Horticulturae*, 46(1-2), 13-24. DOI: 10.1016/0304-4238(91)90088-G.
- Butler, L., Hay, F., Ellis, R., Smith, R. & Murray, T. (2009). Priming and re-drying improve the survival of mature seeds of *Digitalis purpurea* during storage. *Annals of Botany*, 103(8), 1261-1270. DOI: 10.1093/aob/mcp059.
- Balouchi, H. R., Bagheri, F., Kayednezami, R., Movahedi, D.M. & Yadavi, A.R. (2014). Effect of seed aging on germination and seedling growth indices in three cultivars of *Brassica napus* L. *Iranian Journal of Plant Researches*, 26, 397-411. (In Persian).
- Chen, K. & Arora, R. (2013). Priming memory invokes seed stress-tolerance. *Environmental and Experimental Botany*, 94, 33-45. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2012.03.005.
- Chiu, K., Chen, C. & Sung, J. (2002). Effect of priming temperature on storability of primed sh-2 sweet corn seed. *Crop Science*, 42(6), 1996-2003.
- Copeland, L.O. & McDonald, M.B. (2001). *Principles of seed science and technology*. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. pp. 278-281.
- Dearman, J., Brocklehurst, P. & Drew, R. (1986). Effects of osmotic priming and ageing on onion seed germination. *Annals of Applied Biology*, 108(3), 639-648. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1986.tb02003.x.
- Debaene-Gill, S.B., Allen, P.S. & White, D.B. (1994). Dehydration of germinating perennial ryegrass seeds can alter rate of subsequent radicle emergence. *Journal of Experimental Botany*, 45(9), 1301-1307. DOI:10.1093/jxb/45.9.1301.
- Demir, I., Ermis, S. & Okcu, G. (2005). Effect of dehydration temperature and relative humidity after priming on quality of pepper seeds. *Seed Science and Technology*, 33(3), 563-569. DOI: 10.15258/sst.2005.33.3.04.
- Ellis, R. & Hong, T. (1994). Desiccation tolerance and potential longevity of developing seeds of rice (*Oryza sativa* L.). *Annals of Botany*, 73(5), 501-506.
- Ellis, R. & Hong, T. (2007). Quantitative response of the longevity of seed of twelve crops to temperature and moisture in hermetic storage. *Seed Science and Technology*, 35(2), 432-444. DOI: 10.15258/sst.2007.35.2.18.
- Farhoudi, R., Sharifzadeh, F., Poustini, K., Makkizadeh, M. & Kochak Por, M. (2007). The effects of NaCl priming on salt tolerance in canola (*Brassica napus*) seedlings grown under saline conditions. *Seed Science and Technology*, 35(3), 754-759. DOI: 10.15258/sst.2007.35.3.23.
- Farooq, M., Basra, S., Afzal, I. & Khaliq, A. (2006). Optimization of hydropriming techniques for rice seed invigoration. *Seed Science and Technology*, 34(2), 507-512. DOI: 10.15258/sst.2006.34.2.25.
- Ghaderi-Far, F., Alimaghham, S., Kameli, A. & Jamali, M. (2012). Isabgol (*Plantago ovata* Forsk) seed germination and emergence as affected by environmental factors and planting depth. *International journal of plant production*, 6, 185-194. (in Persian)
- González-Zertuche, L., Orozco-Segovia, A., Baskin, C. & Baskin, J. (2002). Effects of priming on germination of *Buddleja cordata* ssp. *cordata* (Loganiaceae) seeds and possible ecological significance. *Seed Science and Technology*, 30(3), 535-548.
- Gorzin, M., Ghaderi-Far, F., Zeinali, E., Razavi, S.E. & Monyan Ardestani, M. (2015). The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams. *Journal of Crops Improvement*, 1 (17), 139-153. (In Persian)
- Gurusinghe, S., Powell, A. L. & Bradford, K. J. (2002). Enhanced expression of BiP is associated with treatments that extend storage longevity of primed tomato seeds. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 127(4), 528-534. DOI: 10.21273/JASHS.127.4.528.
- Hampton, J.G. & TeKrony, D. M. (1995). *Handbook of vigor test methods*. The International Seed Testing Association, Zurich. 117 pp.
- Hardegree, S. P. & Emmerich, W. E. (1994). Seed germination response to polyethylene glycol solution depth. *Seed Science and Technology*, 22, 1-7.
- Hay, F. & Probert, R. (1995). Seed maturity and the effects of different drying conditions on desiccation tolerance and seed longevity in foxglove (*Digitalis purpurea* L.). *Annals of Botany*, 76(6), 639-647. DOI: 10.1006/anbo.1995.1142.
- Hill, H., Cunningham, J. D., Bradford, K. J. & Taylor, A. (2007). Primed lettuce seeds exhibit increased sensitivity to moisture content during controlled deterioration. *HortScience*, 42(6), 1436-1439. DOI: 10.21273/HORTSCI.42.6.1436.

- Hussain, S., Zheng, M., Khan, F., Khaliq, A., Fahad, S., Peng, S. & Nie, L. (2015). Benefits of rice seed priming are offset permanently by prolonged storage and the storage conditions. *Scientific reports*, 5, 8101.
- Ibrahim, E.A. (2016). Seed priming to alleviate salinity stress in germinating seeds. *Journal of Plant Physiology*, 192, 38-46. DOI: 10.1016/j.jplph.2015.12.011.
- Jafar, M., Farooq, M., Cheema, M., Afzal, I., Basra, S., Wahid, M. & Shahid, M. (2012). Improving the performance of wheat by seed priming under saline conditions. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 198(1), 38-45. DOI: 10.1111/j.1439-037X.2011.00485.x.
- Koster, K. L. & Leopold, A. C. (1988). Sugars and desiccation tolerance in seeds. *Plant Physiology*, 88(3), 829-832. DOI: 10.1104/pp.88.3.829.
- Malek, M., Ghaderi-Far, F., Torabi, B., Sadeghipour, H.R. & Hay, F.R. (2019). The influence of seed priming on storability of rapeseed (*Brassica napus*) seeds. *Seed Science and Technology*, 47, 87-92. DOI: 10.15258/sst.2019.47.1.09.
- Malik, C.P. & Jyoti. (2013). Seed deterioration: A review. *International Journal of Life Science Biotechnology and Pharma Resarch*, 3, 374-385.
- McDonald, M. B. (2000). *Seed priming*. (eds. M. Black & J.D. Bewley). Sheffield Academic press. PP: 287-325.
- Parera, C. A. & Cantliffe, D. J. (1994). Dehydration rate after solid matrix priming alters seed performance of shrunken-2 corn. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 119(3), 629-635. DOI: 10.21273/JASHS.119.3.629.
- Powell, A. A., Yule, L. J., Jing, H. C., Groot, S. P., Bino, R. J. & Pritchard, H. W. (2000). The influence of aerated hydration seed treatment on seed longevity as assessed by the viability equations. *Journal of Experimental Botany*, 51(353), 2031-2043. DOI: 10.1093/jexbot/51.353.2031.
- Schipper, J., Van der Toorn, P. & Bruggink, T. (2001). Process for prolonging the shelf life of primed nongerminated seeds. United States patent US. 6, 313-377.
- Schwember, A.R. & Bradford, K.J. (2010). Quantitative trait loci associated with longevity of lettuce seeds under conventional and controlled deterioration storage conditions. *Journal of Experimental Botany*, 61, 4423-4436. DOI: 10.1093/jxb/erq248.
- Schwember, A. R. & Bradford, K. J. (2005). Drying rates following priming affect temperature sensitivity of germination and longevity of lettuce seeds. *HortScience*, 40(3), 778-781. DOI: 10.21273/HORTSCI.40.3.778.
- Sliwiska, E. & Jendrzyczak, E. (2002). Sugar-beet seed quality and DNA synthesis in the embryo in relation to hydration-dehydration cycles. *Seed Science and Technology*, 30(3), 597-608.
- Soeda, Y., Konings, M.C., Vorst, O., van Houwelingen, A.M., Stoopen, G.M., Maliepaard, C.A. & van der Geest, A.H. (2005). Gene expression programs during *Brassica oleracea* seed maturation, osmopriming, and germination are indicators of progression of the germination process and the stress tolerance level. *Plant physiology*, 137(1), 354-368. DOI: 10.1104/pp.104.051664.
- Soltani, A., Galeshi, S., Latifi, N. & Zeynali, E. (2001). Genetic variation for and interrelationships among seed vigor traits in wheat from the Caspian Sea coast of Iran. *Seed Science and Technology*, 29, 653-662.
- Timple, S.E. & Hay, F.R. (2018). High-temperature drying of seeds of wild *Oryza* species intended for long-term storage. *Seed Science and Technology*, 46, 107-112. DOI: 10.15258/sst.2018.46.1.10.
- Ventura, L., Dona, M., Macovei, A., Carbonera, D., Buttafava, A., Mondoni, A., Rossi, G. & Balestrazzi, A. (2012). Understanding the molecular pathways associated with seed vigor. *Plant Physiology and Biochemistry*, 60, 196-206. DOI: 10.1016/j.plaphy.2012.07.031.
- Vieira, R.D., Tekrony, D., Egli, D. & Rucker, M. (2001). Electrical conductivity of soybean seeds after storage in several environments. *Seed Science and Technology*, 3, 599-608.