

اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (*Carthamus tinctorius* L.)

امید محسن نیا^۱ و جلال جلیلیان^{۲*}

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۸/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۲/۱۶

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (*Carthamus tinctorius* L.) به صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹ اجرا شد. تیمارها شامل، آبیاری کامل (I₁)، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (I₂) و زایشی (I₃)، به عنوان کرت‌های اصلی و منابع کودی شامل بدون کود (شاهد) (C)، اوره (U)، کود آلی هیومیکس (O)، بیولوژیک (نیتروکسین (N) و بیوسولفور (B))، تلفیقی: (اوره + هیومیکس + نیتروکسین) (T₁) و (اوره + هیومیکس + بیوسولفور) (T₂)، به عنوان کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تنش کم‌آبی و منابع کودی بر تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه و درصد روغن گلرنگ معنی‌دار بود. بیشترین تعداد طبق در بوته (۱۸/۳) در تیمار I₁T₂ و کمترین تعداد آن (۱۰/۴) در I₂U دیده شد. بالاترین (۴۴/۷ گرم) و پایین‌ترین (۳۲/۰۵ گرم) وزن هزار دانه نیز به ترتیب در تیمارهای I₃T₂ و I₁O بدست آمد. تیمارهای I₁B و I₃C به ترتیب بیشترین و کمترین میزان روغن را دارا بودند. از تیمار I₁ بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک (۸۱۹/۶ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد، در حالیکه کمترین مقدار آن در تیمار I₂ مشاهده شد. تیمارهای آبیاری I₁ و I₂ بیشترین و کمترین وزن دانه در طبق و عملکرد دانه را دارا بودند. بیشترین مقدار عملکرد دانه (۲۸۳۰ کیلوگرم در هکتار) در تیمار T₂ و کمترین مقدار آن (۱۸۴۵/۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار بدون کود بدست آمد. به طور کلی، اعمال تنش کم‌آبی در مرحله رشد رویشی باعث بیشترین کاهش در اکثر صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ شد. در بین منابع کودی، تیمار کود تلفیقی (اوره + هیومیکس + بیوسولفور) بیشترین اثر مفید بر تولید گلرنگ داشت.

واژه‌های کلیدی: قطع آبیاری، کود آلی، کود زیستی، میزان روغن

مقدمه

کشت دانه‌های روغنی و افزایش عملکرد آن‌ها برای کاهش وابستگی به کشورهای دیگر ضروری است (Kafi & Rostami, 2007). از طرفی، با توجه به محدودیتی که از لحاظ منابع آبی و خاکی در کشور وجود دارد، امکان در اختیار گرفتن اراضی جدید برای توسعه کشت دانه‌های روغنی، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. از این‌رو، بیشتر فعالیت‌ها باید روی افزایش عملکرد در واحد سطح، متمرکز شود که می‌توان از طریق اجرای پروژه‌های به‌نژادی و به‌زراعی، راندمان تولید این محصولات را در واحد سطح، افزایش داد. دانه گلرنگ (*Carthamus tinctorius* L.) دارای ۲۵ تا ۴۵ درصد روغن و حاوی ۱۲ تا ۲۴ درصد پروتئین می‌باشد (Khajehpour, 2004; Zainali, 1999) که بین ۷۸ تا ۹۰ درصد روغن گلرنگ را اسیدهای چرب غیراشباع ضروری (اولئیک^۳ و لینولئیک^۴) تشکیل می‌دهند (Zainali, 1999). کمیت و کیفیت گیاهان زراعی به خصوص دانه‌های روغنی تا

امنیت غذایی در کنار حفظ محیط زیست به یک موضوع مهم جهانی در دهه‌های اخیر تبدیل شده است، در جهان امروز که با رشد روز افزون جمعیت مواجه هستیم، اهمیت مدیریت کاربردهای شیمیایی و عناصر غذایی بیشتر مشخص می‌شود (Ghafari et al., 2010). نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌های انستیتو تغذیه ایران حاکی از آن است که ۲۱ درصد از انرژی روزانه مردم کشورمان از طریق مصرف روغن تأمین می‌شود. از طرفی، تولید دانه‌های روغنی به حداقل رسیده، به طوری که بیش از سه میلیون تن در سال، دانه روغنی، روغن خام و کنجاله وارد و بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود (IVOI, 2011). بنابراین، افزایش سطح زیر

۱ و ۲- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

(*- نویسنده مسئول: (E-mail: j.jalilian@urmia.ac.ir)

3- Oleic

4- Linoleic

بیولوژیکی از جمله کودهای نیتروژنه را برای بهبود خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه آفتابگردان توصیه نمودند. بشارتی و صالح راستین (Besharati & Saleh-Rastin, 2001) اظهار داشتند که استفاده از مایه تلقیح تیوباسیلوس همراه با مصرف گوگرد در خاک، وزن خشک ریشه و اندام‌های هوایی ذرت (*Zea mays L.*) را به طور معنی‌داری بهبود می‌بخشد. توحیدی مقدم و همکاران (Tohidi Moghadam et al., 2007) بیشترین تعداد غلاف در هر گیاه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد فسفر دانه سویا (*Glycine max L.*) را بر اثر تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک همراه با مصرف ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و ۱۵ کیلوگرم در هکتار اوره به دست آوردند. همچنین گزارش شده است که افزودن مواد آلی به خاک باعث افزایش عناصر غذایی و قابلیت جذب آنها توسط گیاه شده و بدین ترتیب منجر به افزایش تعادل نیتروژنی و کارایی جذب فسفر می‌شود (Brussard & Ferrera-Cenato, 1997). تعادل عناصر غذایی در گیاهان بستگی به تأمین رطوبت خاک دارد، کمبود رطوبت خاک باعث عدم تعادل تغذیه‌ای می‌شود. در همین راستا، بهدانی و موسوی‌فر (Behdani & Mousavifar, 2011) با بررسی اثر کم‌آبیاری بر وزن خشک اندام‌های هوایی سه ژنوتیپ گلرنگ گزارش نمودند که با افزایش مدت زمان آبیاری از وزن خشک اندام‌های هوایی هر سه ژنوتیپ کاسته شد.

بدین ترتیب، با توجه به این که خشکی و کم‌آبی در ایران همواره از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشاورزی است و از این پدیده طبیعی و غیرقابل تغییر راه فراری نیست و از طرفی، مصرف منابع انرژی، آب و مواد غذایی به طور روزافزونی در جامعه افزایش می‌یابد، لذا بایستی به جای تأکید بر معایب ناشی از آن در صدد مقابله با آن کمر همت بسته و به چاره‌اندیشی پرداخت. بنابراین، پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی کاربرد سیستم‌های مختلف کودی در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار و تعیین تغذیه بهینه گلرنگ در شرایط تنش کم‌آبی اجرا گردید.

مواد و روش‌ها

آزمایش در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه (واقع در عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۳۲ ثانیه و طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۴۱ ثانیه از نصف‌النهار گرینویچ) با ۱۳۲۰ متر ارتفاع از سطح دریا انجام شد. در این تحقیق اثرات دو عامل در قالب کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. کرت‌های اصلی شامل تنش کم‌آبی با سه سطح (آبیاری کامل (I₁))، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (I₂) و قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (I₃) و

حدود زیادی تحت تأثیر حاصلخیزی خاک و عناصر غذایی می‌باشد. هماهنگ‌سازی نیاز گیاه با عرضه عناصر غذایی بسیار مشکل است، مخصوصاً اگر عناصر غذایی فقط از منابعی تأمین گردند که چرخه آنها نیازمند واسطه‌گری میکروارگانیسم‌ها و مشمول تجزیه طیفی از مواد آلی متنوع باشند. با وجود این به نظر می‌رسد که در نظام‌های کشتی که از هر دو راهکار کوددهی، یعنی کودهای شیمیایی و آلی استفاده می‌شود، دستیابی به کارایی بهینه استفاده از عناصر غذایی امکان پذیر باشد (Asadi Rahmani et al., 2007). امروزه به دلیل استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی، مواد آلی زمین‌های کشاورزی در ایران کاهش یافته و ترکیب خاک به بافت سخت و نامطلوبی تبدیل شده است (Naghavi Maremati et al., 2007)، در حالیکه جایگزینی آنها با کودهای آلی و زیستی نقش مهمی را در سلامتی محیط زیست ایفا می‌کند (Chandrasekar et al., 2005). کودهای زیستی در حقیقت ماده‌ای شامل انواع مختلف ریزموجودات آزادی بوده که توانایی تبدیل عناصر غذایی اصلی را از فرم غیر قابل دسترس به فرم قابل دسترس طی فرایندهای بیولوژیکی داشته و منجر به توسعه سیستم ریشه‌ای و جوانه‌زنی بهتر بذور می‌گردند (Rajendran & Devarj, 2004; Chen, 2006; Vessey, 2003). از جمله کودهای زیستی که حاوی ریزموجودات متعددی هستند می‌توان به /زوتوباکتر، نیتروکسین، تیوباسیلوس، بیوسولفور و میکوریزا اشاره کرد (Blak, 2003). باکتری‌های موجود در کود بیولوژیک نیتروکسین علاوه بر تثبیت نیتروژن هوا و متعادل کردن جذب عناصر پر مصرف و ریز مغذی مورد نیاز گیاه، ترشح اسیدهای آمینه و انواع آنتی‌بیوتیک، سیانید هیدروژن و سیدروفور را نیز بر عهده دارند و موجب رشد و توسعه ریشه و قسمت‌های هوایی گیاهان، محافظت از ریشه‌ها در برابر عوامل بیماری‌زای خاکری و در نتیجه افزایش محصول می‌گردد (Gilik et al., 2001). کود بیولوژیک بیوسولفور به منظور تسریع در اکسیداسیون گوگرد گرانوله آلی، تغییر pH خاک، فراهم نمودن شرایط ایده‌آل برای جذب عناصر ریز مغذی و پر مصرف مورد نیاز گیاهان مختلف در خاکهای آهکی و قلیایی به استثنای مزارع برنج کاربرد دارد. به علاوه، هر یک از گونه‌های این جنس می‌تواند طیف خاصی از مواد گوگردی را اکسیده کند.

در تحقیق میرزاخانی و همکاران (Mirzakhani et al., 2008) مشخص شد که تلقیح بذر گلرنگ بهاره با باکتری آزادی /زوتوباکتر و قارچ میکوریز علاوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن، موجب افزایش مقاومت گیاهان در برابر عوامل نامساعد محیطی و بهبود کیفیت محصول می‌گردد. نتایج مطالعه هادی و همکاران (Hadi et al., 2011) روی بررسی تأثیر /آروسپیریوم لیپوفروم بر ویژگی‌های گیاهچه آفتابگردان (*Helianthus annuus L.*) حاصل از بذر شرایط کم‌آبی نشان داد که تلقیح با این باکتری بهبود خصوصیات جوانه‌زنی را در مقایسه با شاهد موجب شد. بدین ترتیب، آنها تلقیح با کودهای

کرت‌های فرعی شامل، تغذیه گیاهی با هفت سطح (بدون کود (شاهد) (C)، اوره (U)، کود آلی هیومیکس (O)، بیولوژیک (نیتروکسین (N) و بیوسولفور (B))، تلفیقی (اوره + هیومیکس + نیتروکسین) (T₁) و (اوره + هیومیکس + بیوسولفور) (T₂)، در نظر گرفته شدند. کود اوره به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار (نصف مقدار توصیه شده در زمان آماده‌سازی زمین و باقیمانده آن در مرحله ۵-۶ برگی) مصرف شد. نیتروکسین حاوی باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن از جنس *lipoferoum Azotobacter chorococum* و *Azospirillum* و حل‌کننده فسفات از جنس *Pseudomonas sp.* بود و به میزان دو لیتر در هکتار و به صورت بذر مال استفاده شد. بیوسولفور نیز حاوی میکروارگانیسم‌های اکسید کننده گوگرد از جنس *Thiobacillus ssp.* بوده و به میزان پنج کیلوگرم در هکتار استفاده شد. همچنین کود آلی هیومیکس (حاوی ۱۲ درصد اسید فولیک، ۶۸ درصد اسید هیومیک و ۱۵-۱۳ درصد پتاسیم) بود و به میزان دو کیلوگرم برای یک تن بذر به صورت بذر مال استفاده شد. کود آلی هیومیکس ۹۵ (Humix 95) ساخته شده توسط شرکت Fertibuy، کشور چین می‌باشد که در ایران توسط شرکت آرمان سبز آدینه توزیع می‌گردد. کودهای بیولوژیک استفاده شده در این تحقیق توسط شرکت فن‌آوری زیستی مهر آسیا (MABCO)، تحت لیسانس و نظارت مستقیم مؤسسه خاک و آب کشور تولید شده بودند. تمامی عملیات بذر مال کردن کودها در سایه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید صورت گرفت که شامل قرار دادن بذر به مدت ۳۰ دقیقه در محلول باکتریایی با ۱۰^۸ سلول زنده در هر میلی‌لیتر (CUF) بود و بلافاصله پس از خشک شدن بذرها در سایه، اقدام به کاشت گردید. از زمین محل اجرای آزمایش قبل از کشت از عمق ۳۰-۰ سانتی‌متری خاک نمونه‌برداری و اقدام به تجزیه خاک شد (جدول ۱).

مرحله رشدی V₁₅ و R_{3.2} به عنوان مراحل اعمال تیمارهای قطع آبیاری در موقع رشد رویشی و زایشی در نظر گرفته شدند (Tanaka

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک محل آزمایش

Table 1- Soil Physico-chemical properties in experimental site

نقطه	ظرفیت	پتاسیم	فسفر (میلی گرم در کیلوگرم)	نیتروژن کل	کربن	اسیدیته	هدایت	بافت
پژمردگی	زراعی	(میلی گرم در کیلوگرم)	Phosphorus (mg.kg ⁻¹)	(درصد)	آلی	خاک	الکتریکی	خاک
دائم (درصد)	(درصد)	Potassium (mg.kg ⁻¹)		Total nitrogen (%)	(درصد)	(pH)	(دسی‌زیمنس بر متر)	Soil texture
PWP* (%)	F.C* (%)				OC (%)		EC (dS.m ⁻¹)	
14.5	27.99	395	11.6	0.094	0.94	7.15	0.54	لومی رسی Clay loam

*F.C: ظرفیت زراعی و PWP: نقطه پژمردگی دائم

*F.C: Field Capacity and PWP: Permanent Wilting Point

1- Least Significant Difference

جدول ۲- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش های مختلف کم آبی و تیمار کودی
Table 2- Analysis of variance (mean comparisons) of yield and yield components of safflower under water deficit stress and fertilizer treatment

میزان روغن Oil content	شاخص برداشت Harvest index	عملکرد بیولوژیک Biologic yield	عملکرد دانه Seed yield	وزن هزار دانه 1000-seed weight	وزن دانه در طبق Weight of seed per head	وزن دانه در طبق No. of seeds per head	تعداد طبق در بوته No. of head per plant	وزن پر طبق Head weight full	درجه آزادی Df	منابع تغییر S.O.V
1.94 ^{ns}	11.44 ^{ns}	1349761.1 ^{ns}	31926.19 ^{ns}	0.423 ^{ns}	0.002 ^{ns}	16.10 ^{ns}	0.58 ^{ns}	0.018 ^{ns}	2	بلوک Block
11.02 ^{ns}	76.72 ^{ns}	57712063.1 ^{**}	4605921.3 ^{**}	76.6 ^{**}	0.219 [*]	341.06 ^{ns}	94.28 ^{**}	0.546 ^{ns}	2	تنش کم آبی (A) Water deficit stress (A)
9.84	30.59	2658215.3	214573.6	4.17	0.015	59.09	1.59	0.161	4	اشتباه کرت اصلی (Ea) Main plot error (Ea)
12.04 ^{**}	83.38 [*]	7836898.4 ^{**}	1291913.3 ^{**}	18.18 ^{**}	0.155 ^{**}	149.59 ^{**}	13.23 ^{**}	0.272 ^{**}	6	تیمار کودی (B) Fertilizer (B)
7.44 ^{**}	50.49 ^{ns}	1012537.6 ^{ns}	96456.4 ^{ns}	16.94 ^{**}	0.068 ^{ns}	37.65 ^{ns}	2.10 [*]	0.063 ^{ns}	12	تنش کم آبی × تیمار کودی A × B
2.20	27.05	937154.6	94373.3	3.23	0.037	20.95	0.884	0.062	36	اشتباه آزمایشی (Eb) Sub plot error (Eb)
6.27	14.28	13.83	12.61	4.58	16.64	14.98	6.83	8.51		ضریب تغییرات (%) CV (%)

ns, * and ** are non significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively
* ns و ** به ترتیب نشانگر عدم معنی داری و معنی داری در سطح احتمال پنج و یک درصد می باشد.

نتایج و بحث

را می‌توان به کاهش تعداد دانه در طبق در اثر قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی، و در نتیجه افزایش سهم مواد فتوسنتزی اختصاص یافته به هر دانه مرتبط دانست. افزایش وزن هزار دانه در شرایط قطع آبیاری توسط امید (Omidi, 2009)، نیز گزارش شده است، این محقق با بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی مختلف بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره، با قطع آبیاری در مرحله تکمه‌زنی شاهد افزایش وزن هزار دانه بود که دلیل آن را کاهش تعداد دانه در طبق در اثر قطع آبیاری در مرحله تکمه زنی و و پرشدن کامل دانه به دلیل انجام آبیاری در مراحل بعدی گزارش کرد.

عملکرد بیولوژیک شامل کل وزن خشک اندام هوایی گیاه است. نتایج تجزیه واریانس این صفت بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای آبیاری در سطح یک درصد بود (جدول ۲). بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک (۸۱۹/۶ کیلوگرم در هکتار) در شرایط آبیاری کامل (I₁) بدست آمد، در حالیکه کمترین مقدار آن (۵۵۷۶/۸ کیلوگرم در هکتار) در شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (I₂) بدست آمد (جدول ۳). کاهش عملکرد بیولوژیک ناشی از کاهش تجمع ماده خشک است و از آنجائی که در مرحله V₁₅ هنوز گیاه با سرعت تقریباً زیادی ماده خشک را تجمع می‌دهد، قطع آبیاری در این مرحله باعث آسیب زیادی به ماده خشک جمعی و در نهایت عملکرد بیولوژیک می‌شود، در حالی که با قطع آبیاری در مراحل پایانی رشد یعنی تیمار I₃ میزان خسارت کمتر می‌شود. برخی از محققان نیز با بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گلرنگ گزارش کردند که کاهش تجمع ماده خشک یکی از اولین عوامل در گیاه است که با قطع آبیاری دچار افت می‌شود و هر چه قطع آبیاری در مراحل رشد سریع گیاه باشد میزان خسارت آن زیادتر خواهد شد؛ به طوریکه کاهش میزان آب در دسترس گیاه در اواخر مراحل رشد تأثیر کمتری بر عملکرد بیولوژیک گیاه دارد (Abulhashem et al., 1998; Omidi, 2009).

اثر متقابل تنش کم‌آبی در تیمار کودی به استثنای تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه و درصد روغن بر سایر صفات مورد بررسی اثر معنی‌داری نداشت (جدول ۲)، بر این اساس بیشترین، تعداد طبق در بوته (به میزان ۱۸/۳ طبق) در شرایط آبیاری کامل (I₁) و تغذیه شده با تیمار تلفیقی T₂ و کمترین تعداد آن (۱۰/۴ طبق) در I₂ دیده شد. به عبارت دیگر، قطع آبیاری در زمان رشد رویشی (I₂) و تیمار کودی اوره تعداد طبق در بوته را به میزان ۴۳/۲ درصد نسبت به شرایط I₁ و تیمار کودی T₂ کاهش داد (جدول ۶). به طور کلی، تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد طبق در بوته در نتیجه ترکیب ساختار ژنتیکی و شرایط محیطی است که نقش برجسته‌ای در عملکرد نهایی دانه بازی می‌کند. اعمال قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی می‌تواند مانع رشد جوانه‌های جانبی شده و تعداد شاخه فرعی را کاهش داد، در نتیجه سبب کاهش تعداد طبق در بوته شود (Hayashi & Hanada, 1985).

محققان دیگر نیز نتایج مشابهی گزارش کرده‌اند، به طوری که در آزمایشی مشخص شد که با افزایش شدت تنش خشکی در گلرنگ، از تعداد طبق در بوته کاسته شد (Haghighat Nia, 2011). بیشترین وزن هزار دانه (۴۴/۷ گرم) از تیمار تلفیقی T₂ و در شرایط آبیاری I₃ بدست آمد، در حالی که کمترین میزان آن (۳۲/۰۵ گرم) در تیمار کود آلی هیومیکس و در شرایط I₁ دیده شد (جدول ۶). بالا بودن وزن هزار دانه در تیمار I₃T₂ کارایی بهتر در تلفیق کود ارگانیک با بیوسولفور و کود شیمیایی نسبت به کاربرد تنه‌های کود ارگانیک را نشان می‌دهد که این یافته را می‌توان از طریق کارایی بهتر سیستم‌های تلفیقی در افزایش فعالیت‌های میکروبی و آنزیمی و آزادسازی عناصر غذایی موجود در کلوئیدهای خاک نسبت به سایر سیستم‌ها توجیه کرد (Shyalaja & Swarajy Alakshmi, 2004). همچنین بیشتر بودن وزن هزار دانه در تیمار I₃ نسبت به آبیاری کامل

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات مختلف گلرنگ در تنش‌های متفاوت کم آبی

Table 3- Comparison of means of different characteristics of safflower in water deficit stress

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) Biologic yield (kg. ha ⁻¹)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) Seed yield (kg. ha ⁻¹)	وزن دانه در طبق (گرم) Weight of seed per head (g)	تنش کم‌آبی Water deficit stress
8819.64 a	2952.51 a	1.27 a*	آبیاری کامل (I ₁) Full irrigation (I ₁)
5576.87 b	2040.65 b	1.08 b	قطع آبیاری در مرحله V ₁₅ (I ₂) Irrigation withhold in V ₁₅ growth stage (I ₂)
6599.92 b	2311.53 b	1.11 b	قطع آبیاری در مرحله R _{3.2} (I ₃) Irrigation withhold in R _{3.2} growth stage (I ₃)

* میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.

* Means within a column followed by the same letter(s) are not significantly different based on LSD test at α=0.05.

در مرحله رشد رویشی (I_2) بود. همچنین، بیشترین تولید دانه و عملکرد بیولوژیک به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (I_3) بدست آمد (جدول ۵).

قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی نیز عملکرد دانه را به میزان ۲۱/۷ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. همچنین در بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه گلرنگ مشخص شد که آبیاری در مراحل پایانی رشد تأثیر زیادی بر عملکرد نداشته است (Singh et al., 1995)، با این حال آزمایش‌های انجام شده توسط برخی محققان از جمله امیدی (Omidi, 2009) بیانگر آن است که قطع آبیاری در مراحل غنچه‌دهی و گلدهی باعث کاهش عملکرد دانه می‌شود که در این آزمایش نیز نتیجه مشابهی به دست آمد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای کودی برای وزن پر طبق و تعداد دانه در طبق وجود داشت (جدول ۲). گیاهان قرار گرفته در تیمار کودی اوره بیشترین میزان وزن پر طبق، تعداد دانه در طبق را به ترتیب (به مقدار ۳/۲ گرم و ۳۹/۲ عدد) دارا بودند، در حالیکه کمترین میزان آن‌ها در تیمار کودی شاهد مشاهده شد، به عبارت دیگر، تیمار کودی شاهد (C)، وزن پر طبق را به میزان (۱۵/۳ درصد)، تعداد دانه در طبق را به میزان ۱۲/۷ عدد نسبت به تیمار کودی اوره، کاهش داد (جدول ۴)، احتمالاً فراهم شدن رشد سریع و تولید منابع فراوان برای فتوسنتز و ماده‌سازی بیشتر از طریق کاربرد کود اوره، منجر به افزایش تجمع ماده خشک و مواد معدنی در ساقه‌ها و برگ‌های گیاه نسبت به تیمار بدون کود (شاهد) شده و به این ترتیب در طول دوره زایشی مواد معدنی تجمع یافته که می‌تواند به اندام‌های زایشی منتقل و در نهایت منجر به افزایش وزن پر طبق و تعداد دانه در طبق شود.

بیشترین وزن دانه در طبق از تیمار کودی اوره به میزان (۱/۳ گرم) و کمترین مقدار آن (یک گرم) از تیمار T_1 بدست آمد، در واقع تیمار کودی T_1 وزن دانه در طبق را به میزان ۲۷/۹ درصد نسبت به تیمار شیمیایی اوره کاهش داد (جدول ۴). تیمار کودی نیز اثر معنی‌داری بر شاخص برداشت داشت، به طوریکه گیاهان قرار گرفته در تیمار کودی اوره بیشترین مقدار شاخص برداشت (۴۱/۰۶ درصد) را دارا بودند، در حالیکه کمترین میزان آن در تیمار بدون کود (شاهد) مشاهده شد، شاخص برداشت در تیمار کودی شاهد به میزان ۱۹/۳ درصد نسبت به تیمار کودی اوره کاهش یافت. تیمارهای کم‌آبی اثر معنی‌داری بر شاخص برداشت نداشتند. عدم معنی‌دار شدن شاخص برداشت در تیمارهای مختلف آبیاری می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در تیمارهای مختلف به طور یکسان تغییر کرده‌اند. نتایج مشابهی در ارتباط با عدم تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گلرنگ بر شاخص برداشت نیز گزارش شده است (Abulhashem et al., 1998).

همچنین تیمار کودی نیز اثر معنی‌داری بر عملکرد بیولوژیک داشت (جدول ۲)، به طوریکه بیشترین مقدار آن در تیمار تلفیقی T_2 به میزان ۸۱۰۹/۵ کیلوگرم در هکتار مشاهده شد، تیمار شاهد نیز عملکرد بیولوژیک را به میزان ۳۲/۷ درصد نسبت به تیمار تلفیقی کاهش داد (جدول ۴).

بیشترین مقدار عملکرد دانه به میزان (۲۸۳۰ کیلوگرم در هکتار) از تیمار کودی T_2 بدست آمد و کمترین مقدار آن (۱۸۴۵/۴ کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد بود، در واقع عملکرد دانه در تیمار بدون کود به میزان ۹۸۴/۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار T_2 کاهش یافت (جدول ۴). بالا بودن عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در تیمار تلفیقی نسبت به بدون کود را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که تیمار تلفیقی T_2 شامل کود اوره، کود آلی و کود بیوسولفور بوده که عناصر نیتروژن، اسید فولیک، اسید هیومیک و پتاسیم و گوگرد را توانسته در اختیار گیاهان تحت این تیمار قرار دهد و بدیهی است زمانی که عناصر غذایی به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار می‌گیرد، به دنبال آن فتوسنتز به خوبی انجام شده و تجمع مواد پرورده به میزان کافی صورت خواهد گرفت.

نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی‌دار بودن اثر تنش کم‌آبی بر وزن دانه در طبق و عملکرد دانه است (جدول ۲)، به طوریکه بیشترین مقدار وزن دانه در طبق (۱/۲۷ گرم) و عملکرد دانه (۲۹۵۲/۵ کیلوگرم در هکتار) در شرایط آبیاری کامل (I_1) مشاهده شد و کمترین مقدار آن‌ها تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی (I_2) به میزان ۱/۰۸ گرم و ۲۰۴۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که شرایط آبیاری I_2 ، وزن دانه در طبق و عملکرد دانه را به ترتیب به میزان ۱۴/۹ درصد و ۳۰/۸ درصد نسبت به شرایط I_1 کاهش داد (جدول ۳). کاهش وزن دانه در طبق و عملکرد دانه در شرایط تنش کم‌آبی نسبت به آبیاری مطلوب را می‌توان به کاهش فتوسنتز و ماده‌سازی در گیاه تحت شرایط تنش نسبت داد چرا که کاهش فتوسنتز خالص و کاهش مواد غذایی انتقال یافته از برگ به دانه از پی‌آمدهای تنش کمبود آب است که باعث کاهش عملکرد دانه می‌شود. در بررسی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گلرنگ در دو رژیم رطوبتی، گزارش شده است که عملکرد دانه گلرنگ در شرایط تنش رطوبتی به میزان ۲۰/۵۸ درصد دچار افت می‌شود (Abolhasani & Saeidi, 2006). با محاسبه سهم هر متر مکعب آب مصرفی در تولید دانه و عملکرد بیولوژیک مشخص شد که به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در تیمارهای آبیاری کامل (I_1)، (I_2) و (I_3) میزان عملکرد دانه به ترتیب ۰/۳۸، ۰/۳۱ و ۰/۴۳ کیلوگرم در هکتار بود، در حالیکه میزان عملکرد بیولوژیک در این شرایط به ترتیب ۱/۱۶، ۰/۸۶ و ۱/۲۴ کیلوگرم در هکتار بود. با مقایسه مقادیر فوق، مشخص شد که بیشترین خسارت وارد شده به اکثر صفات مرتبط با عملکرد گلرنگ در تیمار قطع آبیاری

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات گلرنگ در تیمارهای مختلف کودی

شاخص برداشت (درصد)	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	وزن دانه در طبق (گرم)	تعداد دانه در طبق	وزن بر طبق (گرم)	تیمار کودی Fertilizer
Harvest index (%)	Biologic yield (kg. ha ⁻¹)	Seed yield (kg. ha ⁻¹)	Weight of seed per head (g)	seeds per head	Head full weight (g)	
41.06 ^a	7448.91 ab	2630.55 ab	1.39 a	39.21 a	3.27 a*	اوره (U) Urea (U)
34.74 ^{bc}	7468.96 ab	2635.51 ab	1.08 bc	28.85 bc	2.79 b	ارگانیک (هومیکس) (O) Organic (Humix) (O)
38.08 ^{abc}	7179.94 b	2743.20 a	1.19 b	31.11 b	2.99 b	بیولوژیک (نیتروکسین) Biologic (Nitroxin) (N)
38.98 ^{ab}	5986.53 c	2015.58 c	1.03 bc	29.36 bc	2.92 b	بیولوژیک (بیوسولفور) (B) Biologic (Biosoulphour) (B)
33.34 ^c	7344.88 ab	2344.16 b	1.001 c	30.07 bc	2.81 b	اوره + هومیکس + نیتروکسین (T ₁) Urea + Humix + Nitroxin (T ₁)
35.49 ^{bc}	8109.59 a	2830 a	1.17 bc	28.70 bc	2.96 b	اوره + هومیکس + بیوسولفور (T ₂) Urea + Humix + (T ₂) Biosoulphour
33.12 ^c	5452.83 c	1845.42 c	1.21 ab	26.49 c	2.77 b	بدون کود (شاهد) (C) Control (C)

*میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.
*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD test at $\alpha=0.05$.

جدول ۵- میزان آب مصرفی، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گلرنگ در سطوح مختلف تنش کم آبی

Table 5- Total water used, seed yield and biological yield of safflower under different water deficit stress

عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) Biologic yield (kg.ha ⁻¹)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) Seed yield (kg.ha ⁻¹)	مجموع آب مصرفی (متر مکعب در هکتار) Total water used (m ³ .ha ⁻¹)	تنش کم آبی Water deficit stress
8819.64	2952.51	7599	آبیاری کامل (I ₁) Full irrigation (I ₁)
5576.87	2040.65	6479	قطع آبیاری در مرحله V ₁₅ (I ₂) Irrigation withhold in V ₁₅ growth stage (I ₂)
6599.92	2311.53	5322	قطع آبیاری در مرحله R _{3,2} (I ₃) Irrigation withhold in R _{3,2} growth stage (I ₃)

اثر متقابل تنش کم آبی و منابع کودی بر درصد روغن دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۲)، به طوری که بیشترین درصد روغن به میزان ۲۶/۹۲ درصد در تیمار I₁B و کمترین مقدار آن از تیمار I₃C به میزان ۲۰/۶۸ درصد به دست آمد. به عبارت دیگر، درصد روغن دانه در تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی (I₃) و تیمار بدون کود (C)، به میزان ۶/۲۴ درصد نسبت به تیمار بیوسولفور (B) و شرایط بدون قطع آبیاری (I₁)، کاهش یافت (جدول ۶). نتایج مشابهی نیز با کاربرد تیمارهای تنش خشکی بر میزان روغن آفتابگردان (*Helianthus annuus* L.) (Jalilian et al., 2012) و بادام زمینی (*Arachis hypogaea* L.) (Dwivedi et al., 1996) گزارش شده است. کاهش درصد روغن در اثر تنش خشکی می‌تواند به علت اختلال در فرآیندهای متابولیکی بذر و آسیب به انتقال آسمیلاتها به دانه باشد (Bouchereau et al., 1996). در واقع تنش خشکی به ویژه در هنگام رسیدگی، درصد روغن را کاهش داد، ولی درصد پروتئین را افزایش می‌دهد که این حالت به دلیل تسریع در رسیدگی گیاه می‌باشد. در این حالت فرصت کافی برای سنتز روغن از پروتئین‌های ذخیره شده در دانه وجود نداشته و بنابراین درصد روغن کاهش خواهد یافت (Alyari et al., 2000). تیمار کودی بیوسولفور حاوی میکروارگانیزم‌های اکسید کننده گوگرد می‌باشد که منجر به افزایش جذب عناصر آهن، فسفر، روی و گوگرد توسط ریشه گیاهان می‌شود. محققین بسیاری افزایش میزان روغن دانه در اثر مصرف گوگرد را گزارش کردند. باب‌هولکار و همکاران (Babhulkar et al., 2000) با بررسی تأثیر عناصر روی و گوگرد به همراه کودهای نیتروژن و فسفر بر روی گیاه گلرنگ، گزارش کردند که افزایش سطوح گوگرد و روی باعث افزایش معنی‌داری در محتوای روغن و پروتئین دانه گردید.

نتیجه‌گیری

در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌توان گفت که در صورت کمبود آب در منطقه، با کاهش آبیاری در مرحله زایشی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف آب، می‌توان عملکرد مناسبی بدست آورد. همچنین با توجه به اینکه، بیشترین خسارت وارد شده بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در تیمار تنش کم آبی در مرحله رشد رویشی مشاهده شد، تأمین نیاز آبی گلرنگ در مرحله رشد رویشی ضروری به نظر می‌رسد. در بین تیمارهای کودی مورد آزمایش در این تحقیق نیز از تیمار T₂ که شامل تلفیقی از کودهای (شیمیایی + هیومیکس + بیوسولفور)، بود بهترین نتیجه در مورد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بدست آمد، از اینرو، می‌توان این ترکیب کودی را برای گلرنگ در منطقه مورد آزمایش پیشنهاد کرد.

جدول ۶ - مقایسه میانگین اثر متقابل تنش کم آبی در تیمار کودی بر وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته و محتوای روغن بذور گلرنگ

Table 6- Mean comparisons of interaction between water deficit stress and fertilizer treatments on 1000-seed weight, number of head per plant and oil content of safflower seeds

میزان روغن (درصد) Oil content (%)	تعداد طبق در بوته No. of head per plant	وزن هزار دانه (گرم) 1000-seed weight (g)	تیمار کودی** Fertilizer**	تنش کم آبی Water deficit stress
23.45 bcdef	16.50 b	38.80 cde*	U	
25.60 ab	16.50 b	32.05 g	O	
24.66 abcde	16.65 b	39.26 cde	N	آبیاری کامل (I ₁) Full irrigation (I ₁)
26.92 a	15.33 bc	38.81 cde	B	
23.31 bcdefg	16.22 b	35.40 f	T ₁	
24.53 abcde	18.37 a	37.45 ef	T ₂	
25.11 abcd	13.19 def	38.02 def	C	
25.67 ab	10.42 h	41.65 bc	U	
24.60 abcde	12.42 efg	42.40 ab	O	
22.89 defgh	12.90 defg	37.85 def	N	قطع آبیاری در مرحله V ₁₅ (I ₂) Irrigation withhold in V ₁₅ growth stage (I ₂)
24.34 bcde	10.44 h	40 bcde	B	
22.83 defgh	12.72 efg	37.05 ef	T ₁	
21.28 fgh	13.58 de	42.30 ab	T ₂	
25.46 abc	11.59 gh	38.80 cde	C	
20.90 gh	12.58 efg	40.65 bcd	U	
22.21 efg	14.31 cd	41.60 bc	O	
21.36 fgh	12.76 defg	38.75 cde	N	قطع آبیاری در مرحله R _{3,2} (I ₃) Irrigation withhold in R _{3,2} growth stage (I ₃)
24.90 abcd	11.96 fgh	37.95 def	B	
22.42 efg	12.47 efg	38.80 cde	T ₁	
23.04 cdefgh	15.65 bc	44.75 a	T ₂	
20.68 h	12.17 efg	42.57 ab	C	

*میانگین‌های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.

**Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD test at $\alpha=0.05$.

می‌باشد. (U) کود آلی هیومیکس (O)، بیوسولفور (N)، بیوسولفور (B)، (اوره + هیومیکس + نیتروکسین) (T₁)، (اوره + هیومیکس + نیتروکسین) (T₂) و بدون کود (C) می‌باشد.

**Fertilizer treatments included: Urea (U), Humix as organic fertilizer (O), Biosulphur (N), Biosulphur (B), integrated fertilizer treatments: (Urea + Humix + Nitroxin) (T₁), (Urea + Humix + Biosulphur) (T₂), and Control (C).

منابع

- 1- Abolhasani, K., and Saeidi, G. 2006. Investigation of agronomic traits for safflower genotypes in two moisture regimes in Isfahan. *Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources* 13(4): 100-108. (In Persian with English Summary)
- 2- Abulhashem, L., AminMajumdar, M.N., and Hossain, M. 1998. Drought stress on seed yield, yield attributes, growth, cell membrane stability and gas exchange of synthesized *Brassica napus* L. *Crop Science* 180: 129-136.
- 3- Alyari, H., Shekari, F., and Shekari, F. 2000. Oilseeds. Amidi Press, Tabriz, Iran 182 pp. (In Persian)
- 4- Asadi Rahmani, H., Asgharzadeh, A., Khavazi, K., Rejali, F., and Savaghebi, G.R. 2007. Soil Biological Fertility: A Key to Sustainable Land Use in Agriculture. Jihad Daneshgahi Publications, Tehran, Iran 328 pp. (In Persian)
- 5- Babhulkar, P.S., Dinesh, K., Badole, W.P., Balpande, S.S., and Kar, D. 2000. Effect of sulfur and zinc on yield, quality and nutrient uptake by safflower in vertisols. *Journal of the Indian Society of soil Science* 48: 541-543.
- 6- Besharati, H., and Saleh-Rastin, N. 2001. The Survey of Biological Bacteria Application in Iran. *Agricultural Training Publishing* p. 293-317. (In Persian with English Summary)
- 7- Blak, C.A. 2003. *Soil Fertility Evaluation and Control*. Lewis Publisher, London 415 pp.
- 8- Behdani, M.A., and Mousavifar, B.E. 2011. Effect of insufficient irrigation on plant dry mater and remobilization in three spring safflower genotypes (*Carthamus tinctorius* L.). *Agroecology* 3(3): 277-289. (In Persian with English Summary)
- 9- Bouchereau, A., Clossais, B.N., Bensaoud, A., Beport, L., and Renard, M. 1996. Water stress effects on rapeseed quality. *European Journal of Agronomy* 5: 19-30.
- 10- Brussard, L., and Ferrera-Cenato, R. 1997. *Soil Ecology in Sustainable Agricultural Systems*. New York: Lewis Publishers, U.S.A.
- 11- Chandrasekar, B.R., Ambrose, G., and Jayabalan, N. 2005. Influence of biofertilizers and nitrogen source level on the growth and yield of *Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link. *Journal of Agricultural Technology* 1(2): 223-234.
- 12- Chen, J. 2006. The combined use of chemical and organic fertilizers and/ or biofertilizer for crop growth and soil fertility. International workshop on sustained Management of the Soil Rhizosphere system for efficient crop production and fertilizer Use. October 2007 pp. 16-20.
- 13- Dwivedi, S.L., Nigam, S.N., Rao, R.C.N., Singh, U., and Rao, K.V.S. 1996. Effect of drought on oil, fatty acids and protein contents of groundnut (*Arachis hypogaea* L.) seeds. *Field Crops Research* 48: 125-133.
- 14- Ghafari, S., Poor Yusuf, M., and Hasanzadeh, A. 2010. Biological fertilizers and their impact in reducing consumption chemical fertilizers and environmental protection. National Conference on Biological Diversity and its Effect on the Agriculture and Environment. Urmia, Iran 08 August 2010, 1241 pp. (In Persian with English Summary)
- 15- Gilik, B.R., Penrose, D., and Wenbo, M. 2001. Bacterial promotion of plant growth. *Biotechnology Advances* 19: 135-138.
- 16- Hadi, H., Babaei, N., Daneshian, J., Arzanesh, M.H., Hamidi, A. 2011. Effects of *Azospirillum lipoferum* on seedling characteristics derived from sunflower (*Helianthus annuus* L.) seed water deficit conditions. *Agroecology* 3(3): 320-327. (In Persian with English Summary)
- 17- Haghight Nia, S. 2011. Evaluation of some agronomic characters and yield of spring safflower cultivars under different irrigation regimes in Urmia condition. MSc. dissertation, Faculty of Agriculture, Oroomieh University, Iran. (In Persian with English Summary)
- 18- Hayashi, H., and Hanada, K. 1985. Effects of soil water deficit on seed yield and yield components of safflower. *Japanese Journal of Crop Science* 54: 346-352.
- 19- Iranian Vegetable Oil Industry Association (IVOI). 2011. Available at Web site <http://dpea.moc.gov.ir/shownews.asp?News-id=531821572>. (Verified 10 June 2012)
- 20- Jalilian, J., Modarres Sanavy, S.A.M., Saberali, S.F., and Asilan, K.S. 2012. Effects of the combination of beneficial microbes and nitrogen on sunflower seed yields and seed quality traits under different irrigation regimes. *Field Crops Research* 127: 26-34.
- 21- Kafi, M., and Rostami, M. 2007. Yield characteristics and oil content of three safflower (*Carthamus tinctorius*) cultivars under drought in reproductive stage and irrigation with saline water. *Iranian Journal of Field Crops Research* 1: 121-131. (In Persian with English Summary)
- 22- Khajeh Pour, M.R. 2004. *Industrial Crops*. Jihad University Press. Isfahan University of Technology. Iran 571 pp (In Persian)
- 23- Mirzakhani, M., Ardakani, M.R., Ayneband, A., Shiranirad, H., and Rejali, F. 2008. Effects of inoculation with *azotobacter* and mycorrhiza and different levels of nitrogen and phosphorous on grain yield and its components in spring safflower. The 10th Iranian Crop Production and Breeding Congress. Karaj, Iran. 18-20 August, 2008. p. 413. (In Persian)
- 24- Naghavi Maremati, A., Bahmanyar, M.A., Pirdashti, H., and Salak Gilani, S. 2007. Effect of different rate and type

- of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of different rice cultivars. 10th Iranian Conference of Soil Science, Tehran, Iran pp. 766-767. (In Persian)
- 25- Omidi, A.H. 2009. Effect of drought stress at different growth stages on seed yield and some agro-physiological traits of three spring safflower cultivars. *Seed and Plant Production Journal* 25(2): 15-31. (In Persian)
- 26- Rajendran, K., and Devarj, P. 2004. Biomass and nutrient distribution and their return of *Casuarina equisetifolia* inoculated with biofertilizers in farm land. *Biomass and Bioenergy* 26: 235-249.
- 27- SAS Institute. 2003. The SAS system for Windows. Release 9.1. SAS Institute. Cary, NC.
- 28- Shyalaja, J., and Swarajyalakshmi, G. 2004. Response of sunflower to conjunctive use of organic and chemical fertilizers on yield and quality parameters. *Indian Journal of Dryland Agricultural Research and Development* 19: 88-90.
- 29- Singh, V.D., Shamma, S.K., and Verma, B.L. 1995. Response of safflower to irrigation and phosphorus. *India Journal of Agronomy* 40: 459-464.
- 30- Tanaka, D.L., Riveland, N.R., Bergman, J.W., and Schneider, A.A. 1997. Safflower plant development stages. IVth International Safflower Conference, Bari. 2-7 June.
- 31- Tohidi Moghadam, H., Ghoshchi, R.F., Hamidi, A., and Kasraey, P. 2007. Influence of biofertilizer application on quantity and quality characteristics of soybean. *Iranian Journal of Dynamic Agriculture* 4(2): 205-216. (In Persian with English Summary)
- 32- Vessey, J.K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. *Plant and Soil* 255: 571-586.
- 33- Zainali, A. 1999. Safflower (Identification, Production and Consumption). Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Press, Gorgan, Iran 144 pp. (In Persian)

Archive of SID