

بررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (*Brassica napus* L.) دیم با استفاده از GIS در استان خوزستان

رشید چراغی^{1*}، محمود رمودی²، جواد طائی سمیری³ و شاپور لرزاده⁴

چراغی، ر.، رمودی، م.، طائی سمیری، ج. و لرزاده، ش. 1396. بررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (*Brassica napus* L.) دیم با استفاده از GIS در استان خوزستان. بوم‌شناسی کشاورزی، 9(4): 1007-1019.

چکیده

شناخت چگونگی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه و در نتیجه استفاده کارآمدتر و تطابق بیشتر این منابع حین عملیات کاشت، جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهان زراعی، لازمه هرگونه عملیات زراعی می‌باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی توزیع جغرافیایی احتمال بارندگی و دمای بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (*Brassica napus* L.) دیم در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش از داده‌های روزانه 17 ساله هواشناسی و همچنین پارامترهای بارندگی مؤثر، تاریخ کشت و درجه روز رشد (GDD) استفاده گردید. درجه روز رشد (GDD) مناسب برای تکمیل مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا از منابع مختلف استخراج گردید و با توجه به میزان بارندگی بهینه و دمای بهینه برای آن مرحله، توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه و دمای بهینه در این مرحله رشدی کلزا دیم در محیط GIS حاصل گردید. نتایج نشان داد که توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که نقاط مختلف استان خوزستان از نظر زمان شروع و پایان مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا متفاوت می‌باشند که این می‌تواند به دلیل وجود شرایط آب و هوایی و اقلیمی متفاوت در منطقه مطالعاتی باشد.

واژه‌های کلیدی: اقلیم، امکان‌پذیری، درجه روز رشد، دمای پایه

مقدمه

خاص خود می‌باشد که نبود هر یک از این ویژگی‌ها منجر به عدم رشد و نمو محصول در بعضی از مناطق کشور می‌گردد. از جمله این شرایط می‌توان به بارندگی، دما و تأثیر مستقیم و متقابل آن‌ها اشاره کرد. میزان بارندگی لازم برای کل دوره رشدی کلزا دیم حدود 400 تا 500 میلی-متر می‌باشد و کمبود آب و بروز تنش رطوبتی در مرحله کاشت و سبز شدن موجب به وجود آمدن گیاهچه ضعیف و در نهایت کاهش عملکرد می‌شود (Saeedi Tabar, 2006). درجه حرارت مطلوب برای رشد و نمو این گیاه 25 تا 30 درجه سانتی‌گراد می‌باشد و دماهای طولانی بالای 35 درجه سانتی‌گراد سبب از بین رفتن قابلیت جوانه‌زنی و قابلیت دانه‌گرده می‌گردد (Qadami, 2010). از بطن تکامل زراعت توجه آدمی به درک ارتباط بین گیاه زراعی و عوامل محیطی معطوف بوده است که امروزه تحت عنوان اقلیم‌شناسی کشاورزی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. شناخت پتانسیل‌های اقلیمی

کلزا (*Brassica napus* L.) در بین دانه‌های روغنی یک‌ساله جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده که از نظر سطح زیر کشت مقام دوم و از نظر تأمین روغن مصرفی پس از سویا (*Glycine max* L.) و نخل روغنی (*Guineensis elaeis* L.) رده سوم تولید روغن جهان را به خود اختصاص می‌دهد و گسترش سطح زیر کشت و تولید آن بیش از سایر محصولات می‌باشد (FAO, 2007). کلزا نیز مثل سایر محصولات زراعی و باغی دارای ویژگی‌های اکولوژیکی

1، 2، 3 و 4- به ترتیب مربی (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد)، دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت و استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

(* - نویسنده مسئول: Email: r.cheraghi3094@gmail.com
DOI:10.22067/JAG.V9I4.49563

و کلیماتولوژی منطقه مورد مطالعه از ابتدای تاریخ کاشت تا انتهای مرحله مورد نظر، شرایط دمای متوسط روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس احتمال وقوع دماهای مناسب جوانه‌زنی محاسبه گردید و در محیط GIS به نقشه رقمی تبدیل شد. در نهایت با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب مورد نیاز برای کشت گندم در موقع جوانه‌زنی، کلاسه‌ها و مناطق دارای وضعیت مختلف تعریف شدند. علیجانی و دوستان (Alijani & Doustan, 2006) در طی شناسایی نواحی مستعد کشت زرشک (*Berberis vulgaris* L.) در استان خراسان جنوبی مشخص کردند که عوامل بارش و دما تأثیر به‌سزایی در شناسایی مناطق مستعد دارند و در اکثر نقاط استان متفاوت می‌باشد. ایشان با مقایسه نقشه نهایی با محدوده باغات منطقه به این نتیجه دست یافتند که در ناحیه جنوب خراسان مناطق مستعد کشت زرشک بسیار بیشتر از آن‌چه که در شرایط فعلی کشت می‌شود، می‌باشد و مناطق وسیعی در منطقه قابلیت کشت این گیاه را دارند. رسولی و همکاران (Rasouli et al., 2005) در پژوهشی تحت عنوان نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم در استان اردبیل به این نتیجه رسیدند که مقادیر بارش و ارتفاع از شاخص‌های مؤثر در کشت گندم در این منطقه محسوب می‌شوند. از نتایج دیگر این تحقیق، کشف توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در ترکیب و تولید اطلاعات فضایی با لحاظ نمودن داده‌های غیرفضایی است که می‌تواند مدیران و تصمیم‌گیرندگان را برای دسترسی به اطلاعات یاری نموده و با توجه به نوع برنامه‌ریزی زراعی، مدل متناسب ساخته و برای استفاده ارائه کند. ایشان به این منظور، ابتدا داده‌های بارندگی 15 ایستگاه هواشناسی از سال 1355 الی 1382 را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل نمودند. سپس با بهره‌گیری از نقشه توپوگرافی رقمی استان مناطق مساعد برای کشت گندم در این منطقه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی را شناسایی کردند. در این مطالعه نیز با استفاده از اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی اقدام به شناسایی مناطق دارای شرایط بهینه دمایی و رطوبتی مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا در استان خوزستان و سایر مناطق دارای اقلیم مشابه گردید. کلزا از جمله محصولات مورد نیاز و مهم بخش زراعی بوده که جهت دستیابی به تولید اقتصادی و استحصال بهتر آن در واحد سطح و برای رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به واردات روغن خوراکی باید دست‌اندرکاران و بهره‌وران بخش



هر منطقه و تطابق آن‌ها با عوامل اقلیمی و در نهایت اقلیم زراعی هر منطقه از جمله مباحث و پیشرفت‌های اقلیم‌شناسی کشاورزی می‌باشد. در بسیاری از مناطق کشاورزی، بیشتر گیاهان زراعی به صورت سنتی و با اتکا به تجربه و بدون بررسی تطابق نیازهای اقلیمی مراحل رشدی آن‌ها با عوامل محیطی انجام می‌شود که نهایتاً منجر به کاهش و عملکرد و هدر رفتن منابع اقلیمی می‌گردد. بنابراین به منظور بهره‌برداری مناسب از شرایط اقلیمی، شناخت دقیق نیازهای اقلیمی گیاه و کشت آن در منطقه مناسب از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر بتوان با توجه به نیازهای دمایی و رطوبتی گیاهان زراعی، مناطق مناسب کشت آن‌ها را شناسایی کرد، در عمل می‌توان به عملکرد بیشتری در واحد سطح دست یافت که خود سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و سطح درآمد ملی خواهد شد. رسولی و قائمی (Rasouli & Qaemi, 2010) در پژوهشی مشابه، نیازهای دمایی کلزا در استان‌های خراسان را مورد بررسی قرار دادند. ایشان به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع دماهای مناسب "کاشت تا سبز شدن" در شهرستان بجنورد کمترین مقدار می‌باشد و نظر به این‌که شرایط دمایی برای سبز شدن مناسب نمی‌باشد، باید تمهیدات لازم از جمله شرایط بذری و خاکی مناسب در نظر گرفته شود تا به کمک آن‌ها جوانه‌زنی و سبز شدن بهتر انجام گردد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که در شهرستان بیرجند احتمال وقوع دماهای مناسب "کاشت تا سبز شدن" بیشترین مقدار بوده و شرایط دمایی بسیار مطلوبی جهت کاشت کلزا مهیا می‌باشد. ایشان در بررسی احتمال وقوع دماهای مناسب "کاشت تا سبز شدن" در منطقه مطالعاتی خویش به این نتیجه رسیدند که نقاط مختلف منطقه مطالعاتی از لحاظ تأمین دماهای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا متفاوت بوده و منطقه مطالعاتی به چهار قسمت قابل تفکیک می‌باشد. ساری صراف و همکاران (Sarisaraf et al., 2009) در پژوهشی تحت عنوان پهنه‌بندی پتانسیل‌های اقلیمی کشت گندم (*Triticum aestivum* L.) در استان آذربایجان غربی به این نتیجه دست یافتند که نقش هر یک از عناصر اقلیمی دما و بارش، متناسب با مراحل مختلف رشد، در مناطق مختلف استان متفاوت می‌باشد. ایشان اظهار داشتند که درجه حرارت مناسب مرحله "کاشت تا سبز شدن" گندم 8-14 درجه سانتی‌گراد است و دما در مراحل ابتدایی رشد گیاه به‌ویژه در دوره "کاشت تا سبز شدن" اثر قابل توجه بر گیاهان سبز دارد. بنابراین برای هر یک از ایستگاه‌های سینوپتیک

خوزستان با مساحت بیش از 67000 کیلومتر مربع طبق طبقه‌بندی اقلیمی بر اساس روش دومارتن، دارای سه اقلیم خشک، نیمه‌خشک و مدیترانه‌ای می‌باشد که در شکل 1 نشان داده شده است. متوسط بارندگی سالیانه در این استان حدود 266 میلی‌متر و دوره بارندگی معمولاً بین مهرماه تا اردیبهشت ماه است. متوسط درجه حرارت در دوره گرما، که از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد، حدود 31/2 درجه سانتی‌گراد و حداکثر آن گاهی به بیش از 50 درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد. در طول زمستان متوسط درجه حرارت حدود 14/9 درجه سانتی‌گراد و حداقل آن به‌ندرت ممکن است به چند درجه زیر صفر نیز برسد.

کشاورزی توجه خاصی به این محصول معطوف دارند. از طرفی، مشخص نبودن مناطق مستعد کشت دیم این محصول از مشکلات مهم بر سر راه کشت مطمئن آن در کشور و استان خوزستان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

موقعیت جغرافیایی: استان خوزستان در محدوده 47 درجه و 42 دقیقه تا 50 درجه و 39 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و 29 درجه و 58 دقیقه تا 32 درجه و 58 دقیقه شمالی از خط استوا قرار دارد. شمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فرا گرفته است که ارتفاعات آن در جهت جنوب غربی کاهش می‌یابد. استان



شکل 1- منطقه مورد مطالعه

Fig. 1- The study area

عوامل مزرعه‌ای، نیازمند دریافت میزان حرارتی است که تحت عنوان درجه حرارت تجمعی یا درجه روز رشد تعریف می‌گردد (Koocheki & Sarmadnia, 2012). درجه روز رشد مورد نیاز برای هر مرحله رشدی گیاه کلزا، میزان حرارتی است که باید طی یک دوره زمانی در طول شبانه‌روز تجمع پیدا کند و موجب عبور گیاه از یک مرحله رشدی به مرحله بعد و نهایتاً تکمیل سیکل رشد گردد (Azizi et al., 2006). در این پژوهش نیز برای تعیین زمان دقیق انتهایی مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا از شاخص درجه روز رشد (GDD) استفاده گردید. درجه روز رشد مورد نیاز برای هر مرحله رشدی گیاه کلزا، طبق جدول 2 می‌باشد.

پارامترهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل بارندگی روزانه، دمای ماکزیمم روزانه و دمای مینیمم روزانه بودند که از داده‌های 17 ساله 11 ایستگاه هواشناسی موجود در استان خوزستان که دارای آمار کامل و بلند مدت بودند جمع‌آوری و در نرم‌افزارهای آماری EXCEL و SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مشخصات ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه در جدول 1 نشان داده شده است.

تعیین شروع و پایان مرحله "کاشت تا سبز شدن":

تاریخ دقیق شروع این مرحله کلزا در هر ایستگاه، با در نظر گرفتن زمان دقیق وقوع بارندگی مؤثر به میزان 10 میلی‌متر و بیشتر در طی سال‌های آماری استخراج گردید. هر گیاه برای تکمیل یک مرحله از رشد خود و ورود به مرحله بعد، با شرط فراهم بودن رطوبت و سایر

بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم، همپوشانی لایه بارش بهینه و دمای بهینه در محیط Arc GIS انجام گردید. نقشه نهایی معرف نقاط دارای پتانسیل و درجه اهمیت متفاوت از نظر وقوع بارش و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در استان خوزستان می‌باشد.

کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه: با استناد به نقشه کاربری اراضی استان خوزستان، نقاطی که قابلیت زراعت نداشته و دارای کاربری غیر زراعی می‌باشند شناسایی گردید و در نقشه‌های خروجی بصورت هاشور نمایش داده شده و تحت عنوان مناطق غیر قابل زرع² معرفی گردید.

نتایج و بحث

بازه زمانی مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم: بر اساس یافته‌های این تحقیق زمان تجمع درجه روز رشد لازم برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در هر یک از ایستگاه‌ها باهم متفاوت می‌باشد. متفاوت بودن این بازه زمانی در ایستگاه‌های منطقه می‌تواند به جهت وجود شرایط آب و هوایی متفاوت باشد. با توجه به جدول 3 درجه روز رشد تجمعی لازم برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در ایستگاه بستان دیرتر از بقیه مناطق و در ایستگاه ایزه زودتر از بقیه مناطق استان حاصل می‌شود.

توزیع جغرافیایی احتمالات وقوع بارندگی بهینه برای

مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم: جهت بررسی وضعیت بارندگی نقاط مختلف منطقه مطالعاتی برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم، ابتدا احتمال وقوع بارندگی بهینه در این مرحله رشدی برای همه ایستگاه‌های استان محاسبه شد سپس اقدام به تهیه نقشه توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه در این مرحله رشدی کلزا دیم در محیط GIS گردید. همان‌گونه که در جدول 4 و شکل 2 نشان داده شده است، بیشترین احتمال وقوع بارش بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های بهبهان، ایزه و غرب بستان می‌باشد و در اکثر نقاط منطقه بارندگی بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم به طور چشمگیر حصول نمی‌گردد. در توجیه این مورد می‌توان به پایین بودن میزان بارش و همچنین عدم پراکنش مناسب آن در منطقه

احتمال وقوع بارندگی بهینه در مرحله "کاشت تا سبز

شدن": به منظور تعیین احتمال وقوع بارندگی لازم برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا، با توجه به میزان بارندگی لازم برای این مرحله که 50 میلی‌متر می‌باشد (Saeedi Tabar, 2006)، از توزیع لوگ پیروسون نوع سوم استفاده شد. به این منظور، برای همه ایستگاه‌ها مجموع بارندگی مرحله "کاشت تا سبز شدن" طی هر سال محاسبه گردید. سپس لگاریتم، میانگین، انحراف معیار و ضریب چولگی داده‌ها برای این مرحله محاسبه شد. در مرحله بعد با استفاده از جداول مربوطه، احتمال بروز بارندگی بهینه محاسبه گردید (Mahdavi, 2007).

احتمال وقوع دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز

شدن": پس از استخراج داده‌های دمایی 17 ساله مرحله "کاشت تا سبز شدن" مربوط به همه ایستگاه‌ها، تست نرمال داده‌ها انجام گردید. سپس از داده‌های مربوطه میانگین و انحراف معیار گرفته و با استفاده از رابطه توزیع نرمال و با توجه به دمای بهینه این مرحله که بین 10 تا 25 درجه سانتی‌گراد می‌باشد (Rasuoli & Qaemi, 2010)، احتمال وقوع دمای بهینه برای این مرحله تعیین شد. برای محاسبه احتمال وقوع دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" از معادله زیر استفاده شد (Yazdisamadi et al. 2009).

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{S} \quad (2)$$

که در معادله (2)، Z: سطح احتمال، \bar{X} : میانگین، S: انحراف معیار، و X: به عنوان دمای مورد نظر می‌باشد.

توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه

در مرحله "کاشت تا سبز شدن": برای این منظور، احتمال وقوع بارندگی بهینه و احتمال وقوع دمای بهینه ایستگاه‌های مختلف، برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا دیم، به صورت بانک اطلاعاتی ذخیره گشت. سپس در محیط نرم افزار GIS 9.3¹، با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، لایه احتمال وقوع بارندگی بهینه و لایه احتمال وقوع دمای بهینه استخراج شد. هر کدام از لایه‌های تولید شده به ترتیب معرف نقاط دارای قابلیت بارش و دمای متفاوت بوده و احتمال وقوع بارش و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم را در نقاط مختلف منطقه مطالعاتی نشان می‌دهد. در انتها جهت تولید و استخراج نقشه نهایی احتمال وقوع

2- Non Cultivable

1- Geographical Information System

بوده و دارای دو کلاس خیلی ضعیف و ضعیف می باشد. نظر به این که تأمین رطوبت مهمترین عامل در تعیین نقاط مساعد کشت دیم و موفقیت این روش کشت می باشد، لذا توجه به این مهم برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در استان خوزستان و سایر مناطق دارای اقلیم مشابه معطوف می باشد.

جدول 4- احتمال وقوع بارندگی بهینه (50 میلی متر و بیشتر) در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Table 4- The probability of suitable rainfall (50 mm or more) in the "planting to emergence" of rainfed canola

ایستگاه Station	احتمال وقوع (%) Probability (%)
اهواز Ahvaz	1.10
شوشتر Shoushtar	18.00
دزفول Dezfoul	3.50
آبادان Abadan	22.00
ایذه Izeh	29.00
مسجدسلیمان Masjed soleyman	1.00
بهبهان Behbahan	36.00
امیدیه Omidieh	6.20
رامهرمز Ramhormoz	5.10
بستان Bostan	25.00
ماهشهر Mahshahr	18.00

جدول 5- وضعیت بارندگی اراضی قابل کشت برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Table 5- Rainfall arable land status in the "planting to emergence" of rainfed canola

وضعیت Status	مساحت (%) Area (%)	احتمال وقوع بارندگی بهینه (%) Optimal rainfall probability (%)
ضعیف Poor	14	25-50
خیلی ضعیف very poor	86	25>

رسولی و همکاران (Rasouli et al., 2005) در پژوهشی تحت

مطالعاتی اشاره نمود. با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوا در کشاورزی و وابستگی میزان عملکرد محصولات زراعی به نزولات جوی، رطوبت از عوامل مؤثر بر زراعت به خصوص زراعت دیم می باشد و ارائه اطلاعات صحیح در زمینه بارندگی در سال های گذشته مفید و کارا می باشد (Safikhani, 2007).

جدول 3- تاریخ تجمع درجه روز رشد لازم برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در استان خوزستان

Table 3- Join the accumulation of growing degree days for the "planting to emergence" of rainfed canola in Khuzestan province


ایستگاه Station	GDD= 120
اهواز Ahvaz	28 آبان تا 6 آذر 19 Nov-27 Nov
شوشتر Shoushtar	3 آذر تا 12 آذر 24 Nov-3 Dec
دزفول Dezfoul	25 آبان تا 3 آذر 16 Nov-24 Nov
آبادان Abadan	13 آذر تا 24 آذر 4 Dec-15 Dec
ایذه Izeh	21 آبان تا 2 آذر 12 Nov-23 Nov
مسجدسلیمان Masjed soleyman	27 آبان تا 5 دی 18 Nov-26 Dec
بهبهان Behbahan	9 آذر تا 20 آذر 30 Nov-11 Dec
امیدیه Omidieh	30 آبان تا 9 آذر 21 Nov-30 Nov
رامهرمز Ramhormoz	30 آبان تا 8 آذر 21 Nov-29 Nov
بستان Bostan	13 آذر تا 26 آذر 4 Dec-17 Dec
ماهشهر Mahshahr	13 آذر تا 24 آذر 4 Dec-15 Dec

همان گونه که در جدول 5 نشان داده شده است، احتمال بروز بارندگی بهینه (50 میلی متر و بیشتر) در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در 14 درصد از اراضی قابل کشت استان 25-50 درصد است که بیانگر تناسب ضعیف این قسمت در این مرحله بوده و در 86 درصد از اراضی قابل کشت استان کمتر از 25 درصد است که بیانگر تناسب خیلی ضعیف این قسمت در این مرحله می باشد.

با توجه به شکل 2 عامل بارش در تمام نقاط منطقه مطالعاتی به صورت بهینه و یکنواخت تأمین نمی گردد و احتمال بروز بارندگی بهینه (50 میلی متر و بیشتر) در کل نقاط منطقه کمتر از 50 درصد

در فرآیند کشت گندم دیم می‌باشد و در تمام نقاط منطقه مورد مطالعه به صورت بهینه و یکنواخت تأمین نمی‌گردد.

عنوان نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل به این نتیجه رسیدند که عامل بارش و نحوه توزیع آن از شاخص‌های مؤثر



شکل 2- توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Fig. 2- Geographical distribution of the suitable rainfall probability in the "planting to emergence" of rainfed canola

جدول 6- احتمال وقوع دمای بهینه (25-10 درجه سانتی‌گراد) در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Table 6- The probability of suitable temperature (25-10°C) in the "planting to emergence" of rainfed canola

ایستگاه Station	احتمال وقوع (%) Probability (%)
اهواز Ahvaz	27
شوشتر Shoushtar	58
دزفول Dezfoul	14
آبادان Abadan	38
ایذه Izeh	26
مسجدسلیمان Masjed soleyman	40
بهبهان Behbahan	27
امیدیه Omidieh	0
رامهرمز Ramhormoz	36
بستان Bostan	25
ماهشهر Mahshahr	41

توزیع جغرافیایی احتمالات وقوع دمای بهینه برای

مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم: برای این منظور ابتدا احتمال وقوع دمای بهینه در این مرحله رشدی برای همه ایستگاه‌های استان محاسبه شد سپس اقدام به تهیه نقشه توزیع جغرافیایی احتمال وقوع دمای بهینه در این مرحله رشدی کلزا دیم در محیط GIS گردید. با توجه به جدول 6 احتمال وقوع دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در کل منطقه مورد مطالعه وضعیت قابل توجهی نداشته و بیشترین مقدار آن مربوط به ایستگاه شوشتر به میزان 58 درصد می‌باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد وجود دماهای بالا در منطقه ولی عدم تطابق آن‌ها با مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم می‌باشد.

همان‌گونه که در جدول 7 نشان داده شده است احتمال وقوع دمای بهینه (10 تا 25 درجه سانتی‌گراد) در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم، در شش درصد از اراضی قابل کشت استان 50-75 درصد است، که بیانگر تناسب متوسط این قسمت در این مرحله می‌باشد، در 60 درصد از اراضی قابل کشت استان 25-50 درصد است که بیانگر تناسب ضعیف این قسمت در این مرحله بوده و در 34 درصد از اراضی قابل کشت استان کمتر از 25 درصد است که بیانگر تناسب خیلی ضعیف این قسمت در این مرحله می‌باشد.


با توجه به شکل 3 می‌توان اذعان داشت که عامل دما در تمام نقاط منطقه مطالعاتی بصورت بهینه و یکنواخت تأمین نمی‌گردد و احتمال وقوع دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در کل نقاط منطقه کمتر از 75 درصد بوده و دارای سه کلاس خیلی ضعیف، ضعیف و متوسط می‌باشد.

کاملی و همکاران (Kamali et al., 2008) نیز در پژوهشی جهت پتانسیل‌یابی اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی به این نتیجه رسیدند که توزیع جغرافیایی وقوع درجه حرارت‌های مناسب مرحله جوانی‌زنی به صورت غیر یکنواخت بوده و شامل چهار کلاس متفاوت می‌باشد.

جدول 7- وضعیت دمایی اراضی قابل کشت برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Table 7- Temperature arable land status e in the "planting to emergence" of rainfed canola

وضعیت Status	مساحت (%) Area (%)	احتمال وقوع دمای بهینه (%) Optimal temprature probability (%)
متوسط Intermediate	6	50-75
ضعیف Poor	60	25-50
خیلی ضعیف Very Poor	34	25>



شکل 3- توزیع جغرافیایی احتمال وقوع دمای بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Fig. 3- Geographical distribution of the suitable temperature probability in the "planting to emergence" of rainfed canola

بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کمتر از 25 درصد است و 33/7 درصد از اراضی قابل کشت استان را شامل می‌شود و بیانگر تناسب خیلی ضعیف این مناطق در مرحله "کاشت تا سبز شدن" می‌باشد. مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" بین 25 تا 50 درصد می‌باشد و 66/2 درصد از اراضی قابل کشت استان را پوشش می‌دهد و بیانگر تناسب ضعیف این مناطق است. مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" بین 50 تا 75 درصد

توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم: از همپوشانی نقشه‌های توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی بهینه، احتمال وقوع دمای بهینه و نقشه کاربری اراضی استان در محیط نرم افزار Arc Map، نقشه توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا دیم در استان خوزستان حاصل شد. طبق جدول 8 اراضی قابل کشت منطقه مطالعاتی به سه قسمت تقسیم‌بندی گردید. مناطقی که در آنها احتمال وقوع بارندگی و دمای

"کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم کمتر از 25 درصد بوده و بیانگر وضعیت خیلی ضعیف این مناطق می باشد. در شهرستان های اهواز، شوشتر، گتوند، رامهرمز، باغملک، مسجدسلیمان، لالی، آبادان، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، بهبهان و جنوب شهرستان های ایذه و بستان احتمال حصول دما و بارش بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم بین 25-50 درصد بوده و بیانگر وضعیت ضعیف این مناطق می باشد. همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود تنها در بخش اندکی از جنوب شهرستان آبادان احتمال حصول دما و بارش بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم بین 50-75 درصد بوده که مبین امکان موفقیت بیشتر کشت کلزا به صورت دیم در این منطقه می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش های زیادی از قبیل پژوهش کاملی و همکاران (Kamali et al., 2008)، رسولی و قائمی (Rasuoli & Qaemi, 2010)، علیجانی و دوستان (Alijani & doustan, 2006) و ساری صراف و همکاران (Sarsaraf et al., 2009) مطابقت دارد. ایشان نیز به این نتیجه دست یافتند که عوامل اقلیمی بارش و دما در مراحل رشدی مختلف گیاهان زراعی دارای پراکندگی غیر یکنواخت بوده و در همه نقاط منطقه مورد مطالعه به صورت بهینه و یکنواخت تأمین نمی گردد.


می باشد که 0/01 درصد از اراضی قابل کشت استان را پوشش می دهد و معرف تناسب متوسط این مناطق از نظر تأمین دما و بارندگی بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" می باشد.

جدول 8- وضعیت توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Table 8- The geographical distribution of probability of suitable temperature and suitable rainfall in the "planting to emergence" of rainfed canola

وضعیت Status	مساحت (%) Area (%)	احتمال وقوع (%) Probability (%)
متوسط Intermediate	0.01	50-75
ضعیف Poor	66.2	25-50
خیلی ضعیف Very Poor	33.7	25>

همان طور که در شکل 4 ملاحظه می شود احتمال حصول پارامترهای دما و بارش بهینه در همه نقاط منطقه مورد مطالعه به صورت ایده آل تأمین نمی شود. با توجه به شکل 4 می توان ادعان داشت که در شهرستان های اندیمشک، دزفول، شوش، امیدیه، هندیجان، شمال شهرستان های لالی، ایذه، بستان و اراضی جنوب غربی اهواز و بهبهان احتمال حصول دما و بارش بهینه برای مرحله



شکل 4- توزیع جغرافیایی احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم

Fig. 4- Geographical distribution of the probability of suitable temperature and suitable rainfall in the "planting to emergence" of rainfed canola

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت عناصر و عوامل اقلیمی در کشت گیاهان زراعی، مطالعه تأثیرات آب و هوایی بر روی محصولات زراعی به خصوص دانه‌های روغنی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به نتایج این تحقیق عامل بارندگی به عنوان یک عامل محدودکننده در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم شناسایی شد و در اکثر مناطق اراضی قابل کشت استان، میزان رطوبت لازم برای این مرحله رشدی کلزا دیم تأمین نمی‌شود، لذا با توجه به اهمیت رطوبت برای جوانه‌زنی بذور گیاهان زراعی و نظر به این که شرایط رطوبتی موجود در استان برای جوانه‌زنی و سبز شدن کلزا دیم مساعد نمی‌باشد، توصیه می‌شود برای فراهم شدن نیاز آبی این مرحله رشدی و جهت استقرار بهتر گیاهچه‌ها و ورود بهتر به مراحل بعدی رشد و در نهایت افزایش عملکرد، آبیاری با مدیریت صحیح و در زمان مناسب انجام شود. همچنین از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که شرایط دمایی در نقاط مختلف استان خوزستان متفاوت بوده و هر نقطه از استان از نظر احتمال وقوع دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم دارای درجه اهمیت خاصی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود، تمهیدات لازم برای سبز شدن این گیاه زراعی از قبیل شرایط خاکی، بذری و مدیریتی مناسب در نظر گرفته شود تا به کمک آن‌ها جوانه‌زنی و سبز شدن بهتر انجام شود و گیاه زراعی به نحو بهتری استقرار یابد. با توجه به جدول 8 و شکل 4 می‌توان دریافت که بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم در قسمت‌های شمالی و قسمتی از جنوب اراضی قابل کشت استان دارای احتمال وقوع کمتر از 25 درصد می‌باشند. در نتیجه نیازمند توجه بیشتر به نحوه کشت و تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت دیم کلزا می‌باشد. همچنین شکل 4 نشان دهنده این مهم است که قسمت میانی و جنوب شرقی اراضی قابل کشت استان دارای احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه بین 25 تا 50 درصد می‌باشد که این مناطق نیز دارای

منابع

- Alijani, B., and Doustan, R. 2006. Identify areas susceptible barberry cultivation in South Khorasan province using GIS. *Journal of Geography and Regional Development* 8: 13-33. (In Persian with English Summary)
- Azizi, M., Soltani, A., and Khavari Khorasani, S. 2006. Rapeseed (Physiology, Farming, Breeding, Biotechnology) (Translation). Mashhad University Jihad Press, Mashhad, Iran. (In Persian)
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2007. FAO Statistic Service, [Online]. Available at Web site:

شرایط بهینه دمایی و بارندگی برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم نمی‌باشند. همان‌طور که از شکل 4 نمایان است، تنها قسمت کوچکی از جنوب شهرستان آبادان دارای احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه 50 تا 75 درصد می‌باشد که با رنگ سیاه نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل 4 مشاهده می‌شود در هیچ نقطه از اراضی قابل کشت استان، احتمال وقوع بارندگی و دمای بهینه برای مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم 75 تا 100 درصد نمی‌باشد که این بیانگر پتانسیل بسیار ضعیف منطقه برای این مرحله رشدی کلزا دیم می‌باشد و می‌بایست با اتکا به مدیریت صحیح سایر شرایط و منابع موجود، برای حصول بیشترین بازده در اراضی قابل کشت استان تلاش نمود. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت که نقاط مختلف استان خوزستان از لحاظ تاریخ شروع و پایان مرحله "کاشت تا سبز شدن" گیاه کلزا متفاوت می‌باشند و این ناشی از تفاوت اقلیمی موجود و همچنین متفاوت بودن میزان دمای هوا در نقاط مختلف و در نتیجه تفاوت در مجموع انرژی حرارتی دریافتی در نقاط مختلف استان خوزستان می‌باشد. نظر به این که تجمع درجه روز رشد تعیین‌کننده ورود گیاهان زراعی از یک مرحله به مرحله بعد می‌باشد، پس توجه بیشتر به انتخاب تاریخ کشت گیاه کلزا دیم برای تجمع درجه روز رشد لازم و مطابقت بیشتر مراحل حساس این گیاه با بارندگی‌های منطقه توصیه می‌شود. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که هر قسمت از استان از لحاظ شرایط بهینه بارندگی و دمایی در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا دیم دارای درجه اهمیت خاصی می‌باشد و باید با تلاش فراوان و تعیین مناطق مختلف منطقه و فراتر از آن تمامی مناطق مناسب برای زراعت، بهترین محصول را در زمان مناسب در آن منطقه کشت کرد و از خطرات احتمالی کاست و با احتمال موفقیت بیشتر اقدام به کشت نمود تا به بیشترین سطح عملکرد دست یافت.

www.FAO.org/crop/statistics.

- Kamali, Q.A., Sadaghianipoor, A., and Sedaqatkerdar, A. 2008. Investigation of climatic potential of rainfed wheat cultivation in East Azarbaijan province. *Journal of Soil and Water (Agricultural Science and Technology)* (22) 2: 467-483. (In Persian with English Summary)
- Koocheki, A., and Srmdania, Q.H. 1391. *Crop Physiology*, Mashhad, 17th Edition, Published by SID Mashhad, Mashhad, Iran. (In Persian)
- Mahdavi, M. 2007. *Applied Hydrology*. Fifth Printing, Publishing and Printing Institute of Tehran University, Tehran, Iran. (In Persian)
- Qadami, N. 2010. *Agriculture and Modified Oilseed Rape (Planting and Harvesting)*, Tehran, Volume I, Publications, Education and Agricultural Extension, Tehran, Iran. (In Persian)
- Rahnama, A.A. 2006. *Guide magazine promoting the planting and harvesting of rapeseed in Khuzestan*. Khuzestan Agriculture Organization, Promotion and Management of Operating System. (In Persian)
- Rasouli, S.J., and Qaemi, A. 2010. Climate temperature mapping using GIS needs based on canola cultivation in the province of Khorasan. *Electronic Journal of Crop Production* 3(1): 121-138. (In Persian with English Summary)
- Rasuoli, A.A., Qasemi Golezani, K., and Sobhani, B. 2005. The role of precipitation and height of Ardabil province in determining appropriate areas for the cultivation of wheat using geographical information system. *Journal of Geography and Development* p. 183-200. (In Persian with English Summary)
- Saeedi Tabar, H. 2006. The effect of irrigation on sensitive stages of canola growth. *The Journal of Olive* 174: 1-44. (In Persian)
- Safi Khani, S. 2007. Evaluation of the 10 annual increase in production and yield of wheat in the country. *Culture Magazine Industry* 94: 23-34. (In Persian with English Summary)
- Sari Saraf, B., Bazgir, S., and Mohammadi, Q.H. 2009. Climate zoning dryland wheat in the province of West Azerbaijan. *Geography and Development Journal* 13: 5-26. (In Persian with English Summary)
- Sidlauskas, G., and Bernotas, S. 2003. Some factors affecting seed yield of spring oilseed raps (*Brassica napus* L.), *Agronomy Research* 1(2): 229-243.
- Yazdi Samadi, B., Amiri Oqan, H., and Peyqambari, S.A. 2009. *Applied Probability and Statistics*. The Second Edition, Tehran University Press, Tehran, Iran. (In Persian)