



تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگی‌های (*Hibiscus sabdariffa* L.)

زهرا میر^۱، مهدی دهمرده^{۲*}، عیسی خمری^۳ و جمشید پیری^۴

تاریخ دریافت: 1395/05/19

تاریخ پذیرش: 1395/12/14

میر، ز.، دهمرده، م..، خمری، ع..، و پیری، ج. 1396. تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد کمی و برخی ویژگی‌های کیفی چای ترش (*Hibiscus sabdariffa* L.). *بوم شناسی کشاورزی*, 9(4): 1194-1207.

چکیده

به منظور بررسی اثرات کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد و شاخص‌های کیفی چای دارویی چای ترش (*Hibiscus sabdariffa* L.) آزمایشی در مزرعه آموزشی - پژوهشی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 1395-1394 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح مصرف کود آلوی شامل؛ شاهد، ورمی‌کمبیوت، کودگاوی، جلک دریابی و سه سطح محلول پاشی آهن شامل؛ شاهد، محلول پاشی به میزان سه و شش سی سی در هزار بوند. تیمارهای کود زیستی عامل اصلی و سطوح مختلف محلول پاشی آهن عامل فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد مطالعه شامل؛ عملکرد اقتصادی، بیولوژیک، شاخص برداشت، مقدار کلروفیل a، b و کاروتینوئید، آنتوسیانین، کربوهیدرات و پروتئین بود. مصرف سطوح مختلف محلول پاشی آهن و تیمارهای کود زیستی و برهmekش آن‌ها بر تمامی صفات به جز شاخص برداشت در سطح يك و پنج درصد معنی‌دار شد. بیشترین مقدار عملکرد اقتصادی وزن خشک کاسبرگ چای ترش برابر با 60/587 کیلوگرم در هектار با مصرف توان شش سی سی در هزار محلول پاشی آهن و کود زیستی جلک دریابی به دست آمد و بالاترین مقدار آنتوسیانین کاسبرگ (9/860 میکرومول بر گرم وزن تر) در تیمار سه در هزار آهن و کود دامی حاصل گردید، همچنین غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن سبب افزایش میزان کربوهیدرات و پروتئین سرشارخه‌ها گردید. نتایج نشان داد که مصرف تلفیقی کودهای زیستی و محلول پاشی آهن، نسبت به مصرف جداگانه آن‌ها می‌تواند در افزایش عملکرد و ویژگی‌های چای ترش نقش موثری را ایفا کند.

واژه‌های کلیدی: آنتوسیانین، پروتئین، جلک دریابی، کلروفیل، ورمی‌کمبیوت

این چرخه در نتیجه از بین رفتان حاصل خیزی خاک، عدم تعادل مواد غذایی آن و عملیات زراعی نامناسب مختلط می‌شود (Koocheki et al., 2000). در مدیریت پایدار خاک، توجه به حفظ توازن عناصر غذایی و حاصل خیزی آن بسیار با اهمیت بوده و لازم است عناصر غذایی که به وسیله اندام‌های گیاهی از زمین خارج می‌شوند، از طریق افزودن کود به زمین بازگشت داده شود (Martin et al., 2006). کودهای دامی از سویی قابلیت جذب عناصری مانند روی، مس، آهن، فسفر، پتاسیم و نیتروژن را افزایش می‌دهند (Rezaenejad & Afyuni, 2001) و با چرخش مواد غذایی در مناطقی با سیستم زراعی فشرده، حاصل خیزی خاک را نیز بهبود می‌بخشند (A1-Nahid, 1991).

مقدمه

در سیستم‌های کشاورزی رایج برای به دست آوردن بیشترین عملکرد، استفاده مداوم از کودهای شیمیایی امری اجتناب‌ناپذیر تلقی شده است. در حالی که کاربرد بی‌رویه آن‌ها به دلیل تغییر در PH خاک و تجمع نمک بیش از اندازه در آن، سبب کاهش حاصل خیزی خاک و فعالیت باکتریایی آن می‌شود (Pokorna, 1984). سلامتی گیاه، خاک و جانداران بستگی به چرخش عناصر غذایی در بوم‌نظام دارد.

1- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد اگروکولوژی، دانشیار، استادیار، گروه زراعت و مری، گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
2- نویسنده مسئول: (Email: Dahmard@gmail.com)
DOI: 10.22067/JAG.V9I4.56478

جلبک‌های دریایی به عنوان کود در کشاورزی در بین رومی‌ها مرسوم بوده است. همچنین، در انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ژاپن و چین این کار بسیار رایج است. استفاده از این ماده به عنوان کود در محصولات زراعی در نواحی ساحلی در همه نقاط جهان متداول است (Vazques et al., 2000).

چای ترش یا چای مکی با نام علمی *Hibiscus sabdariffa* از خانواده پنیرک L. شد. ارتفاع این منطقه از سطح دریا 481 متر بوده و در 61 درجه و 41 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. بر اساس آمار هواشناسی، این منطقه جز اقلیم‌های خشک و بسیار گرم، با میانگین بارندگی سالیانه 63 میلی‌متر و دمای متوسط 23 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. خاک محل آزمایش دارای بافت لوم-شنی و pH آن برابر با 7/6 بود (جدول 1).

پس از انجام عملیات خاک‌ورزی، کرت‌هایی با ابعاد 2/5 در 2/5 متر، ایجاد شد. فاصله بین کرت‌ها نیم‌متر و بین بلوک‌ها یک متر در نظر گرفته شد. کودهای زیستی ورمی کمپوست و گاوی چند روز قبل از کاشت به زمین اضافه شد. بذرها به صورت کپه‌ای و پس از مرطوب نمودن با کود آلی جلبک دریایی با تراکم 80000 بوته در هکتار (فاصله بین بوته‌ها 25 سانتی‌متر و فاصله بین ردیف‌ها 50 سانتی‌متر) در اول اردیبهشت ماه کاشته و بلافاصله به صورت شیاری آبیاری شد. بذر چای ترش مورد استفاده از پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل تهیه شد. آزمایش به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار که عامل اصلی شامل کودهای زیستی در چهار سطح، بدون کود (شاهد)، ورمی کمپوست به میزان 51 کیلوگرم در مترمربع، کود گاوی نیز به میزان 51 کیلوگرم در مترمربع و جلبک دریایی به میزان 2/5 گرم پودر آن با 2/5 لیتر آب حل شد و عامل فرعی سه سطح محلول پاشی آهن شامل، شاهد (عدم محلول-پاشی)، محلول پاشی به میزان سه سی‌سی در هزار در مرحله پنجم الی شش برگی، شش سی‌سی در هزار قبل از گلدهی در نظر گرفته شدند. در مراحل اولیه رشد گیاه تا زمانی که گیاهچه‌ها از خاک خارج و به طور کامل مستقر شوند، آبیاری با دور کوتاه انجام گرفت و در مراحل بعد به طور یکنواخت و با توجه به نیاز گیاه انجام شد و مبارزه مکانیکی با علفهای هرز در مراحل مختلف رشد گیاه در چند نوبت انجام گرفت. برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخن برداشت از هر کرت نمونه‌گیری از دو ردیف وسط و پس از حذف اثر

میکرووارگانیسم‌های مفیدی هستند که هر یک به منظور خاصی مانند تثبیت نیتروژن، رهاسازی بیون‌های فسفات، پتابسیم، آهن و غیره تولید می‌شوند. این میکرووارگانیسم‌ها معمولاً در اطراف ریشه مستقر شده و گیاه را در جذب عناصر یاری می‌کنند (Wu et al., 2005) و باعث کاهش بیماری‌های گیاه، بهبود ساختمان خاک، تحریک بیشتر رشد گیاه و بالا رفتن کمیت و کیفیت و افزایش مقاومت آن در برابر تنفس-های محیطی می‌شوند (Nagananda et al., 2010). استفاده از ۱ گیاهی است چندساله، با شاخه‌های فرعی، با رنگ سبز تیره مایل به قرمز و برگ‌ها منتاوب و پنج‌لایه دارای سه تا هفت لوب و حاشیه برگ‌ها دندانهای، بدون کرک، گل‌ها بزرگ با دمگل کوتاه است. میوه‌ها توسط کاسبرگ‌های گوشتشی احاطه شده که حاوی 22 تا 34 دانه در هر کپسول می‌باشند. این گیاه دارای یک ریشه راست، عمیق و قابل نفوذ است (Zargari, 1995). طبق تحقیقات نعمتی و همکاران (2014) (Nemati et al., 2014) مصرف تلفیقی کودهای دامی و زیستی، نسبت به مصرف جداگانه آن‌ها می‌تواند در افزایش عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش نقش مؤثری را ایفا کند.

برجی آباد و همکاران (Borji Abad et al., 2014) گزارش کردند که تأثیر مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر تعداد غوزه، تعداد شاخه فرعی، تعداد دانه در غوزه و بوته و شاخص‌های کلروفیل معنی‌دار بود. بیشترین شاخص‌های کلروفیل برگ از محلول پاشی چای ترش با آهن حاصل شد که نسبت به شاهد افزایش 29 درصدی را نشان داد. لازم به ذکر است که بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه واکنش کودی چای ترش بر مبنای مصرف انواع کودهای شیمیایی بوده، واکنش این گیاه نسبت به کودهای زیستی و محلول پاشی آهن کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتری است به همین منظور این آزمایش با هدف بررسی اثر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چای ترش در شرایط آب و هوایی گرم و خشک انجام شد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان زابل در سال زراعی 1394-95 اجرا

از طریق نسبت عملکرد اقتصادی به عملکرد بیولوژیک محاسبه شد. برای سنجش آنتوسمیانین نمونه‌گیری از کاسبرگ‌ها در آبان ماه، هنگام رسیدگی فیزیولوژیک میوه‌ها انجام شد، گرفتن نمونه به منظور سنجش پروتئین، کلروفیل، کاروتونوئید و کربوھیدرات در مرحله گلدهی، از برگ‌های فوقانی چای ترش انجام شد.

حاشیه‌ای در سطح یک مترمربع انجام گرفت، بوته‌ها از سطح زمین قطع و کدگذاری شد و به آزمایشگاه منتقل گردید، سپس اقدام به جداسازی کاسبرگ‌ها شد و پس از خشک کردن در آون در دمای 74 درجه سانتی‌گراد و به مدت 48 ساعت، وزن خشک بوته و وزن خشک کاسبرگ اندازه‌گیری شد. این دو ویژگی به ترتیب معادل عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی چای ترش هستند. شاخص برداشت نیز

جدول 1- ویژگی های فیزیکی و شیمیابی خاک محل آزمایش
Table 1- Soil physicochemical characteristics of experimental location

Table 1: Soil physicochemical characteristics of experimental location										
Textures	بافت	شن	رس	لای	پتابسیم	فسفر	ماده آلی	اسید	هدایت	
	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(میلی گرم بر کیلوگرم)	(میلی گرم بر کیلوگرم)	نیتروژن (درصد) N (%)	Organic material (%)	یته pH	الکتریکی (دسیزیمیس بر متر)
Loam clay	42	30	28	175	11.2	5	16	7.6	1.5	EC (dS.m ⁻¹)

منحنی استاندارد گلوکز به دست آمد (Clairmont et al., 1986).

اندازه‌گیری میزان بروتائین

اندازه‌گیری غلظت پروتئین به وسیله روش برادفورد انجام شد (Bradford, 1976).

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه آماری داده‌ها با نرم‌افزار SAS نسخه 9/1 و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چندامنه‌ای دانکن در سطح پنج درصد اتحام شد.

نتائج و بحث

عملکرد اقتصادی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کودهای زیستی بر عملکرد اقتصادی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. (جدول 2).
 بیشترین مقدار عملکرد کاسبرگ خشک (414/70) کیلوگرم در هکتار از کاربرد کود گاوی به دست آمد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت؛ در حالی که کمترین مقدار عملکرد اقتصادی (286/21) کیلوگرم در هکتار) مربوط به شاهد بود (جدول 3). مصرف کود گاوی مقدار عملکرد اقتصادی را حدود 45 درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جدول 3).

ارزیابی، صفات

اندازه‌گیری، کلروفیل، a، b و کاربوناتنیدها

جهت اندازه گیری مقدار کلروفیل^a, b و کاروتینوئیدها از روش آرانون، 1967 (میلی گرم بر گرم وزن تر) و از برگ چای ترش استفاده شد.

اندازه‌گیری، آنتو سیانس، کاسیس‌گی

آنتوسیانین ها از لحاظ شیمیایی متعلق به گروه فنول ها می باشند. برای اندازه گیری مقدار آنتوسبیانین ها از روش واگنر (Wagner, 1979) استفاده شد.

اندازه‌گیری، کوه‌های ات

برای اندازه‌گیری کربوهیدرات پس از افزودن 10 میلی‌متر اتانول درصد به 0/2 گرم بافت تازه برگ و قرار دادن آن در حمام بن‌ماری به مدت یک ساعت، با دمای 80 درجه سانتی‌گراد، یک میلی‌متر فنول 0/5 درصد و 5 میلی‌متر اسید سولفوریک 98 درصد به یک میلی‌متر از این محلول اضافه شد و جذب آن در طول موج 483 نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر قرائت شد. میزان کربوهیدرات استخراج، براساس مکروگرم گلوكز به گرم وزن، تر برگ و بر اساس،

جدول 2- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن جای ترش

Table 2- Analysis of variance (mean square) for economical yield, biological yield and harvest index, under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	عملکرد بیولوژیک Biological yield	عملکرد اقتصادی Economical yield	شاخص برداشت Harvest index
تکرار Replication	2	5114692.13 **	18347.29 **	1.411 ns
کودزیستی Biofertilizers (A)	3	6709729.34 **	29546.27 *	4.567 ns
خطای اصلی Error a	6	11135545.77	16490.15	5.788
محلول پاشی آهن Foliar iron (B)	2	3758173.64 **	89932.29 **	4.442 ns
زیستی × محلول پاشی آهن (A×B)	6	906852.22	3227.47	0.422 ns
خطای فرعی Error b	16	498859.3	8330.90	1.557
ضریب تغییرات (درصد) C.V (%)	-	10.359	24.935	22.648

*، ** و ns: به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و عدم معنی‌داری.
*, ** and ns: are significant at p≤%5 and p≤%1 and no significant, respectively.

مواد غذایی اکوسیستم خاک به شمار می‌رود و از طریق بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک باعث افزایش عملکرد محصول می‌شود (Fallahi et al., 2009) (Ahmadian et al., 2004) روی بررسی اثر مصرف کود دامی بر کمیت و کیفیت عملکرد زیره سبز (*Cuminum cyminum L.*) نیز نشان داد که تعداد چتر در بوته، تعداد بذر در گیاه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمار کود دامی افزایش می‌یابند. همچنین در بررسی عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان (*Helianthus annuus L.*) تحت تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد مشخص گردید که کاربرد توانم کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های زیستی بیشترین تأثیر را در بهبود صفات مورد بررسی آفتابگردان داشت (Nazarly & Seyed Sharifi, 2013) همچنین نتایج مشابهی از تأثیر مثبت مصرف کودهای زیستی بر عملکرد

تأثیر محلول پاشی آهن بر عملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول 2). بیشترین عملکرد اقتصادی (461/73 کیلوگرم در هکتار) از تیمار شش سی سی در هزار محلول پاشی آهن به دست آمد (جدول 3). البته به نظر می‌رسد که گیاهان در تیمار شش سی سی در هزار محلول پاشی آهن در مقایسه با تیمار شاهد (بدون محلول پاشی) در حدود 57 درصد، افزایش عملکرد کاسبرگ داشتند. بهمکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد کاسبرگ نشان داد که بالاترین میزان (587/60 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد کود زیستی جلیک دریابی + غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن به دست آمد. این مقدار نسبت به تیمار شاهد (335/53 کیلوگرم در هکتار) بیش از 73 درصد افزایش عملکرد داشت (جدول 4). بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، کاربرد کود دامی سبب افزایش عملکرد اقتصادی شد. کود دامی از مهمترین منابع انرژی و

آفتابگردان گزارش شده است (Yousefpoor et al., 2014)

جدول 3- مقایسه میانگین عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن چای ترش
Table 3-Means comparison of economical yield, biological yield and harvest index, under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) Economical yield (kg.h^{-1})	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) Biological yield (kg.h^{-1})	شاخص برداشت (درصد) Harvest index (%)	تیمارهای آزمایش Treatments
293.15 ^b	6335.6 ^b	4.977 ^b	محلول پاشی آهن (سی سی در هزار) Foliar iron (CC per thousand)
343.23 ^b	6686.1 ^b	5.380 ^{ab}	0
461.73 ^a	7431.4 ^a	6.173 ^a	3
286.21 ^a	6430 ^a	4.572 ^a	شاهد Control
363.97 ^a	5845 ^a	6.128 ^a	ورمی کمپوست Vermicompost
414.70 ^a	7825 ^a	5.347 ^a	کود گاوی Manure cow
399.27 ^a	7170 ^a	5.994 ^a	جلبک دریایی Sea algae

* در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشترک، براساس آزمون چندامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.

* In Hurstons Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan's test at 5% probability level.

کیلوگرم در هکتار) به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت (جدول 4).

در این رابطه می‌توان گفت که مصرف مقادیر مناسب کود زیستی تأمین با محلول پاشی آهن، موجب بهبود احتمالی فعالیت‌های میکروبی مفید در خاک و معدنی کردن عناصر غذایی شده است و در نهایت وزن خشک بوته چای ترش (عملکرد بیولوژیک) را افزایش داده است. بر اساس نتایج، کود دامی باعث افزایش عملکرد بیولوژیک هم شد. در این رابطه می‌توان گفت، احتمالاً افزودن کود دامی به خاک با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهای حیاتی آن، ضمن ایجاد بستری مناسب برای رشد ریشه و فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، امکان افزایش رشد و در پی آن تولید ماده خشک را فراهم کرده است. استفاده از محلول پاشی آهن نیز روی عملکرد بیولوژیک تأثیر مثبتی

عملکرد بیولوژیک

نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که مصرف کودهای زیستی و محلول پاشی آهن و برهمکنش آن‌ها بر عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی‌داری داشت (جدول 1). بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک (7825 کیلوگرم در هکتار) از کاربرد کود گاوی به دست آمد. عملکرد بیولوژیک در تیمار شش سی سی در هزار محلول پاشی آهن (4/6) کیلوگرم در هکتار) نسبت به شاهد (6335/6 کیلوگرم در هکتار) افزایش داشته است (جدول 3). برهمکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن نیز دارای اختلافی معنی‌دار از نظر عملکرد بیولوژیک می‌باشد (جدول 4)، به طوری که عملکرد بیولوژیک در تیمار جلبک دریایی + غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن (8894)

در پی داشت، بهطوری که بیشترین عملکرد از تیمار شش در هزار حاصل شده است که با نتایج عبدل و همکاران (Abd-EL et al.,) (1998) روی سویا (*Glycine max L.*) مطابقت داشت.

جدول ۴- مقایسه میانگین عملکرد اقتصادی، بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تأثیر بر همکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن چای ترش
Table4- Means comparison of economical yield, biological yield and harvest index, in interaction effects of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

کود زیستی (کیلوگرم در هکتار) Bio fertilizer (kg.h ⁻¹)	محلول پاشی آهن (سی سی در هزار) Foliar iron(CC per thousand)	شاخص برداشت (درصد) Harvest index (%)	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) Biological yield (kg.h ⁻¹)	عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) Economical yield (kg.h ⁻¹)
شاهد Control	0	5.100 ^{a*}	6890 ^{abc}	338.13 ^{bc}
	3	5.247 ^a	6856 ^{abc}	335.53 ^{bc}
	6	5.607 ^a	7241 ^{abc}	407.67 ^{bc}
ورمی کمپوست Vermicompost	0	4.817 ^a	4530 ^c	219.77 ^c
	3	6.043 ^a	5068 ^{bc}	307.70 ^c
کود گاوی Manure cow	6	5.893 ^a	5694 ^{abc}	348.50 ^{bc}
	0	5.430 ^a	6421 ^{abc}	339.77 ^{bc}
جلیک دریابی Sea algae	3	5.417 ^a	7166 ^{abc}	377.97 ^{bc}
	6	6.543 ^a	7896 ^{ab}	503.13 ^{ab}
	0	4.563 ^a	7502 ^{bc}	274.93 ^c
جلیک دریابی Sea algae	3	4.813 ^a	7655 ^{abc}	351.73 ^{bc}
	6	6.650 ^a	8894 ^a	587.60 ^a

*در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشترک، براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تقاضت معنی‌داری ندارند.

*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan's test at 5% probability level.

زیستی و محلول پاشی آهن و برهمکنش آن‌ها از نظر شاخص
برداشت، بود (جدول ۲). بیشترین میزان شاخص برداشت (6/128)

شاخص برداشت
نتایج تجزیه واریانس نشان‌دهنده عدم معنی‌داری اثر کودهای

طریق بهبود ساختمان خاک و افزایش درصد ماده آلی آن باعث بهبود رشد ریشه، بالا بردن توان جذب و نگهداری آب و نیز افزایش مقدار عناصر قابل جذب برای گیاه شد و از این طریق باعث بهبود تجمع ماده خشک در گیاه می‌شود. در مورد مصرف محلول پاشی آهن نیز، غلظت شش در هزار بالاترین میزان شاخص برداشت را نشان داد. تأمین مقدار کافی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به ویژه عناصر ریزمغذی یکی از جنبه‌های بسیار مهم در مدیریت زراعی است و می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و شاخص برداشت ایفا کند.

غلظت رنگیزهای فتوستتری (کلروفیل a، b و کاروتونوئید)
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر کودهای زیستی، محلول پاشی آهن و برهمکنش آنها بر غلظت کلروفیل a، b و کاروتونوئیدهای برگ معنی دار شد (جدول 5).

درصد) در تیمار ورمی کمپوست مشاهده شد که نسبت به شاهد 4/572 (درصد) حدود 34 درصد افزایش داشت. بیشترین میزان شاخص برداشت در کاربرد محلول پاشی آهن از تیمار غلظت شش در هزار 6/173 (درصد) حاصل شد که نسبت به شاهد 4/977 (درصد) بیش از 24 درصد بود (جدول 3). مقایسه میانگین‌های برهمکنش مصرف کودهای زیستی و محلول پاشی آهن نشان داد که کاربرد تیمار جلک دریابی + غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن، دارای بیشترین شاخص برداشت (6/650 درصد) و کمترین آن مربوط به شاهد 5/1 (درصد) است (جدول 4). بر اساس نتایج بدست آمده، کود آلی ورمی کمپوست سبب افزایش شاخص برداشت شد، به طوری که ورمی - کمپوست در محیط کاشت به دلیل افزایش فعالیت میکروبی و کمک به چرخش بهتر عناصر غذایی، باعث تسهیل جوانهزنی بذر می‌شود. هم‌چنین استفاده از حاصلخیز کننده‌های خاک مانند ورمی کمپوست از

جدول 5- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) ویژگی‌های کیفی تحت تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن چای ترش
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) for qualitative characteristics under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	کربوهیدرات Carbohydrate	کاروتونوئید Carotenoids	کلروفیل b Chlorophyll b	کلروفیل a Chlorophyll a	پروتئین Protein	آنتوسیانین Anthocyanin
تکرار Replication	2	0.413	0.413	2.689	11.039	0.0003	12.878
کودزیستی Bio Fertilizers (A)	3	0.708**	0.708**	0.442*	10.063**	0.0100**	14.585**
خطای اصلی Error a	6	1.131	1.131	1.210	4.930	0.0012	2.524
محلول پاشی آهن Foliar iron (B)	2	2.470**	2.470**	4.196**	31.895**	0.0064**	28.064**
کود							
زیستی × محلول پاشی آهن AxB	6	0.070 ^{ns}	0.070 ^{ns}	0.130 ^{ns}	1.608 ^{ns}	0.0010 ^{ns}	2.596 ^{ns}
خطای فرعی Error b	16	0.106	0.106	0.136	1.442	0.0007	1.475
ضریب تغییرات C.V (%)	-	23.676	23.676	25.082	27.347	23.753	20.011

* و **: بهترتب معنی دار در سطح پنج و یک درصد.

* and **: Are significant at $p \leq 0.05$ and $p \leq 0.01$.

کود دامی است که نسبت به شاهد بهترتب افزایش 42، 51 و 83

به طوری که بیشترین مقدار کلروفیل a، b و کاروتونوئید مربوط به

درصدی را نشان داده است (جدول ۶). در سطوح محلول یاشی آهن نیز تیمار شش در هزار آهن، نسبت به شاهد، بهترین تیمار بود که به ترتیب، افراش ۹۰ و ۱۰۰ درصدی آن، را در پرداخت داشت (حدوای ۶).

جدول 6- مقایسه میانگین وینچگی های کیفی تحت تأثیر کودهای زیستی و محلول یا شی آهن چای ترش

Table 6- Means comparison of qualitative characteristics under the influence of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

تیمارهای آزمایش Treatments	رنگیزهای فتوسنتزی Pigments photosynthetic						آتوسیانین Anthocyanin (μmol.g⁻¹)	
	کربوهیدرات (میکرو گرم بر گرم) Carbohydrate (μg.g⁻¹)	کاروتونوئید (میلی گرم بر گرم) Carotenoids (mg.g⁻¹)	b (میلی گرم بر گرم) Chlorophyll b (mg.g⁻¹)	b (میلی گرم بر گرم) Chlorophyll a (mg.g⁻¹)	a (میلی گرم بر گرم) Chlorophyll a (mg.g⁻¹)	پروتئین (میلی گرم بر گرم) Protein (mg.g⁻¹)		
محلول پاشی آهن (سی سی در هزار) Foliar iron (CC per thousand)								
کود زیستی Bio fertilizers								
شاهد Control	0.946 ^c	0.946 ^c	0.907 ^c	3.079 ^b	0.089 ^b	4.311 ^b		
ورمی کمپوست Vermicompost	1.342 ^b	1.342 ^b	1.432 ^b	3.880 ^b	0.113 ^a	7.096 ^a		
کود گاوی Manure cow	1.851 ^a	1.851 ^a	2.087 ^a	6.217 ^a	0.135 ^a	6.799 ^a		
جلبک دریایی Seaweed	1.095 ^a	1.095 ^a	1.172 ^a	2.944 ^a	0.088 ^b	4.396 ^b		
	1.185 ^a	1.185 ^a	1.606 ^a	4.338 ^a	0.079 ^b	5.831 ^{ab}		
	1.656 ^a	1.656 ^a	1.670 ^a	5.395 ^a	0.140 ^a	6.722 ^a		
	1.582 ^a	1.582 ^a	1.454 ^a	4.891 ^a	0.142 ^a	7.326 ^a		

*در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشترک، براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن درستطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.

*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan's test at 5% probability level.

انجامد و بر میزان جذب عناصر میکرو (از جمله آهن، منگنز و منیزیم) که در ساخت کلروفیل نقش مهم ایفا می‌کنند، می‌افزایند و سرانجام سبب افزایش سنتر کلروفیل می‌شوند. سنجولی (Sancholli, 2007) تیمار شش در هزار محلول پاشی آهن نیز باعث افزایش میزان رنگیزه‌های فتوستنتری چای ترش گردید که در این راستا ملکوتی و همکاران (Malakouti & Tehrani, 1999) با توجه به این که عنصر آهن در ساختار کلروفیل نقش مستقیمی ندارد اما وجود عنصر آهن کافی سبب بهبود کلروفیل‌سازی در گیاه می‌شود و وضعیت کلروفیل چای ترش می‌تواند در میزان فتوستنتر تأثیرگذار باشد. نتایج این آزمایش، با تحقیقات یوندنی و همکاران، (Peyvandi et al.,

نتایج مقایسه میانگین‌های برهمکنش کودهای زیستی و محلول- پاشی آهن نشان می‌دهد که بالاترین افزایش در میزان کلروفیل a، کاربرد همزمان ورمی کمپوست و غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن به وجود آمده و بالاترین افزایش در میزان کلروفیل b، به کار- بردن همزمان جلبک دریابی و غلظت شش در هزار آهن بوده و در نهایت بالاترین افزایش در میزان کاروتونوئید در اثر ترکیب همزمان تیمار شاهد و غلظت شش در هزار آهن بوده است. در مورد تأثیر مثبت کاربرد مقدار بیشتر کود دامی بر میزان کلروفیل برگ می‌توان گفت، این کودها با تأمین نیازهای غذایی موجودات ذره بینی خاک، باعث افزایش آن‌ها می‌شوند که این امر به کاهش PH خاک می-.

کاسبرگ چای ترش دارد. کاربرد محلول پاشی آهن نیز میزان آنتوسبیانین را افزایش داد، به طوری که بیشترین مقدار مربوط به تیمار سه در هزار و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد بود (جدول 6). مقایسه میانگین برهمکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن حکایت از آن دارد که تیمار کود دامی همراه با غلظت سه در هزار محلول پاشی آهن بهترین تیمار است و میزان آنتوسبیانین کاسبرگ موجود در این تیمار (8/960 میکرومول بر گرم وزن تر) نسبت به تیمار شاهد (4/380 میکرومول بر گرم وزن تر) 100 درصد افزایش داشته است (جدول 7).

(2011) در آزمایشی روی گیاه دارویی ریحان (*Ocimum basilicum*) (L.) با استفاده از کود آهن و نانو کود آهن باعث افزایش محتوی کلروفیل شدند، مطابقت دارد.

مقدار آنتوسبیانین

مقدار آنتوسبیانین به طور معنی داری تحت تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن قرار گرفت (جدول 5). بیشترین میزان ترکیب فنولی از جمله آنتوسبیانین در میان کودهای زیستی، جلبک دریایی بود که نسبت به شاهد 67 درصد افزایش داشت (جدول 6). بنابراین به نظر می‌رسد جلبک دریایی نقش مثبتی در افزایش مقدار آنتوسبیانین

جدول 7- مقایسه میانگین ویژگی‌های کیفی تحت تأثیر برهمکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن چای ترش

Table 7- Means comparison of qualitative characteristics in interaction effects of bio-fertilizers and foliar iron of sour tea

Bio-fertilizer (kg.h ⁻¹)	کود زیستی (کیلو گرم در هکتار)	محلول پاشی آهن (سی سی در هزار)	پروتئین (میلی گرم بر گرم)	a کلروفیل (میلی گرم بر گرم)	b کلروفیل (میلی گرم بر گرم)	کاربوهیدرات (میکرومول بر گرم)	آنتوسبیانین (میکرومول بر گرم)
	Foliar iron (CC per thousand)	Protein (mg.g ⁻¹)	Chlorophyll a (mg.g ⁻¹)	Chlorophyll b (mg.g ⁻¹)	Carotenoids (mg.g ⁻¹)	Carbohydrate (μg.g ⁻¹)	Anthocyanin (μmol.g ⁻¹)
Control	0	0.083 ^{bcd}	3.591 ^{ab}	0.483 ^d	1.487 ^{abcd}	1.487 ^{abcd}	4.380 ^{bcd}
	3	0.153 ^a	4.475 ^{ab}	1.357 ^{abcd}	1.737 ^{abc}	1.737 ^{abc}	6.787 ^{abc}
شاهد	6	0.164 ^a	6.488 ^a	2.064 ^{ab}	2.198 ^a	2.198 ^a	5.903 ^{abc}
Vermicompost	0	0.057 ^c	3.224 ^{ab}	0.666 ^{cd}	0.751 ^{cd}	0.751 ^{cd}	3.403 ^c
	3	0.069 ^c	3.853 ^{ab}	0.866 ^{bcd}	1.358 ^{abcd}	1.358 ^{abcd}	5.240 ^{abc}
ورمی کمپوست	6	0.080 ^{bc}	6.491 ^a	1.630 ^{abcd}	1.978 ^{ab}	1.978 ^{ab}	7.293 ^{abc}
Manure cow	0	0.105 ^{abc}	3.740 ^{ab}	1.439 ^{abcd}	1.013 ^{bcd}	1.013 ^{bcd}	4.413 ^{bcd}
	3	0.112 ^{abc}	4.045 ^{ab}	1.836 ^{abcd}	1.314 ^{abcd}	1.314 ^{abcd}	8.960 ^a
کود گاوی	6	0.142 ^{ab}	6.035 ^a	1.983 ^{abc}	1.652 ^{abcd}	1.652 ^{abcd}	6.867 ^{abc}
Seaweed	0	0.111 ^{abc}	1.763 ^b	1.039 ^{bcd}	0.531 ^d	0.531 ^d	5.050 ^{bcd}
	3	0.118 ^{abc}	3.148 ^{ab}	1.669 ^{abcd}	0.961 ^{bcd}	0.961 ^{bcd}	7.400 ^{ab}
جلبک دریایی	6	0.155 ^a	5.854 ^a	2.671 ^a	1.575 ^{abcd}	1.575 ^{abcd}	7.133 ^{abc}

*در هر ستون میانگین‌های دارای حروف مشترک، براساس آزمون چند دامنه‌ای دانک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند.

*Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on Duncan's test at 5% probability level.

طبق نتایج موجود، کود زیستی جلبک دریایی نقش مثبتی در افزایش مقدار آنتوسبیانین کاسبرگ چای ترش دارد. در پژوهش حاج سید هادی و همکاران (Haj Seyed Hadi et al., 2008) نیز استفاده از کود آلی، باعث بالا رفتن فعالیت‌های میکروبی خاک و افزایش ترکیب فنولی سیلیمارین در ماریتیغال (*Silybum*

(*mariannum* L.) شد. کاربرد محلول پاشی آهن نیز مقدار آنتوسبیانین را افزایش داد این نتایج ممکن است به علت تأثیر عنصر آهن بر مشتقان ترکیب فنولی به عنوان پیش ماده سنتز آنتوسبیانین ساختار فلاونوئید بوده باشد.

نسبت به شاهد حدود 61 درصد افزایش نشان داده است. کاربرد محلول پاشی آهن نیز سبب افزایش مقدار پروتئین چای ترش شد که در این زمینه تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی سبب افزایش معنی-دار درصد پروتئین در پنبه (Gossypium herbaceum L.) (Sawan et al., 2001) (Baygi et al., 2010) اعلام کردند که با افزایش محلول پاشی آهن، عملکرد دانه و پروتئین‌های دانه سویا افزایش معنی‌داری نشان داد.

نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که کاربرد ترکیبی کود زیستی و محلول پاشی آهن با غلظت شش در هزار، بیشترین تأثیر را بر خصوصیات کمی و کیفی داشت. بر این اساس کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و محلول پاشی آهن برتری قابل توجهی را نسبت به کاربرد جداگانه هر یک از آن‌ها داشت. با توجه به شرایط نامطلوب حاکم بر خاک از جمله آهکی بودن و pH بالای 7/6 باعث جلوگیری از جذب عناصر بهویژه آهن از خاک می‌گردد، ولی تیمارهای محلول-پاشی، این عنصر را به طور مستقیم در اختیار گیاه قرار داده و با تأمین این عناصر نیاز گیاه برطرف شده و باعث افزایش اکثر صفات اندازه-گیری شده است. افزایش میزان محلول پاشی آهن با بهبود تحرک و کارایی عناصر غذایی سبب افزایش ویژگی‌های کمی و کیفی گردید. همچنین با توجه به نقش مهم کودهای زیستی در خصوص بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حاصل خیزی زمین‌های زراعی، تأمین سطوح مناسب این مواد در خاک برای دستیابی به حداکثر عملکرد لازم به نظر می‌رسد. هر چند استفاده از کودهای آلی نسبت به کودهای معدنی هزینه بیشتری را در بر دارد، ولی بهدلیل تأثیر بلند مدت آن بر بهبود ویژگی‌های فیزیکی، بیولوژیکی و تغذیه‌ای خاک می‌تواند از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد و استفاده متواالی و بهینه از زمین‌های کشاورزی را ممکن سازد. بر این اساس، مدیریت کودی با کودهای زیستی و محلول پاشی آهن امری مهم در کشاورزی ارگانیک محسوب می‌شود.

مقدار کربوهیدرات

نتایج تجزیه واریانس (جدول 5)، نشان‌دهنده معنی‌دار بودن تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن و برهمکنش آن‌ها بر مقدار کربوهیدرات موجود در برگ‌های فوکانی چای ترش در سطح یک درصد آماری بود. طبق اطلاعات جدول 6، تیمار کود دامی بالاترین مقدار کربوهیدرات را نشان داد. در مقایسه محلول پاشی آهن مشخص گردید تیمار شش در هزار بالاترین مقدار کربوهیدرات را دارد. نتایج مقایسه میانگین‌های برهمکنش کودها بیانگر این بود که کاربرد همزمان تیمار شاهد با غلظت شش در هزار محلول پاشی آهن بهترین اثر را بر مقدار کربوهیدرات‌ها داشت (جدول 7). این مقدار 2/198 میلی‌گرم گلوکز بر گرم وزن تر نمونه بوده است. محلول پاشی آهن به میزان شش در هزار سبب افزایش مقدار کربوهیدرات برگ شد که در این خصوص رمرودی و همکاران (Ramroudi et al., 2011) بیان نمودند که کاربرد محلول پاشی عناصر ریزمغذی می‌تواند نقش مفیدی بر بہبود خصوصیات کمی و کیفی گیاهان از جمله اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) ایفا نماید.

مقدار پروتئین سرشارخه‌ها

تأثیر کودهای زیستی و محلول پاشی آهن و بر هم کنش آن‌ها در سطح یک درصد، بر مقدار پروتئین برگ معنی‌دار شد (جدول 5). مقایسه میانگین‌ها نشان‌دهنده وجود تفاوت معنی‌دار بین انواع مختلف کودهای زیستی است؛ به طوری که بیشترین مقدار پروتئین از تیمار جلبک دریایی به دست آمد که نسبت به شاهد حدود 61 درصد افزایش نشان داده است (جدول 6). کاربرد محلول پاشی آهن نیز بر مقدار پروتئین چای ترش افزود، به نحوی که بیشترین مقدار مربوط به غلظت شش در هزار بود که نسبت به شاهد افزایش 52 درصدی داشت (جدول 6). مقایسه میانگین‌های بر همکنش کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر مقدار پروتئین نشان داد که بالاترین مقدار مربوط به تیمار شاهد به همراه غلظت شش در هزار آهن است. این مقدار 0/164 میلی‌گرم بر گرم وزن تر است که تفاوت ناچیزی با تیمار جلبک دریایی دارد (جدول 7).

بیشترین مقدار پروتئین از تیمار جلبک دریایی به دست آمد که

منابع

- Ahmadian, A., Ghanbari, A., and Galavi, M. 2004. The effect of consume manure on yield, yield index and quality of cumin. Proceeding of 2nd Medicinal Plants Symposium, Shahed University of Tehran, Iran 27-28 January. (In

Persian)

- Al-Nahid, T.S. 1991. Effect of frequency of irrigation on sewage sludge amended soil and corn nutrition. *Arid Soil Research Rehabilitation* 5(2): 137-146.
- Arnon, A.N. 1967. Method of extraction of chlorophyll in the plants. *Agronomy Journal* 23: 112-121.
- Baygi, A., Nasri, M., Oveysi, M., and Tarighol Eslami, M. 2010. Effects of drought and foliar iron fertilization in flowering stage on the grain yield, protein and oil in soybean. Proceedings of the National Conference on Advances in Crop Production Plant Origin. Islamic Azad University Bojnord 5 and 6 June, p. 1-6. (In Persian)
- Borji Abad, A., Galavi, M., and Ramroudi, M. 2014. The effect of density on morphological characteristics and use of micro-nutrients and indicators of chlorophyll of sour teas. The National Conference of Medicinal plants and Sustainable Agriculture. Mofattah Shahid Faculty of Hamedan. August 30. (In Persian)
- Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry* 72: 248-254.
- Clairmont, K.B., Hagar, W.G., and Davis, E.A. 1986. Manganese toxicity to chlorophyll synthesis in tobacco callus. *Plant Physiology* 80: 291-293.
- Fallahi, J., Koocheki, A., and Rezvani Moghaddam, P. 2009. Effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile (*Matricaria recutita*) as a medicinal plant. *Iranian Journal of Field Crops Research* 7(1): 127-135. (In Persian with English Summary)
- Haj Seyed Hadi, M.R., Darzi, M.T., and Sharifi Ashoorabadi, E. 2008. Study the effects of conventional and low input production system on quantitative and qualitative yield of *Silybum marianum* L. 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR, Modena, Italy. September 19.
- Koocheki A., Hosseini, M., and Dezfouli Hashemi, A. 2000. Sustainable Agriculture (Translated). Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Mashhad, Iran, 164 pp. (In Persian)
- Malakouti, M.J., and Tehrani, M. 1999. The Role of Micronutrients in Enhancing the Performance and Improve the Quality of Agricultural Products, Tarbiat Modarres University Press, Print Notification, Tehran, Iran 229 p. (In Persian)
- Martin, E.C., Slack, D.C., Tannksley, K.A., and Basso, B. 2006. Fresh and composted dairy manure applications on alfalfa yield and the environment in Arizona. *Agronomy Journal* 98: 80-84.
- Nagananda, G.S., Das, A., Bhattacharya, S., and Kalpana, T. 2010. *In vitro* studies on the effects of bio fertilizers (*Azotobacter* and *Rhizobium*) on seed germination and development of *Trigonella foenum graecum* L. using a novel glass marble containing liquid medium. *International Journal of Botany* 6: 394-403.
- Nazarly, R., and Seyed Sharif, R. 2013. Study of qualitative and quantitative yield and some agronomic characteristics of sunflower (*Helianthus annuus* L.) in response of seed inoculation with PGPR in various levels of nitrogen fertile. *Journal of Agroecology* 5(3): 308-317. (In Persian with English Summary)
- Nemati, M., Dahmardeh, M., Khammari, A., and Nejati Yazdi Nezhad, M. 2014. Effect of bio-fertilizers and manure on economic performance and quality characteristics of hibiscus. *Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research Journal* 31(4): 610-625. (In Persian with English Summary)
- Peyvandi, M., Parandeh, H., and Mirza, M. 2011. Comparison of Nano with chelated iron chelated iron on growth performance and activity of antioxidant enzymes basil. *What's New in Cellular and Molecular Biology Biotechnology Journal* 4(1): 89-99.
- Pokorna, K. 1984. Effects of long term fertilization on the dynamics of changes of soil organic matter. *Zbl. Microbiology (Zentralblatt Fur Bakteriologie-international Journal of Medical Microbiology Virology Parasitology and Infectious Diseases)* 139: 497-504.
- Ramroudi, M., Keikha Jaleh, M., Galavi, M., Seghatoleslami, M.J., and Baradran, R. 2011. The effect of various micronutrient foliar applications and irrigation regimes on quantitative and qualitative yields of isabgol (*Plantago ovata* Forsk.). *Journal of Agroecology* 3(3): 277-289. (In Persian with English Summary)
- Rezaenejad, Y., and Afyuni, M. 2001. Effect of organic matter on soil chemical properties, and corn yield and elemental uptake. *Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science* 4(4): 19-29. (In Persian with English Summary)
- Sancholli, N. 2007. Effects of different ratios of manure and chemical mixture on soil properties, Yield SC 704 corn varieties. MSc thesis of Zabol University, Zabol, Iran. (In Persian with English Summary)
- Sawan, Z.M., Hafez, S.A., and Basyony, A.E. 2001. Effect of nitrogen fertilization and foliar application of plant

- growth retardant and zinc on cotton seed, protein and oil yields and oil properties of cotton. Journal of Agronomy and Crop Science 186: 183-191.
- Vazques, P., Holguin, G., and Puente, M. 2000. Phosphate solubilizing microorganism associated with the rhizosphere of mangroves in semiarid coastal lagoon. Biology fertility of Soils 30: 460-468.
- Wagner, G.J. 1979. Content and vacuole/extravacuole distribution, free amino acids and anthocyanins in protoplasts. Plant Physiology 64: 88-93.
- Wu, S.C., Caob, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C., and Wong, M.H. 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma 125: 155-166.
- Yousefpoor, Z., Yadavi, A., Balouchi, H., and Farajee, H. 2014. Evaluation of some physiological, morphological and phonological characteristics in Sunflower (*Helianthus annuus* L.) influenced by biological and chemical sources of nitrogen and phosphorus. Journal of Agroecology 6(3): 508-519. (In Persian with English Summary)
- Zargari, A. 1995. Medicinal Plants. Tehran University Press., Tehran, Iran 5(1): 15-32. (In Persian)