

شماره ۱۰۶، بهار ۱۳۹۴

صص: ۶۵~۲۰

تأثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه‌ای گوسفندان ماکویی

- عباسعلی احمدی نقدی^۱، رسول پیرمحمدی (نویسنده مسئول)^۱، محسن صحرابی بلوردی^۱، خسرو پارسايی مهر^۱
- ۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
- ۲ دانشیار تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۹۲ تاریخ پذیرش: خرداد ۹۳

شماره تماس نویسنده مسئول: ۰۹۱۴۴۴۳۱۳۹۰

Email: r.pirmohammadi@urmia.ac.ir

چکیده

این تحقیق، بر روی سه راس گوسفند نر فیستوله دار با میانگین وزنی 50 ± 3 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین 3×3 اجرا شد. تیمارها شامل جیره پایه (شاهد) به علاوه دو جیره حاوی ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم اسانس نعناع فلفلی در روز بود. مایع شکمبه گوسفندان در ۳ ساعت پس از خوراک‌دهی صبح از طریق فیستولا شکمبه‌ای جمع آوری و میزان pH، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار آن اندازه‌گیری شد. روز پایانی هر دوره (۳ ساعت پس از خوراک‌دهی نوبت صبح) از طریق ورید و داج خون گیری به عمل آمد و میزان گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، HDL، LDL، NEFA، پروتئین قام، آلبومین و گلوبولین اندازه‌گیری گردید. ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و چربی خام؛ غلظت نیتروژن آمونیاکی، استات، پروپیونات، بوتیرات و کل اسیدهای چرب فرار شکمبه و غلظت فراستجه‌های خونی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.

واژه‌های کلیدی: اسانس نعناع فلفلی، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه.

Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 106 pp: 65-70

Effect of Peppermint (*Mentha Piperita L.*) on Digestibility and Rumen Fermentation of Makuei Sheep

By: Ahmadi A.A Naghadehi. Pirmohammadi R. (Corresponding Author; Email:r.pirmohammadi@urmia.ac.ir, Tel: +989144431390), Sahraei M. Belverdy. and Parsaeimehr K. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

Received: May 2013**Accepted: June 2014**

In a 3×3 Latin square design three treatments including: 1) basal diet (control) in addition to diets containing 2) 100 and 3) 200 mg/day of Peppermint essential oils were tested in three ruminally cannulated male sheep with average body weight of 50 ± 3 kg. Rumen liquor was sampled 3 hours after feeding to determine rumen pH, N-NH₃ and volatile fatty acids. On the last day of each period, blood samples were taken 3 hours after feeding via jugular vein to determine glucose, triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, NEFA, total protein, albumin and globulin. Dry matter intake and digestibility of DM, CP, NDF, ADF and EE; the ruminal parameters and blood metabolites were not affected by the treatments.

Key words: Peppermint essential oils, Digestibility, Rumen Fermentation.

مقدمه

متیل است (لاک و استودولا، ۱۳۷۶). استفاده از گیاه نعناع در تلیسه‌های هلشتاین سبب کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتزوآهای شکمبه و در نتیجه بهبود متابولیسم نیتروژن در شکمبه شد (Ando et al., ۲۰۰۳). در مطالعه دیگر، مصرف ۵ درصد گیاه نعناع فلفلی در جیره گاوها هلشتاین بدون تاثیر معنی‌دار بر تخمیر شکمبه و شیر تولیدی، سبب کاهش تولید متان شد (Hosoda et al., ۲۰۰۵). با توجه به اطلاعات محدود در رابطه با تاثیر انسانس نعناع فلفلی در تغذیه نشخوارکنندگان، در این تحقیق، اثر انسانس این گیاه بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه و متابولیت‌های خونی گوسفندان نژاد ماکویی بررسی شد.

مواد و روش‌ها

آزمایش بر روی ۳ راس گوسفند نر بالغ فیستوله دار نژاد ماکویی با میانگین وزن 50 ± 3 کیلوگرم در قالب طرح مرتع لاتین 3×3 طی ۳ دوره ۱۷ روزه (۱۰ روز عادت پذیری و ۷ روز داده برداری) انجام شد. جیره غذایی براساس جداول استاندارد انجمن ملی تحقیقات (۱۹۸۵) و به میزان ۲ برابر احتیاجات نگهداری تنظیم شد (جدول

طی سالیان اخیر، مطالعاتی در مورد استفاده از انسانس‌های گیاهی به عنوان جایگزین برای آنتی‌بیوتیک‌های محرك رشد در صنعت خوراک دام، انجام شده است. انسانس‌های گیاهی، ترکیبات فعال طبیعی هستند که به دلیل فرار بودن، استخراج آنها به روش تقطیر با بخار آب یا حللاهای استخراج کننده انجام می‌شود (Greathead, ۲۰۰۳; Simon, ۱۹۹۰). خاصیت ضد میکروبی انسانس‌های گیاهی علیه طیف وسیعی از میکرووارگانیسم‌ها (Burt, ۲۰۰۴)، به ترکیبات ترپنوتیکی و فنولی موجود در آن نسبت داده شده است.

(Chao et al., ۲۰۰۰; Helander et al., ۱۹۹۸). اثرات ضد میکروبی انسانس‌های گیاهی اخیراً موجب گردید که بعضی از محققان از این ترکیبات برای تغییر در الگوی تخمیر شکمبه به منظور بهبود بازدهی خوراک استفاده کنند. با توجه به اینکه عملده تحقیقات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفته است، اکنون نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی حیوان زنده می‌باشد (Benchaar et al., ۲۰۰۸). یکی از گیاهان دارویی نعناع فلفلی است که از سبزی‌های خوراکی با طبیعت گرم محسوب می‌شود (رجحان، ۱۳۷۵). انسانس نعناع حاوی متنول، متنون و استات

نمونه گیری از شکمبه در روز شانزدهم هر دوره، ۳ ساعت پس از خوراک دهی صبحگاهی توسط فیستولا شکمبه انجام شد. بلافضلله پس از اخذ نمونه شکمبه، pH آن اندازه گیری شد. نمونه های مایع شکمبه با استفاده از پارچه ۴ لایه متقال صاف و بر اساس روش Reynal و همکاران (۲۰۰۷)، دو نمونه از آن جهت اندازه گیری اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی با اسید سولفوریک ۵۰ درصد با نسبت ۱ به ۵۰ اسید سولفوریک به مایع شکمبه مخلوط گردید و تا هنگام آنالیز در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد (Ipharrague et al., ۲۰۰۷). اندازه گیری اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه به روش Bartley و Ottenstein (۱۹۷۱) توسط دستگاه کروماتو گرافی Philips PU4410، Cam-bridge، UK در آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه تهران انجام شد. نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بر اساس روش Smith و Murphy (۱۹۹۳) و با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتری مدل (RC 501، USA) اندازه گیری شد. خون گیری در روز پایانی هر دوره در زمان ۳ ساعت پس از خوراک دهی نوبت صبح از طریق ورید و داج به عمل آمد. نمونه گرفته شده داخل لوله های تحت خلا حاوی سدیم هپارین ریخته شد. پلاسمما توسط سانتریفیوژ با ۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد جدا و در فریزر نگهداری گردید. اندازه گیری فرستجehای خونی توسط کیت های تجاری شرکت پارس آزمون و رندوکس با استفاده از دستگاه اتو آنالیزr مدل (Alcyon300,USA) انجام شد.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش GLM نرم افزار SAS (۲۰۰۲) استفاده شد.

نتایج و بحث

از لحاظ ماده خشک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری وجود نداشت (جدول ۲). موفق با نتایج آزمایش حاضر، در دو مطالعه، استفاده از سطح ۵ درصد گیاه نعناع فلفلی تاثیر معنی داری بر مصرف ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم مصرفی گاوهای شیرده نداشت (Hosoda et al., ۲۰۰۶؛ ۲۰۰۵).

۱). تیمارهای آزمایش شامل: جیره شاهد، به علاوه دو جیره حاوی ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم اسانس نعناع فلفلی در روز بودند. جیره به صورت کاملاً مخلوط در دو وعده ۸ صبح و ۴ بعدازظهر در اختیار حیوانات قرار داده شد. قبل از هر وعده خوراک دهی، اسانس نعناع با ۱۰۰ گرم کنسانتره مخلوط شد و در اختیار حیوان گذاشته می شد تا از مصرف کل اسانس توسط حیوان اطمینان حاصل گردد. اسانس آزمایش از شرکت باریج اسانس کاشان که ماده موثره آن متوال به میزان ۳۲ درصد بود تهیه گردید.

جدول ۱- نسبت مواد خوراکی (درصد) و غلظت مواد مغذی جیره پایه آزمایشی

مواد خوراکی ^۱	اجزاء	مقدار
یونجه خشک	۵۲	
کاه جو	۱۲/۵	
دانه جو	۲۴/۵	
سبوس گندم	۱۰	
مکمل معدنی و ویتامینی	۰/۵	
نمک	۰/۵	
قرکیب مغذی		
انرژی قابل متابولیسم ^۲	۲/۳۰	
ماده خشک ^۱	۸۹/۷۵	
پروتئین خام ^۱	۱۱/۲۰	
دیواره سلولی ^۱	۴۳/۷۳	
دیواره سلولی بدون همی سلولز ^۱	۲۴/۷۰	
عصاره اتری ^۱	۲/۵۰	
کلسیم ^۱	۰/۶۴	
فسفر ^۱	۰/۳۵	

۱. بر حسب درصد، ۲. مگاکالری در کیلو گرم

طی هفته داده برداری در هر دوره ، مصرف خوراک تعیین و قابلیت هضم با روش جمع آوری مدفوع انجام گرفت.

Hosoda و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند که سطح ۵ درصد گیاه نعناع سبب کاهش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز گاوهای هلشتاین شد. عدم تطابق نتایج آزمایش Hosoda و همکاران (۲۰۰۵) با نتایج آزمایش حاضر و Ando و همکاران (۲۰۰۳) احتمالاً به علت مصرف سطح بالاتر گیاه نعناع فلفلی در آن آزمایش می‌باشد که به علت داشتن غلظت بیشتری از ترکیبات ثانویه گیاهی و ضد میکروبی، سبب مهار تخمیر میکروبی شکمبه شده است.

(Hosoda et al., ۲۰۰۵). همچنین افزودن اسانس نعناع فلفلی به جیره گوساله‌های هلشتاین تاثیری بر ماده خشک مصرفی آنها نداشت (اباکری و همکاران، ۱۳۸۹).

قابلیت هضم ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، پروتئین خام و چربی خام تیمارهای آزمایشی تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی قرار نگرفتند (جدول ۲). مشابه نتایج آزمایش حاضر، Ando و همکاران (۲۰۰۳) در اثر افزودن سطح ۳ درصد گیاه نعناع فلفلی، تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک در تیسه‌ها مشاهده ننمودند. با این وجود،

جدول ۲- میانگین ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم مواد مغذی جیوه‌های آزمایشی

p-value	SEM	غلظت اسانس ^۱			قابلیت هضم ماده خشک مصرفی ^۲
		۲۰۰	۱۰۰	صفر	
۰/۶۰	۰/۰۶	۱/۹۴	۲/۰۷	۱/۹۸	قابلیت هضم
۰/۷۲	۱/۸۳	۵۶/۰۰	۵۳/۹۳	۵۵/۷۳	ماده خشک ^۳
۰/۲۰	۲/۰۱	۴۷/۶۶	۴۵/۶۶	۴۷/۰۰	دیواره سلولی ^۳
۰/۶۴	۱/۱۳	۴۰/۶۶	۳۷/۰۰	۳۸/۳۳	دیواره سلولی بدون همی سلولز ^۳
۰/۲۴	۱/۳۰	۴۹/۳۳	۴۷/۳۲	۴۶/۰۰	پروتئین خام ^۳
۰/۶۰	۲/۰۴	۴۶/۰۰	۴۷/۰۰	۵۰/۶۷	چربی خام ^۳

۱. میلی گرم در روز، ۲. کیلو گرم در روز، ۳. بر حسب درصد

تخمیر شکمبه‌ای

نداشت. Ando و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که گیاه نعناع فلفلی موجب کاهش جمعیت پروتزوآهای شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه شد. با توجه به اینکه پروتزوژن آهار نقش مهمی را در تولید آمونیاک در شکمبه بر عهده دارند (Bach et al., 2005)، کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی به مهار جمعیت پروتزوآبی شکمبه نسبت داده شد. علت تفاوت نتایج حاضر با نتایج آزمایش ذکر شده احتمالاً به علت اختلاف در

غلظت pH مایع شکمبه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (جدول ۳). موافق با نتایج آزمایش حاضر، Hosoda و همکاران (۲۰۰۶؛ ۲۰۰۵) نیز با افزودن گیاه نعناع تاثیر معنی داری در pH شکمبه گاوهای شیری مشاهده نکردند. با این وجود در مطالعه Ando و همکاران (۲۰۰۳)، مصرف گیاه نعناع فلفلی سبب کاهش معنی دار pH شکمبه شد که دلیلی برای آن ذکر نگردید. اسانس نعناع تاثیر معنی داری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه

Hosoda et al., 2005 ; Hosoda et al., 2006 ; Ando et al., 2003 نتایج موافق با نتایج آزمایشات سایرین می‌باشد (.

دز اسانس مصرفی و جیره پایه آزمایش می‌باشد. هم چنین غلظت استات، پروپیونات، بوتیرات و تولید کل اسیدهای چرب فرار در شکمبه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. این

جدول ۳- فرانجه‌های شکمبه گوسفندان تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی

غلظت اسانس ^۱						فرانجه
p-value	SEM	۲۰۰	۱۰۰	صفرا		
۰/۶۰	۰/۲۴	۶/۲۶	۶/۳۱	۶		pH
۰/۸۷	۱/۱۹	۱۴/۸۸	۱۵/۷۷	۱۵/۲۲		نیتروژن آمونیاکی ^۲
۰/۴۰	۰/۹۷	۷۲/۹۳	۷۱/۷۳	۷۴/۱۰		استات ^۳
۰/۳۰	۱/۳۹	۱۵/۱۳	۱۷/۶۶	۱۴		پروپیونات ^۳
۰/۵۵	۰/۵۶	۱۰/۷۵	۹/۸۰	۱۰/۴۶		بوتیرات ^۳
۰/۳۰	۱/۵۰	۱۰۲/۲۸	۹۸/۵۸	۹۹/۴۳		^۳ TVFA

۱. میلی گرم در روز، ۲. میلی گرم در دسی لیتر، ۳. میلی مولار

جدول ۴ - فرانجه‌های پلاسمای گوسفندان تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی

غلظت اسانس ^۱						گلوكز ^۲
p-value	SEM	۲۲۰	۱۱۰	صفرا		
۰/۵۱	۳/۸۴	۶۰	۶۷/۶۶	۶۳/۳۳		
۰/۳۷	۱/۷۱	۱۰۲/۲۸	۹۸/۵۸	۹۹/۴۳		تری گلیسرید ^۲
۰/۸۸	۴/۱۴	۶۳/۳۳	۶۰/۳۳	۶۲/۰۰		کلسترول ^۲
۰/۵۳	۵/۵۸	۴۵/۳۳	۳۵/۰۳	۳۸/۸۳		^۳ HDL
۰/۱۶	۰/۶۱	۱۹/۴۶	۱۹/۸۶	۲۲/۰۶		^۳ LDL
۰/۳۷	۰/۰۲	۰/۱۷	۰/۲۲	۰/۲۰		^۳ NEFA
۰/۲۳	۰/۲۴	۷/۱۹	۷/۵۳	۷/۳۳		پروتئین تام ^۳
۰/۳۲	۰/۱۵	۳/۵۳	۳/۹۰	۳/۸۰		آلبومن ^۳
۰/۷۰	۰/۱۳	۳/۶۶	۳/۶۳	۳/۵۳		گلوبولین ^۳

۱. میلی گرم در روز، ۲. میلی گرم در دسی لیتر، ۳. گرم در دسی لیتر، ۴. میلی مولار

فراسنجه‌های خونی

صرف اسانس نعناع اثری بر غلظت گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، NEFA، LDL، HDL، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین خون نداشت. در مطالعه‌ای گیاه نعناع فلفلی تاثیر معنی‌داری بر غلظت فراسنجه‌های پلاسمای خون نداشت (Hosoda et al., ۲۰۰۶) که موافق با نتایج آزمایش حاضر است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در روز اسانس نعناع فلفلی تاثیری بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه گوسفندان نداشت.

پاورقی

1. National Research Council

منابع

- ابابکری، ر.، ریاسی، ا.، فتحی، م.ح. و نعیمی پور، ح. (۱۳۸۹). مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی کشور، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ۳۰-۲۹ شهریور. لاق، ژ. و استودولا، ژ (۱۳۷۶). گیاهان دارویی. ترجمه سائد زمان. تهران. انتشارات فقنوس. چاپ سوم. ص. ۴۶-۲۳۳-۲۳۲. رجحان، م.ص. (۱۳۷۵). غذا و شفا. ناشر خیام. ص. ۱۶۲-۱۵۸.
- Ando, S., Nishida, T., Ishida, M., Hosoda, K. and Bayaru, E. (2003). Effect of peppermint feeding on the digestibility, ruminal fermentation and protozoa. *Livestock Production Science*. 82:245-248.
- Bach, A., Calsamiglia, S. and Stern, M.D. (2005). Nitrogen Metabolism in rumen. *Journal of Dairy Science*. 88: 9-21.
- Benchaar, C., Wang, Y., Chaves, A.V., McAllister, T.A. and Beauchemin, K.A. (2008). Use of plant extracts in ruminant nutrition. In: Acharya, S.N., Thomas, J.E. (Eds.), Advanced in Medicinal Plant.
- Burt, S. (2004). Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. *International Journal of Food Microbiology*. 94: 223-253.
- Chao, S.C., Young, D.G. and Oberg, C.J. (2000). Screening for inhibitory activity of essential oils on selected bacteria, fungi and viruses. *Journal of Essential Oil Research*. 12: 639-649.
- Greathead, H. (2003). Plants and plant extracts for improving animal productivity. *Journal of Proceedings of the Nutrition Society*. 62: 279-290.
- Helander, I.M., Alakomi, H. L., Latva-Kala, K., Mattila-Sandholm, T., Pol, L., Smid, E.J. and et al. (1998). Characterization of the action of selected essential oil components on Gram negative bacteria. *Journal of Agriculture Food Chemistry*. 46: 3590-3595.
- Hosoda, K., Kuramoto, K., Eruden, B., Nishida T. and Shioya, S. (2006). The Effects of Three Herbs as Feed Supplements on Blood Metabolites, Hormones, Antioxidant Activity, IgG Concentration, and Ruminal Fermentation in Holstein Steers. *Journal of Animal Science*. 19: 35-41.
- Hosoda, K., Nishida, T., Park, W.Y. and Eruden, B. (2005). Influence of *Mentha piperita* L. (Peppermint) Supplementation on Nutrient Digestibility and Energy Metabolism in Lactating Dairy Cows. *Asian and Australian Journal of Animal Science*. 18: 1721-1726.
- Ipharraguerre, I. R., Reynal, S. M., Lineiro, M., Broderick, G. A. and Clark, J. H. (2007). A Comparison of Sampling Sites, Digesta and Microbial Markers, and Microbial References for Assessing the Postruminal Supply of Nutrients in Dairy Cows. *Journal of Dairy Science*. 90:1904-1919.
- NRC, (1985). *Nutrient Requirements of Sheep*. Nat Acad Press, Washington, DC, Sixth reved.
- Ottenstein, D. M. and Bartley, D.A. (1971). Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution. *Annual Chemistry*. 43: 952-955.
- Reynal, S. M., Ipharraguerre, I.R., Liñero, M., Brito, A. F., Broderick, G. A and Clark, J.H. (2007). Omasal flow of soluble proteins, peptides, and free amino acids in dairy cows fed diets supplemented with proteins of varying ruminal degradabilities. *Journal of Dairy Science*. 90:1887-1903.
- SAS Institute. (2002). SAS Users Guide: Statistics. SAS Institute Inc., Cary, NC.
- Simon, J.E. (1990). Essential oils and culinary herbs. In: Janick, J., Simon, J.E. (Eds.), Advances in New Crops. Timber Press, Portland, OR. 472-483.
- Smith, F.E. and Murphy, T.A. (1993). Analysis of Rumen Ammonia and Blood urea Nitrogen. www.liferaydemo.unl.edu.