



## بررسی اثر مزولیت‌های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی

جواد غلامی<sup>۱\*</sup> - محمد حسن فولادی<sup>۲</sup> - محمد سالارمعینی<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۹۰/۵/۲۲

تاریخ پذیرش: ۹۰/۹/۳۰

### چکیده

در این مطالعه اثرات مزولیت‌های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در غالب طرح کاملاً تصادفی با سه نیمار (بدون مزولیت: شاهد؛ با مزولیت ریز: عبوری از الک ۱ میلی‌متری و مانده در الک ۰/۰۲۲۵ میلی‌متری، با مزولیت درشت: عبوری از الک ۳/۳۶ میلی‌متری و مانده در الک ۱/۶۸ میلی‌متری) انجام شد. مزولیت جمع‌آوری شده به میزان ۲ درصد از سن ۷ تا ۴۲ روزگی به جیره اضافه شده و در جیره بدون مزولیت از سنگریزه استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از مزولیت درشت بر عملکرد جوجه‌ها تأثیر منفی داشته و مزولیت ریز بر عملکرد بی‌تأثیر بود. بدین ترتیب که جوجه‌هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنها بی‌که مزولیت مصرف نکرده بودند، به طور معنی داری افزایش وزن کمتری داشتند. همچنین جوجه‌هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنها بی‌که مزولیت مصرف نکرده بودند یا مزولیت ریز مصرف کرده بودند به طور معنی داری ضریب تبدیل غذایی بالاتری داشتند. در نمونه‌های خون جوجه‌های گروه شاهد نسبت به آنها بی‌که مزولیت درشت مصرف کرده بودند تری گلیسیرید بیشتری مشاهده شد. در مورد لیپوپروتئین‌ها با دانسته بالا، جوجه‌هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به آنها بی‌که سنگریزه مصرف کرده بودند به طور معنی داری غلظت لیپوپروتئین‌های با دانسته پایین بالاتری داشتند اما به این لحاظ تفاوت معنی داری بین جوجه‌هایی که مزولیت ریز مصرف کرده بودند با آنها بی‌که سنگریزه یا مزولیت درشت مصرف کرده بودند وجود نداشت. میزان آلکالین فسفاتاز، گلوکز، آلبومین، تیروکسین، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با دانسته پایین و اسید اوریک سرم خون و قابلیت هضم ماده حشك و پروتئین خوراک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

**واژه‌های کلیدی:** مزولیت، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم، جوجه‌های گوشتی

### مقدمه

از قسمت معدی — رودی و اجتناب از اثرات مضر ورود سموم به محصولات دامی در چرخه غذایی، در جیره استفاده می‌شوند (۱۱). امروزه از زئولیت‌ها به عنوان یک افزودنی مفید به جیره جوجه‌های گوشتی نام برده می‌شود و در سطح تجاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در بسیاری از مواقع استفاده از زئولیت بدون تعیین سطح مایکوتوكسین‌ها در خوراک، صورت می‌گیرد که شاید این یک راهکار پیشگیرانه بتویله در مناطقی باشد که شرایط برای رشد قارچ‌های تولید کننده مایکوتوكسین‌ها روی گیاهان و خوراک‌های انبارشده مهیا است. اما دلایل دیگری هم وجود دارند که صرف نظر از وجود مایکوتوكسین‌ها در خوراک می‌توانند استفاده از زئولیت‌ها را برای بهبود عملکرد و افزایش سلامت جوجه‌های گوشتی توجیه‌پذیر کنند. از جمله اینکه زئولیت‌ها نقش مهمی را در دفع فلزات سنگین (۲۳)، و رفع نقایص متابولیکی اسکلت (۲۲)، بازی می‌کنند. همچنین ترکیبات دریافت شده از خوراک و مواد اولیه مضر تشکیل یافته

مزولیت‌ها از انواع زئولیت‌های طبیعی هستند (۳)، و زئولیت‌ها گروهی از آلومنیوسیلیکات‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می‌باشند که ساختمان سه بعدی نامحدودی داشته و دارای خلل و فرج بسیار ریزی (۳-۱۰ آنگستروم) هستند. زئولیت‌ها در ساختمان خود دارای کاتیون‌های قابل تبدیل بوده و از ویژگی‌های آنها قابلیت برگشت پذیر جذب و دفع آب، بدون ایجاد تغییر در ساختمان آنها می‌باشد (۱۰). در سال ۱۹۹۰ که نقش زئولیت در کنترل مسمومیت با آفلاتوکسین کشف شد، امید به زئولیت‌ها برای استفاده در صنعت دامپروری افزایش یافت (۲۱). زئولیت‌ها به مخلوط کاهش جذب مایکوتوكسین‌ها

۱- به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
۲- نویسنده مسئول: (Email:javad\_gholami83@yahoo.com)

در الک ۲۲۵ میلی‌متری) و درشت (عبوری از الک ۳/۳۶ میلی‌متری و مانده در الک ۱/۶۸ میلی‌متری) الک شدند و به میزان ۲ درصد از سن ۷ تا ۴۲ روزگی به جیره اضافه شد و در جیره بدون مزویت از سنگریزه استفاده شد که نیمی از آن هم اندازه مزویت ریز و نیمی هم اندازه مزویت درشت بود. سعی شد تا اندازه مزویت درشت با اندازه زئولیت تجاری موجود در بازار برابر باشد.

میزان مصرف خوارک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی هر هفته و نیز در دوره‌های مختلف پرورش اندازه گیری شد. برای تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با استفاده از مارکر خارجی، اکسید کروم به میزان ۰/۳ درصد با جیره مخلوط گردید و طی ۳ روز پایانی آزمایش در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت و در روز کشتار، مدفعه درون ایلئوم از فاصله کیسه زرده (زاده مکل) تا انتهای ایلئوم (۲ سانتی‌متر مانده به تقاطع ایلئو - سکال) جمع‌آوری گردید. در پایان سن ۴۲ روزگی یک قطعه جوجه از هر تکرار پس از خونگیری ذبح شد و فاکتورهای خونی و وزن قطعات لاشه ثبت گردید. سرم نمونه‌های جمع‌آوری شده در ۴۲ روزگی، برای بررسی فراستجه‌های خونی به آزمایشگاه ارسال شدند. مقادیر تری‌گلیسیرید و کلسترول با استفاده از دستگاه RA-۱۰۰۰ و با کیت تجاری پارس آزمون، مقدار هورمون تیروکسین با استفاده از دستگاه گاماکانتر و کیت ایمونو، مقدار HDL<sup>۳</sup> با استفاده از کیت تجاری هیومون و مقادیر آلبومین، اسید اوریک و آکالالین فسفاتاز با استفاده از کیت تجاری پارس آزمون اندازه گیری شدند. داده‌های بدست آمده در غالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و هر تیمار با ۴ تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که مدل آماری و تیمارهای آزمایشی به شکل زیر بودند:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

در این مدل  $\mu$  مقدار هر مشاهده،  $\alpha_i$  میانگین جمعیت،  $\epsilon_{ij}$  اثر مزویت و  $\epsilon_{ij}$  اثر خطای آزمایشی می‌باشد.

تیمار ۱: بدون مزویت (شاهد)، تیمار ۲: با مزویت دانه ریز، تیمار ۳: با مزویت دانه درشت.

کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SAS (۲۰) انجام شد و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد.

## نتایج و بحث

### صرف خوارک

میزان خوارک مصرفی روزانه در دوره سنی ۷ تا ۲۱ روزگی برای جوجه‌هایی که مزویت ریز مصرف کردند نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر بود ( $P < 0/05$ ).

بوسیله میکرواورگانیسم‌های روده‌ایی مانند آمونیاک و سموم با منشاء داخلی<sup>۱</sup> که اگر جذب شان کم و دفع شوند، از ورودشان به گردش خون جلوگیری می‌گردد و بنابراین سبب کاهش مواد سمی در کبد می‌شود که صرفه‌جویی در انرژی لازم برای سمزدایی، جهت افزایش عملکرد استفاده می‌شود (۱۷). همچنین پیشنهاد شده است که زئولیت‌ها سبب عبور کنترل مواد هضمی از دستگاه گوارش می‌شوند که منجر به بهبود استفاده از مواد مغذی بویژه در مورد نیتروژن می‌شوند و این امر سبب کاهش دفع آن از طریق مدفعه می‌گردد (۱۲). قابلیت بهبود مصرف مواد مغذی ممکن است به کاهش میکرواورگانیسم‌های دستگاه گوارش نیز مربوط باشد (۱۸). الیور (۱۶) گزارش کرد که اندازه و مقدار کلونی ابتدا و انتهای روده به طور معنی‌داری جیره‌های حاوی زئولیت کمتر است. زئولیت‌ها ممکن است عبور خون از پرزها را تسهیل نموده و فعالیت سلول‌های جداره پرزها را افزایش دهند که به نوبه خود می‌تواند هضم و جذب مواد مغذی را افزایش دهد (۱۳ و ۱۸). هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات مزویت‌های منطقه معوئیه رفسنجان بر عملکرد، فراستجه‌های خونی و قابلیت هضم جوجه‌های گوشتشی می‌باشد. بعلاوه از آنجا که در تحقیقات گذشته اندازه ذرات زئولیت‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است تعیین اندازه مناسب برای زئولیت‌های مورد استفاده در تعذیه جوجه‌های گوشتشی یکی دیگر از اهداف این تحقیق می‌باشد.

## مواد و روش‌ها

این آزمایش در سالن مرغداری تحقیقاتی دانشکده کشاورزی داشتگاه شهری باهنر کرمان انجام شد. طول دوره پرورشی ۴۲ روز بود و آزمایش از روز هفتم و بر روی بستر انجام شد. در این روز تعداد ۱۰ قطعه جوجه خروس گوشتشی از سویه راس ۳۰۸ در هر قفس قرار گرفت، البته به طوری که میانگین وزن جوجه‌ها در قفس‌های مختلف با هم مشابه بود. جیره براساس حداقل احتیاجات مواد مغذی توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات تعذیه امریکا (۱۹۹۴) تنظیم شد. ترکیب و آنالیز خوارک مورد استفاده در این آزمایش در جدول ۱ نشان داده شده است. مزویت مورد مطالعه در این تحقیق از منطقه معوئیه رفسنجان در کیلومتر ۴۵ جاده رفسنجان-سرچشم جمع‌آوری شد. مکان‌یابی محل جمع‌آوری مزویت با استفاده از اطلاعات موجود در گزارشات سازمان زمین‌شناسی (۳)، انجام شد. پس از جمع‌آوری مزویت‌ها، ناخالصی‌های قبل مشاهده با چشم غیرمسلح جداسازی شد و مزویت‌ها در کوره به مدت ۳۰ دقیقه در دمای حدود ۷۰۰ سانتی‌گراد حرارت داده شدند و پس از آسیاب شدن با استفاده از الک‌های استاندارد در دو اندازه ریز (عبوری از الک ۱ میلی‌متری و مانده

1- Enterotoxins

2- Ross-308

۳- لیپوپروتئین‌ها با دانسیته بالا

جدول ۱- ترکیب جیره‌های مورد استفاده در سنین صفر تا ۲۱ و ۴۲ تا ۴۲ روزگی جوجه‌های گوشتی (بر حسب درصد).

مواد خوارکی	جیره آغازین (۰ تا ۲۱ روزگی)	جیره رشد (۲۱ تا ۴۲ روزگی)	ذرت
۶۲/۸	۵۷/۴۳		
۲۶/۵۳	۳۱/۸		کنجاله سویا
۳	۳		پودر ماهی
۲/۴	۲		روغن گیاهی
۱/۲۴	۱/۱۵		پودر صدف
۰/۷	۱/۱		دی کلسیم فسفات
۰/۲۷	۰/۳۷		نمک
۰/۰۶	۰/۱۵		دی ال متیوین
۲	۲		مزولیت و یا سنگریزه
۱	۱		مکمل ویتامین <sup>۱</sup> + معدنی <sup>۲</sup>
<b>آنالیز محاسباتی</b>			
۳۰۰۱	۲۸۹۴	انرژی قابل سوخت و ساز (کیلوکالری در کیلو گرم)	
۱۸/۸۷	۲۰/۸۲	پروتئین خام (%)	
۱/۰۱	۱/۱۴	لیزین (%)	
۰/۳۹	۰/۵	متیوین (%)	
۰/۶۹	۰/۸۳	متیوین + سیستین (%)	
۰/۸۵	۰/۹۱	کلسیم (%)	
۰/۳۳	۰/۴۱	فسفر قابل استفاده (%)	
۰/۱۴	۰/۱۸	سدیم (%)	
۲/۶۹	۲/۳۹	اسید لیتوئیک (%)	
۳/۲۶	۳/۵۱	فیبر خام (%)	

۱- هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی ۳۶۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A، ۸۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D، ۷۲۰۰ واحد بین المللی ویتامین E، ۲۶۴۰ میلی گرم ویتامین B<sub>۲</sub>، ۱۱۷۶ میلی گرم ویتامین B<sub>۶</sub>، ۴۰۰ میلی گرم ویتامین B<sub>۹</sub>، ۸۰۰ میلی گرم ویتامین K<sub>۱</sub>، ۲۹۲۰ میلی گرم اسید پاتوتونیک، ۱۲۰۰۰ میلی گرم نیاسین، ۴۰۰ میلی گرم بیوتین، ۲۰۰۰۰ میلی گرم کولین کلارايد بود.

۲- هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی ۴۰۰۰۰ میلی گرم منگنز، ۲۰۰۰۰ میلی گرم آهن، ۴۰۰۰ میلی گرم روی، ۴۰۰ میلی گرم ید و ۸۰ میلی گرم سلنیوم بود.

### افزایش وزن روزانه بدن

در دوره‌های ۷ تا ۲۱ روزگی (P<0/01)، ۲۱ تا ۴۲ روزگی و ۷ تا ۴۲ روزگی (P<0/05) عامل مزولیت سبب اختلافات معنی‌داری بین جوجه‌ها به لحاظ افزایش وزن روزانه شد. بدین ترتیب که افزایش وزن روزانه جوجه‌هایی که جیره آنها فاقد مزولیت بود و آنها بی‌مزولیت ریز مصرف کرده بودند یکسان بود اما افزایش وزن روزانه آنها بی‌مزولیت که مزولیت درشت مصرف کرده بودند به طور معنی‌داری کمتر از افزایش وزن دو گروه دیگر بود (جدول ۲). برخی از پژوهش‌های پیشین تصدیق می‌کنند که استفاده از زئولیت در جیره طیور اثر مفیدی روی افزایش وزن دارد، هر چند که نتایج بسیار متناقض هستند. اوئنس (۹)، ۳۹ مقاله را مرور کرد و نتیجه‌گیری کرد که به جز در تعداد کمی از آزمایشات که پیشرفت بسیار انگشتی در رشد جوجه‌های گوشتی در اثر گنجاندن زئولیت در جیره‌شان نشان دادند اکثر آزمایشات اثر مفیدی را نشان ندادند. لطف‌الهیان و همکاران (۶)، گزارش کردند که افزودن زئولیت به جیره جوجه‌های گوشتی می‌تواند

اما میزان خوارک مصرفی روزانه بین پرنده‌گانی که به جیره آنها مزولیت درشت اضافه شده بود با پرنده‌گان تنگیه شده با سایر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در دوره پرورش رشد تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایش به این لحاظ مشاهده نشد (جدول ۲). لطف‌الهیان و همکاران (۶)، نیز با افزودن سطوح صفر، ۲، ۴ و ۶ درصد از دو نوع زئولیت هیولاندیت و کلینوپیتولیت به جیره جوجه‌های گوشتی مشاهده کردند که با افزایش سطح زئولیت، مقدار مصرف خوارک افزایش یافت. یکی از دلایل این امر می‌تواند افزایش قابلیت هضم جیره باشد چون بین قابلیت هضم جیره و خوارک مصرفی همیستگی مثبت وجود دارد (۴). از طرفی ثابت شده است که افزایش تعادل آنیون-کاتیون جیره موجب افزایش خوارک مصرفی می‌شود (۱). مشخص شده است که آلودگی جیره با مایکوتوكسین‌ها می‌تواند سبب کاهش مصرف خوارک شده که افزودن زئولیت به این جیره‌ها می‌تواند این اثر منفی را تعدیل کند (۱۵).

در نتیجه مواد مغذی آن با کارابی بهتری مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به عملکرد بهتر شده است. زیرا باراش و همکاران (۷) گزارش کرده‌اند که فعالیت آنزیمی بالاتر ممکن است بدلیل حضور خوارک در قسمت معدی - رویی برای مدت طولانی‌تر یا به وسیله نرخ کندتر عبور خوارک از دستگاه گوارش تحریک شود. البته نتایج قابلیت هضم صحت این نظریه را تأیید نمی‌کند. همچنین می‌توان این نظریه را هم مطرح کرد که بدلیل تمایل جوجه‌ها برای مصرف قسمت‌های درشت‌تر خوارک، درصد مزولیت دریافتی از خوارک‌های حاوی مزولیت درشت در مقایسه با خوارک‌های حاوی مزولیت ریز، بیشتر بوده است و با توجه به پرشدن دستگاه گوارش این جوجه‌ها با مواد مغذی کمتر نسبت به آنها بیکاری که مزولیت ریز مصرف کرده‌اند، مواد مغذی دریافتی آنها به نسبت کمتر و هدر روی مواد مغذی در قسمت‌های پرت خوارک آنها بیشتر بوده است و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد آنها شده است.

بیشتر آزمایشات انجام شده جهت بررسی کارابی زئولیت‌ها برای بهبود شاخص‌های عملکردی در جوجه‌های گوشتی، در شرایطی انجام شده است که جیره آزمایشی با مایکوتوكسین‌ها، بویژه آفلاتوکسین‌ها به طور مصنوعی آلوده شده است و در واقع قابلیت زئولیت‌ها به عنوان مواد جاذب برای کاهش اثرات سوء مایکوتوكسین‌ها که ترکیبات معمول در خوارک هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته است (۱۶ و ۱۹)، که در سیاری از این مطالعات نتایج استفاده از زئولیت‌ها مثبت گزارش شده است. نتایج آزمایش کیابی و همکاران (۵)، نیز که زئولیت طبیعی را بدون آلوده کردن جیره به مایکوتوكسین‌ها در تغذیه جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار دادند، با نتایج آزمایش حاضر موافق است. این در حالی است که استراکووا و همکاران (۲۲)، اثر استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت در سطوح ۰/۵، ۱/۵ و ۲/۵ درصد را بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی مثبت ارزیابی کردند.

سبب افزایش اضافه وزن روزانه بدن شود در حالی که کیابی و همکاران (۵)، عکس این اثر را با افروdon زئولیت به جیره جوجه‌های گوشتی گزارش کردند.

### ضریب تبدیل غذایی

همانطور که در جدول ۲ ملاحظه می‌شود عامل مزولیت سبب اختلافات معنی‌داری به لحاظ ضریب تبدیل غذایی شد. در دوره ۷ تا ۲۱ روزگی ضریب تبدیل غذایی جوجه‌هایی که مزولیت مصرف نکرده بودند بهتر از آنها بود که به جیره آنها مزولیت اضافه شده بود ( $P<0.05$ ) اما بین جوجه‌هایی که مزولیت ریز و درشت مصرف کرده بودند اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در دوره‌های ۲۱ تا ۴۲ روزگی و ۷ تا ۴۲ روزگی بین جوجه‌هایی که به جیره آنها مزولیت ریز اضافه شده بود با جوجه‌هایی که به جیره آنها سنتگریزه یا مزولیت درشت اضافه شده بود به لحاظ ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت اما ضریب تبدیل غذایی جوجه‌هایی که به جیره آنها سنتگریزه اضافه شده بود بطور معنی‌داری بهتر از ضریب تبدیل جوجه‌هایی بود که مزولیت درشت مصرف کرده بودند ( $P<0.05$ ). با مشاهده نتایج آزمایش حاضر، این مسئله استباط می‌شود که استفاده از مزولیت درشت بر عملکرد جوجه‌ها تأثیر منفی داشته و مزولیت ریز بر عملکرد بی‌تأثیر بوده است. دلایلی که برای توضیح این اثرات می‌توان بر Sherman عبارتند از اینکه اندازه کوچک‌تر ذرات مزولیت سبب افزایش سطح مؤثر آنها می‌شود که می‌تواند کارابی مزولیت به عنوان ماده جاذب مایکوتوكسین‌ها، سومون داخلی و فلزات سمی را افزایش دهد. همچنین می‌توان عنوان کرد، جوجه‌هایی که از مزولیت درشت استفاده کرده بودند انرژی بیشتری را برای خرد کردن مزولیت و رساندن ذرات آن به اندازه‌ای که از سنگدان قابل عبور باشد صرف کرده‌اند که در نتیجه بر عملکردشان تأثیرگذار بوده است. یا اینکه ذرات خوارکی که حاوی مزولیت ریز بوده‌اند در دستگاه گوارش بهتر بهم چسبیده و ماندگاری مواد هضمی آن در روده بیشتر بوده و

جدول ۲- مقایسه میانگین‌های مصرف خوارک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی در دوره‌های مختلف پرورشی

	صرف خوارک (گرم/پرنده/روز)						گروه‌های آزمایشی
	افزایش وزن بدن (گرم/پرنده/روز)			ضریب تبدیل (گرم/گرم)			
۷-۴۲	۲۱-۴۲	۷-۲۱	۷-۴۲	۲۱-۴۲	۷-۲۱	۷-۴۲	۲۱-۴۲
روزگی	روزگی	روزگی	روزگی	روزگی	روزگی	روزگی	روزگی
۱/۸ <sup>b</sup>	۱/۹۵ <sup>b</sup>	۱/۵۶ <sup>b</sup>	۶۷/۷۴ <sup>a</sup>	۸۷/۷۷ <sup>a</sup>	۳۷/۸۹ <sup>a</sup>	۱۲۵/۸۴	۱۷۰/۶۸
۱/۹۶ <sup>ab</sup>	۲/۱۰ <sup>ab</sup>	۱/۶۶ <sup>a</sup>	۶۶/۷۰ <sup>a</sup>	۸۵/۵۶ <sup>a</sup>	۳۸/۴۰ <sup>a</sup>	۱۳۰/۷۴	۱۷۵/۵۰
۲/۱۲ <sup>a</sup>	۲/۲۵ <sup>a</sup>	۱/۷۳ <sup>a</sup>	۵۹/۲۹ <sup>b</sup>	۷۵/۶۴ <sup>b</sup>	۳۴/۷۷ <sup>b</sup>	۱۲۵/۶۴	۱۶۹/۳۷
۰/۰۴۲	۰/۰۵۱	۰/۰۲۶	۱/۴۳۴	۲/۰۶۴	۰/۵۸۳	۱/۸۷۸	۲/۶۸۰
*	*	*	*	*	**	ns	ns
						*	*
						سطح معنی‌داری	

ns اختلاف معنی‌دار نیست، \* اختلاف در سطح ۵ درصد معنی‌دار است ( $P<0.05$ ), \*\* اختلاف در سطح ۱ درصد معنی‌دار است ( $P<0.01$ ), SEM انحراف استاندارد میانگین، میانگین‌های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

بودند بدليل کاهش بهرهوری از مواد مغذی جیره بوده است و نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن صحت این نظریه را تایید می‌کنند. زیرا عنوان می‌شود که در زمان کاهش دسترسی به مواد مغذی فعالیت لیپاز لیپوپروتئینی در ماهیچه‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین تری‌گلیسیریدهای خون و تری‌گلیسیریدهای براحت شده از LDL<sup>۱</sup> و VLDL<sup>۲</sup> به عنوان منبع انرژی استفاده شده و در نتیجه غلظت تری‌گلیسیریدها، LDL و VLDL کاهش یافته و غلظت HDL افزایش می‌یابد (۲). نتایج بسیاری از آزمایشاتی که در آنها جیره آزمایشی با مایکوتوكسین‌ها، بویژه آفلاتوکسین‌ها آلوود شده بودند نشان داده است که این سوموم موجب کاهش میزان آلبومین، کلسترول و اسید اوریک و افزایش میزان آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه‌های گوشتی می‌گردد و در بسیاری از موارد استفاده از زئولیت این اثرات را تعديل می‌نماید (۱۵). نتایج آزمایش حاضر اختلاف معنی‌داری را به لحاظ این پارامترها در مورد استفاده از مزولیت نشان ندادند (جدول ۳).

**قابلیت هضم و وزن نسبی دستگاه گوارش**  
بین هیچ یک از تیمارهای آزمایشی به لحاظ قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین (جدول ۴) و وزن نسبی پانکراس، سنگدان، دوازده، ایلئوم فوقانی، ایلئوم تحتانی و سکومها (جدول ۵) تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اما همان طور که در جدول ۶ مشاهده می‌شود عامل مزولیت سبب اختلاف معنی‌داری در اندازه سکوم جوجه‌های آزمایشی شد ( $P < 0.05$ ).

دیگر (۸)، نیز گزارش کرد که استفاده از زئولیت‌ها در جیره جوجه‌های گوشتی شاخص‌های عملکرد را بهبود می‌دهد. در مورد تنافق‌های موجود در نتایج مربوط به اثر زئولیت بر عملکرد جوجه‌های گوشتی دلایل زیادی را می‌توان برشمرد. نوع زئولیت مورد استفاده، محل استخراج زئولیت، فرآوری زئولیت، مقدار و اندازه ذرات زئولیت مورد استفاده و شرایط انجام آزمایش از مواردی هستند که می‌توانند بر نتایج آزمایش اثرگذار باشند (۲۱).

### فراسنجه‌های خونی

سلامتی و عملکرد تولیدی حیوان همواره تحت تأثیر مواد مغذی و متابولیت‌های موجود در خون می‌باشد. انتظار می‌رود با شناخت رابطه بین عوامل بیوشیمیایی خون و صفات تولیدی بتوان تولید را افزایش داد (۶). همانطور که در جدول ۳ ملاحظه می‌شود عامل مزولیت سبب بروز اختلاف در غلظت تری‌گلیسیرید ( $P < 0.001$ ) و HDL ( $P < 0.05$ ) سرم جوجه‌ها شد. بدین ترتیب که سرم جوجه‌هایی که مزولیت مصرف نکرده بودند نسبت به پرنده‌گانی که مزولیت ریز یا درشت مصرف کرده بودند حاوی تری‌گلیسیرید بیشتری بود. پرنده‌گانی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند نسبت به پرنده‌گانی که سنگریزه مصرف کرده بودند به طور معنی‌داری غلظت HDL بالاتری داشتند اما به این لحاظ اختلاف معنی‌داری بین جوجه‌هایی که مزولیت ریز مصرف کرده بودند با پرنده‌گانی که سنگریزه یا مزولیت درشت مصرف کرده بودند، وجود نداشت. به نظر می‌رسد کاهش غلظت تری‌گلیسیرید و افزایش غلظت HDL سرم جوجه‌هایی که مزولیت ریز مصرف کرده بودند نسبت به جوجه‌هایی که مزولیت مصرف نکرده

جدول ۳- مقایسه میانگین فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

گروه‌های آزمایشی	واحد بین المللی در لیتر	آلبومین در لیتر	آلکالین فسفاتاز نانونگرم در دسم لیتر	تیروکسین دسم لیتر	کلسترول میلی گرم در دسم لیتر	تری‌ گلیسیرید میلی گرم در دسم لیتر	LDL اسید اوریک					
								بدون مزولیت	مزولیت ریز	مزولیت درشت	SEM	سطح معنی‌داری
ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

ns اختلاف معنی‌دار نیست.

\* اختلاف در سطح ۵ درصد معنی‌دار است ( $P < 0.05$ ), \*\*\* اختلاف در سطح ۰/۰۱ درصد معنی‌دار است ( $P < 0.001$ ), SEM انحراف استاندارد میانگین، میانگین‌های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

۱- لیپوپروتئین‌ها با دانسیته پائین

۲- لیپوپروتئین‌ها با دانسیته بسیار پائین

دوازدهه و ایلئوم فوقانی و تحتانی سبب بروز اختلافات معنی‌داری نشد. به طور کلی در این آزمایش گروه‌های تیماری در برخی موارد قادر به اعمال اثراتی در خصوصیات دستگاه گوارش بوده‌اند اما به نظر می‌رسد این اثرات به حدی نبوده‌اند که بتوانند سبب بروز اختلاف معنی‌داری در قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین مصرفی شوند.

بدین ترتیب که اندازه سکوم جوجه‌هایی که مزولیت ریز مصرف کرده بودند به طور معنی‌داری بزرگ‌تر از اندازه سکوم آنهاست بود که مزولیت مصرف نکرده بودند اما اختلاف اندازه سکوم جوجه‌هایی که مزولیت درشت مصرف کرده بودند با اندازه سکوم جوجه‌هایی که مزولیت ریز مصرف نکرده بودند، به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. اما عامل مزولیت در مورد اندازه

جدول ۴- مقایسه میانگین درصد قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

قابلیت هضم (درصد)		گروه‌های آزمایشی	ماده خشک	پروتئین
۷۲/۲۸	۹۱/۳۰			
۷۴/۶۳	۹۱/۸۵	بدون مزولیت		
۶۹/۴۵	۹۰/۹۰	با مزولیت ریز		
۲/۵۰	۰/۹۰	با مزولیت درشت		
ns	ns	SEM		
		سطح معنی‌داری		

ns اختلاف معنی‌دار نیست.

SEM انحراف استاندارد میانگین.

جدول ۵- مقایسه میانگین وزن نسبی اجزاء دستگاه گوارش به وزن زنده جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

اندام‌های مختلف دستگاه گوارش						
درصد		سکوم‌ها	پانکراس	سنگدان	دوازدهه	ایلئوم فوقانی
گروه‌های آزمایشی	ایلئوم تحتانی	دوازدهه	سنگدان	پانکراس	ایلئوم فوقانی	اندام‌های مختلف دستگاه گوارش
بدون مزولیت	۰/۲۹۰	۰/۹۶۰	۱/۲۱۵	۰/۵۳۳	۱/۴۵۳	۰/۲۴۵
با مزولیت ریز	۰/۳۰۸	۰/۸۱۰	۱/۱۳۰	۰/۴۸۰	۱/۳۷۵	۰/۲۱۳
با مزولیت درشت	۰/۳۱۸	۰/۹۱۰	۱/۱۲۰	۰/۵۳۵	۱/۴۸۳	۰/۲۲۸
SEM	۰/۰۱۴	۰/۰۳۳	۰/۰۲۹	۰/۰۱۷	۰/۰۷۱	۰/۰۱۰
سطح معنی‌داری	ns	ns	ns	ns	ns	ns

ns اختلاف معنی‌دار نیست.

SEM انحراف استاندارد میانگین.

جدول ۶- مقایسه میانگین طول قسمت‌های مختلف روده جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی

سانتی‌متر					
گروه‌های آزمایشی					سکوم
دوازدهه	ایلئوم تحتانی	ایلئوم فوقانی	دوازدهه	ایلئوم فوقانی	سکوم
b۱۶/۲۵	۳۱/۷۵	۶۸/۷۵	۷۷/۲۵	بدون مزولیت	
a۱۹/۶۳	۳۱/۲۵	۷۵/۵۰	۷۷/۵۰	با مزولیت ریز	
ab۱۸/۱۳	۳۰/۷۵	۷۲/۲۵	۶۸/۰۰	با مزولیت درشت	
۰/۵۸	۰/۷۶	۱/۶۵	۲/۲۰	SEM	
*	ns	ns	ns	سطح معنی‌داری	

ns اختلاف معنی‌دار نیست.

\* اختلاف در سطح ۵ درصد معنی‌دار است ( $P < 0.05$ ).

SEM انحراف استاندارد میانگین،

میانگین‌های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

زئولیت درشت استفاده شده در این آزمایش با اندازه زئولیتی که معمولاً در سطح تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد یکسان بود، می-توان توصیه کرد که بهتر است زئولیت موجود در بازار در اندازه ریزتر تهیه شود.

### نتیجه‌گیری و پیشنهادها

با مشاهده نتایج آزمایش حاضر، این مسئله استباط می‌شود که استفاده از مزولیت درشت بر عملکرد جوجه‌ها تأثیر منفی داشته و مزولیت ریز بر عملکرد بی‌تأثیر بوده است. از آنجایی که اندازه ذرات

### منابع

- باباپور، ع. ۱۳۷۸. مطالعه اثر کاربرد زئولیت روی توان تولیدی بردهای نر پرواری ورامینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
- رحیمی، ش. ۱۳۸۲. تعذیه مقایسه ای پرندگان (ترجمه). دانشگاه تربیت مدرس تهران. صفحه ۲۶۵-۲۶۴.
- عطاپور، ح. ۱۳۷۴. زئولیت‌ها (کانی‌شناسی، زمین‌شناسی و کاربرد) و بررسی پترولوزیکی زئولیت‌های منطقه بردسیر و رفسنجان استان کرمان. مدیریت زمین‌شناسی منطقه خاوری (کرمان)، صفحه ۱۲۲.
- فرهمند، پ. ۱۳۸۱. غذای دام و طیور. انتشارات دانشگاه آذربایجان غربی.
- کیایی، س. م. م. مدیرصانعی، م. فرخوی، و. ا. تقیری. ۱۳۸۱. تأثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه‌های گوشتی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۵۷، شماره ۵۷، صفحه ۳۴-۱۸.
- لطف الهیان، ه. ف. شریعتمداری، و. م. شیوازاد. ۱۳۸۳. بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیره‌های غذایی بر عوامل بیوشیمیایی خون، وزن نسبی اندام‌های داخل بدن و عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۶۴، صفحه ۳۴-۱۸.
- Barash, I., N. Zafira, and I. Nir. 1992. Metabolic and behavioral adaptation of light-bodied chicks to meal feeding. Br. Poult. Sci. 33:271-278.
- Debic, M. 1994. Influence of clinoptilolites on chicken growth. Poult. Abstract. Vol. 21. No. 9. 309.
- Evans, M. 1989. Zeolites - Do they have a role in poultry production? Farrell, D.J. (Ed). In: Recent Advances in Animal Nutrition in Australia. pp. 245-268.
- Kazemian, H. M., Ghannadi, H. Faghidian. 2001. Effect of different parameters on the uptake of Ag<sup>+</sup>, Ni<sup>++</sup>, Cd<sup>++</sup>, Pb<sup>++</sup>, and Zn<sup>++</sup> in natural zeolites obtained from Semnan, Meyaneh and Firozkoh regions in Iran. Zeolite 97 conference.
- Kubena, L. F., and R. B. Harvey. 1991. Effect of hydrated sodium calcium aluminosilicate on growing turkey poulets during aflatoxicosis. Poult. Sci. 70:1823-183.
- Melenova, L., K. Ciahotny, H. Jirglova, H. Kusa, and P. Ruzek. 2003. Removal of ammonia from waste gases by adsorption on zeolites and their utilization in agriculture (In Czech). Chem. Listy. 97: 562-568.
- Nestorov, N. 1984. Possible application of natural zeolite in animal husbandry. In: Zeo Agriculture: Use of Natural Zeolite in Agriculture and aquaculture, eds. Pond, W.G. and Mumpton, F.A., p.197. Westview Press, Boulder, Colorado, U.S.A.
- National Research Council. 1994. Nutrient Requirements for Poultry. 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC. USA.
- Oguz, H., F. Kurtoglu, V. Kurtoglu, and Y. O. Birdane. 2002. Evaluation of biochemical characters of broiler chickens and clinoptilolite exposure. Research in Veterinary Science (Abstract). In CAB Abstract 1998.
- Oliver, M. D. 1989. Effect of feeding clinoptilolite (zeolite) to three strain of laying hens. Br. Poult. Sci. 30:115-121.
- Papaioannou, D. S., P. D. Katsoulos, N. Panousis, and H. Karatzias. 2005. The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal diseases: A review. Microporous Mesoporous Mat 84: 161-170.
- Petukine, N. 1991. Influence of zeolites on animal digestion. In: Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Eds. Fuentes, G.R. and Gonzalez, J.A., p.280. Havana, Cuba.
- Rizzi, L., M. Simioli, P. Roncada, and A. Zaghini. 2003. Aflatoxin B1 and clinoptilolite in feed for laying hens: Effects on egg quality, mycotoxin residues in livers, and hepatic mixed-function oxygenase activities. J. Food Prot. 66: 860-865.

- 20- SAS Institute. 1999. SAS User's Guide: Statistics. Ver. 8. SAS Institute, Inc., Cary, NC.
- 21- Shariatmadari, F. 2008. The application of zeolitein poultry production. World's poult. sci., vol. 64, 76-84.
- 22- Strakova, E., R. Pospisil, P. Suchy, L. Steinhauser, and I. Herzig. 2008. Administration of clinoptilolite to broiler chickens during growth and its effect on the growth rate and bone metabolism indicators. ACTA Vet. BRNO. 77:199-207.
- 23- Tepe, Y., I. Akyurt, C. Ciminli, E. Mutlu, and M. Caliskan. 2004. Protective effect of clinoptilolite on lead toxicity in common carp Cyprinus carpio. Fresenius Environ. Bull. 13: 639-642.

Archive of SID