

اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و گوارش‌پذیری مواد مغذی در بردهای نر نژاد مهربان

رضا علیمحمدی^۱ - حسن علی‌عربی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۲۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۲۸

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت‌های خون و گوارش‌پذیری مواد مغذی در بردهای نر نژاد مهربان دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ۱۸ رأس برده با سن ۴-۵ ماه و میانگین وزن بدن $35/9 \pm 2/7$ گروه تصادفی به ۳ گروه تقسیم شدند و تیمارها شامل: تیمار اول (جیره شاهد بدون افزودن مکمل سلنیوم، که حاوی ۰/۰۶ پی‌پی‌ام سلنیوم بود)، تیمار دوم (جیره شاهد + ۰/۲ پی‌پی‌ام سلنیوم بصورت سلنتیت‌سدیم) و تیمار سوم (جیره شاهد + ۰/۴ پی‌پی‌ام سلنیوم بصورت سلنتیت‌سدیم) بود. این آزمایش ۷۰ روز به طول انجامید. در روزهای صفر، ۳۵ و ۷۰ آزمایش خون‌گیری انجام شد. در آزمایش دوم ۴ رأس برده از هر گدام از گروه‌های آزمایش اول بطور تصادفی به قفسه‌های متابولیکی انتقال یافتد تا اثر مکمل سلنیوم بر گوارش‌پذیری ظاهری مواد مغذی اندازه‌گیری شود. آزمایش قابلیت خضم شامل ۱۲ روز عادت‌پذیری و ۶ روز جمع‌آوری نمونه‌ها بود. این تحقیق بصورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. افزودن سلنیوم به جیره تأثیر معنی‌داری بر عملکرد بردها نداشت. در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری از لحاظ غلظت عناصر معدنی پلاسمما، متابولیت‌های چربی سرم و همچنین گوارش‌پذیری مواد مغذی جیره وجود نداشت. در تیمارهای دریافت کننده سلنیوم، کاهش معنی‌داری در غلظت هورمون تراپیودوتیرونین (T₄) و افزایش معنی‌داری نیز در غلظت هورمون تری‌یدوتیرونین (T₃) سرم و فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX) خون کامل مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با سطح ۰/۲ پی‌پی‌ام سلنیوم نیاز بردهای در حال رشد مهربان، تأمین می‌شود.

واژه‌های کلیدی: برده، سلنیوم، عملکرد، گوارش‌پذیری

مقدمه

در سال ۱۹۷۳ و با کشف گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX) مشخص شد (۱). گلوتاتیون‌پراکسیداز در تنظیم فرایندهای اکسیداسیو و محافظت از غشاء سلولی ایفای نقش می‌کند (۱). نقش سلنیوم در فعالیت تیروئیدپراکسیداز به عنوان سلنوآنزیمی که در یددار کردن گلوبولین و جلوگیری از تخریب غشاء اپیتلیال تیروقید عمل می‌کند نیز شناسایی و گزارش شده است (۱). از جمله سلنوآنزیمهای دیگر می‌توان به آنزیمهای جداكتنده ید اشاره نمود که برای تبدیل هورمون تراپیودوتیرونین (T₄) به شکل متابولیکی فعال تر آن یعنی هورمون تراپیودوتیرونین (T₃) ضروری است (۱). توصیه‌ی NRC (۱۹۸۵) برای بردهای در حال رشد، مقدار ۰/۱ تا ۰/۲ میلی‌گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک جیره بوده در حالی که NRC (۲۰۰۷) این مقدار را به ۰/۰۲ تا ۰/۰۴۴ میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک افزایش داده است. امروزه سلنیت‌سدیم معمول ترین شکل سلنیوم خوارکی بوده که به جیره دام افزوده می‌شود. تحقیقات متعددی به منظور بررسی نقش

تولید بینه و تداوم سلامتی در دام و طیور، مستلزم تأمین مواد مغذی ضروری به میزان مشخص و به شکل قابل دسترس در بدن می‌باشد. بیشتر خوارک‌هایی که بطور معمول در تغذیه دام استفاده می‌شوند از نظر برخی مواد مغذی دچار کمبود بوده و نیاز به مکمل‌های غذایی را پدید می‌آورد. در بین مکمل‌های خوارکی، مواد معدنی پرصرف و کم‌صرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. سلنیوم از جمله مواد معدنی کم‌صرف و ضروری است که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توجه محققان تغذیه انسان و دام را به خود معطوف کرده است. اهمیت بیولوژیکی سلنیوم به عنوان جزئی از سلنوآنزیم‌ها

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بولوی سینا همدان
Email: h_aliarabi@yahoo.com
۲- نویسنده مسئول:

-۲- جیره شاهد + ۰/۲ میلی گرم سلنیوم به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیت سدیم؛ -۳- جیره شاهد + ۰/۴ میلی گرم سلنیوم به ازاء هر کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیت سدیم.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی مواد خوراکی و جیره پایه مورد استفاده در آزمایش

گرم در کیلوگرم ماده خشک		اقلام جیره
۳۲۰		یونجه
۵۸۰		جو
۴۰		کنجاله سویا
۵۰		سیوس گندم
۱۰		مکمل ویتامینی و معدنی ^۱
(g/kg DM ترکیب شیمیایی جیره پایه)		
۹۰۹	ماده خشک	
۲/۷	انرژی قابل متابولیسم (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک)	انرژی قابل متابولیسم (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک)
۱۳۳	پروتئین خام	
۱۸۱	دیواره سلولی نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)	دیواره سلولی نامحلول در شوینده خنثی (NDF)
۳۳۶	چربی خام	
۱۷/۲	کلسیم	
۶/۵	فسفر	
۳/۴		
۰/۰۶	سلنیوم (میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک)	
۱- با استفاده از مکمل معدنی در هر کیلوگرم از جیره پایه مقدار:		
۶ میلی گرم FeSO ₄ ·7H ₂ O	۵ میلی گرم MnSO ₄ ·H ₂ O	۸ میلی گرم ZnSO ₄ ·7H ₂ O
۰/۰۵ میلی گرم CoCl ₂ ·6H ₂ O	۵ میلی گرم CuSO ₄ ·5H ₂ O	۰/۰۵ میلی گرم KI
۰/۰۵ میلی گرم A	۰/۰۵ میلی گرم E	۰/۰۵ میلی گرم D
۰/۰۵ واحد بین المللی ویتامین A، ۰/۰۵ واحد بین المللی ویتامین E فراهم شد.		

در طول دوره آزمایش، جیره غذایی پس از توزین روزانه در دو نوبت (۸ صبح و ۶ بعد از ظهر) در اختیار بردها قرار گرفت و جهت تعیین مقدار خوراک مصرفی، قبل از ریختن خوراک و عدد صبح، باقیمانده خوراک روز قبل از آخر جمع‌آوری و ثبت شد. جهت بررسی تغییرات وزن بردها، پس از تعیین وزن همه بردها در ابتدای آزمایش، بردها همچنین در روزهای ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶ و ۴ با اعمال محرومیت قرار گرفتند.

علاءو بر روز شروع آزمایش، در روزهای ۳۵ و ۷۰ نیز خونگیری به عمل آمد به طوری که قبل از نوبت غذایی صبح و با اعمال محدودیت غذایی ۱۲ تا ۱۴ ساعته از طریق ورید و داج از تمام بردها خونگیری شد. خون گرفته شده در دو لوله جداگانه یکی حاوی هپارین برای بست آوردن پلاسما و دیگری بدون هپارین چهت بدست

تعذیه‌ای سلنیوم انجام گرفته است. جونیپر و همکاران (۱۲)، مشخص نمودند که استفاده از سلنیوم باعث افزایش غلظت سلنیوم خون، شیر و بافت‌ها شد. کومار و همکاران (۱۷ و ۱۸)، وانگ و همکاران (۳۶)، نیز به ترتیب افزایش اینمنی و مقاومت در برابر بیماری‌ها و افزایش رشد میکروارگانیسم‌های شکمیه را با استفاده از مکمل سلنیوم گزارش نموده اند. با این حال در برخی تحقیقات دیگر تقاضوت چشمگیری مشاهده نشده است که می‌تواند به دلیل شرایط پرورش و مقدار سلنیوم جیره پایه باشد (۲۶، ۳۱ و ۳۵).

علیرغم به اینکه خاک بسیاری از نقاط دنیا و از جمله ایران با کمبود سلنیوم مواجه است (۱۵ و ۲۱)، علاوه کمبود نیز در دام‌ها شایع می‌باشد، در کشور ما تحقیقات چنانی به منظور بررسی اثر سلنیوم صورت نگرفته است. علاوه بر این، اکثر تحقیقات بر مبنای تزریق سلنیوم در جنس ماده بوده است (۱۵، ۱۹ و ۲۱). تحقیقات اندکی در نشخوارکنندگان به منظور بررسی اثر سلنیوم خوارکی بر گوارش پذیری مواد غذی و غلاظت سایر عناصر انجام گرفته و نیاز به تحقیقات جدید ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و گوارش پذیری مواد غذی جیره در بره‌های نر نژاد مهریان انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات دامپروری گروه علوم دامی داشتگاه بوعلی سینا همدان طی دو مرحله انجام شد. بدین منظور، تعداد ۱۸ رأس بره نر همراه با سن ۴-۵ ماه و میانگین وزن بدن ۲/۷ کیلوگرم انتخاب شدند. جایگاه نگهداری دامها شامل ۱۸ ± ۳/۵ کیلوگرم انتخاب شدند. جایگاه نگهداری دامها شامل ۱۸ جایگاه انفرادی، هر یک به ابعاد 180×110 سانتی‌متر بود، که قبل از قرار گرفتن دامها، محوطه ابتدا تمیز و سپس با شعله افکن ضدغافونی شد. از یونجه خشک، دانه جو، سبوس گندم و کنجاله سویا به عنوان اجزاء تشکیل دهنده جیره غذایی (جدول ۱) استفاده شد.

جیره غذایی با توجه به جداول نیازهای غذایی NRC (۱۹۸۵) تنظیم و کلیه نیازهای دام به جز سلنیوم تأمین شد. به منظور افزودن سلنیوم به جیره از سلنتیت سدیم تهیه شده از شرکت مرک (مرک، آلمان) استفاده شد. از سبوس گندم نیز به عنوان حامل مکمل ها استفاده گردید.

برههای جهت عادت‌پذیری به محیط و جیره جدید در یک دوره دو هفته‌ای با جیره بدون مکمل سلنیوم تعذیه شدند. در پایان دوره عادت‌دهی، برههای که ۱۲ الی ۱۴ ساعت از آب و خوراک محروم بودند توزین شده (این عمل طی دو روز متوالی انجام شد) و میانگین دو روز محسابه شد. سپس به طور تصادفی به ۳ تیمار تقسیم شده (هر تیمار شامل ۶ بره)، و به مدت ۷۰ روز با دسترسی آزاد و انفرادی تعذیه شدند. تیمارها شامل: ۱- جیره غذایی پایه بدون مکمل‌های سلنیوم؛

دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل 100 Varincary) و مقدار ازت نیز با استفاده از دستگاه کلدل ا تعیین شد. برای محاسبه مقدار گوارش پذیری مواد غذایی، مقدار دفع شده از مقدار خورده شده کم شد. این پژوهش به صورت طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. به دلیل اینکه وزن اولیه برههای در شروع آزمایش یکسان نبود، برای آنالیز داده‌ها از کوواریانس استفاده شد.

برای صفاتی مثل وزن بدن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، گوارش پذیری مواد خوراکی از مدل آماری زیر استفاده شد:

$$Y_{ij} = \mu + T_i + e_{ij}$$

Y_{ij} = مقدار مشاهده تیمار i ام در تکرار j ام

μ = اثر میانگین

T_i = اثر تیمار i ام

e_{ij} = اثر خطای آزمایش مربوط به تیمار i ام در تکرار j ام

صفات مربوط به غلظت تری گلیسیرید، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی کم و خیلی کم (LDL و VLDL)، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد (HDL)، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، Fe, Zn, P, Ca و Cu سرم و همچنین مقدار T_3 و T_4 سرم با استفاده از چارچوب طرح کاملاً تصادفی تجزیه شدن که مدل‌های آماری آن در زیر نشان داده شده است:

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + E_{ijk} + B_j + E_{bijk}$$

Y_{ijk} = مشاهده مربوط به تیمار i و زمان اندازه‌گیری j در تکرار k

μ = میانگین کلی مشاهده‌ها

A_i = اثر تیمار i

E_{ijk} = اشتباه اصلی

B_j = اثر زمان اندازه‌گیری j

AB_{ij} = برهم‌کنش تیمار i و زمان اندازه‌گیری j

E_{bijk} = اشتباه فرعی

مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن با سطح احتمال خطای ۰/۰۵ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS ویرایش ۹/۱ (SAS ۲۰۰۴) صورت گرفت.

نتایج و بحث

اطلاعات مربوط به عملکرد برههای از روز صفر تا ۷۰ آزمایش در جدول ۲ ارائه شده است. در تحقیق حاضر، افزودن سلنیوم در مقادیر ذکر شده، از نظر افزایش وزن روزانه، وزن نهایی، خوراک مصرفی و ضریب ایجاد نکرد ($P > 0/05$). همسو با نتایج حاضر، وینولا و همکاران (۳۵) نیز تفاوت معنی‌داری در افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی برههای دریافت کننده $0/3$ و $0/45$ پی‌پی ام سلنیوم

آوردن سرم ریخته شد. نمونه‌های خون پس از انتقال به آزمایشگاه، به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ شده (با سرعت ۳۵۰۰ دور در دقیقه) و پلاسمایا سرم آنها جدا گردید. نمونه‌های پلاسمایا و سرم تا زمان اندازه‌گیری، در دمای ۲۰–۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. از نمونه‌های روز صفر، ۳۵ و ۷۰ جهت اندازه‌گیری غلظت برخی مواد معدنی پلاسمایا (کلسیم، فسفر، روی، مس و آهن)، تری گلیسیرید، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی کم (LDL)، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد (HDL)، غلظت هورمون‌های T_3 و T_4 سرم، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) خون کامل استفاده شد.

فعالیت آنزیم GPX خون کامل با استفاده از کیت RANSEL (محصول شرکت RANDOX، انگلیس)، مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده کیت و توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل Varincary 100) اندازه‌گیری شد. میزان تری گلیسیرید، کلسترول، VLDL، LDL، HDL سرم خون نیز با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل 100 Varincary) تعیین شد. همچنین غلظت هورمون‌های T_3 و T_4 سرم با استفاده از کیت شرکت پادتن گستر، توسط دستگاه الایزا ریدر (مدل ELX808) Bio-Tek اندازه‌گیری شد. غلظت روی، آهن و مس پلاسمایا هضم طبق روش وسترما (۳۷)، توسط دستگاه جذب اتمی (مدل Variant spectrAA220) تعیین شد. غلظت کلسیم و فسفر پلاسمایا نیز توسط کیت‌های ساخت شرکت زیست شیمی مطابق با دستور سازنده کیت و با دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل 100 Varincary) اندازه‌گیری شد.

بعد از پایان مرحله اول ۴ راس بره از هر تیمار به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر قابلیت هضم هضم معدنی انتخاب شد. برههای در قفس‌های متابولیکی قرار گرفته و جهت سازگاری به شرایط جدید به مدت ۱۲ روز، با جیره مشابه با آزمایش اول و در سطح نگهداری تغذیه شدند. پس از آن، مرحله اصلی آزمایش آغاز شد و ۶ روز به طول انجامید. در این مرحله مقدار خوراک خورده شده، باقی‌مانده احتمالی خوراک و کل مدفوع طی ۲۴ ساعت به طور روزانه ثبت و از آنها نمونه برداری صورت گرفت. آب مصرفی نیز به صورت دستی و با ثبت مقدار مصرف روزانه در اختیار دامها قرار گرفت. جهت تعیین ترکیب شیمیابی نمونه‌های خوراک و مدفوع (ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، چربی خام، و ماده آلی) از روش‌های AOAC (۱۹۹۰) استفاده شد. ان-دی-اف (فیبر نامحلول در شوینده خشی) و ای-دی-اف (فیبر نامحلول در شوینده اسیدی) نیز به روش ون-

-سوست و همکاران (۳۴)، تعیین شد. اندازه‌گیری غلظت روی، مس، سلنیوم، آهن و کلسیم در نمونه‌های خوراک، طبق روش وسترما (۳۷)، و با دستگاه جذب اتمی مدل Variant spectrAA220 بود. در حالی که برای تعیین فسفر از

مشاهده نشد ($P < 0.05$). نتایج حاضر با نتایج معینی و همکاران (۲۰)، در تلیسه‌های آبستن و مهری و همکاران (۲۱)، در بردهای تازه متولد شده به دنبال تزریق سلنیوم همخوانی دارد. با این حال کریستالدی و همکاران (۵)، دریافتند که تجویز سلنیوم به گوسفندان چراگری که از مراع موافق با کمبود مس تنذیه می‌شدند باعث افزایش جذب مس و بهبود رشد شد.

در آزمایش حاضر، اثر افزودن سلنیوم در بر غلظت آهن پلاسمای متمایل به معنی دار شدن بود ($P < 0.05$). مقدار آهن در تیمارهای با مصرف سلنیوم، نسبت به گروه شاهد کمتر بود. کجوری و همکاران (۱۶) بیان کردند که تزریق مکمل سلنیومی به صورت سلنتیت سدیم به بردها، کاهش غلظت آهن سرم را بهمراه داشت. علت این امر را می‌توان به اثر سلنیوم در افزایش بیان ژن ترانسفیرین به عنوان ناقل آهن به درون سلول نسبت داد (۱۶). به علاوه مهری و همکاران (۲۱)، با تزریق مکمل سلنیومی به بردها مشاهده نمودند که با وجود کاهش عددی غلظت آهن پلاسمای نسبت به تیمار شاهد این تفاوت معنی‌دار نشد.

با دقت به جدول ۴ ملاحظه می‌شود که دریافت سلنیوم اثری بر غلظت تری گلیسیرید (TG) و کلستروول (CHOL) نداشت ($P > 0.05$). نتایج تحقیق حاضر با مشاهدات کومار و همکاران (۱۷) و (۱۸)، در بردهایی که مقدار 0.15 ± 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم مصرف کرده بودند، و موگال و همکاران (۲۲)، در گاموئیش‌های جوان مصرف کننده 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم، همسو بود. این در حالی است که ابراهیمی و همکاران (۷)، در تحقیق خود با تأمین مقدار 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم به مدت 60 روز در گوساله‌های شیرخوار یک ماهه دریافتند که غلظت کلستروول پلاسمای گوساله‌ها کاهش یافت و کاهش غلظت کلستروول در تیمارهای با مکمل سلنیوم را به افزایش مقدار هورمون T_3 نسبت دادند.

(علاوه بر جیره پایه حاوی 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم) مشاهده نکردند. مقدار 0.15 ± 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم به صورت سلنتیت سلنیوم به جیره پایه حاوی 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم نیز تأثیری بر نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایی بردهای در حال رشد نداشت (۱۸). در مقابل، افزودن سلنیوم در تحقیق شی و همکاران (۳۲)، به میزان 0.03 پی‌پی‌ام به جیره پایه علوفه‌ای، حاوی 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم باعث افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه بیشتر در بزها شد. دلیل این اختلاف را می‌توان از مقدار بیشتر سلنیوم جیره پایه در تحقیق حاضر (0.06 پی‌پی‌ام) و بهبود جذب سلنیوم با استفاده از جیره کنستانترهای نسبت به علوفه‌ای (۱۴) دانست. به طور کلی با توجه به نتایج حاضر و مقایسه آنها با تحقیقات انجام شده می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تفاوت در نتایج احتمالاً ناشی از مقدار سلنیوم در جیره پایه و نوع جیره می‌باشد.

در روز صفر تفاوت معنی‌داری بین تیمارها از نظر فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده وجود نداشت ($P > 0.05$). بنابراین داده‌ها در جداول به صورت اندازه‌های تکرار شده و بدون در نظر گرفتن روز صفر آنالیز و ارائه شده‌اند. اثر زمان و اثر متقابل تیمار و زمان نیز برای فراسنجه‌ها معنی‌دار نبود ($P > 0.05$).

نتایج مربوط به غلظت عناصر روی (Zn)، مس (Cu)، آهن (Fe)، کلسیم (Ca) و فسفر (P) پلاسمای بردهای مورد بررسی در این آزمایش در جدول ۳ ارائه شده است. تحقیقات اندکی به منظور بررسی اثر مقابل سلنیوم و سایر مواد معدنی در غلظت‌های توصیه شده، در نشخوارکنندگان انجام شده است و بیشتر تحقیقات نیز به صورت تزریق سلنیوم بوده که حذف اثرات احتمالی محیط شکمبه را به دنبال داشته است. افزودن سلنیوم، اثری بر غلظت کلسیم، فسفر، مس و روی پلاسمای نداشت ($P > 0.05$). در آزمایش کومار و همکاران (۱۸)، نیز استفاده از 0.15 ± 0.03 پی‌پی‌ام سلنیوم به صورت سلنتیت سدیم به جیره بردهای پرواری، تأثیری بر غلظت کلسیم و فسفر پلاسمای خون نداشت که با نتایج ما سازگار است. با افزودن سلنیوم در مقدارهای 0.03 و 0.06 پی‌پی‌ام، تفاوت معنی‌داری در غلظت مس و روی پلاسمای

جدول ۲- مقایسه میانگین مربوط به عملکرد بردهای نر مهربان در تیمارهای آزمایشی

تیمار	میانگین وزن اولیه (کیلوگرم)	میانگین وزن روزانه (کیلوگرم در روز)	میانگین وزن نهایی (کیلوگرم در روز)	میانگین خوراک مصرفی روزانه به افزایش وزن	ضریب تبدیل غذایی (خوراک)
گروه شاهد	$35/26$	$0/241$	$52/12$	$1/557$	$6/608$
0.03 سلنیوم	$36/35$	$0/259$	$53/84$	$1/653$	$6/433$
0.04 سلنیوم	$36/15$	$0/249$	$53/25$	$1/605$	$6/533$
SEM	$1/175$	$0/013$	$1/61$	$0/181$	0.035
اثر تیمار	$0/798$	$0/606$	$0/789$	$0/511$	0.034
P وزن اولیه	-	$0/899$	-	-	-

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

این محققین دریافتند که کمبود سلنیوم در موش، افزایش میزان کلسترول و LDL پلاسمای خون را به دنبال دارد و دلیل این امر را به افزایش فعالیت آنزیم بتاهیدروکسی-بتمتیل-گلوتاریل-کوا رداکتاز که آنزیم تنظیم کننده بیوسنتز کلسترول در پستانداران می باشد نسبت دادند. کاشانا و جیانتی (۱۳)، نیز بیان نمودند که در جوجه‌های تخمگذار دریافت کننده سلنیوم نسبت به گروه شاهد غلظت LDL کمتر شد ولی غلظت HDL تغییری نکرد. همچنین فالکوسکا و همکاران (۸)، نشان دادند که افزودن سلنیوم و ویتامین E باعث افزایش غلظت HDL در خون گاوها شد که احتمالاً ناشی از اثر ویتامین E است. به طور کلی نتایج حاضر نشان می‌دهد که استفاده از سلنیوم اثر معنی‌داری بر فراسنجه‌های لیپیدی سرم خون بردهای نر مهریان ندارد.

ارتباط مستقیمی بین غلظت سلنیوم و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در خون وجود دارد و فعالیت این آنزیم بعنوان شاخص مهمی برای وضعیت سلنیوم دام در نظر گرفته می‌شود (۲۵). نتایج مربوط به میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون در جدول ۵ ارائه شده است. افزودن مکمل سلنیوم به جیره در مطالعه حاضر، باعث افزایش فعالیت GPX شد ($P < 0.001$). مطابق با نتایج حاضر، کین و همکاران (۲۶)، با افزودن مقدار ۰/۰ پی‌بی‌ام سلنیوم به جیره پایه حاوی ۰/۰۶ پی‌بی‌ام سلنیوم بصورت آلی و معدنی در بردهای پرواری، رونتری و همکاران (۲۸)، با استفاده از شربت سلنیوم از منبع سلنیت‌سدیم به صورت هفتگی به گاوها هر فورد به میزان ۲۰ میلی‌گرم و بک و همکاران (۴)، در گووالله‌های حاصل از گاوها دریافت کننده ۰/۲۶ پی‌بی‌ام سلنیوم، افزایش در فعالیت GPX را گزارش نموده‌اند. کومار و همکاران (۱۸)، نیز با افزودن مقدار ۰/۱۵ پی‌بی‌ام سلنیوم به جیره پایه حاوی ۰/۱۹ پی‌بی‌ام سلنیوم افزایش در فعالیت GPX گلbul‌های قرمز را گزارش نمودند.

جدول ۳ - غلظت روی، مس، آهن، کلسیم و فسفر پلاسمما (میلی‌گرم در لیتر) در تیمارهای آزمایشی

تیمار / فاکتور	فسفر	کلسیم	آهن	رس	روی	مس
۶۷/۰۳	۱۱۵/۱۰	۱/۹۱	۱/۲۴	۰/۶۷۷	گروه شاهد	
۶۶/۲۳	۱۱۵/۷۸	۱/۷۵	۱/۲۲	۰/۶۹۵	۰/ سلنیوم	۲
۶۸/۶۷	۱۱۵/۰۲	۱/۶۹	۱/۲۰	۰/۷۶۸	۰/ سلنیوم	۴
۲/۱۴	۴/۳۰	۰/۰۶۷	۰/۰۴	۰/۰۹۱	SEM	
۰/۷۱۹	۰/۹۹۰	۰/۰۷۹	۰/۰۸۰۵	۰/۰۸۰۱	اثر تیمار	
۰/۷۷۶	۰/۵۸۰	۰/۷۳۷	۰/۰۹۹۰	۰/۱۴۰	P زمان	
۰/۱۲۹	۰/۹۵۵	۰/۹۷۶	۰/۰۹۸۵	۰/۰۸۴۱	P تیمار × زمان	

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها

مشخص شده است که افزودن هورمون T_3 به موش‌های مواجه با کمبود سلنیوم باعث کاهش ۵۷ درصدی غلظت کلسترول سرم خون می‌شود و به نظر می‌رسد که غلظت کلسترول سرم خون با اثر هورمون‌های تیروئیدی بر کبد کنترل می‌شود (۲۹). در تحقیق حاضر افزودن مکمل سلنیومی، افزایش معنی دار غلظت هورمون T_3 را به دنبال داشت ولی اثر قابل توجهی بر غلظت کلسترول خون ایجاد نکرد که می‌تواند به نوع و سن دام مورد مطالعه و همچنین مقدار سلنیوم در جیره پایه مرتبط باشد. همچنین گابریزوک و همکاران (۹)، بیان نمودند که در بردهای دریافت کننده سلنیوم، غلظت کلسترول پلاسمما پایین‌تر از بردهای تیمارهای دیگر بود ولی غلظت تری‌گلیسیرید تغییر محسوسی نداشت. ایزوکا و همکاران (۱۰)، نیز اثر سلنیوم را بر متابولیسم لیپید در موش‌های تغذیه شده با مقادیر زیاد کلسترول بررسی نموده و گزارش داده‌اند که سلنیوم باعث کاهش غلظت تری-گلیسیرید و کلسترول در سرم شد. در تحقیق حاضر کاهش عددی در غلظت LDL سرم خون بردهای دریافت کننده سلنیوم مشاهده شد، هرچند این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود ($P > 0.05$). این مطلب را می‌توان با توجه به نتایج تحقیق کیو و همکاران (۲۷)، توجیه کرد.

جدول ۴ - غلظت متابولیت‌های چربی سرم (میلی‌گرم در دسی لیتر) در تیمارهای آزمایشی

تیمار / فاکتور	TG	CHOL	HDL	LDL	VLDL
گروه شاهد	۴۲/۸۵	۷۲/۳۳	۳۴/۳۸	۳۰/۵۵	۷/۴۱
۰/ سلنیوم	۳۹/۳۲	۷۲/۰۸	۳۷/۲۴	۲۶/۰۶	۷/۸۷
۰/ سلنیوم	۳۷/۰۱	۶۸/۰۸	۳۹/۹۴	۲۰/۹۱	۸/۵۷
SEM	۱/۹۹	۴/۲۰	۲/۶۳	۲/۳۵	۰/۳۹۸
اثر تیمار	۰/۱۴۷	۰/۷۲۹	۰/۳۵۳	۰/۰۹۱	۰/۱۵۲
P زمان	۰/۶۳۳	۰/۸۶۵	۰/۶۹۰	۰/۰۹۰۲	۰/۶۴۶
P تیمار × زمان	۰/۰۷۰	۰/۰۸۰۵	۰/۱۵۵	۰/۰۵۴۰	۰/۰۹۷۰

VLDL، LDL، HDL، CHOL، TG به ترتیب عبارتند از: تری‌گلیسیرید،

کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد، لیپوپروتئین‌های با چگالی کم و

لیپوپروتئین‌های با چگالی خلی کم.

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

نمودند که غلظت T_3 سرم و نسبت T_3 به T_4 در برده‌های دچار بیماری تحلیل ماهیچه‌ای نسبت به برده‌های سالم کمتر است. بنابراین نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که افزودن سلنیوم (صرف نظر از مقدار آن) سبب بهبود تبدیل T_4 به T_3 شده است. همچنین افزودن ۰/۲ میلی‌گرم سلنیوم، نیاز برده‌های در حال رشد را تأمین می‌کند.

تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مکمل شده با سلنیوم و گروه شاهد از نظر گوارش‌پذیری مواد مغذی خوراک مشاهده نشد (جدول ۶) که در تفاوچ با نتایج کومار و همکاران (۱۸)، می‌باشد. این محققین نیز با استفاده از مقدارهای ۰/۱۵ و ۰/۳ پی‌پی‌ام سلنیوم به صورت سلنیتسدیم تفاوت قابل توجهی را گزارش ندادند. همچنین ایوانسیج و ویس (۱۱)، در گاوهاشی شیری هلشتاین، با استفاده از ۰/۳ پی‌پی‌ام سلنیوم معدنی تفاوتی را مشاهده ننمود. اما بر اساس گزارش وانگ و همکاران (۳۶)، افزودن سلنیوم آلی در سطح ۰/۱۵ و ۰/۳ و ۰/۴۵ پی‌پی‌ام به جیره پایه حاوی ۰/۰۷ پی‌پی‌ام سلنیوم در گاوهاشی شیری، افزایش گوارش‌پذیری مواد مغذی ذکر شده را به دنبال داشته است. این محققین علت این امر را به افزایش تخمیر شکمبه‌ای در نتیجه افزایش مقاومت و فعالیت میکرووارگانیسم‌ها به ویژه باکتری‌های سلولولاریتیک نسبت دادند. تفاوت مشاهده شده را می‌توان به نوع مکمل استفاده شده نسبت داد زیرا مشخص شده است که بخشی زیاد از سلنیوم معدنی در شکمبه به شکل نامحلول می‌شود (۳۳).

نتیجه گیری

بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که از لحاظ عملکرد، غلظت عناصر کلسیم، فسفر، روی و مس پلاسماء، همچنین ترکیبات لیپیدی سرم خون و قابلیت هضم مواد مغذی تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای دریافت کننده مقدار ۰/۲ پی‌پی‌ام و ۰/۴ پی‌پی‌ام سلنیوم و گروه شاهد وجود نداشت.

دریافت مقدار بیشتر سلنیوم با افزایش عددی فعالیت GPX خون همراه بود. با در نظر گرفتن این مطلب که سلنیوم جزء سازنده آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است و رابطه خطی مستقیمی بین مقدار سلنیوم خون و فعالیت این آنزیم وجود دارد ($r = 0.958$) نتیجه فوق منطقی به نظر می‌رسد (۲۵).

افزودن مکمل سلنیوم، تفاوت معنی‌دار غلظت T_4 و T_3 به T_3 سرم برده‌های دریافت کننده مکمل و گروه کنترل را بهمراه داشت (جدول ۵). بطوری که تیمارهای دریافت کننده مکمل سلنیوم نسبت به تیمار شاهد، غلظت بالاتری از لحاظ T_3 و غلظت کمتری از لحاظ T_4 و نسبت T_4 به T_3 داشتند ($P < 0.05$). مشابه با نتایج تحقیق حاضر، ویتل و همکاران (۳۸)، در گوساله‌هایی که سلنیوم را به صورت کپسول درون شکمبه‌ای دریافت کرده بودند، و آرتور و همکاران (۳)، در گوساله‌های پروواری تأمین شده با مقدار ۱/۰ میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک سلنیوم نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در غلظت T_3 و کاهش در T_4 را گزارش داده‌اند. در مقابل نتایج آزمایش حاضر، کومار و همکاران (۱۷ و ۱۸) به ترتیب با افزودن مقدار ۰/۱۵ و ۰/۰ پی‌پی‌ام سلنیوم به صورت سلنیتسدیم و سلنیومتیونین به مدت ۹۰ روز و افزودن ۰/۱۵ و ۰/۳ پی‌پی‌ام سلنیوم به صورت سلنیتسدیم طی سه ماه به جیره برده‌های پروواری، تغییری در غلظت T_3 ، T_4 و نسبت این دو هورمون مشاهده نکردند. البته می‌توان دلیل این امر را ناشی از بیشتر بودن مقدار سلنیوم جیره پایه (۰/۰ پی‌پی‌ام) دانست. تأمین ۰/۳ پی‌پی‌ام سلنیوم در تحقیق موگال و همکاران (۲۲) در گاومیش نیز تغییری در فراسنجه‌های ذکر شده ایجاد نکرد. ارتباط بین سلنیوم و غذه تیروئید نه تنها مرتبط با فعالیت پراکسیدازها در محافظت از تیروئید و سنتز هورمون‌های تیروئیدی است، بلکه با فعالیت دیدینازها که سلنیوآنزیم‌های مسئول کاتالیز تبدیل T_4 به شکل فعال‌تر متابولیکی آن (T_3) می‌باشند نیز مرتبط است (۱). دلیل و همکاران (۶)، گزارش

جدول ۵- میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) خون کامل و غلظت هورمون‌های تیروئیدی سرم خون (نانومول بر لیتر) در تیمارهای آزمایشی

T_4/T_3	T_4	T_3	GPX(U/gHb)	تیمار / فاکتور
^a ۵۷/۷۴	^a ۸۵/۱۰	^b ۱/۴۸	^b ۲۴۹/۳	گروه شاهد
^b ۴۶/۸۸	^b ۷۶/۰۰	^a ۱/۶۳	^a ۴۱۲/۷	۰/۰ سلنیوم
^b ۴۴/۷۱	^b ۷۳/۵۰	^a ۱/۶۶	^a ۴۶۴/۸	۰/۰ سلنیوم
۲/۴۲	۲/۶۶	۰/۰۴	۲۲/۱	SEM
۰/۰۱۴	۰/۰۱۸	۰/۰۲۲	۰/۰۰۰۳	اثر تیمار
۰/۲۹۱	۰/۱۸۲	۰/۷۵۴	۰/۱۵۳	P زمان
۰/۹۷۵	۰/۸۶۷	۰/۹۷۵	۰/۷۲۴	P تیمار×زمان

حروف غیر مشابه در هر ستون از هر بخش نشان دهنده اختلاف آماری معنی‌دار در سطح ۰/۰۵ می‌باشد.

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

نظر می‌رسد که با سطح ۰/۲ پی‌پی‌ام سلنیوم علاوه بر جیره پایه حاوی ۰/۰۶ پی‌پی‌ام سلنیوم، نیاز بردهای در حال رشد مهریان، تأمین می‌شود.

اما کاهش معنی‌داری در غلظت هورمون تترایدوتیرونین (T₄) و افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX) خون كامل و غلظت هورمون تری‌یدوتیرونین (T₃) سرم مشاهده شد. به

جدول ۶- اثر افزودن مکمل سلنیوم بر درصد گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی جیره

تیمار	ماده خشک	ماده آلی	چربی خام	ان-اف-سی	پروتئین خام	ان-دی-اف	ای-دی-اف
گروه شاهد	۳۴/۰۱	۵۰/۵۴	۶۷/۵۲	۸۹/۳۶	۶۱/۷۹	۷۲/۸۱	۶۸/۹۹
۰/۲ سلنیوم	۳۳/۸۵	۵۳/۴۵	۶۸/۹۷	۹۱/۶۲	۶۱/۲۲	۷۳/۷۲	۷۱/۰۳
۰/۴ سلنیوم	۳۳/۷۷	۵۵/۲۵	۶۷/۷۲	۹۰/۴۹	۶۲/۳۱	۷۴/۲۱	۶۸/۵۲
SEM	۱/۳۲	۱/۱۹	۱/۳۲	۲/۷۶	۱/۷۴	۱/۷۱	۱/۴۳
اثر تیمار	۰/۳۳۸	۰/۱۳۶	۰/۳۹۲	۰/۸۴۸	۰/۹۰۹	۰/۲۱۰	۰/۴۳۹

SEM: خطای استاندارد میانگین‌ها.

منابع

- Abd ElGhany Hefnawy, J. L. and Tortora-Perez. 2010. The importance of selenium and the effects of its deficiency in animal health. *Small Rum Res.* 89:185-192.
- AOAC. 1990. Official methods of analysis 15th edition. Association of official analytical chemist, Arlington, U.S.A.
- Arthur, J. R. 1988. "Effects of selenium and vitamin E status on plasma creatine kinase activity in calves". *J Nutr.* 118, 747-755.
- Beck, P. A., T. J. Wistuba, M. E. Davis, and S. A. Gunter. 2003. Effect of selenium supplementation of beef cows on immune responses of weaned beef calves. *J Anim Sci.* 81 (Suppl. 2), 8 (Abs. 67).
- Cristaldi, L. A., L. R. McDowell, C. D. Buergelt, P. A. Davis, N. S. Wilkinson, and F. G. Martin. 2005. Tolerance of inorganic selenium in wether sheep. *Small Rum Res.* 56:205-213.
- Dalir-Naghadeh, B., and S. A. Rezaei. 2008. Assessment of serum thyroid hormone concentrations in lambs with selenium deficiency myopathy. *Am J Vet Res.* 69:659-663.
- Ebrahimi, M., A. Towhidi, and A. Nikkhah. 2009. Effect of organic selenium (sel-plex) on thermometabolism, blood chemical composition and weight gain in holstein suckling calves. *Asian Aust J Anim Sci.* 7:984-992.
- Falkowska, A., D. Minakowski, and J. Tywonczuk. 2000. The effect of supplementing rations with selenium and vitamin E on biochemical parameters in blood and performance of cows in the early stage of lactation. *J Anim Feed Sci.* 9:271-282.
- Gabryszuk, M., M. Czauderna, A. Baranowski, N. Strzałkowska, A. Jozwik1, and J. Krzyzewski. 2007. The effect of diet supplementation with Se, Zn and vitamin E on cholesterol, CLA and fatty acid contents of meat and liver of lambs. *Anim Sci Pap and Rep* 1:25-33.
- Iizukay Sakurai, E., and Y. Tanaka. 2001. Effect of selenium on serum, hepatic and lipoproteins lipids concentration in rats fed on a highcholesterol diet. *Yakugaku Zasshi*, 121:93-96.
- Ivancic, J., and W. J. Weiss. 2001. Effect of dietary sulphur and selenium concentrations on selenium balance of lactating Holstein cows. *J Dairy Sci.* 84:225-232.
- Juniper, D. T., R. H. Phipps, A. K. Jones, and G. Bertin. 2006. Selenium supplementation of lactating dairy cows: effect on selenium concentration in blood, milk, urine and feces. *J Dairy Sci.* 89:3544-3551.
- Kanchana, G. and G. P. Jeyanthi. 2010. The effect of supplementation of diet with vitamin E and selenium and their combinations on the performance and lipid profiles of layer chicken. *International Journal of Pharma and Bio Sciences.* 1:1-11.
- Koenig, K. M., L. M. Rode, R. D. H. Cohen, and W. T. Buckley. 1997. Effects of diet and chemical form of selenium metabolism in sheep. *J Anim Sci.* 75:817-827.
- Kojouri, G. A. and A. Shirazi. 2007. Serum concentration of Cu, Zn, Fe, Mo, and Co in newborn lambs following systemic administration of Vitamin E and selenium to the pregnant ewes. *Small Rum Res.* 70:136-139.
- Kojouri, G. A., S. Jahanabadi, M. Shakibaie, A. M. Ahadi, and A. R. Shahverdi. 2011. Effect of selenium supplementation with sodium selenite and selenium nanoparticles on iron homeostasis and transferring gene expression in sheep: A preliminary study, *Research in Veterinary Science*.
- Kumar M., A. K, Garg, R. S. Dass, V. K. Chaturvedi, V. Mudgal, and V. P. Varshney. 2009. Selenium supplementation influences growth performance, antioxidant status and immune response in lambs. *Anim Feed Sci*

- Tech. 153:77-87.
- 18- Kumar, N., A. K. Garg, and V. Mudgal. 2008. Effect of different levels of selenium supplementation on growth rate, nutrient utilization, blood metabolic profile, and immune response in lambs. Biol Trace Elem Res. 126:S44-56.
 - 19- Moeini, M. M. Karami, and E. Mikaeili. 2009 . Effect of Selenium and Vitamin E Supplementation during Late Pregnancy on Se Status, and Reproduction Indices. Anim Rep Sci. 114(1-3): 109-114.
 - 20- Moeini, M. M., Kiani, A., Karami, H. and Mikaeili, E. 2011. "The effect of selenium administration on the selenium, copper, iron and zinc status of pregnant heifers and their newborn calves". J Agri Sci and Tech 13:53-59.
 - 21- Mohri, M., A. Ehsani, M. A. Norouzian, M. Heidarpour, and H. A. Seifi. 2011. Parenteral selenium and vitamin E supplementation to lambs: hematology, serum biochemistry, performance, and relationship with other trace elements. Biol Trace Elem Res.139:308-316.
 - 22- Mudgal, V., A. K. Garg, R. S. Dass, and V. P. Varshney. 2008. Effect of selenium and copper supplementation on blood metabolic profile in male buffalo (*Bubalus bubalis*) calves. Biol Trace Elem Res.121:31-38.
 - 23- NRC. 1985. Nutrient Requirements of Sheep, 5th edn. National Academy of Sciences, Washington, DC.
 - 24- NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. National Academy Press,Washington, DC.
 - 25- Puls, R. 1994. Mineral Levels in Animal Health: Diagnostic Data 2nd ed. Sherpa International, Clear Book. P.356.
 - 26- Qin, S. J. Gao, and K. Huang. 2007. Effects of different selenium sources on tissue selenium concentrations, blood GSH-Px activities and plasma interleukin levels in finishing lambs. Biol Trace Elem Res. 116:91-102.
 - 27- Qu, X., K. Huang, L. Deng, and H. Xu. 2000. Selenium deficiency-induced alternations in the vascular system of the rat. Biol Trace Elem Res. 75:119-128.
 - 28- Rowntree, J. E., G. M. Hill, D. R. Hawkins, J. E. Link, M. J. Rincker, G. W. Bednar, and M. J. Kreftjr. 2004. Effect of Se on selenoprotein activity and thyroid hormone metabolism in beef and dairy cows and calves. J Anim Sci. 82:2995-3005.
 - 29- Roy, E., Y. Murata, K. Cua, Y. Hayashi, H. Seo, and S. Refetoff. 1998. Thyroid hormone action on liver, heart, and energy expenditure in thyroid hormone receptor b-deficient mice. The Endocrine Society. 139:12.
 - 30- SAS Institute. 2004. User's Guide. Version 9.1: Statistics. SAS Institute, Cary, NC.
 - 31- Serra, A. B., K. Nakamura, T. Matsui, T. Harumoto, and R. I. Fujihara. 1994. Inorganic selenium for sheep: II. Its influence on rumen bacterial yield, volatile fatty acid production and total tract digestion of timothy hay. Asian Aust J Anim Sci. 7:91-96.
 - 32- Shi, L., W. Xun, W. Yue, C. Zhang, Y. Ren, Q. Liu, Q. Wang, and L. Shi. 2011. Effect of sodium selenite, Se-yeast and nano-elemental selenium on growth performance, Se concentration and antioxidant status in growing male goats. Small Rum Res. 96:49-52.
 - 33- Spears, J. W. 2003. Trace mineral bioavailability in ruminants". J Nutr. 133:1506-1509.
 - 34- Van soest, P. J., J. B. Robertson, and B. A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animsl nutrition. J Dairy Sci. 74:3583-3592.
 - 35- Vignola, G., L. Lambertini, G. Mazzone, M. Giamarco, M. Tassinari, G. Martelli, and G. Bertin. 2009. Effects of selenium source and level of supplementation on the performance and meat quality of lambs. Meat Sci. 81:678-685.
 - 36- Wang, C., Q. Liu, W. Z. Yang, Q. Dong, X. M. Yang, D. C. He, P. Zhang, K. H. Dong, and Y. X. Huang. 2009. Effects of selenium yeast on rumen fermentation, lactation performance and feed digestibilities in lactating dairy cows. Livestock Science. 126:239-244.
 - 37- Westterma, L. R. and F. Constabel. 1982. Plant tissue culture metbods 2deev. Ed. Sasatoon: National Research Council of Canada, Prairie Regional Laboratory.
 - 38- Wichtel, J. J., A. L. Craigie, D. A. Freeman, H. Varela-Alvarez, and N. B. Wiliamson. 1996. Effect of selenium and iodine supplementation on growth rate and on thyroid and somatotrophic function in dairy calves at pasture. J Dairy Sci. 79:1865-1872.