



مقاله علمی - پژوهشی

بررسی ترکیبات ضایعات تقطیری گندم و اثر سطوح مختلف آن بر عملکرد و ریخت‌شناسی
ژژنوم در جوجه‌های گوشتی در دوره‌های آغازین و رشدحشمت سپهری^{۱*}، زینب نوری^۲، امیر آذرلی^۳، علی رضا حسابی نامقی^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

چکیده

به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی، دو آزمایش مجزا انجام شد. در هر آزمایش تعداد ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتی مخلوط یک روزه سویه راس-۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ گروه و ۶ تکرار در هر گروه (هر تکرار دارای ۱۵ قطعه جوجه) در طی دوره‌های آغازین و رشد مورد آزمایش قرار گرفتند. جوجه‌های انتخابی برای سن ۲۲ تا ۴۲ روزگی از ابتدای دوره تا ۲۱ روزگی با جیره فاقد ضایعات تقطیری گندم تغذیه شدند. در آزمایش اول که جوجه‌ها از سن ۱ تا ۲۱ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند، سطوح صفر، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ درصد و در آزمایش دوم که از ۲۲ تا ۴۲ روزگی ادامه یافت، سطوح صفر، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد از ضایعات تقطیری گندم استفاده شد. مطابق نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی ضایعات تقطیری گندم، مقادیر پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، لیزین، متیونین، کلسیم و فسفر کل به ترتیب ۳۰/۵، ۸/۵، ۴، ۰/۵۷، ۰/۵۳، ۰/۲۶ و ۰/۹۳ درصد بود. میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره پرورش (۱ تا ۲۱ روزگی) بین گروه‌های مختلف آزمایشی دارای تفاوت معنی‌دار بود (۰/۰۵). به طوری که بیشترین میانگین افزایش وزن کل به ترتیب مربوط به گروه‌های حاوی ۳ درصد و شاهد (۸۴۶/۷۴ و ۸۴۷/۳۱ گرم) بود. همچنین جوجه‌های تغذیه شده با سطح ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم مصرف خوراک کمتری (۱۱۳۶/۵۹ گرم) نسبت به سایر گروه‌ها و گروه شاهد داشتند ($P < 0.05$). در سنین ۳۰ تا ۳۷ روزگی و ۳۸ تا ۴۵ روزگی، با توجه به طی شدن دوره عادت‌پذیری (پرنده ۷ روز ضایعات تقطیری گندم مصرف کرده است)، مصرف سطوح بالاتر ضایعات تقطیری گندم (۱۵ و ۲۰ درصد) باعث وزن بیشتری در جوجه‌های تغذیه شده با این سطوح نمود ($P < 0.05$) مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های تغذیه شده با سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم در بازه‌های زمانی مختلف تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد. افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم در هر دو آزمایش، نتایج معنی‌داری بر صفات ریخت‌شناسی ژژنوم نداشت و با افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم، ارتفاع پرزها کاهش و طول کریپت‌ها در ژژنوم افزایش یافت. مطابق نتایج حاصل از این آزمایش‌ها، بهترین سطح جایگزینی ضایعات تقطیری گندم بر پایه ذرت-کنجاله سویای جوجه‌های گوشتی در بازه زمانی ۱ تا ۲۱ روزگی، ۳ درصد و در بازه زمانی ۲۲ تا ۴۵ روزگی ۲۰ درصد بود.

واژگان کلیدی: جوجه، ریخت‌شناسی ژژنوم، عملکرد، ضایعات تقطیری گندم

مقدمه

عدم تعادل جمعیت باکتری‌های آن می‌شوند (۲). تفاله خشک دانه گندم تقطیر شده همراه با مواد حل شده (DDGS) یک محصول فرعی در تولید اتانول می‌باشد. در طی تولید الکل، نشاسته از دانه گرفته شده و به الکل و دی‌اکسید کربن تبدیل می‌شود. با تجزیه نشاسته به الکل، مابقی مواد مغذی در دانه باقی می‌ماند که تحت

کمبود منابع اصلی جیره غذایی طیور از قبیل ذرت و کنجاله سویا در ایران و افزایش قیمت آنها، ضرورت استفاده از خوراک‌های جایگزین و ارزان‌تر را نشان می‌دهد. جیره‌های غنی از پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای باعث افزایش گران‌روی محتویات دستگاه گوارش و

۴- استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی مشهد، ایران.
(Email: h.sepehrimoghadm@pnu.ac.ir) * نویسنده مسئول: DOI: 10.22067/ijasr.v13i2.74299

۱- استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران.
۳- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

حیوانات و جیره‌ها در آزمایش اول و دوم

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی واقع در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام شد. در آزمایش اول، تعداد ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس - ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ گروه و ۶ تکرار در هر گروه (هر تکرار دارای ۱۵ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۲۱ روزگی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: (۱) شاهد (جیره پایه بدون استفاده از ضایعات تقطیری گندم)، (۲) جیره حاوی ۳٪ ضایعات تقطیری گندم، (۳) جیره حاوی ۶٪ ضایعات تقطیری گندم، (۴) جیره حاوی ۹٪ ضایعات تقطیری گندم و (۵) جیره حاوی ۱۲٪ ضایعات تقطیری گندم بودند. جیره‌های آزمایشی بر اساس ذرت و کنجاله سویا با توجه به نیازمندی‌های توصیه شده توسط NRC (۱۹۹۴)، برای مراحل مختلف پرورش جوجه‌های گوشتی بر اساس نتایج حاصله از آنالیز نمونه ضایعات تقطیری گندم با کمک نرم‌افزار جیره‌نویسی WUFFDA تنظیم گردیدند به طوری که جیره‌ها به لحاظ انرژی و پروتئین یکسان بودند (۱۲). مدیریت پرورش بر اساس دستورالعمل موسسه راس اجرا شد (۱۵). اجزای تشکیل‌دهنده جیره‌های غذایی گروه‌های آزمایشی مختلف برای دوره (۱ تا ۲۱ روزگی) در جدول ۱ گزارش شده است.

آزمایش دوم: در این آزمایش، جوجه‌ها از ۱ تا ۲۱ روزگی با جیره فاقد ضایعات تقطیری گندم تغذیه شدند. سپس ۴۵۰ قطعه جوجه ۲۱ روزه سویه راس ۳۰۸ با میانگین وزن مشابه از میان گله تجاری که در مزرعه تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مشهد پرورش یافته بودند، انتخاب شدند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ گروه و ۶ تکرار و ۱۵ قطعه جوجه در هر تکرار انجام گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل: (۱) شاهد (جیره پایه بدون استفاده از ضایعات تقطیری گندم)، (۲) جیره حاوی ۵٪ ضایعات تقطیری گندم، (۳) جیره حاوی ۱۰٪ ضایعات تقطیری گندم، (۴) جیره حاوی ۱۵٪ ضایعات تقطیری گندم و (۵) جیره حاوی ۲۰٪ ضایعات تقطیری گندم بودند. جیره‌های آزمایشی بر اساس ذرت و کنجاله سویا با توجه به نیازمندی‌های توصیه شده توسط NRC (۱۹۹۴)، بر اساس آنالیز بدست آمده و با کمک نرم‌افزار جیره‌نویسی WUFFDA تنظیم گردید. کلیه مراحل مدیریت پرورش مطابق راهنمای مدیریت راس ۲۰۰۷ اجرا شد (۱۵).

روش‌های آزمایش

عملکرد

در پایان هر هفته با توزین مقدار خوراک باقیمانده و وزن بدن، مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. برای تصحیح شاخص‌ها، ابتدا روز مرغ هر واحد آزمایشی مطابق فرمول زیر محاسبه گردید.

عنوان بقایای تخمیر غلات نام گرفته است. تحقیقات بر ارزش غذایی تفاله خشک غلات تقطیر شده از ۵۰ سال پیش آغاز شده و همواره ادامه داشته است (۲۵). محتوی انرژی قابل متابولیسم بالا، پروتئین خام متوسط و فسفر قابل هضم، تفاله خشک گندم تقطیر شده را تبدیل به یک ماده غذایی با ارزش و ارزان قیمت نموده است (۱۹ و ۲۳). فرآیند تولید بر ارزش تغذیه‌ای DDGS تأثیر گذار است (۴) و حرارت می‌تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده در قابلیت هضم اسیدهای آمینه باشد. استفاده از DDGS در جیره طیور سودمندی‌هایی در عملکرد و رشد گونه‌های مختلف طیور نشان داد که مربوط به عوامل محرک رشد موجود در آن است (۱۱). DDGS می‌تواند در سطح ۱۰ تا ۲۰ درصد در جیره مرغ تخم‌گذار بدون تأثیر منفی بر تولید تخم‌مرغ همراه با مکمل لیزین استفاده شود (۸). همچنین این محققین گزارش کردند که DDGS می‌تواند در حدود ۳۰ درصد جایگزین پروتئین جیره مرغ‌های تخم‌گذار شود. خشک کردن سریع و با درجه حرارت بالا باعث از بین رفتن و آسیب به اسیدهای آمینه و پروتئین می‌شود (۷). به منظور ارزیابی کیفیت پروتئین DDGS به عنوان تنها منبع پروتئینی جیره در تغذیه جوجه‌های در حال رشد، اسیدهای آمینه تریپتوفان و آرژینین، بعد از لیزین، به عنوان دومین و سومین اسید آمینه محدودکننده گزارش شدند، اگرچه DDGS دارای محدودیت‌هایی در رابطه با تریپتوفان و آرژینین است، کیفیت پروتئین DDGS بوسیله مکمل لیزین به مقدار زیادی بالا می‌رود (۱۳).

در جریان مطالعه‌های آنزیم‌های هیدرولیز کننده NSP در جیره‌های حاوی DDGS استفاده شدند و تأثیر مثبتی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار داشتند (۲۰). در تحقیقی دیگر نشان داده شد که از ۵ تا ۸ درصد DDGS در جیره آغازین جوجه‌های گوشتی و بوقلمون، ۱۲ تا ۱۵ درصد در جیره‌های رشد و پایانی جوجه‌های گوشتی، بوقلمون و مرغ‌های تخم‌گذار بدون هیچگونه تأثیر منفی بر عملکرد می‌توان استفاده نمود (۱۶). هدف از انجام این آزمایش، بررسی امکان جایگزینی DDGS در جیره‌های جوجه‌های گوشتی در بازه زمانی ۲۱-۲۲ و ۴۲-۲۲ روزگی و بررسی اثرات سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم بر عملکرد و خصوصیات ریخت‌شناسی ژنوم در دوره‌های آغازین و پایانی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی ضایعات تقطیری گندم

قبل از شروع آزمایش، به منظور تعیین مقدار مواد مغذی موجود در ضایعات تقطیری گندم، به طور تصادفی از آن نمونه‌گیری به عمل آمد. نمونه‌ها برای آنالیز اسیدهای آمینه به آزمایشگاه مؤسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش‌گستر منتقل شدند. همچنین درصد پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، کلسیم و فسفر اندازه‌گیری شدند (۱).

جدول ۱- اجزای خوراک و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی (۱ تا ۲۱ روزگی)
Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (1 to 21 days)

اجزاء متشکله (درصد) Components (%)	گروه ۱ (شاهد) First treatment (control)	گروه ۲ Second treatment	گروه ۳ Third treatment	گروه ۴ fourth treatment	گروه ۵ Fifth treatment
ذرت Corn	58.5	57.6	56.7	55.2	52.8
کنجاله سویا Soybean meal	35.2	33.1	31.2	29.7	29
ضایعات تقطیری گندم DDGS	-	3	6	9	12
کربنات کلسیم Calcium carbonate	1.34	1.35	1.35	1.35	1.36
روغن سویا Soybean oil	1.7	1.55	1.37	1.32	1.43
دی‌کلسیم فسفات Di-calcium phosphate	1.8	1.81	1.8	1.81	1.81
نمک طعام Salt	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
ال-ترئونین L-Threonine,99	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13
دی‌ال-متیونین DL-Methionine,98	0.21	0.21	0.24	0.21	0.2
ال-لیزین هیدروکلراید L-Lysine HCl,78	0.22	0.26	0.29	0.31	0.3
مکمل مواد معدنی Mineral supplement ¹	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
مکمل ویتامینه Vitamin supplement ²	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Calculated analysis ترکیبات محاسبه شده					
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم) Metabolisable energy (kcal/kg)	2950	2950	2950	2950	2950
پروتئین خام (درصد) Crude protein (%)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
کلسیم (درصد) Calcium (%)	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
فسفر قابل دسترس (درصد) Available P (%)	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
متیونین (درصد) Methionine (%)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
لیزین (درصد) Lysine (%)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01

هر کیلوگرم جیره تأمین می‌کرد: ویتامین A: ۹۰۰۰ واحد بین المللی، ویتامین ای: ۶۵ واحد بین المللی، ویتامین د: ۵۰۰۰ واحد بین المللی، ویتامین کا: ۸۰ واحد بین المللی، سیانو کوبالامین: ۰/۱۵ میلی‌گرم، ریوفلاوین: ۶/۶ میلی‌گرم، کلسیم پانتوتات: ۱۰ میلی‌گرم، نیاسین: ۳۰ میلی‌گرم، کولین: ۵۰۰ میلی‌گرم، بیوتین: ۰/۱ میلی‌گرم، تیامین: ۱/۸ میلی‌گرم، پیریدوکسین: ۳ میلی‌گرم، اسید فولیک: ۱ میلی‌گرم، ویتامین منادیون: ۲ میلی‌گرم، آنتی‌اکسیدان (اتوکسی کوئین): ۱۰۰ میلی‌گرم بود.

هر کیلوگرم جیره تأمین می‌کرد: منگنز: ۱۰۰ میلی‌گرم، روی: ۵۰ میلی‌گرم، مس: ۱۰ میلی‌گرم، آهن: ۵۰ میلی‌گرم، یند: ۱ میلی‌گرم، سلنیوم: ۰/۲ میلی‌گرم بود.

¹Vitamin premix provided per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 15 mg; riboflavin 6.6 mg

²Mineral premix provided per kg of diet: Mn 100 mg; Zn 50 mg; Cu 10 mg; Fe 50 mg; I 1 mg; Se 2 mg.

کریپت به پرز تا پایه کریپت)، ارتفاع پرز/عمق پرز، عرض ابتدایی پرز، عرض میانی پرز، عرض انتهایی پرز بودند (۱۷).

آنالیز آماری

آنالیز اطلاعات به صورت یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. میانگین تمام گروه‌ها برای دوره آزمایش با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS، Version 9.2 تجزیه و تحلیل شدند. در ضمن مقایسات میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵٪ انجام شد.

نتایج و بحث

اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی و میزان اسیدهای آمینه ضایعات تقطیری گندم به ترتیب در جداول ۳ و ۴ گزارش شدند. کوزانت و همکاران (۳) مقادیر پروتئین خام، چربی خام و فیبر خام را در ده نمونه از ضایعات تقطیری گندم، به ترتیب در حدود ۳۶/۱، ۴/۶ و ۸/۳٪ گزارش کردند.

همچنین محتوای TME_n را برای ضایعات تقطیری گندم با دامنه‌ای بین ۲۴۹۰ تا ۳۱۹۰ با میانگین ۲۸۲۰ Kcal/kg گزارش کردند. مطابق مطالعه‌ای دیگر، محتوای TME_n برای ضایعات تقطیری گندم معادل ۲۸۷۱ Kcal/kg می‌باشد (۶). تفاوت‌هایی که بین ترکیبات شیمیایی ضایعات تقطیری گندم استفاده شده در این تحقیق با ترکیبات شیمیایی گندم‌های تقطیری در سایر مطالعات وجود دارد، ناشی از ژنوتیپ، شرایط آب و هوایی، مرحله رشد در زمان برداشت، حاصلخیزی و خصوصیات خاک، تغییر در طی نگهداری و فرآیند انبار کردن می‌باشد که این عوامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مقدار ماده خشک در نمونه تازه DDGS در مقایسه با نمونه‌ای که در ۲۰- و ۴+ درجه سانتی‌گراد ذخیره شدند، به ترتیب کاهش می‌یابد ولی میزان ویتامین E، ویتامین A و خصوصیات آنتی‌اکسیدانی افزایش یافت (۲۳).

عملکرد

آزمایش اول

میانگین صفات عملکردی در آزمایش اول به تفکیک در گروه‌های مختلف در ۱ تا ۱۰ روزگی، ۱۱ تا ۲۱ روزگی، و ۱ تا ۲۱ روزگی در جدول ۵ گزارش شده است.

روزجوجه = (تعداد جوجه‌های زنده در پایان دوره × طول دوره) + (تعداد روزهایی که جوجه‌های تلف شده زنده بودند × تعداد تلفات) سپس برای محاسبه شاخص عملکرد، میانگین خوراک مصرفی هر دوره بر تعداد روز جوجه تقسیم شد و همین‌طور برای محاسبه میانگین افزایش وزن، این عمل انجام شد.

ریخت‌شناسی

قطعات ژژونوم در ۲۱ و ۴۵ روزگی از دو پرند در هر تکرار جدا شد و با محلول کلرید سدیم (wt/vol) ۰/۹ در صد شسته شده و بعد از آبکشی، در بافر فرمالدئید ۴ درصد ثابت شدند. از ژژونوم به دلیل اینکه اهمیت بالایی در جذب مواد غذایی دارد، نمونه‌گیری به عمل آمد (۱۷). سپس نمونه‌های بافتی توسط دستگاه اتومات فرآوری بافت LT201 processor (Tissue)، در طی ۱۸ ساعت آبگیری، شفاف سازی و پارافین دهی شد. بعد از خارج کردن نمونه‌های بافتی، قالب‌گیری بو سیله قالب‌های لوکهارت و در پارافین مرک انجام گرفت و از بلوک‌های پارافین منجمد شده حاوی بافت، توسط دستگاه میکروتوم (LEICA RM ۲۱۴۵)، برش‌هایی به ضخامت ۶ میکرومتر تهیه شد. سپس برش‌های ایجاد شده را روی لام قرار داده و به منظور اینکه پارافین به لام نچسبد، آب و الکل بر آن ریخته و سپس لام در حمام بن‌ماری با دمای ۴۹ درجه سانتی‌گراد (دمای ذوب پارافین) قرار گرفت تا ورقه مربوطه صاف شود و چین و چروک‌ها از بین بروند. برای تهیه چسب روی لام، از سفیده تخم‌مرغ و گلیسرین به میزان مساوی استفاده شد. سپس چسب را روی لام ریخته و به این ترتیب باز شدن چین و چروک‌ها تست شد، در صورتی که چین و چروک‌ها باز نشده بودند، لام‌ها دوباره در آب قرار می‌گرفتند. سپس لام‌ها به مدت ۲ تا ۳ ساعت در دمای محیط آزمایشگاه گذاشته شدند تا خشک شوند. نمونه‌های خشک شده در گزیلل یک و دو، هر کدام به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفتند تا پارافین آنها جذب شده و مجدداً نمونه‌ها در دمای محیط خشک شدند. سپس نمونه‌ها در ظروف حاوی الکل مطلق به ترتیب با درصدهای ۹۹/۸، ۹۶، ۸۰ و ۷۰ درصد به مدت ۲ تا ۳ دقیقه گذاشته شدند تا آبدهی آنها انجام شود و سپس در آب مقطر شستشو داده شدند. آماده شدن نمونه‌ها در رنگ آمیزی‌های مختلف تا این مرحله مشترک است که تحت عنوان دپارافینه شدن و آبدهی با آب مقطر می‌باشد. سپس رنگ آمیزی اختصاصی هماتوکسیلین-ئوزین انجام شد. پارامترهای که اندازه‌گیری شد شامل ارتفاع پرز (از نوک پرز تا محل اتصال پرز به کریپت)، عمق کریپت (از محل اتصال

جدول ۲- اجزای خوراک و ترکیب شیمیایی جیره‌های آزمایشی (۲۲ تا ۴۲ روزگی)

Table 2- Ingredients and chemical composition of experimental diets (22 to 42 days)

اجزاء متشکله (درصد) Components (%)	گروه آزمایشی اول (شاهد) First experimental group (control)	گروه آزمایشی دوم Second experimental group	گروه آزمایشی سوم Third experimental group	گروه آزمایشی چهارم The fourth experimental group	گروه آزمایشی پنجم Fifth experimental Group
ذرت corn	63.6	62.1	60.5	57	57.4
کنجاله سویا Soybean meal	30.6	27.3	24	20.8	17.5
ضایعات تقطیری گندم DDGS	-	5	10	15	20
کربنات کلسیم Calcium carbonate	1.08	1.1	1.11	1.12	1.13
روغن سویا Soybean oil	1.59	1.33	1.1	0.84	0.6
دی کلسیم فسفات Dicalcium phosphate	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87
نمک طعام Salt	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ال-ترونین %L-Threonine,99	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
دی ال-متیونین %DL-Methionine,98	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16
ال-لیزین %L-Lysine HCl,78	0.11	0.16	0.21	0.27	0.32
مکمل معدنی Mineral supplement	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
مکمل ویتامینه Vitamin supplement	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
کولین Choline	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Calculated analysis					
ترکیبات محاسبه شده					
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم) Metabolisable energy (kcal /kg)	2950	2950	2950	2950	2950
پروتئین خام (درصد) Crude protein (%)	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
کلسیم (درصد) Calcium (%)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
فسفر قابل دسترس (درصد) Available phosphorous (%)	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
متیونین (درصد) Methionine (%)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
لیزین (درصد) Lysine(%)	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92

^۱هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین آ: ۹۰۰۰ واحد بین المللی، ویتامین ای: ۶۵ واحد بین المللی، ویتامین د: ۵۰۰۰ واحد بین المللی، ویتامین کا: ۸۰ واحد بین المللی، سیانوکوبالامین: ۰/۱۵ میلی‌گرم، ریبوفلاوین: ۶/۶ میلی‌گرم، کلسیم پانتوتات: ۱۰ میلی‌گرم، نیاسین: ۳۰ میلی‌گرم، کولین: ۵۰۰ میلی‌گرم، بیوتین: ۰/۱ میلی‌گرم، تیامین: ۱/۸ میلی‌گرم، پیریدوکسین: ۳ میلی‌گرم، اسید فولیک: ۱ میلی‌گرم، ویتامین منادیون: ۲ میلی‌گرم، آنتی‌اکسیدان (توکسی کوئین): ۱۰۰ میلی‌گرم بود.

^۲هر کیلوگرم جیره حاوی: منگنز: ۱۰۰ میلی‌گرم، روی: ۵۰ میلی‌گرم، مس: ۱۰ میلی‌گرم، آهن: ۵۰ میلی‌گرم، ید: ۱ میلی‌گرم، سلنیوم: ۰/۲ میلی‌گرم بود.

^۱Vitamin premix per kg of diet: vitamin A 9000 IU; vitamin E 65 IU; vitamin D 5000 iu; VITAMIN k 80 IU; cyano cobalamin 15 mg; riboflavin 6.6 mg

^۲Mineral premix per kg of diet: mn 100 mg; zn 50 mg; cu 10 mg; fe 50 mg; I 1 mg; se 2 mg.

جدول ۳- ترکیبات شیمیایی ضایعات تقطیری گندم خشک

Table 3- Chemical compounds of distillation of dry wheat

ترکیبات شیمیایی Chemical compounds	مقادیر amounts
رطوبت (%) Humidity (%)	7.00
خاکستر (%) Ash (%)	4.76
چربی (%) Fat (%)	8.40
پروتئین خام (%) Crud Protein (%)	30.52
فیبر (%) Fiber (%)	4.00
کلسیم (%) Calcium (%)	0.26
فسفر (%) Phosphorus (%)	0.93
سدیم (ppm) Sodium (ppm)	395

جدول ۴- پروفایل اسیدهای آمینه ضایعات تقطیری گندم

Table 4- Distillation wheat amino acid profiles

اسیدهای آمینه Amino acids	مقادیر amounts
دی ال- متیونین (%) DL-Methionine (%)	0.53
تریپتوفان (%) Tryptophan (%)	0.245
اسید آسپارتیک (%) Aspartic Acid (%)	2.14
اسید گلوتامیک (%) Glutamic Acid (%)	12.83
سرین (%) Serine (%)	1.79
هیستیدین (%) Histidine (%)	0.69
آلانین (%) Alanine (%)	1.97
تایروزین (%) Tyrosine (%)	0.87
والین (%) Valine (%)	2.36
فنیل آلانین (%) Phenylalanine (%)	1.62
ایزولوسین (%) Isoleucine (%)	1.08
لوسین (%) Leucine (%)	2.37
لیزین (%) Lysine (%)	0.57

یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشته ولی با گروه حاوی ۳ درصد گندم اختلاف معنی‌داری ایجاد کرد ($P < 0.05$). نتایج حاکی از آن است که میانگین افزایش وزن بدن در کل دوره پرورش (۱ تا ۲۱ روزگی) بین گروه‌های مختلف آزمایشی دارای تفاوت معنی‌داری بود ($P < 0.05$). به طوری که بیشترین میانگین افزایش وزن مربوط به گروه حاوی ۳ درصد و گروه شاهد (۸۴۶/۷۴ و ۸۴۷/۳۱ گرم) به ترتیب بود.

افزایش وزن در ۱ تا ۱۰ روزگی بین گروه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد، اگرچه جوجه‌های تغذیه شده با ۳ درصد ضایعات تقطیری گندم افزایش وزن بیشتری (۲۳۱/۱۱ گرم) نسبت به گروه شاهد و سایر گروه‌ها و گروه شاهد نشان دادند. همین روند در بازه سنی ۱۱ تا ۲۱ روزگی نیز مشاهده شد و اختلاف ایجاد شده معنی‌دار گردید ($P < 0.05$)، به طوری که گروه شاهد و سایر گروه‌ها با

جدول ۵- تأثیر سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در سن ۱ تا ۲۱ روزگی^۱
Table 5- Effect of DDGS on performance of broiler chickens at 1- 21 days of age¹

گروه‌ها Treatments	افزایش وزن بدن (گرم/پرنده/دوره) Body weight gain (g/b/period)		مصرف خوراک (گرم/پرنده/دوره) Feed intake (g/b/period)		ضریب تبدیل غذایی Feed conversion (g/g)				
	۱ تا ۱۰ روزگی 1 to 10 days	۱۱ تا ۲۱ روزگی 11 to 21 days	۱ تا ۱۰ روزگی 1 to 10 days	۱۱ تا ۲۱ روزگی 11 to 21 days	۱ تا ۱۰ روزگی 1 to 10 days	۱۱ تا ۲۱ روزگی 11 to 21 days	۲۱ تا ۱ روزگی 1 to 21 days		
شاهد control	229.52	617.22 ^b	846.74 ^a	288.13	870.47	1158.6 ^a	1.2553	1.4103	1.3683
3%	231.11	627.84 ^a	847.31 ^a	290.04	873.14	1163.18 ^a	1.2549	1.3996	1.3727
6%	228.72	623.61 ^b	841.69 ^{ab}	283.23	871.11	1154.34 ^a	1.2383	1.3879	1.3714
9%	224.19	622.90 ^b	837.51 ^b	281.99	869.87	1151.86 ^a	1.2578	1.3964	1.3753
12%	223.05	620.48 ^b	837.11 ^b	277.12	859.47	1136.59 ^b	1.2424	1.3851	1.3577
SEM	6.37	7.19	19.65	7.12	18.39	4.11	0.032	0.048	0.039
P-value	0.33	0.048	0.047	0.39	0.41	0.05	0.42	0.31	0.52

^۱در هر ستون میانگین‌های دارای حروف غیرمشترک با هم اختلاف معنی‌داری دارند ($P < 0.05$).

¹Means within same column with different superscripts differ ($P < 0.05$).

سنین مختلف ایجاد نکرد و بدترین ضریب تبدیل خوراک متعلق به گروه حاوی ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم در بازه سنی ۱ تا ۲۱ روزگی بود. جیره حاوی ۳ درصد ضایعات تقطیری گندم در بازه زمانی ۱ تا ۲۱ روزگی بهترین نتیجه را ایجاد کرد که می‌توان به تنوع مواد خوراکی موجود در جیره خوراکی نسبت داده و از طرفی در این سطح میزان فیبر جیره افزایش چندانی نداشته که باعث کاهش مصرف خوراک و کاهش عملکرد حیوان شود ولی سطح ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم باعث افزایش میزان پلی‌ساکاریدهای غیرقابل هضم شده و مصرف خوراک را کاهش داد، لذا وزن حیوان کاهش یافت. استفاده از DDGS به علت محتوی فیبر بالا بر مصرف خوراک، برداشت مواد مغذی و سلامت متابولیک تأثیرگذار است (۲۵). فرآوری گندم در جهت تولید ضایعات تقطیری گندم باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در درصد پروتئین خام (۳۰/۵ درصد) نسبت به گندم خواهد شد، همچنین میزان فیبرخام (۳ درصد) نیز کاهش می‌یابد و جایگزینی چنین مواد خوراکی با پروتئینی بیشتر از ذرت و فیبرخام کمتر از سویا

افزایش سطح DDGS به ۹ تا ۱۲٪ موجب کاهش معنی‌داری در وزن بدن جوجه‌های گوشتی می‌شود. این محققین اشاره کردند که انرژی پایین DDGS جیره احتمالاً فاکتوری محدود کننده در نیازهای جوجه‌ها است (۱۶).

مصرف خوراک در پرندگان تحت آزمایش در بازه سنی ۱ تا ۱۰ روزگی و ۱۱ تا ۲۱ روزگی تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد،

ولی در سن ۱ تا ۲۱ روزگی تفاوت معنی‌دار بود ($P < 0.05$)، به طوری که جوجه‌های تغذیه شده با سطح ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم مصرف خوراک کمتری (۱۱۳۶/۵۹ گرم) نسبت به سایر گروه‌ها و گروه شاهد داشتند. افزودن ۱۰ درصد DDGS اثر منفی بر مصرف خوراک نداشت (۵). مصرف غلاتی مثل گندم به دلیل وجود پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای و استفاده از آنها در جیره غذایی بدون عمل‌آوری، سبب افزایش ویسکوزیته دستگاه گوارش شده و از طریق پوشش سطح مواد غذایی، دسترسی آنزیم‌ها به مواد مغذی و قابلیت هضم را کاهش می‌دهد. ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی‌داری بین

عادت‌پذیری (پرنده ۷ روز ضایعات تقطیری گندم مصرف کرده است) مصرف سطوح بالاتر ضایعات تقطیری گندم (۱۵ و ۲۰ درصد) باعث وزن بیشتری در جوجه‌های تغذیه شده با این سطوح نمود ($P < 0.05$)؛ به طوری که افزایش وزن در جوجه‌های تغذیه شده با ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم در این فواصل زمانی نسبت به گروه شاهد و سایر گروه‌ها از مقادیر بیشتری برخوردار شد.

مصرف خوراک در جوجه‌های تغذیه شده با سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم در بازه زمانی‌های مختلف تفاوت معنی‌داری ایجاد نکرد اگرچه با طی شدن دوره عادت‌پذیری، در سنین بالاتر، مصرف خوراک نسبت به هفته اول، افزایش یافت.

افزودن DDGS تا سطح ۲۵ درصد برای مرغ‌های لگه‌ورن (۲۴ هفته) اثر منفی بر مصرف خوراک ندارد (۵). همچنین افزودن ۱۰ درصد DDGS اثر منفی بر مصرف خوراک نداشت. مصرف غلاتی مثل گندم به دلیل وجود پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای موجود در آنها و استفاده از آنها در جیره غذایی بدون عمل‌آوری، سبب افزایش ویسکوزیته دستگاه گوارش شده و از طریق پوشش سطح مواد غذایی، دسترسی آنزیم‌ها به مواد مغذی و قابلیت هضم را کاهش می‌دهد. افزایش سن باعث تکامل دستگاه گوارش و آنزیم‌های مربوطه می‌شود و تا حدودی اثرات منفی ناشی از افزایش سطح فیبر در جیره خوراکی کاهش می‌یابد (۹). کاهش قابلیت هضم مواد مغذی منجر به کاهش وزن خواهد شد.

(۳ درصد در مقایسه با ۷ درصد) در جیره‌هایی بر پایه ذرت - کنجاله سویا منجر به تنوع مواد خوراکی شده و بعد از طی نمودن دوره عادت‌پذیری و تکامل دستگاه گوارش نتایج بهتری به همراه خواهد داشت.

عملکرد در آزمایش دوم

همان طور که در پیشتر نیز ذکر شد، در آزمایش دوم، جوجه‌ها از سن ۱ تا ۲۱ روزگی مطابق احتیاجات با جیره‌ای بر پایه ذرت و کنجاله سویا تغذیه شدند؛ گروه‌های آزمایشی از سن ۲۲ روزگی به مصرف پرنده‌گان رسید. تأثیر سطوح مختلف ضایعات تقطیری گندم بر افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در آزمایش دوم در جدول ۶ نمایش داده شده است. همان طور که از این جدول استنتاج می‌شود، میانگین افزایش وزن بدن در بازه سنی ۲۲ تا ۲۹ روزگی، در گروه حاوی ۵ (۵۸۱/۲۲ گرم) و ۱۰ (۵۸۰/۷۱ گرم) ضایعات تقطیری گندم نسبت به گروه شاهد (۵۷۶/۳۷ گرم) و گروه حاوی ۱۵ و ۲۰ درصد به ترتیب (۵۷۹/۸۱ و ۵۷۵/۲۷ گرم) ضایعات تقطیری گندم بیشتر است، اگرچه این تفاوت‌ها معنی‌دار نبود. مصرف ضایعات تقطیری گندم در سطوح ۵ و ۱۰ درصد باعث ایجاد اثرات متقابل و تنوع مواد خوراکی در جیره غذایی شده و با توجه به تکامل دستگاه گوارش در این سن، آنزیم‌های لازم برای هضم و جذب این سطوح از ضایعات تقطیری گندم وجود دارد و با افزایش سطح مصرف، به دلیل بالا رفتن سطح فیبر در جیره خوراکی، افزایش وزن کاهش می‌یابد. در سنین ۳۰ تا ۳۷ روزگی و ۳۸ تا ۴۵ روزگی، با توجه به طی شدن دوره

جدول ۶- تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیری گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در سن ۲۲ تا ۴۵ روزگی^۱

Table 6- Effect of DDGS on performance of broiler chickens at 22- 45 days of age¹

گروه‌ها treatments	افزایش وزن (گرم) Body weight gain (gr)			مصرف خوراک (گرم) Feed intake (gr)			ضریب تبدیل خوراک (گرم/گرم) Feed conversion (gr/gr)		
	۲۹ تا ۳۲ روزگی 22 to 29 days	۳۰ تا ۳۷ روزگی 30 to 37 days	۳۸ تا ۴۵ روزگی 38 to 45 days	۲۲ تا ۲۹ روزگی 22 to 29 days	۳۰ تا ۳۷ روزگی 30 to 37 days	۳۸ تا ۴۵ روزگی 38 to 45 days	۲۹ تا ۳۲ روزگی 22 to 29 days	۳۰ تا ۳۷ روزگی 30 to 37 days	۳۸ تا ۴۵ روزگی 38 to 45 days
شاهد control	576.37	643.76 ^c	652.99 ^b	955.23	1240.64	1460.79	1.6573	1.9271	2.2370
5%	581.22	645.84 ^{bc}	656.73 ^b	956.41	1240.93	1461.59	1.6455	1.9214	2.2255
10%	580.71	650.92 ^b	658.90 ^b	955.41	1241.66	1462.30	1.6452	1.9075	2.2193
15%	579.81	652.31 ^{ab}	669.73 ^a	954.94	1242.87	1465.21	1.6469	1.9053	2.1877
20%	575.27	657.39 ^a	676.59 ^a	950.77	1245.23	1466.38	1.6527	1.8942	2.1673
SEM	30.94	34.69	36.21	39.27	52.48	64.32	0.076	0.098	0.312
P value	0.0912	0.0482	0.0463	0.179	0.183	0.0937	0.421	0.532	0.389

^۱در هر ستون میانگین‌های دارای حروف غیرمشترک با هم اختلاف معنی‌داری دارند ($P < 0.05$).

¹Means within same column with different superscripts differ ($P < 0.05$).

تغذیه شده با ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم به لحاظ عددی مساوی

در بازه سنی ۲۲ تا ۲۹ روزگی ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های

افزایش ترن‌آور سلولی^۱ ارتفاع پرز کاهش و عمق کریپت افزایش می‌یابد. گزارش شده است که به پرزهای روده و غشاء مخاطی روده کوچک جوجه‌های گوشتی که با جیره حاوی ۸۰ درصد چاودار تغذیه شدند آسیب زیادی وارد شد (۱۴).

کوتاه‌تر شدن و ضخیم‌تر شدن پرزهای روده کوچک و افزایش تعداد سلول‌های گابلت در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با دانه جو نیز گزارش شده است (۲۱).

افزودن آنزیم زایلاناز به جیره‌های حاوی گندم باعث افزایش ارتفاع پرز شده ولی تأثیری بر عمق کریپت نداشت (۲۴). استفاده از پس‌ماند ضایعات تقطیری گندم در جیره، تأثیر منفی بر مورفولوژی روده و میزان مرگ و میر ندارد (۹). تغییرات در مورفولوژی سلول‌های روده به علل متفاوتی از قبیل ساختار فیزیکی مواد غذایی و فرم خوراک و ماهیت شیمیایی مواد آزمایشی می‌تواند باشد (۱۰).

نتایج مندرج در جدول ۸ نشان می‌دهد که هیچ یک از صفات مربوط به ریخت‌شناسی روده به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر گروه‌های آزمایشی مختلف قرار نگرفته‌اند. بررسی نتایج مربوط به ارتفاع پرز نشان می‌دهد که گروه‌های دریافت‌کننده سطوح ۱۵ و ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم نسبت به گروه شاهد به لحاظ عددی موجب کاهش این صفت مهم روده شده‌اند. همچنین بررسی نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت نشانگر آن است که به لحاظ عددی گروه‌های دریافت‌کننده سطوح ۱۵ و ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم نسبت به گروه شاهد موجب کاهش این نسبت شده‌اند. از طرفی، عرض پرز در بررسی هر سه شاخص آن (ابتدایی، میانی و انتهایی) نشان می‌دهد که با افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم این صفت روده نیز به لحاظ عددی کاهش یافته است.

بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم در گروه‌های آزمایش، منجر به کاهش ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شده است، که با کاهش عددی در گروه‌های دریافت‌کننده ضایعات تقطیری گندم همراه می‌باشند. همچنین افزایش عددی اندکی در عمق کریپت گروه‌های دریافت‌کننده ضایعات تقطیری گندم مشاهده می‌شود، لذا نقش همپوشانی بین این یافته‌ها و هم‌راستا بودن با نتایج سایر محققین وجود داشته و تأثیر سوء استفاده از غلات حاوی پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر ریخت‌شناسی روده باریک را تأیید می‌کند. این تأثیر منفی در مورد غلات مختلف متفاوت بوده و هر غله‌ای بازه‌ای از سطوح برای استفاده در جیره را دارا می‌باشد. بررسی نتایج اولین پژوهش، استفاده از سطح ۳ درصد ضایعات تقطیری گندم را برای بدست آوردن بهترین نتیجه در جیره آغازین جوجه‌های گوشتی تأیید می‌نماید.

ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های تغذیه شده با گروه شاهد شد و سایر گروه‌ها به لحاظ عددی ضریب تبدیل غذایی کمتری داشتند؛ اگرچه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد و همچنین در بازه سنی ۳۰ تا ۳۷ روزگی و ۳۸ تا ۴۵ روزگی نیز اختلاف معنی‌داری بین مقادیر ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد.

بهبود ضریب تبدیل خوراک در گروه حاوی ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم نسبت به سایر گروه‌ها و گروه شاهد ملاحظه می‌شود. با افزایش سن، به دلیل تکامل دستگاه گوارش و آنزیم‌های مربوطه، مصرف سطوح بیشتر ضایعات تقطیری گندم باعث بروز عملکرد بهتری شده است. در طول فرآیند خشک کردن DDGS، مواد در معرض حرارت ۲۶۰ تا ۱۱۵۰ درجه فارنهایت وابسته به کارخانه اتانول‌گیری قرار می‌گیرند. این افزایش حرارت تا حدودی بر قابلیت هضم فیبر تأثیرگذار است و باعث بهبود آن می‌شود (۲۲). در بازه سنی ۷ تا ۲۱ روزگی سطح ۲۰ درصد DDGS را در جیره غذایی به منظور تخمین ارزش غذایی این ماده خوراکی در شرایط دمایی مختلف استفاده کردند (۲۳).

ریخت‌شناسی روده

بررسی نتایج مربوط به ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت (جدول ۷) در بازه زمانی ۱ تا ۲۱ روزگی نشان می‌دهد که گروه دریافت‌کننده سطح ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم نسبت به گروه شاهد و نیز سایر گروه‌ها به لحاظ عددی موجب کاهش ارتفاع پرز شده و گروه‌های دریافت‌کننده سطوح ۶، ۹ و ۱۲ درصد ضایعات تقطیری گندم نسبت به دو گروه دیگر به لحاظ عددی موجب کاهش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شده‌اند. با افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم در جیره خوراکی پرندگان تحت مطالعه، عمق کریپت افزایش یافت، اگرچه این افزایش معنی‌دار نبود. مطابق نتایج جدول ۷، مقادیر عددی عرض ابتدایی، میانی و انتهایی پرز به ترتیب افزایش پیدا کرد، همچنین افزایش سطح ضایعات تقطیری گندم در جوجه‌های این آزمایش منجر به کاهش صفات مربوطه شد. هیچ اختلاف معنی‌داری در این صفات مشاهده نشد.

کاهش ارتفاع پرز و افزایش عمق کریپت در نتیجه استفاده از دانه گندم در مقایسه با ذرت گزارش شده است (۱۸). ویسکوزیته بالای محتویات گوارشی سبب کاهش ارتفاع پرز می‌شود. دلیل این موضوع را می‌توان به تخریب و تحلیل سلول‌های پوششی نوک پرز توسط فیبر نسبت داد، با افزایش آنزومی این سلول‌ها، فعالیت سلول‌های زاینده موجود در عمق کریپت برای ساخت سلول‌های پوششی و جایگزین نمودن آنها با سلول‌های آتروفی شده افزایش می‌یابد. با

جدول ۷- تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیری گندم بر ریخت‌شناسی ژنوم جوجه‌های گوشتی در ۲۱ روزگی (میکرومتر)^۱
Table 7- Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 days¹

گروه‌ها Treatments	ضایعات تقطیری گندم (DDGS)				خطای استاندارد SEM	سطح احتمال P-value
	شاهد Control	3%	6%	9%		
ارتفاع پرز (میکرومتر) Height of villi (µm)	890.14	889.54	885.66	885.83	24.96	0.71
عمق کریپت (میکرومتر) Crypt depth (µm)	156.79	156.99	159.11	160.34	161.82	15.8
ارتفاع پرز / عمق کریپت Height of villi / depth of crypt	5.67	5.66	5.56	5.52	5.44	0.6
عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) Villi top width (µm)	64.31	64.01	60.11	59.37	59.84	12.48
عرض میانی پرز (میکرومتر) Villus middle width (µm)	106.12	104.02	103.44	103.00	102.79	14.28
عرض انتهایی پرز (میکرومتر) Villi end width (µm)	108.33	105.79	103.95	99.73	91.51	14.01

^۱در هر ستون میانگین‌های دارای حروف غیرمشترک با هم اختلاف معنی‌داری دارند (P<0.05).

^۱Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

جدول ۸- تأثیر مقادیر مختلف ضایعات تقطیری گندم بر ریخت‌شناسی ژنوم جوجه‌های گوشتی در سن ۴۵ روزگی^۱
Table 8- Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 45 days¹

گروه‌ها Treatments	ضایعات تقطیری گندم (DDGS)				خطای استاندارد SEM	سطح احتمال P-value
	شاهد Control	5%	10%	15%		
ارتفاع پرز (میکرومتر) Height of villi (µm)	1326.1	1326.4	1324.71	1321.5	1321.1	91.95
عمق کریپت (میکرومتر) Crypt depth (µm)	220.75	222.75	223	223.11	223.75	17.8
ارتفاع پرز / عمق کریپت Height of villi / depth of crypt	6.007	5.95	5.86	5.81	5.75	0.64
عرض ابتدایی پرز (میکرومتر) Villi top width (µm)	145	144.5	143.65	142.75	140.00	15.99
عرض میانی پرز (میکرومتر) Middle villi Length (µm)	200.12	200.01	196.87	195.11	191.99	16.21
عرض انتهایی پرز (میکرومتر) Villi end width (µm)	208.25	207.25	203.67	203.75	199.01	17.27

^۱در هر ستون میانگین‌های دارای حروف غیرمشترک با هم اختلاف معنی‌داری دارند (P<0.05).

^۱Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان اظهار داشت که استفاده از ضایعات تقطیری گندم در بازه سنی ۱ تا ۲۱ روزگی، با توجه به عدم تکامل دستگاه گوارش در اوایل دوره پرورش، در سطوح

مطابق نتایج حاصل از آزمایش دوم، تأثیر سوء استفاده از غلات حاوی پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر مورفولوژی روده تأیید می‌شود. بررسی نتایج پژوهش دوم، استفاده از سطح ۲۰ درصد ضایعات تقطیری گندم برای بدست آوردن بهترین عملکرد را تأیید می‌کند.

گندم توصیه می‌شود. با افزایش سن، به دلیل تکامل دستگاه گوارش و طی شدن دوره عادت‌پذیری به ضایعات تقطیری گندم، به خصوص از سن ۳۸ روزگی به بعد، جایگزینی ضایعات تقطیری گندم با ذرت و کنجاله سویا نتایج مناسبی ایجاد خواهد کرد.

بالا، نتایج مطلوبی ایجاد نخواهد کرد و سطح ۳ درصد ضایعات تقطیری گندم باعث ایجاد تنوع در جیره خوراکی شده و بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت. در بازه سنی ۲۲ تا ۴۵ روزگی سطح ۲۰ درصد ضایعات تقطیری

منابع

1. AOAC International. 2012. Official Methods of Analysis. 19 th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.
2. Ceerqin, C., N. K. Morgan, S. B. Wu, R. A. Swick, and M. Choct. 2017. Dietary inclusion of arabinoxyloligosaccharides in response to broilers challenges with subclinical necrotic enteritis. *British Poultry Science*, 58 (4): 418-424.
3. Cozannet, P., M. Lessire, C. Gady, J. P. Metayer, Y. Primot, F. Skiba, and J. Noblet. 2010. Energy value of wheat dried distillers grains with solubles in roosters, broilers, layers, and turkeys. *Poultry Science*, 89(10): 2230-2241.
4. Cromwell, G.L., Herkelman, K.L. and T. S. Stahly. 1993. Physical, chemical, and nutritional characteristics of distillers dried grains with solubles for chicks and pigs. *Journal Animal of Science*, 71: 679-686.
5. Falahnomeli, A. 2012. Effect of wheat distillers dried grains with or without enzyme on egg quality, blood composition and performance of laying hens. Animal Science Department of Agriculture Faculty of Ferdowsi University. MSC project. (In persian)
6. Fastinger, N.D., J. D. Latshaw, and D. C. Mahan. 2006. Amino acid availability and true metabolizable energy content of corn distillers dried grains with solubles in adult cecectomized roosters. *Poultry Science*, 85: 1212-1216.
7. Lumpkins, B.S., A. B. Batal, and N. M. Dale. 2003. The effects of distiller's dried grains plus soluble fed to laying hens. *Poultry Science*, 82 (Suppl 1): 104. (Abstract).
8. Matterson, L.D., J. Tlostuhowicz, and E. P. Singsen. 1966. Corn distillers dried grains with solubles in rations for high-producing hens. *Poultry Science*, 45: 147-151.
9. Min, Y. N., H. L. Li, L. Li, Z. Y. Niu, L. J. Wang, S. L. Liu, J. Zhang, and F. Z. Liu. 2013. Effects of dietary distillers dried grains soluble concentrations on intestinal morphology of broiler chicken. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 12 (1): 6-9.
10. Nemati, M. H., N. Osanloo, and N. Nobakht. 2015. Effect of feeding raw and processed triticale grain on performance and morphology of small intestinal mucosa in broilers. *Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi)*, 109:83-94. (In persian)
11. Noll, S.L., J. Brannon, and C. Parsons. 2007. Nutritional value of corn distiller dried grains with solubles (DDGs): Influence of solubles addition. *Poultry Science*, 86 (Suppl. 1): 68.
12. NRC. 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC.
13. Parsons, C.M., D. H. Baker, and J. M. Harter. 1983. Distillers dried grains with solubles as a protein source for the chick. *Poultry Science*, 62: 2445-2451.
14. Rakowska, M., B. Rek-Cieply, E. Lipinska, T. Kubinski, I. Barcz, and B. Afanasjstoev. 1993. The effect of rye, probiotics and niasin on fecal flora and histology of the small intestine of chicks. *Journal of Animal Science*, 2: 73-81.
15. Ross Broiler Nutrition Specification. 2017. Home page address: <http://www.aviagen.com>
16. Scheideler, S. E., M. Masadah, and K. Roberson. 2008. Dried distillers grains with solubles in laying hens ration and notes about mycotoxins in DDGS. In Pre-Show Nutrition Symposium, Midwest Poultry Federation Convention, March 18-20 St. Paul, MN.
17. Sepheri Moghadam, H., H. Nasiri Moghadam, H. Kermanshahi, A. Heravi, and A. Raji. 2011. The effect of threonine on mucin2 gene expression, intestinal histology and performance of broiler chickens. *Italian Journal of Animal Science*, 10(2): 64-71.
18. Shahir, M., S. Moradi, A. Afsariyan, and A. Heydarinia. 2011. Effect of enzyme and organic acid in corn-wheat basal diet on performance and small intestine morphology of broiler. *Iranian Journal of Animal Science Research*, 3(4):351-362. (In persian).
19. Spiehs, M.J., M. H. Whitney, and G. C. Shorsen. 2002. Nutrient database for distiller's dried grains with solubles produced from new ethanol plants in Minnesota and South Dakota. *Journal of Animal Science*, 80: 2639-2645.
20. Swiatkiewicz, S., and J. Koreleski. 2006. Effect of maize distillers dried grains with soluble and dietary enzyme supplementation on the performance of laying hens. *Journal of Animal and Feed Science*, 5: 253-260.
21. Viveros, A., A. Brenes, M. Pizarro, and M. Castanb. 1994. Effect of enzyme supplementation of a diet based on barely, on apparent digestibility, growth performance and gut morphology of broilers. *Animal Feed Science and Technology*, 48: 237-251.
22. Warnick, R.E., and J. O. Anderson. 1968. Limiting essential amino acids in soybean meal for growing chickens and effects of heat upon availability of essential amino acids. *Poultry Science*, 47: 281-28.
23. Whiting, I., V. Pirgozliev, S. P. Rose, F. Karadas, M. W. Mirza, and A. Sharpe. 2018. The temperature of storage of a

- batch of wheat distillers dried grains with solubles samples on their nutritive value for broilers. *British Poultry Science*, 59 (1): 76-80.
24. Wu, Y. B., V. Ravindran, D.G. Thomas, M. J. Birtles, and W. H. Hendriks. 2004. Influence of method of whole wheat inclusion and xylanase supplementation on the performance, apparent metabolisable energy, digestive tract measurements and gut morphology of broilers. *British Poultry Science*, 45: 385-394.
25. Youngji, R., E. Kiarie, and F. M. Lange. 2018. Nutritive value of corn distillers dried grains with solubles steeped without or with exogenous feed enzyme for 24h and fed to growing pigs. *Journal of Animal Science*, 96 (4): 2352-2360.



Determination of wheat distillers dried grains Analysis and effect DDGS on performance and histological characteristics of jejunum in broiler chickens in starter and finisher

Heshmat Sepehri Moghadam^{1*}, Zainab Noori², Amir Azarli³ and Alireza Hesabi Nameghi⁴

Submitted: 22-07-2018

Accepted: 10-02-2020

Introduction Emerging low cost animal feed stock, originating from bioprocessing and food production is increasing on a global scale. In particular, dried distillers' grains soluble (DDGS) is a by-product of the ethanol industry created in the fermentation process of cereal grains starch in dry mill ethanol plants. DDGS is defined as the product obtained after removal of ethyl alcohol by distillation from the yeast fermentation of a grain or a grain mixture by condensing and drying at least 75% of the resultant whole stillage by methods employed in the grain distilling industry. DDGS present a high concentration of energy, protein. Especially with respect to the original grains. DDGS are mainly obtained from corn, wheat, barley, sorghum and rice, as well as from grain blends. DDGS could be considered a poultry feed stuff as an alternative source of protein in poultry ration with other protein source or after dietary supplementation with lysine. The aim of this study is to investigate the effect of different levels of DDGS on performance and histology of jejunum in broiler chicken in starter, grower and finisher and analyzed DDGS.

Materials and Methods This experiment was done in 2 periods (first experiment was 1-21 days and second was 22-42 days). In first experiment 450 multiple Ross 308 broiler chicks were divided randomly into 5 experimental treatments and 6 replicates and second experiment had 5 treatment and 6 replicates and each replicate was assigned to a pen with 15 birds. Birds had given ad-libitum access to water drinking and diet. The experimental treatments received a basal diet that was supplemented as follows: control (without DDGS), 3%, 6%, 9% and 12% DDGS at first experiment and control (without DDGS), 5%, 10%, 15% and 20% DDGS at the second experiment. Prior to formulating the experimental diets, it was analyzed for dry matter, protein, amino acids, fat, crude fiber, ash. The amount of feed intake and body weight gain were measured weekly. At 21 and 45 days, 2 birds of each replicate were killed and intestinal segments removed. Samples (approximately 4 cm) were taken from the midpoint between the point of entry of the bile duct and Meckel's diverticulum (jejunum) for histology characteristics. Data were analyzed using GLM procedures of SAS software (SAS, 2006) in a completely randomized design. Differences between means were tested using Duncan's test (1995). Differences were considered significant at $P < 0.05$.

Results and Discussion The chemical composition of the DDGS samples was determined at the beginning period. Crude protein, crude fat crude fiber, lysine and methionine were 30.5, 2.5, 3, 0.31 and 0.15% respectively. The differences between DDGS in this experiment with the others are depended upon plant species, genotype, climate, and stage of growth, the kind of soil and storage conditions. The results of the first experiment have shown that body weight gain increased in broiler fed 3% DDGS and control (847.31, 846.74). Results showed that 3% levels of DDGS fed to broilers increased body weight gain significantly from 11-21 d ($P < 0.05$). The least body weight gain and feed intake was belonged to 12% DDGS vs. broilers fed 0, 3 and 6% DDGS from 1-21 d. The feed intake decreased in broilers fed to 12% of DDGS in comparison to control groups and the other treatments. Feed conversion ratio was not significantly affected by treatments from 1-21 d. There was not any significant difference between feed conversion ratios in 1-21 day between treatments. There was significant difference ($P < 0.05$) between

1-Assistant Professor, Agriculture Department, Payam-e-Noor University, I. R. Iran.

2-Graduate Master in poultry nutrition in Payam-e-noor University, Agriculture Department, Payam-e-Noor University, I. R. Iran

3-Graduate Master in poultry nutrition in Payam-e-noor University, Agriculture Department, Payam-e-Noor University, I. R. Iran

4-Assistant Professor, Department of Animal Science, Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan, Mashhad, Iran

(* - Corresponding Author Email: h.sepehrimoghadm@pnu.ac.ir)

DOI: 10.22067/ijasr.v13i2.74299

body weight gain in 30-37 days old. The lowest and highest body weight gain observed in birds fed 20% and 5% DDGS, respectively. There was not any significant difference between feed intake and feed conversion in 22-45 days. Villus height decreased to 881.01 μm in 12% containing diets in comparison to the other treatments. Crypt depth was lowest in control (156.79 μm). Effect of DDGS on the histology of jejunum broiler chickens in 21 and 42 days was not significant. There was a tendency for an increased in crypt depth and decreased in villi height as dietary DDGS increased from 0 to 20%, however it was not significant.

Conclusion It can be concluded from this study, in first experiment (1-21 d) the dietary treatments containing 3% DDGS shows better performance in comparison to the other treatment. In second experiment (22-45%), 20% of DDGS was the best treatments for performance.

Key words: Broiler chickens, DDGS, Histology, Performance